




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.462





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.462





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.462



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.462

1.6.462





1-6-462 AI

HERIO-
TROPHEVM
Silefiæ,

In quo
ANIMALIUM,
hoc est,
QVADRUPEDUM, REPTILI-
UM, AVIUM, PISCIIUM,
INSECTORUM

natura, vis & usus sex libris
perstringuntur :

Concinnatum & elaboratum

à

CASP. SCHVVENCKFELD
MEDICO HIRSCHBERG.

Omnibus Philosophiæ, Medicinæ & Sa-
nitatis studiosis profu-
turum.



LIGNICII




*Impensis DAVIDIS ALBERTI Bi-
bliopola Vratisl.*

Anno MDCIII.



1-6-462



MAGNIFICO ET NO-
BILISSIMO VIRO, PIETATE,

literis, prudentiâ, multarumq; rerum
experientiâ clariss. Dn.

IOANNI NOSTITZ

â Noës, in Gros & Klein Strentz,
Ducc. Lignicens. & Bregens. Consiliario, Ducatus
Wolaviensis & Districtus Herrnstadiani Capitaneo,
Domino suo & patrono benignis-
simo S.



On minus verè quàm eleganter, Nobilissime &
amplissime Vir, sapientissimus Atheniensium
Legislator dicere solebat: Αἰεὶ γηράσκω πολλὰ δι-
δασκόμενος, id est, Senesco semper multa addi-
scens. Quo dicto innuere voluit, neminem
esse tam felicem tamq; fortunatum, licet inge-
niosissimus ab omnibus judicetur, qui omnium rerum cogniti-
onem exactè & perfectè habeat, sed toto vita curriculo nobis
perpetuò esse discendum, secundum illud Poëte:

Discimus & morimur: Schola Vita est nostra sub ipsam

Usq; necem: doctus cetera disce mori.

Solon ut summus Philosophus, imbecillitatem quidem inge-
nii humani & tenebras in Hominis mente quodammodo per-
spexit, sed ut Ethnicus, veram & genuinam causam, utpote
Dei verbo, quod Lucerna est pedibus nostris, non instructus,
ignoravit. Nos verò Christiani, quibus Jehova benignus &
misericors ex mera sua gratia & bonitate in Verbo volunta-
tem suam revelavit, ex fontibus puræ & sanioris Philosophiæ
scimus, Hominem à summo Rerum Conditor, ex Corpore &
Anima fuisse coagmentatum, immortalem, nulli neq; mutatio-
ni neq; perpeffioni, si in justitia perstitisset, obnoxium: intelli-
gentem, rationalem, hoc est consilio, mente, cogitatione, pruden-
tia

EPISTOLA

tia praditum, partim ut vitæ suæ auctorem coleret, partim ut
 hanc Rerum universitatem Mundiq; ornatum contemplaretur,
 partim ut deinceps cum reliquis Hominibus vitæ societatem
 placidè & quietè coleret. Impressit præterea Divinitatis suæ
 imaginem, quæ consistebat in justitia, probitate, sanctimonia
 ceterisq; divinis virtutibus, & ut breviter dicam, erat tan-
 quam Deus aliquis terrestris, vita beata & immortalis omniq;
 rerum scientia à Deo donatus, nullis neq; vitiis, neq; morbis aut
 casibus ac perpeffionibus subjectus, cui terrarum omnis ambitus
 fruendus datus erat: peculiariter verò ad habitandum & co-
 lendum certus hortus omnium amœnissimus, qui Paradysus di-
 cebatur, destinatus; in quo tanquam pulcerrimo, amœnissimo
 & delicatissimo Viridario, non otio vanisq; artibus se dederet,
 sed Deum & Procreatorem suum verè agnosceret, celebraret,
 in fide atq; imperio ipsius permaneret, omnia illi accepta ferret,
 eoq; nomine pietatem, cultum ac venerationem præstaret. Hu-
 ic à vitæ Auctore, Arbores binæ, tanquam Religionis notæ atq;
 indices assignabantur: una erat vitæ, cujus fructum certis die-
 bus ederet; altera Notitia boni & mali, cujus poma ne attingeret
 interdictum erat; fore enim, si adversus edictum hoc
 faceret, ut morte sit moriturus. Adamus hac florente & be-
 ata vita cum frueretur, à Satana, qui felicitatem hanc ei invidi-
 debat, specie serpentis astuti & fraudulentis, blanditiis verbo-
 rum (quod persuasus, si Arboris illius pomis vesceretur, futurum
 esse, ut quasi Jehova Deus esset, libertate uteretur, suaq; sibi ar-
 bitratu viveret) à sui Creatoris fide atq; obsequio abductus, in
 perditam arrogantiam delapsus, contemnere summum illud Je-
 hova interdictum cepit, vetitæq; Arboris fructu vesci. Quo fa-
 cto Homo miserrimus, qui sibi meliorem conditionem & felici-
 tatem, quam ipsemet Deus protoplastes concesserat, promitte-
 bat, in tantas derepentè tenebras prolapsus ac devolutus est, &
 pelago calamitatum quasi submersus, ut non solum veste justiti-
 æ & innocentia fuerit spoliatus, ac pristinam dignitatem a-
 miserit

DEDICATORIA.

misericordia, Verumetiam omnium virium actionumque languorem, imò totius Naturæ depravationem sibi accersiverit. Pro Libertate enim (quam ipsemet sibi somniabat, & Satanas astute ac callide pollicebatur) servitutem perpetuam, pro justitia injustitiam, pro luce tenebras, pro scientia ignorantiam, pro sanitate firma Morborum mille myriades, pro vita denique jucunda & perpetua calamitates infinitas & mortem aeternam reportavit. Quemadmodum enim Pueri, qui jucundo ac suavi aspectu illecti, poma Mandragoræ aut baccas Solani furiosi degustarunt, sapore, tremore, convulsionibus, amentia & aliis gravissimis symptomatibus corripiuntur, ut etiam mente conturbati, calido nativo suffocato (nisi mox antidotis vis maligna reprimatur) succumbant & intereant: ita esus pomi vetiti in Paradiso Hominem tantoperè depravavit, ut instar Opii hausti non saltem actiones omnes Corporis enervavit; verumetiam Mentem ejus adeo pervaserit, ut somno alto quasi sepultus, stupidus & attonitus oppressus fuisset, nisi Samaritanus φιλάνθρωπος Jesus Christus, verus Medicus & Salvator, ejus calamitate motus, in continenti alexipharmacum efficacissimum ei porrexisset, vulnus alioquin Telephium & immediabile balsamum gratia infundens obligasset, & spiritus vitales penè dissolutis vino salutis colligendo recreasset, exhilarasset, firmasset. Et ut ii, qui Opium aut aliud fortius narcoticum sumserunt, longo post tempore, quamvis restituantur, ejus virulentiam in Cerebro ceterisque Corporis partibus & actionibus persentiunt: sic venenum illud, quod Adamus ex pomo comestis contraxit [et si Christi merito adeo fuerit repressum & perfractum, ut amplius nulli eum vera fide amplectenti ad salutem obesse queat] adeo Hominis substantiam universam intoxicavit, ut tota vita tempore contagium illud, peccatum nimirum & omnium actionum torpor & imbecillitas percipiantur, donec tandem morte corporali in terra tanquam magno destillatorio resolutum & penitus separatum fuerit. Hinc illi lacrumæ! hinc

EPISTOLA

imaginis divinae in Mente humana destructio, hinc omnium
 rerum ἀταξία, virium omnium & facultatum infirmitas & e-
 nervatio: ex hoc fonte Artium cum liberalium tum mechani-
 carum addiscendarum difficultas & labor manarunt. Quod
 si Homo mandato Creatoris sui obediens fuisset, omnia facile ac
 perfecte sine labore absq; molestia novisset: quemadmodum le-
 gimus in Sacris, Adamum ante lapsum tanta sapientia fuisse
 illuminatum, ut non solum habuerit exactam omnium rerum
 cognitionem, verumetiam ex primo intuitu Animalis univer-
 sam ejus naturam & vires perviderit: at post defectionem, eti-
 am si totum vitae tempus ad inquisitionem harum rerum conse-
 ramus & quotidie proficiamus, nunquam tamen eam perfectio-
 nem, quae antea fuit, assequemur. Quamobrem, cum omnium
 rerum oblivio hominis mentē ceperit, non est quod quisquā sibi
 imaginetur in hac vita perfectionē, sed quo diutius in hisce ter-
 ris est superstes, eo plura semper, quae discenda sunt, inveniet.
 Imperscrutabilia enim sunt opera Dei, adeo ut neq; Senib[us] [licet
 senect[us] venerabilis, ut inquit J.C. in l. semper ff. de jure immu-
 nitatis, & melior sit umbra Senis quā gladius juvenis] studi-
 um discendi abjiciendum: ad exemplum J.C. Pomponii, qui in
 l. apud Julianum ff. de fidei commiss. libertate inquit: Ego
 discendi cupiditate [quam solam vivendi rationem in octavū
 & septuagesimum annum aetatis duxi] memor sum ejus senten-
 tiae, quam dixisse fertur Julianus: Ἐάν τὸν ἐν γοῦ πὸ δ' αἰ ἐν τῇ
 σὺν ἔχω, προσμαδῶν τὴ βουλὴν αὐτῷ, id est, Etsi alterum pedem
 in sepulcro haberem, adhuc addiscere quid vellem. Idipsum
 confirmat venerandus senex Medicorum facile princeps Hippo-
 crates Coss, qui scribit Artem Medicam longiorem esse, quā
 ut Homo etiam si diutissime vivat, eam perfecte assequi possit;
 cujus rei causam assignat lib. 1. Aphor. 1. Vita, inquit, brevis,
 ars longa, occasio praeceps, experimentum fallax & periculo-
 sum, judicium difficile. Nec verò satis est, Medicum fecisse su-
 um officium, nisi quoq; Aegrotus, suum Astantes faciant, sintq;

externa

DEDICATORIA.

externa ritè comparata. Brevis est vita duplici ratione. Primò si conferatur cum longævitate prioris seculi. In prima Mundi atate Hominum vita fuit longissima. Adamus enim primus homo annos vixit 930. Enos 905. Jared. 962. Omnium diutissimè in his terris immoratus est Mathusalem, qui vitam ad nongentesimum sexagesimum nonum annum perduxit: Noachus vivendo attigit annum 950. postea paulatim ceperunt decrescere & imminui anni. Abrahamus enim moritur anno atatis sue 175. Isaacus 180. Jacobus 147. veluti ipsemet coram Pharaone Aegyptiorum rege conqueritur. Dies, inquit, peregrinationis vite mea centum triginta annorum sunt, parvi & mali, & non pervenerunt usq. ad dies patrum meorum, quibus peregrinati sunt. Moyses vir Dei Psalm 90. idem confirmat cum ait: In diebus ipsis annorum nostrorum sunt septuageni anni, aut [ut simus valentissimi] octogeni anni, etiam excellentissimum eorum, laboriosum est & molestum, quo festinè exciso avolamus. Hac ultima & decrepita Mundi senectù, propter magnitudinem peccatorum in genere humano usq. adeo decurtati sunt dies vite nostra, ut eam potius umbram judices, si cum Majorum atate comparatur. $\chi \delta \iota \sigma \iota \epsilon \phi \iota \lambda \iota \sigma \tau \circ \iota$, inquit Hiobus 8. sui libri capite, id est Hesterni sumus & ignoramus, quoniam sicut umbra dies nostri supra terram.

Nascentes morimur, finisq. ab origine pendet.

Dein Vita nostra brevis dicitur facta collatione ad artem Medicam, ut de ceteris Artibus hoc loco nihil dicam. Hac enim multarum & maximarum rerum cognitionem requirit. Primo, proprium subjectum, Corpus nimirum humanum considerat, admirabilem ejus fabricam naturamq. explorat, omnium partium numerum, situm, naturam, usum, harmoniam, organa functionibus famulantia perpendit: Hinc causas, quae fabricam hanc & naturam conservant, quaeq. eandem destruunt & demoliuntur, inquirunt: Tandem indagat presidia, quibus ea, quae Elementorum concordiam turbant, & omnis generis mor-

bos

EPISTOLA

bos accersunt, propelluntur. Quapropter cum singularem Stir-
 pium, Animalium, & quæ in Terra visceribus genita eruuntur,
 Metallorum nimirum, Lapidum, Gemmarum, Succorum, &c.
 Eorum item, quæ ex Mari & aquis extrahuntur, vires Ars Me-
 dica explicet, hæc omnia Medico cognoscenda sint, fieri vix po-
 test, ut unus Homo omnia invenire, discere & perficere possit:
 siquidem Memoria debilis, tempus vivendi breve, & materia
 ejusmodi non uni Terrarum loco à Deo concessa, sed longè la-
 teq; per Terrarum orbem diffusa sit. Stirpium, quas solum
 Silesiacum producit, & Fossilium, quæ terra eruuntur, Cata-
 logum seu Indicem in tyronum gratiam ante triennium publici
 juris feci. Quoniam verò inter ea, quæ Medicinam facere vo-
 lenti summopere necessaria sunt, haud postremum locum obtinent
 Animalia, quippe sine horum cognitione, vix dietam conveni-
 entem agro prescribere, multo minus pharmaca seu prasidia,
 quæ ab iis desumuntur plurima, commodè propinare liceat, ut
 Memoriae inservirem, quæ labilis est, & studiosis gratum facerem,
 amicis urgentibus, Patriæ nostræ Silesiæ Animalia, quæ passim
 & variè dispersa, partim in aëre volitant libero, partim oberrant
 in sylvis, aut Montium recessibus, accessu aliòquin difficilissimis
 vitam peragunt, partim in terræ latebris occultantur, partim
 deniq; in profundis aquarum gurgitibus stabulantur, aut lim-
 pidis Montium rivulis delectantur, certo & angusto quasi vi-
 vario includere volui: ex quo tyrones, eorum formam, colo-
 rem, differentias, partes, locum, vitæ genus, mores, natu-
 ram & usum sine magno labore cum voluptate addicerent,
 & tanquam ex promtuariorio ad sanitatem conservandam,
 Morbosq; propulsandos, non ferinas modò & delicatas, sed
 salubres carnes ac pharmaca in usum Hominis depromere
 possent. Ut enim Remedia, quæ ab Animalibus petuntur,
 facilius quàm Stirpes & Mineralia, ob innatum humo-
 rem superfluum viciantur, minusq; durant, præsertim quæ ali-
 unde ex remotis terris acquirere oportet, sæpè semiputrida
 à Vermibus

DEDICATORIA.

à vermibus erosa inutilia ad nos feruntur: sic multò magis è re feret, Medicū diligenter considerasse domi nata & sua regione seu patriæ propria, (utpote à quibus possit habere remedia genuina, recentia, vegeta, incorrupta) quàm neglectis inquilinis, exotica solū eligere, situ, squalore & vetustate labefactata & viciata. Nec medico solū utilis Animalium contemplatio, verumetiam Homini Christiano summa admiratio de infinita Conditoris potentia, sapientia, bonitate, administratione accedit. Nullum enim Animal tam exiguum, nullum insectum tam minutum, in quo non aliquid summum, illustre, rarum, imò non aliquid divinum spectetur. Præclara, ait Siracides, cap. 43. v. 27. sunt Jehovæ opera & mirabilia, varia bestiarum genera & omnium pecorum & creatura beluarum. Item v. 36. Multa abscondita majora his, pauca enim vidimus operum ejus. Et Psaltes Psalm 104. v. 3. Sit honor Jehovæ in seculum, letetur Jehova in operibus suis. Taceo voluptatem, quæ Philosopho ex harmonia, varietate, colore, cantus suavitate, concentu vario, & mira loquacitate suboritur.

Patriarchas legimus pecoris ditissimos ac studiosissimos fuisse. Jacobus sui avunculi Labanis, Josephus, Isaaci, & David patris sui gregem parvit. Solomon Rex omnium sapientissimus, sicuti ex libris Regum constat, præter historiam plantarum, etiam Animalium naturas diligentissimè exploravit, & Avium, Reptilium ac Piscium historiam consignavit. Alexander, qui propter rerum gestarum magnitudinem Magnus dictus, Macedonum Rex, inflammatus cupiditate Animalium naturas noscendi, Aristoteli, summo in omni doctrina viro hoc munus delegavit, eiq; autor fuit, ut per Aucupes, Pastores, Venatores, Piscatores & alios quoscunq; eorum naturas diligenter percontaretur & exploraret; unde libros de Animalibus quinquaginta condidit; ob quem laborem cum ei obtulisset

b octingenta

EPISTOLA

octingenta talenta muneris in loco rependisse ex historiis constat.

Romani prisce non alium in finem ex remotissimis terris Animalia varia & bestias indomitas Romam adduci magnis sumptibus curabant, eaq; vivariis veluti carceribus coercita alebant, quàm ut eorum naturas investigarent: unde etiam Theriotropheia, Ornithones, Piscinas, Aviaria passim extruebant. Quare si eximios Dei viros, Reges potentissimos, Medicos excellentissimos, Philosophosq; doctissimos non puduit cum summa admiratione Creatoris, perpendere & inquirere Animalium naturas, cur nobis dedecori esse putemus, si huic studio aliquid temporis tribuamus? Divus Paulus Apostolus propterea Ethnicos inexcusabiles pronunciat, quòd Deum, quem ex operibus agnoverunt, non coluerint. Hinc Sirac. 43. & 32. Glorificate Dominum, quantumcunq; poteritis, supervalebit adhuc & admirabilis magnificentia ejus. Tibi verò, Vir Nobilissime, hunc laborum meorum factum offerre, dedicare & consecrare volui. Primum quòd Tibi præter L. L. doctrinam, cui natura ductu Germaniæ & Galliæ Academiæ, & præsertim celeberrimam Parisiorum Scholam frequentando, animum applicuisti, imprimis veræ pietatis, sanæq; doctrinæ, & aliarum liberalium Artium studia summopere sint cura. In te enim omnes hoc suspiciunt & admirantur, quòd ad generis nobilitatem, & nominis splendorem, exemplo clarissimorum olim in Repub. virorum, liberalium Artium cognitionem & literarum studia adjunxeris. Deinde quòd tanto amore prosequeris Artem Medicam, ut non solum valde familiariter utaris Medicorum consuetudine, verum etiam ipse simplicium medicamentorum, quantum tibi per graviora negotia licet, inquiras, consignes, & pauperculis subditis tuis, quibus res angusta domi, jam egrotantibus gratis pharmaca subministrare non dedigneris. Insuper, ut publicum extaret testimonium amoris mei erga T. M. summi, & ut grati animi

VI

DEDICATORIA.

ti animi erga eximiam tuam in me voluntatem, quæ mihi multis argumentis perspecta est, aliquam significationem darem. Tantamenim sensu jam elapso anno, dum thermas nostras valetudinis ergo visitasses, tuam in me benevolentiam, ut nullo officio compensare posse existimem. Demum ut esset quasi preservator sanitatis, sine qua Homini nihil utilius dari potest, nihil gratius, nihil suavius esse potest. Cum enim preservatio ab Arthritide & Calculi torminibus, quibus sæpe graviter dive-xaris, ut plurimum consistat in proba & exquisita victus ratione, legitimorumq; prophylacticorum usu, quæ absq; cognitione hujus materie vix potest attentari, reperies ea hoc Theriotropheio, quæ eligenda, quæ vitanda sint, non pauca ἐνκόμισα, si adjunxeris Stirpium & Mineralium Catalogum, quæ mali utriusq; vim infringant, Corpusq; ab ejusmodi molestiis liberent.

Abs te itaq; quod reliquum est, Vir amplissime, summo-pere peto, ut hocce munusculum serena fronte tranquilloque animo suscipias, me unâ cum meis commendatum habeas. Deus Opt. Max. qui universum Terrarum Orbem sua omnipotentia & providentia regit & gubernat, T. M. Ecclesiæ, Reipublicæ, Patriæ, quâ diutissimè conservet, ac indies toti familia tuæ nobilissimæ largiter benedicat. Vale. Cervimontii Anno 1603. 20. Maii, quo patria mea dulcissima Gryphiber-ga, (proh dolor) ex improvise subortis ignibus tota in cineres redacta est, quod hoc Eteosticho Dn. Casp. Conr. continetur.

MaII LVX VICena poLo nItet eCCe sVperno,
Vt rVIt In CIneres heV GrIfeberga LeVes.

Amplitud. V.

A

CASPAR SCHVENCKFELT
M E D. D.

b 2

Catalogus

CATALOGUS AUTORUM,

quorum opera in hoc Theriotropheio
usus sum.

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ælianus | Felix Platerus |
| Albertus Magnus | Ferrantes Imperatus |
| Alciatus | Francif. Valeriola |
| Anaxagoras | Francif. Massaria |
| Andreas Libavius | Fulgosius |
| Angelus Politianus | Gabriel Fallopius |
| Annales Vindelicæ | Galenus |
| Antonius Gvainerius | Georg. Agricola |
| Aristophanes | Georg. Fabricius |
| Aristoteles | Gvido |
| Athenæus | Gviliel. Rondeletius |
| Avicenna | Had. Junius |
| Autor Philomelæ | Hesiodus |
| Baptista Fiera | Hesychius |
| Baptista Mantuanus | Hieronymus Cardanus |
| Beda | Hippocrates |
| Bellonius | Homerus |
| Biblia Sacra | Jacobus Hollerius |
| Caspar Bauhinus | Joh. Bauhinus |
| Caspar Peucerus | Joh. Bodinus |
| Celsus | Joh. Fernelius |
| Cicero | Joh. Goropius |
| Columella | Joh. Wierus |
| Columbus | Isidorus |
| Conradus Gesnerus | Jul. Cæsar Scaliger |
| Conradus Lycosthenes | Lambertus Danæus |
| Dioscorides | Levinus Lemnius |
| Diphilus | Macrobius |
| D. Ambrosius | Manilius |
| D. Augustinus | Marcus Varro |
| D. Basilus | Martialis |
| D. Hieronymus | Mizaldus |
| Eustathius | Nicander |

Nigidius

Nigidius
 Olaus Magnus
 Oppianus
 Orpheus
 Ovidius
 Palladius
 Paræus
 Paulus Agineta
 Paulus Eberus
 Paulus Jovius
 Perottus
 Petrus Gyllius
 Petrus Andreas Mattioli
 Philemon
 Pisanelius
 Plato
 Plinius
 Plutarchus
 Pollux
 Porphyrius
 Praxagoras
 Proclus

Q. Serenus
 Rabi Moyfes
 Rembert. Dodonæus
 Rhazes
 Ruellius
 Scribonius
 Seneca
 Sophocles
 Strabo
 Suidas
 Sylvius
 Theocritus
 Theodorus Gaza
 Theophrastus
 Turnebus
 Virgilius
 Ulysses Aldrovandus
 Wottonius
 Xenophon,



b3

AD

AD CL. VIRUM
D. CASP. SCHWENCK-
FELTUM,

De Tractatu ipsius Zoographico.

NOSSE DEUM & sese veré sapientia prima est,
Ultima nec, reliqua & nosse creata DEI.
CHRISTUS Doctorum Doctor ter maximus unus
Doctores nostros hæc creat atq; vocat :
Ad volucres, inquit, vestros attollite vultus,
Inspicite inculti & florida prata soli,
Ex his non dubia & Patri confidere mente
• Discite, qui certa cuncta tuetur ope.
Hujus ab exemplo doctus, Clarissime Doctor,
Si patriam sic vis nosse creata tuam,
Grata tuo tua sunt & grata futura futuro
Sæclo, posteritas si qua futura pia est.

M. NICOLAUS LUDOVICUS
Scholæ Lig. Rector.

In opus Physicum D. D.

CASPARIS SCHWENCK-
FELDII &c.

INdubio est ob te, SCHWENCKFELDE, Silesia magno,
Plus uter ex vobis debeat alterutri.
Ipsa tibi vitam, & quidvis dedit artium, opumq;
Tu vitam ipsi, artes, reddis, opesq; datas.
Reddis, quæ data sunt : patriæ tu plurane debes ?
Das, quod non reddat : debet ea æne tibi ?

Das

viii

*Das patria nomen tua per monumenta, facisq; huic
Ut vita, ars & opes sint opera tua opus.
Reddere perge tua patriæ data, plura datisq;
Omnia debere ut gaudeat illa tibi.*

M. JOHANNES AB HOECKELSHOVEN.

IN NATURALEM
SILESIÆ
HISTORIAM
CASPARIS SWENCK-
FELDII, MEDICI
CELEBERRIMI

ODE ALCAICA.

SICNE ergo Soles atque Proserpinas,
SWENCKFELTE, totas non Cerebri sine
Sudore multo, ponderosis
Est operis amor immoriri;
Somniculosi ut raro aliquid tibi,
Quamvis per astum vinque, papaveris
Indat laborum pertinaci
Latinius Endymion, quietis
Statæ madescens largius umidam
Vapore frontem & tempora languida ?
Menses per omnes arduorum
Mole frequente negotiorum

Quantum

Quantum occuperis, novimus; & tuo in
Lare hospitali vidimus : anxie
Nunc CERVIMONTANO popello
Viva tuæ sitiente Hygeiæ
Pocilla : nunc & finitimis opem
Tuam obstinatè sollicitantibus
Tam civibus, quàm conglobatis
Nobilium agminibus virorum;
Glebosa amœnæ jugera SLESIDOS,
Et imminentis rura BOHEMIÆ
Gaudentium impressis aratris
Findere, divitiore censu.
Qvos languentes Pœonium in modum
Succinctus herbis vividioribus
Succo & salubri tam recoctos
Et vegetos dare suesti : utrumque ut
Porrexe gnatum non Epidaurii,
Neque Æsculapum pharmaca credui
Præsentius, per tempe habentes
Thessala, seu Pelopis rotundâ
In Cherronêso. Proin' quasi nuspiam
Alii labores suppeditent, ita
Miracla Naturæ proprium
SLESIDOS indigenis abundè
Indulta terris munere Cœlitum
Indagine acri nec sine Apolline
Rimaris. Agros perque vastos
Vidi egomet, patriosque montes
Te curiosum ferre pedem; undique
His congerendis, quæ facerent rei &
Telæ institutæ. Vidi & hujus
Ipse domi penoris stupendas

Nuper

IX

Nuper struices ! Segrege in arculā
Quævis videndam se species dabat :
 Heic stirpium discrimina, illic
 Cernere erat genus omne Gemmas,
Nostris repertas finibus, haut sine
Argenti & Auri ac Fossilium omnium
 Dite apparatu. Sentientum
 Sæcula mille alibi figuris
Diversa miris adspiciebam; uti
Jovis sereni filiolas, Aves,
 Gregesque nantum squamivestres,
 Reptiliumque Animalculorum
Spectacula plusquàm mirifica : ut Parens
Natura nostro sub Jove nil feré
 Vi Dædalæa existimetur
 Subter humum, inque eâ, & ex eâdem
Profeminare, aut gignere in aëre
Aquisve rari & monstrifici, in tuis
 Compendiosum quod locare
 Hospitium laribus recuset.
At non in arcis has tacitis tibi
Gazas acervas lividus : omnibus
 Sed possidendas liberali
 Distribui gaudes papyro;
Doctâ papyro, congenitabilem
Naturam & usum ac vim generum ratam
 Delineanti singulorum,
 Et methodo facili stiloque.
Nondum ter acrem signa per obvii
Phlegonta Phœbus Zodiaci rapit,
 De PLANTULIS ex quo peritum
 FOSSILIBUSQUE anui dedisti

c

Librum

Librum Ævitati; nunc ANIMALIBUS
Super docendis auctor idoneus
Idem æmularis : quod bonum sit.
Maçtè GenI atque operæ beatæ
SUENCKFELTE sollers ! Maçtè o Apollinis
Germana proles ! Scilicet hoc pol est,
Hoc est benignam præbuisse
Materiam Patriæ inquilinis;
Dantis JEHOVÆ tot bona tantaque
Deprædicandi : hoc nempe reciproca est
Rependere Altrici benignæ
Præmia promeritasque grates.
Hoc est, Lucernam non modii invido
Damnare claustro : sed patulam suis
Aptare Lychnuchis; ut almæ
Munera lucis alijs ministret.
Silvas SABOTHIS montibus arbitrer,
Ferasque filvis, gramina pascuis,
Pisces abundanti VIADRO
Defore, aves per inane magnum
Non serius : quàm nominis in tui
Clarore telam texet Arâneus;
Famamque Lethæus tuorum
Sustulerit meritorum Obâter.

M. MEL. LAUBANUS
Illustris Gymnasii Goldberg.
Pro - Rector pangeb.

Ad



Ad Patriam Apostrophe.

Nomina Scribenti pecudum, volucrum atq; ferarum,
Et quæ plura foves, Slesia, jure faves.
Alma fave, firmaq; gradus constanter, & illum,
Atq; via simili quos juvat ire, fove.
Ut faveas, foveasq; satis tibi censeo causa :
Quod, qua sis, mundo jam propè scire datur.
Nimirum istud habes modò munere Palladis, in te
Quæ sedem à Grajo transtulit orbe suam.
Teq; locans cælo, diversas extudit artes,
Et campum ingeniis pandit, amore tui.
Ne, veluti quondam, lateas, cum scilicet essent
Hæc loca pellitis barbariora Scythiis.
Nunc nulli cedis terrarum. Et tempore nullo
Ut cedas ulli, munus habeto Dei.

M. ANDREAS CALAGIUS
Vratislav.
P. C.

IN CL. VIRI
D. CASPARIS SCHVVENCK-
FELDII PHYSICI REIPUB.
Hirschbergensis Ordinarii

THERIOTROPHEUM
SILESIACUM.

*Parodia ad Od. 1. lib. 2.
Horat.*

MOrbum ex peracto crimine noxium,
Morbique causas, & genera, & modos;
Virésque Parcarum; gravésque
Lethi inimicitias, & ausa
Nondum expiato tetrica corpore,
Laboriosi plenum opus ingenI
Versas: & sublevas misellos
Suppositos Lachesi severæ.
Paullum perennis cura negotii
Relinqvat ædes: mox, ubi publicas
Res factitatis, grande munus
Pansophico repetis calore.
Prædulce cunctis præsidium malis,
Et concidenti, vir bone, corpori,
Cui Phœbus æternos honores
Antidoto peperit salubri;
Jam nunc sonanti murmure turgidas
Rimaris undas; jam nemora expetis:
Jam cura naturæ volantes
Quærit aves, aviumque formas.
Videre pisces jam videor vagos
Non impedito carcere conditos:

Et

Et cuncta brutorum subacta,
Præter atrocem animum Unicornis.
Boa & repentum quodque nocentius
Silesianâ vixerat inscium
Tellure; cunctorum at figuras
Tu libro in hoc prior edidisti.
Qvis non celebri carmine doctior
Vates Camœnis grande negotium
Collaudat, & conscripta quæque
Slessacis animata terris?
Qvis Cous? aut quis non celebrat Sophus
Opus venustum? quis Physices amans
Non concinit magnum laborem?
Quæ tacet ora Librum ævi-clarum?
Sed ne relictis, Calliope, modis
Coi retardes nomina Phœbici,
Parnassico mecum sub arvo
Tange chelyn graviore plectro.

M. CASPAR CONRADUS P.L.



In

In Historiam five Catalogum
Animalium Silesiæ,

*Viri Clarissimi & Excellen-
tissimi Dn.*

CASPARIS SCHVVENCK-
FELDII

PHIL. ET MED. DOCTORIS
ac Reip. Hirschberg. Physici
Ordinar.

EPIGRAMMA.

Qui nuper stirpes & fossile quodque docebas,
Quod modò sub terra viscere Slesis habet.
E terrâ ad cælum scandis, scribisq; volucres,
Quas modò sub cæli culmine, Slesis habet.
Addis & innumeras pecudum pecorumq; cohortes,
Atq; hominem, qui illas nobilitate prait.
Omnia scribuntur, quæ cerni animalia possunt,
Et Grajà & Latîa scripta leguntur ope.
O opus auditu rarum! visuque venustum!
O opus & lectu dignum & amore hominum!

IN EUND. CATALOGUM
&c.

Parodia Odæ Horat. 29.
lib. 1. Carm.

Caspar, vetustis nunc Arabum invides
Libris: & altam quæris adoream,

Non

Non ante descriptis Silesis
Alitibus, variisq; brutis
Addis nitorem, quæ tibi Apollinis
Sopho-Medenti numina servient?
Phæbus quis in mundo capillis
Ad genium statuatur auctis,
Doctus volucres dicere Slesicas
Venâ politâ? quis neget urnulis
Doctum reduci posse Côm,
Tristibus, & Medicam reverti?
Cum Tu probatos undiq; nobiles
Libros Medentum, Slesiacum & solum
Ornare scriptis eruditis
Pollicitus meliora pergis?

BALTH. EXNERUS Hirschbergius
 JC. & Poeta Cæsarius f.



PSALM


PSALM 103. V. 22.

Benedicite Iehovæ omnia
opera ejus, in omnibus
locis Dominationis ejus.



LIBER PRIMUS
Animalium generalis con-
sideratio.

ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
SILESIÆ.

 Hæ, θηρίον τό, feram
aut beluam veteri-
bus propriè signifi-
cat. Interpres Dio-
scoridis non, simpliciter pro
fera, sed veneno obnoxia be-
stia, ut Vipera; Lupo, accipit.
Hinc θηρίον, á Medicis dice-
bantur pharmaca ex plurimis
simplicibus, industria singu-
lari, sumtu maximo conge-
sta, composita & arte permi-
sta; vel quód illarum carnes,
ut Vipera recipere; vel poti-
us quód earum venenis ad-
versarentur. Interdum θηρί-
ον vocabulum etiam de Le-
poribus, Avibus & aliis Ani-
malibus, veluti apud Xeno-
phontem, intelligitur. Ex hoc
lata significatione componi-
tur θηρίοτροφείον. Ein Thier-
garten Vivarium in quo fera
aluntur. Erant. n. vivaria se-

pta quædam loca, in quibus
feræ vivæ pascebantur. *Mar-
cus Varro libro 3. de Re Rustica,*
Leporaria dicit appellari, in-
quiens: Villaticæ pastionis
tria sunt genera, Ornithones,
Leporaria, Piscinæ; alii Ro-
boraria vocant.

Vivaria Aprorum & Gli-
rium cæterorumq; sylvestri-
um primus togati generis in-
venit Q. Fulvius Lippius, qui
in Tarquinienfi septa habuit
jugera 40. in quo erant inclu-
si Lepores, Cervi, Apri, Ca-
preæ, Oves feræ &c. Nec diu
imitatores defuere L. Lucul-
lus & Q. Hortensius.

Gordiano Imperatori eti-
amnum privato erat sylva,
in qua habuit Cervos ducen-
tos, Britannos equos feros 30.
Oves feras albas mille, de-
cem Capreas quas inaurari

A fecerat,

fecerat, Struthiones Mauros
miniatus 300. Onagros 30. A-
pros 150. Ibices 200. Damas
200.

Aviaria primus institu-
it, inclusis omnium generum
Avibus, M. Lælius Strabo,
Brundusii: equestris ordinis,
Ex eo cæperunt Romani
carcere coercere Animalia,
quibus Natura cælum assi-
gnaverat. Plin. lib. 10. c. 50.

Marcus Varro **Qviritium**
doctissimus & elegantissimus,
in Ornithone quem animi
causa constituit sub Casine,
longè vicit non modò arche-
typon inventoris *ἀρχιτυπὸν*
ἀρχιτυπὸν M. Lælii Strabonis, qui
Brundusii primus in peristyllo
habuit exhedra conclusas A-
ves, quas pasceret objecto re-
te, sic etiam in Tusculano
magno ædificio Luculli, ut
ipse Varro tradit lib. 3. c. 3. de
Re Rustica.

In villa Ostiensi M. Seius
habebat greges magnos An-
serum, Gallinarum, Colum-
barum, Gruum, Pavonum,
nec non Glirium, Piscium,
Aprorum, & cætera venatio-
nis, ex quibus rebus Scriba li-
brarius libertus in annos sin-
gulos plus quinquagena

millia é villa carpere dice-
batur.

Piscinas quàm refertas
habuerint preciosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi
Principes, L. Philippus & Q.
Hortensius, quos Cicero Pis-
cinarios appellat, etiam il-
lud indicium est, quod M.
Varro in libro de Agricultura
refert, M. Catonem, qui post
Uticæ periit, cum hæres testa-
mento Lucilii esset relictus,
Pisces de piscina ejus 40. mil-
libus vendidisse. *Macrobius lib.*
3. Saturn. c. 15.

Cochlearum vivaria instituit
Fulvius Hirpinus in Tarqui-
niensi, paulò ante civile bel-
lum, quod cum Pompeio ma-
gno gestum est, distinctis qui-
dem generibus earum, sepa-
ratim ut essent albæ, quæ in
Reatino agro nascuntur, sepa-
ratim Illyricæ, quibus magni-
tudo præcipua: Astricariæ
quibus fecunditas: Solitariae
quibus nobilitas.

Romanos imitati sunt Im-
peratores, Reges, Principes,
Duces, qui voluptatis & recre-
ationis causâ; magnis sumti-
bus aliunde ex remotis ter-
ris, accersitis Animalibus vi-
varia extruxerunt.

Sis

Sic Imperator noster Romanus Rudolphus Dei gratia II. omnis generis bestias, veluti Leones, Tigrides, Pantheras, Urfos, Lynces, Aquilas, Falcones albos, & alia plura, Pragæ in arce regia, certis locis tanquam claustris coercet.

Hodie passim exstant Leporaria Ducum, Baronum, Magnatum, in quibus cum iucunditatis, tum utilitatis gratia, Cervi, Capreoli, Damæ, Lepores, & similia Animalcula pascuntur.

Hunc Animalium Silesiæ discursum Theriotrophei nomine insignivi, eo nomine, quod hic non integra & universa Animalium historia contineatur: sed quorundam saltem & quidem plurimorum, eorumque tum perfectorum, tum Insectorum, partim domi natorum, partim aliunde acvisitorum natura perstringatur. Cujus autorem agnosco, non Q. Fulvium Lippium, non M. Lælium Strabonem, non Q. Hortensium, vel Imperatorem aut Regem aliquem potentissimum: sed summus Rerum Opifex ipsemet Deus Vivarium hoc instituit, qui ut uni-

versum Terrarum orbem tanquam vivarium amplissimum & spaciosissimum condidit, (eumque in certas quasdam classes seu regiones distribuit, variisque non solum Stirpibus ac Plantis adornavit, verum etiam innumera Animalium varietate prospexit, ut Homo, quem tanquam Cultorem & Dominum instituit, inde omnia ea ad Corporis sui sustentationem & conservationem necessaria, ceu ex promptuario quodam desumeret, Animum voluptate recrearet, ac inprimis Deum conditorem suum vere agnosceret & jugiter celebraret) sic etiam pro immensa sua misericordia & bonitate inexhaustibili, hanc terræ partem, quæ Silesia dicitur, adeo benigne respexit, ut quæ olim deserta, inculta, sterilis, & sylvis densissimis horrida, jam fertilis maximeque excolta videatur. Olim erat domicilium gentis feræ, barbaræ, de Deo nullam cognitionem habentis; hodie Dei gratia Populus Deum timens & celebrans hanc incolit: olim latronibus & incursionibus, nec non intestinis bellis dilacerabatur & devastabatur,

A 2

ut peregrinari

ut peregrinari non tutum esset: nunc sylvis densis ac vastis cæsis ac diminutis, in certos Ducatus divisa, oppidis, & pagis innumeris referta est, ut cuius tuto ac secure iter facere liceat. In summa tanta omnium rerum, siue Corporis conservationem spectes siue Animæ salutem consideres, abundantia affluit, ut nulli provinciæ quamvis amplissimæ cedat.

Situs. Positum est in ea Europæ parte quæ Germania dicitur sub grad. longitudinis 38. 39. 40. 41. 42. præter paucas minutas: Latitudinis verò 50. 51. 52. ferè inter Bojemiam, Luzatiam, Marchiam Brandeburgensem & Poloniam.

Figura ejus non rotunda seu circularis, sed tetragoni formæ laterum inæqualium. Longitudo enim quæ miliarium est plusquam quadraginta germanicorum valde superat latitudinem quæ vix est miliarium viginti.

Sepimentum. Munitur natura, Austrum versus muro quadraginta leucarum, montibus videl. Sudetis, qui ab occasu Orientem versus ex-

currunt, Silesiam a Bojemia & Moravia determinantes, tandem cum Carpatho junguntur. A Septentrione & occasu occurrunt vastæ sylvæ cum Viadi parte. Occidentale latus claudunt & obvalant Aquæ ductus qui sunt Luza, Qvadás, Boberus.

*Loca Animalibus
destinata.*

Sunt varia & quamplurima:

Montes Sudetes, Carpathi juga, **Colles**, **Sylvæ** vastæ, **Nemora**: **Fluvii** insignes, Viadus, Boberus, Cattus, Qvadás, Torrentes & rivuli ex Montibus decurrentes innumeri: **Stagna** plurima veluti Cunicense, Slabacense, Culmenense, Brenningense, Ilgenense, Svibocense, Nastich dictum, & alia multa, quæ magnam alunt piscium variorum copiam. **Piscinarii** per universam Silesiam infinitus fere est numerus qui Cyprinos gignunt laudatissimos præter Lucios, Carasas, Erythrophthalmos &c. **Agri**, **Campi latissimi**, **Prata**, **Ericeta**, **Vrbes ex oppida** numerantur centum viginti & plura, **Pagi** ultra

ultra 19000. *Arces* Ducum Baronum, Equitum, Nobilium, Magnatum plurimæ, reticeo *Cænobia*, *Abbatias* & *Canonicorum collegia*, de quibus in Catalago nostro stirpium & Fossilium Silesiæ egimus.

Animalia quæ in hoc theriotropheio aluntur, varia & plurima sunt, ac sequentibus quinque libris offeruntur.

Præfectus est Homo non quivis, sed Silesiacus, cui Deus ex mera gratia hanc terræ partem concessit, ut eam coleret, plantaret, & omnibus cum terræ nascentibus, tum Animantibus in cibo & medicina pro arbitrio cum gratiarum actione frueretur. De cuius origine, propagatione, partibus intermis, externis, cōservatione, destructione, brevi post, si fata vitæ concesserint, peculiari volumine differemus.

DE ANIMALIBUS in genere.

Ζῷον, & πρὸ τῆς ζωῆς ἄ vita. Animans, Animal, sine se habende Creatur. Corpus est vivum anima sentiente præ-

ditum, ut Homo, Leo, Aquila, Delphinus, Angvilla, Mus, Aranea.

Viventia seu Animâ informata Corpora triplicia sunt. 1. *Quædam* Animam obtinent *ὑπερτακτικὴν* nutritivam seu vegetalem, quæ virtute vitali quidem vivunt, pullulant ac germinant, sibiq; simile procreant, sed omni sensu privantur, ut Plantæ & Stirpes. 2. *Aliæ* non solummodo vegetatricis Animæ viribus instructæ sunt; verum etiam sensuum iudicio, cuius opinione ad bonum feruntur & mala declinant, præcellunt, ut Bruta. 3. *Aliæ* deniq; intelligentia & ratione sunt prædita ac reliquorum, nempe vegetantis & sentientis vires omnes sub se comprehendunt, ut solus Homo, qui omnium animalium perfectissimum, rationalis, ad iustitiam & sanctimoniam veritatis secundum Deum fuit conditus, ut reliquis omnibus tanquam Dominus præesset ac dominaretur.

Animalium Differentiæ.

Differentiæ & species Animalium sunt variæ, quæ sumuntur

muntur *partim* ab eorum forma; *partim* á materia five partibus quibus constant, quas alia ab aliis diversas habent; *partim* ab accidente, ut á virtus ratione, á vitæ actu, á moribus eorum, ab usu, á motu, colore &c.

1. Animalium alia sanguinem habent, ut Homo, Equus etc.

Alia Exangvia sunt, ut Apes, vesperæ.

2. Alia vescuntur carne, ut *σαρκοφάγα* Carnivora, *ζωοφάγα*, Leo, Lynx, Lupus, Aquila, Accipiter, Polypus, Lucius, Astacus etc.

alia frugibus, *καρποφάγα* frugivora, ut Apes, Cervus, Boves, Columbus, Cornix frugilega.

alia omnia attingunt *πανφάγα*, Omnivora, quæ herbis, fructibus, vermibus, seminibus vescuntur, ut Ursus, Pica varia, Corvus, Insecta nonnulla, ut Muscæ, Vesperæ.

alia *ιδιότροφα* cibo sui generis utuntur proprio, ut Avis Paradysi aëre, Apes Melle, Aranei venatu Muscarum.

3. Quædam in uno vivunt Elemento:

In Aere ut Volatilia.

in Terra ut Quadrupeda.

in Aqua ut Aquatilia.

quædam in duobus, ut *εμφίβια*, *επαμφότερα*; & vel in Aëre & aqua, ut Ardea, Mergi, Anates &c.

in Aere & Terra Vespertiliores. in Terra & aqua, ut Fiber, Lubra, Crocodilus, Testudo, Ranæ. Quædam in tribus in aëre, aqua & terra, Cygnus.

4. Nonnulla sunt Gregalia, quæ gregatim degunt amicaq; sunt, ut Armenta, Cervi, Sturni, Columbæ, Cyprini, Lampræ, Apes, Formicæ.

Quædam Solitaria, quæ non gregatim inimicaq; vivunt, frequentiam vitantia, ut Leones, Ursi, Lynces, Aquilæ, Delphinus, Silurus, Conger, Struthiones.

Quædam ancipitem vitam agunt, quæ modo societate, modo solitudine gaudet, ut Lupi.

5. Alia *μόνοχροα*, Unicolora, ut Leones fulvi, quorum genus totum habet unum colorem, Corvi nigri, Olores candidi.

πολύχροα Versicolora, ut Cuniculi, Porcelli Indici, Psittaci, *εὐχρόα*, Toticolora, quorum

qvorum Corpus habet quidem unum colorem, sed non omnia ejusdem generis Corpora, ut Bos albus est, at non omnes.

ποικίλα, varia: vel toto genere ut Panthera, Pavo: vel parte, ut Boves, Capræ.

6. Alia sunt Civilia πολιτικὰ καὶ ζῶα, quæ labore communicant, id est qvorum opus communi efficitur opera, munusq; idem omni est, ut Homo, Grus, Apis, Formica. Horum alia sub duce degunt, ut Apes; alia nulli subdita sunt imperio, ut Formicæ.

Incivilia, quæ inter se pugnant, ut Carnivora.

7. Quædam sunt; Cicuta, mansveta τῶν ἀσφαλῶν, ut Homo, Mulus, Canis, Gallinæ, Columbæ.

Fera perpetuò, ἄγρια, ut Lupus, Lynx, Tigris.

non perpetuò, sed interdum mansvescunt, ut Elephas, Ursus, Corvus, Leo. *sec. illud.*

Longa dies homini docuit parère Leones.

8. Nonnulla Stabilia, sede stabili vivunt, quam nunquam mutant, nec peregrinantur, ut Domestica, Con-

chilia, Ostrea, Conchæ, Spongiæ marinæ.

Mutant, sed statuto tempore, ut Grus, Ciconia, Hirundo, Acipenser, Salmo,

9. Alia venantur, ut Lynces, Aquilæ, Bubones, Lucii, Siluri. Recondunt, ut Cricetus, Nucifrangulus, Formicæ, Apes.

10. Alia domicilia sibi parant, ut Talpa, Meles, Vulpes, Formicæ.

nullis includuntur casis, ut Quadrupeda ferè omnia, Insectorum plura.

Cavernas subeunt, ut Ursi, Lacerti, Serpentes.

per summa Telluris degunt, ut Canis, Equus, Armenta. tota hyeme delitescunt. Horum alia sibi annonam parant, cujus ope in vestibulis vescantur, ut Criceti, Apes, Formicæ; alia sine cibo & potu hyemem ferè transigunt ac dormiunt, ut Ursi, Taxo, Mustelarum genera, Serpentes, Glires, de quibus Poëta:

Tota mihi dormitur hyems,
& pingvior illo
Tempore sum, quo me nil
nisi somnus alit.

— 10 —

λογικόν, Rationale, ratione præditum,
ut Homo.

Perfectum,
Εναιμόν,
Sanguineū,
seu sangvi-
ne prædi-
tum;

vel

Animal
aliud

Αλογόν seu
Brutū qvōd
ratione &
intellectu
caret,

aliud

Imperfectum, Εντέμον,
Αναιμόν, Exangve, San-
gvinis expers, ut insecta
qvæ sanguine carent, &
Corpus incisuris distin-
ctum habent. Apis, Hiru-
do, Eruca.

Χερσαῖον ζῷον
extra aquam
degit. Terre-
strium omne
genus qvōd
vivit vel

in

Aëre, ut Volatilia, Volucra,
Aerivaga πτηνὰ vel πτηνικὰ ἢ
ἀερόποδες Plat. qvæ alis & plu-
mis volant binisq; pedibus
gradiuntur, Fliegende Thier/
gestügel.

Terra ut
χερσαῖα,
Terre-
stria
qvæ vel

quaternis pedibus
incedunt, ut τε-
τραποδὰ, πεζὰ, τε-
τραποδῆς, Terre-
stria, Quadrupe-
da, Vierfüßige
Thier.

Pedibus carent, ut
ἐρπυσιαῖα, ἑρπεταῖα,
Reptilia, Serpen-
tes, Lumbrici,
Kriechend Thier.

Υδατοῦ ζῷον, Aquaticum, qvōd in aquis im-
moratur, ut Aquatilia, Natatilia, ὑδατικά
Schwimmende Thier/ qvæ in aqua degunt
victumq; ex humore petunt, nec sine humo-
re vivere possunt, veluti pisces.

Animalium partes.

Pars est corpus naturale consistens toti coherens & ejusdem usui conferens, μέρος. Ein Theil.

Membrum μέλος, κῶλον. Ein Gliedmasse/ Caro artus regens.

Artus Ἀρθρον, μέλη, compages & nodi corporum. Quædam sunt veluti vincula Membrorum quibus articulantur & colligantur, Glieder / Gliedmassen.

Articulus Ἀρθρίδιον. Gelenck / Gleichlin / junctura & nodus Membri.

Corpus σῶμα, δέμας, quasi vinculum Animæ, quo alligatur corpori, Ein Leib.

Corpusculum σωματίον, id est. parvum Corpus, Ein Leiblin.

Corpus mortuum, Cadaver, Cassum animâ Corpus, νεκρός, Ein Leich / Todter Körper / Aas.

Anima ψυχή die Seele. est forma vivificans.

Anima alia est Stirpium, quæ vitam vegetalem largitur.

Bestiarum, quæ cum vegetatione sensum & mo-

tum tribuit. Hominis, quæ vegetalem, sensualem & intellectualem vitam largitur: hæc separata à Corpore per se subsistit & immortalis est: Illa Stirpium & Brutorum perinde ac forma domus aut fenestra perit ædium ruina.

Partes Animalium alia sunt Communes.

Omnibus, ut Cor, Caput, Venter, Os, Oculus, Intestinum.

Pluribus diversi generis, ut Pedes Quadrupedibus, Avibus, Homini.

Proprie seu peculiare tantum Animalium.

Generi, ut pennæ Avibus, squamæ Piscibus.

Speciei, ut Lana Ovibus.

Partium item alia sunt Similares, ὁμοιομερῆ μόρια, quæ sibi undique similes sunt: alia Instrumentaria, Officialia, μόρια ὀργανικά & ἀνομοιομερῆ, quæ ex Similibus constant.

Animalium partes Similares.

Cuticula Ἐπίδερμις, δέμας. Ein Häute/ Felle/ pars similis tenuissima Ce-

B - parum

parum exteriori involucro similima.

Cutis $\chi\epsilon\omega\varsigma, \delta\epsilon\gamma\mu\alpha$, Pellis, Corium, Haut / Fahl / Leder / corpus est nervosum, totam Corporis superficiem exornans atq; protegens, idq; decoris gratia; etiam ut offensam & noxam omnem prohibeat. Contextus perpetuus in omnibus Animalibus, nec alibi interpellatur, quam ubi naturales meatus, ut in ore & excrementorum exitibus & ungribus.

Cutis crassior Brutorum, tenuissima Hominis.

Cutis meatus, Meatus cuticulares *Plin.* Pori, Foramina invisibilia Cutis *Cels.* $\omega\gamma\omega\varsigma$, die Schweislöcher.

Membrana, $\delta\epsilon\mu\iota\omega\epsilon\iota\mu\alpha$ zart Hautlin / pars Cuti prætenui spissaq; similis in sanguineis Animalibus, Cute siccor.

Membranula $\epsilon\mu\epsilon\iota\omega\epsilon\iota\mu\alpha$ Ein Fällchen.

Tegumentum, Animalium: vel Molle: & læve ut Cutis Hominis.

Villosum, Corium Quadripedibus.

Durum continuum.

Corticeum, Oviparis pedestribus ut Testudini.

Crustaceum, Crustatis, Cancris, Locustis, Astacis;

Testaceum siliceum, Ostreis.

Durum non continuum.

pennatum, Avibus.

sqvamosum, Piscibus.

aculeosum Hystrici, Erinaceo.

Pilus, $\sigma\epsilon\iota\varsigma$, crassior & procerior lana. Gignitur ex vaporibus fuliginosis ex Cute prodeuntibus, jam lori formam adeptis. Haar.

Pilos habent Pedestria, qui differunt:

Substantia, dum alii duri, molles, mediocres.

Colore, dum quidam albi, nigri, ruffi, flavi, medii.

Copia, dum pauci vel multi. *magnitudine*, dum longi, breves vel crispi

Pili defunt Avibus, Piscibus, putamine Intectis.

Caro, $\sigma\alpha\varsigma\varsigma, \kappa\epsilon\tau\alpha\varsigma, \delta\epsilon\iota\varsigma\varsigma$ Fleisch / Caro quasi carens vita, est veluti molle fulcimentum & pingviusculum ossibus impositum, ornandi pariter & velandi causa. Aboletur & in venas ac fibras transir, quoties extenuatur Animal & gracilescit.

Vertitur in pingve

pingve, quoties pabuli copia
suppetit.

Caro triplex. 1. sincera seu
propriè absq; fibris, nunquam
per se, sed Musculi pars.

2. Musculosa,

3. Viscerum *παρέγχυμα*,
qualis substantia Cordis,
Jecinoris, Lienis, Renum.

Caruncula *ράγκιον, σαγ-
κιδιον, κρεάδιον* Ein Stücklein
Steisch.

Musculus, *μῦς*, Die
Maus pars ex simplici carne
& villis nervosis contexta.
Media præcipuè Musculi pars
est caro, extrema definit in
tendinem.

Glandula, *Αἴμαρ, Ἐν
Δρῖσι* *Αἰμαρ* *ἐν* *οὐσσοῦν* *σαγ-
κιδίον*, Carni proxima na-
tura, veluti conglomerata Ca-
to, sed exangvis.

Glandulae triplices sunt.

1. densæ, ficiiores, vaso-
rum, venarum scil. & arteri-
arum fulcimentum, neq; sen-
sum neq; motum habent, neq;
nervum ullum.

2. rariores, cavernosæ, fistu-
losæ ac madidæ, spongiæ
in modum, humore imbutæ.

ut salivares, Testes, in Mam-
millis &c.

3. utriusq; generis admo-
dum exiguæ, ut vulgus ipsum
lateant, veluti in Mesenterio.

Pingvedo, Adeps, Axun-
gia generaliter sumitur, pro
cujuscunq; Animalis oleosa
& pingvi substantia, sive du-
ra & concreta, sive liquida &
fluida fuerit.

Adeps, *πῖμα, κνίσσα*, Ar-
vina, Schmer/Schmalz/Sei-
ste. pingvedo subcutanea, seu
oleosa & pingvis substantia,
Sebo liquidior, quæ ad ignem
facile liquefcens difficile rur-
sus densatur, oleo longa ve-
tustate incrassato similis. Gi-
gnitur ex sanguinis parte ma-
gis aëria pingviq; & fluxili,
per tenues venas effusa circa
Animalis membranofas ac
nervofas partes, ubi cogitur
& concrefcit. Reperitur
in Animalibus humidioribus
utrinq; dentatis, non Corni-
geris & multifidis, ut in Ho-
mine, Leone, Urso, Porco,
Cane, Gallina, Aquila, An-
sere.

Sebum, Sepum *σέας*,
Adeps solidior, Duschlitt/vn-

B 2

gel/

get/Τολχ. Crassius & durius.

Adipe: fragile est nec ad ignem tam facile liquefit & funditur, fususq; ac liquefactus celerrime coit ac congelatur. Sebum habent Animalia terrestria & sicca non utrinq; dentata, Cornigera, ut Boves, Cervi, Hirci, Oves.

Axungia, ἀξὺνχιον, Schmalz / Fischtron / Adeps fluidior, Liqumen: Pinguedo est media inter oleum & adipem crassioris consistentia. Raro & difficile post liquationem concrefcit, veluti Piscium, Anguillæ, Testudinis, Lutræ.

Medulla μυελός Dios. ἐν τῷ ὀστέῳ, das Mark in Weizen / alimentum est sanguineum, quod in ossa spinamq; distribuitur, concoquitur & in ipsorum naturam transit. Omnis medulla mollior, calefacit, rarefacit, ulcera replet. Colligitur æstatis exitu, appetente Autumno & hyeme, in usum Medicum.

Vena φλέψ, ἐκ τῆς ἀρτηρίας, Blut / Ader / sanguinis canalis. Non æquæ in omnibus patet venarum series.

Arteria, ἀρτηρία, ἄρτην

vena pulsabilis, sanguinem continens arteriosum, Pulsader / Schlagader.

Fibra, villus, ἵψ, Zädersin / Zäfersin der Ader / Mediæ inter nervum & venam naturæ.

Tendo, τένων, Ἀπὸ τῶν ἰσχυρίων μὲν Gal. Ein Sehne / Seine / SpanAder / naturæ mixtæ, mediæ inter Ligamentum & Nervum. In hos Musculi desinunt.

Ligamentum, συνδεσμός, quo ligantur ossa, Corpus nervosum, album, exangve, solidum sine sensu, concavitate expers, ex osse ortum habens, Os ossi aut Musculum ossi conjungit & tanquam vinculum continet. Haarnachs.

Cartilago χόνδρος Kroschel / Knorpel / ejusdem ferè cum Osse naturæ, ex osse ligamentoq; constans, verum ligamento durior, osse mollior. Inseritur articulis veluti pulvinar, ne attritu mutuo lædantur ossa.

Cartilago: Terrestrium nullo foramine hincit, nec Ossium more medullâ continet.

Aquatilium, Cartilagineis ossibus

ossibus proportionatur, humorem in medullæ speciem continens.

Gressilium Nares, Aures, Extrema, cartilagine constant.

Os, ὀστέον, Os / omnium partium durissimum maximeq; terrestre, naturâ siccissimum. Ossa habent sanguine prædita omnia, quæ ad proportionem tantummodo, duritie, mollitie, magnitudine, figura aut multitudine discrepant.

Paulo differunt Avium ossa.

Proportione eadem sunt piscium, aut aliquod obtinent quod vice fungitur ossium, spinam aut cartilaginem.

Ossa: grandia, ampliter concava & medullosa, Hominis.

Minora, solida ac sine Medulla ferè, Leonis.

Densa et dura, Robustioribus Quadrupedibus, Camelo Pantheræ, Lupo, Eqvo: Avibus, Aquilæ, Accipitri, Corvo.

Laxa, cava & levia, Imbecillioribus Animalibus, Homini, Ovi, Capræ.

Nervus. Νεύρον, Ein Nerve / Nerven / Nerven / Nervus pars est longa, alba, porosa,

per quam sensus & motus à Cerebro in universas Animalis partes diffunditur.

Nervi sunt omnibus Sanguineis: prætenues incerti, Piscibus juxta spinam.

Sanguis, αἷμα, Anima Blut / vitæ thesaurus.

tenuior, crassior, Bubulus sincerior, turbulentior, frigidior, calidior.

Multa de Sanguinis Animalium viribus, à Scriptoribus prodita sunt, quæ factoperculo fabulosa potius & vana reperiuntur quàm vera. Galenus.

Cruor, sanguis ater à vulnere manans, gerunnen Blut.

Sanies, ἰχθὺς inconcoctus sanguis, etiam quod in Exanguibus vicem sanguinis præstat.

Pituita, φλέγμα, sanguis crudus imperfectè coctus, Feuchtigkeit / wässrig / roh Geblütte.

Bilis flava χόλη ξανθή, Galle / Cholera. Humor amarissimus folliculo quodam Hepati adnato inclusus.

Pauca Animalia felle carent, Asinus, Cervus.

Pleraq; habent, idque humidius

midius ac maximé imbecil-
lum, Majora Animalia, Qua-
drupeda, Pisces, Olor.

Subtilius minora, Lynx.

Acrius & ficcius, Aves rapaces, Aquila, Accipiter.

Omnis fellis vis est acris &
excalefaciens, intensis tamen
& remissis viribus.

Bilis atra, μελαγχολία,
χολή μέλαινα, sanguis crassior
seu faculentus, Schwarze
Blut/ Melancholen.

Succus, χυμός, χυλός,
Humor in corpore valente a-
bundans, Safft / qvalis est
Chylus in ventriculo, & Chy-
mus in Hepate.

Genitura, γένος, γονί,
σπέρμα, θορός, Natürlicher
Samen/ Semen naturale, se-
men genitale.

Excrementum, περιττω-
μα, Wust/vnslat/vbersluffiger
vnracht.

Saliva, πτύελον, πτύσ-
μα, σάλιον, Sputum, Geisser/
Speichel/Oris excrementum.

Spuma, Αἰθήρ, Schaum/
sordities quædam ebulliens

in saliva, in sanguine, &c.

Sudor, iſſe, Schweiß /
Excrementum aqueum per
cutem exudans.

Muccus, Mucus, μύξα,
λέμβος, βλέννα, Narium hu-
miditas & crassior pituita,
Ρος.

Lotium, Urina $\xi\sigma\phi$,
Harn/Brims/ tertia conco-
ctionis excrementum fero-
sum.

Alvi excrementum,
 Alvus, Stercus, Merda, κόπρος,
 σκυβαλον, Απόδιον γάστρος,
 Dreck / Kott / Mist / Unflat.

*Animalium Partes
Dissimilares.*

Caput κεφαλὴ καὶ αὐτὸ κεφαλή,
Das Häubt / der Kopff /
superior in Animalis corpore
pars, quæ Cerebrum con-
tinet, & in quo sensus omnes
demto tactu, (qui in toto
Corpore æquabiliter tusus
est) interpretes & nuncii re-
rum, tanquam in arce mirifi-
cæ ad usus necessarios collo-
cati sunt, à quo etiam motus
in universum Corpus, veluti
à fonte derivatur.

Capitulum,

Capitulum, κεφάλιον
Ein Köpfflin.

Vertex capitis, κορυφή
Περίκεφαλον Orph. Der Wirbel
auffm Haupte / Calvæ medi-
um discrimen & æquamen-
tum Capillorum.

Sinciput, βρέγμα, βρεγ-
μὲς pars prior, das vordertheil.

Occiput, Occipitium,
ὠπίον, pars posterior das hin-
dertheil.

Calvaria, Calva, κράνιον
q. κράνιον id est, galea, quod
Cerebrum integat, Hirnscha-
le / Perficitur continuo osse,
Cani compacto ex pluribus,
Homini & reliquis Anima-
libus.

Commisuræ Cranii,
ῥαφαὶ τοῦ κρανίου, ῥαμμαί. Su-
turæ die Fugen der Hirnscha-
le.

Pericranion, περίκρα-
νιον, Cutis Calvariam inte-
gens & capillos generans, die
Haut der Hirnschale.

Corona, στέφανος, τὸ ἐξ ὅ-
μοιο, extremus Capillorum
ambitus Haarkranz.

Facies, πρόσωπον, das
Angeſicht / das Antlitz / pars in

Homine tantum, quæ in prio-
re parte Calvæ subjacet. Quia
Homo unus Animalium e-
rectus est, solus prospicit an-
te versus, vocemq; ante versus
mittit.

πρότομον In pisce & Bove.
ῥάμφος Rostrum, ῥύγχος.
der Schnabel.

Frons μέτωπον ἢ ἴον, με-
σόφρον die Stirne / pars faciei
sub sincipite posita, inter id-
ipsum & oculos existens.

Tempora, κροτάφοι, κρό-
φα. ab utraq; frontis parte si-
ta, die Schläffe / pars inter u-
trumlibet Oculum, Aures &
Verticem.

Oculus, ὀφθαλμός,
ὄμμα Ocellus Ein Auge.

Sinus, Oculi pelvis, Ocu-
li cavum, κόγχος Poll. ωελίς
Ruff. das hohle der Augen Con-
cavæ altitudines, quibus Ocu-
li continentur, quæ Palpebras
circumdant.

Supercilium, ὀφρύς,
ὀφρύων, ῥέσος, ἴλας, Auge-
brauen / Ductus Pilorum supra
Palpebras Ober Augenbrauen.

Intercilium, μεσώφρον
Ruff. Intermedium inter su-
percilia spacium, unde Na-
sus incipit, estq; depile.

Capira

Capita Superciliorum,
 οφρύων κεφαλαί, Partes Super-
 ciliorū, quæ Naribus proxi-
 mæ sunt.

Οὖραι Caudæ quæ ad Tem-
 pora accedunt.

Τύλοι. Pili Superciliorum.

Palpebra, Gena, Plin.
 βλεφαρον, σκύνιον, κάλυμμα,
 pars superius inferiusq; te-
 gens, Visus tunica opercu-
 lumve, Augendeckel / Augen-
 lied.

Palpebra carent Pisces, Inse-
 cta, Crustacea.

Palpebrarum crepido,
 Ελπίστον, Εντετύχωμα, Οσχος,
 Extremus Palpebrarum am-
 bitus, unde Cilia excrescunt.

**Cilium βλεφαρίδες, τάγ-
 σσι, Ruff.** pili, qui extremo
 Palpebrarum ambitui adhæ-
 rent, Augbrauen Haar.

Cilia obtinent omnia quæ
 pilos habent. His carent Pi-
 sces, Insecta & Crustacea.

**Pupilla, Κόρη, Augapffel/
 Augstern / pars oculi media,**
 seu humor quo videmus.

Pupilla rotunda in Homi-
 ne; oblongiuscula veluti ri-
 ma in Brutis.

Oculi nigrum, Oculi

Iris, τόμελαρ καὶ ἱρις, Oculi
 circulus Pupillam ambiens,
 Das schwarze im Auge.

Unicolor omnibus Ani-
 malibus in sua cujusq; specie.
 Atrum Boum.

Cæsum, γλαυκόν,
 Fulvum χαροπόρον, Aquilæ,
 Lynxi, Leoni.

Caprinum Αἰγώπορον, Ca-
 prino generi.

Aquinum ὕδαρον, aqueum
 Ovibus.

Ruffum, aureum seu cro-
 ceum Buboni, Oto.

Versicolor, πολυχρόρον, Ho-
 mini, Equo.

Oculi candidum.
 τὸ λευκόν, σφενδόνη, album
 quod postremo nigrum cir-
 cundat, Das weisse im Auge/
 Simile ferè in omnibus.

πασσάι partes Pupillæ pro-
 ximæ.

Αλωξ, Circulus qui candi-
 do proximus est.

πρίμνον, ultima pars candi-
 di totius.

Ὡς totus Oculorum am-
 bitus.

Anguli Oculorum.
 Radices Oculorum, Εγκαν-
 θίδες, Augenecken.

Κάνθον Oculi angulus,
 pars communis superioris, in-
 feriorisq;

feriorisq; Palpebræ, Augen-
winkel / qvi duplex utriusq;
Oculi.

παγὰι, anguli Oculorum
juxta nares, Augenwinkel ge-
gen der Nasen.

παρωπία, anguli qvi tem-
pora spectant.

Oculi grandiores, Ho-
mini, Lynxi, Aquilæ.

mediocres,

parvi,

prominentes, Muri Co-
rylino.

conditi.

Auris, Οἶς, Ακοή, Poll.
Ακουσμα, Das Ohr / pars Ca-
pitis qvâ audimus.

Auricula exterior, Omnis
Cartilago Aurem ambiens.

Auricula, πτερυγία,
qvâsi Ala seu pinna, πτερυγιον,
Auris Cels. Ohrsepslin / Constat
solum Cartilagine & cutē.
Cartilaginea pars Auriculæ
latior.

Auricula infima, Ansa
Auriculæ, λόφος, Kropfel am
Ohr. Auriculas habent par-
vas seu perexiguas :

immobiles Homo.

mobiles Bruta.

Majores, Asinus, Cervus,
Lepus.

Auriculis carent Aves, Pis-

ces. Qvæ penna, cortice
aut squama integuntur, iis
patet meatus auditorius.

Capreolus, ἑλῖξ, Ruff.
κοχλία. Poll. exterior Auricu-
læ ambitus, Der Ohrenrand.

Scapha, Ἀνδελῖξ, σκάφος,
Poll. pars interior, anfractus
cochlææ similis, definit in os
qvod Auriculam planē imi-
tatur.

Concha, κόγχη, κόγχιον,
cavum Auriculæ.

Auris meatus, πῶρος
ἀκυστικός, Ακοή. Ruff. rotun-
dum qvod in medio est fora-
men, Die höle des Ohres.

Testudo, Καμάρα, conca-
merata Auriculæ pars, ubi
foramen Auris patet.

Nasus, ῥίς, μυκτήρ, Die
Nase / pars faciei inter Ocu-
los, olfactûs organum.

Nasum : habent spirantia,
explanatiorem Homines; mi-
nus Bruta,

Non habent qvæ non spi-
rant, ut Pisces.

Nares, μυκτῆρ & μυῶτῆ-
ρες, Ruff. ῥωθῶνες, μύξαι, Sa-
phod, partes concavæ utrinq;
positæ

C

posita, quæ meatum præbent spiritui, Nasi foramina seu fenestra Nasenlöcher / Naselöcher.

Foramina ante os habent, sed non explanata Aves, Serpentes, Ovipara.

Interfinium, κίωρ, ἰσθμῖον, διάφραγμα, Interseptum, Intersepimentum vel discrimen Narium, Imbrex Narium Arnob. Nasi pars cartilaginea quæ Nares vel meatus ipsos discriminat, Mittelwende der Nasen.

Nasi orbiculus, Pirula isid. Orbiculus protuberans, cui subsunt Nares, seu tota Nasi summitas, σφαίριον Ruff. das runde Stößlin der Nase.

Alæ, Pinnulæ, πτερυγία, ὑπώλαι, externæ Narium partes seu pulpa utrinque orbiculum Nasi sepiens.

Vibrissæ, Narium pili das Haar in der Nase.

Malæ, μάλα, Genæ, partes sunt, quæ sub cavis inter Nasum & Auris veluti margines leviter eminent, Oculosque ab inferiore parte tutantur. Wange / Backen.

Buccæ, βουκία, γνάθοι sub genis laxiores partes, quæ iratis aut spiritu a pulmone re-

vocato compressis ad hoc labiis inflantur, hilaritatem risumque indicantes Holsbacken.

Lacuna, φάληρον, Cavum in Labro superiore sub Naribus Grublin unter der Nasen.

Labrum, Labium, χείλος, ἔξωτος ὁ δόντωρ, Hom. χελών. Leffse / Lippe. Caro permobilis, mollis, Naribus subjacens.

Labrum superius, Oberleffsen / inferius, unterleffsen.

Maxilla, Mandibula, γαμφύλη, σιαγών, γένυς, Kinnbacken.

Mandibula superior, quæ soli Crocodylo & psittaco mobilis: Inferior, quam movent omnia Animalia: sursum, deorsum, in latera, Homo, Quadrupede: sursum deorsum tantum Pisces, Aves, Quadrupeda Ovipara,

Os, στόμα, λογιον der Mund / das Maul / pars omnibus Animalibus maxime communis, quæ cibis intro demittitur, quo ipsa augeantur ac sustineantur: seu fissura intra Labra & Maxillas, quæ cibis recipitur.

Os compressum, rescissum,

amplum

amplum. Rictu Oris amplo sunt omnia Carnivora Animalia, Leo, Lupus animal, Lupus piscis, Rana piscatrix, Silurus.

Palatum, ὑπερώα, ὀυρανίσκος. Gal. der Gaumen.

Fauces, Guttur. *Plin.* der Rache/ φάρυγξ, φάρυγγος, ἰσθμός, pars illa Oris universa, quæ Gulæ prætenditur, cibum & spiritum capiens.

φάρυγξ etiam dicitur Gulæ summa pars atq; initium, sicuti postrema Stomachus, der Schlund.

Lingva γλῶττα, πλῆκτρον γλῶττις, *Nonn.* pars sentiens saporem, die Zunge.

Lingva: absoluta, mollissima, lata Homini.

dura, crassa Quadrupedibus viviparis.

longa & bifida Lacertis, trifidula & tenuiss. vibrans & prælonga Serpentibus.

imbricata asperitatis ac limæ similis Lynxi, Leoni, Pardis.

ossea: spinosa Piscibus quibusdam: ut Trutis, Salmoni,

tota Certhiæ.

apice extremo Picorum^m generi, Jynge.

Imperfecta,

Tota adhærens palato Testudini.

Proglossis, pars prior quæ acuta est.

Hypoglossis ὑπογλωσσίς, Caro quæ attingit inferiorem Maxillam.

Tonsillæ, παριδμία Gal. Ἀντιάδες ὠτόχοι Hipp. Amygdala Chir. Glandulæ, quarum in intimo ore quatuor conspiciuntur: binæ ad Lingvæ radicem singulæ, utrinque conspiciuæ, & binæ peculiares, quæ μύλα Polluc.

Columella, κίων, γαστρίων das Zäpflein/ particula carnea oris penitioris parte hærens σαφυλοφόρον, Uvula.

Gingivæ, ὄνυα, Zahnfleisch / Carnes quæ Dentes continent. Internæ, ἐνὺα: externæ, ὀνύα: quæ inter Dentes continentur, ἄρμυδι.

Dentes, ὀδόντες, τομῆς Záhne quorum usus primarius ut cibum conficiant, secundarius, ut voci articulatae inserviant, invadant, defendant, retineant.

C 2

φραγμός.

φραγμαδς, totus Dentium
ordo, Dentium acies. die reihe
oder ordnung der Zähne.

Præsepia, φάτνια, φάτ-
ναι ossa quæ dentes conti-
nent.

Cavernæ, σὀρηια, ὀλυσ-
κιδ. Pell. Mortariola Locula-
menta, quibus singuli dentes
sunt infixi, Zahnholder/ Zahn-
löcher.

Dentes exerti, χαυλιό-
δοντες, Schifferzähne/ Haujzäh-
ne/ quales Verri, Apro, Ele-
phanto.

Dentes acuti, pectina-
tim se stipant, ferrati καρχα-
ρδόντες, quales Piscibus fe-
ré, Serpentibus, Canibus.

Dentes continui, con-
tinuati, Bobus, Capris,
Eqvo.

Dentes: plures sunt Maribus.
pauciores feminis.

mutantur primores, Ho-
mini, Leoni, Cani, Rumi-
nantibus.

non mutantur, sed perpe-
tuó manent Maxillares.

Mentum, Αδρειωρ,
γένειον, das Kinn,

Collum, τραχηλος, der
Hals/pars Corporis quæ Ca-
piti vicina inter caput, Hu-
meros & Thoracem sita seu
interjacens,

Jugulum, λευκανία, Αν-
τικάρδιον Ruff. der Unterhals/
A Collo communis Colli &
pectoris pars seu cavitas pro-
pe thymum. σφαγή ἀσφάττω,
quod mactaturi pecudes, il-
lum locum incidant, cum dis-
secta in ramos ibi Vena cava
lædatur; hoc modo & Mors
præsentissima adferatur.

Cervix, Αυχλώ, δαρέ, ἰνί-
ον, Ruff. das Genüßke/ posteri-
or Colli pars.

Collum habent, quibus
gula & arteria, vivipara &
Ovipara quædam.

Perfectum, breve Homo, &
quibus Crura brevia.

Longum Avibus, quibus
Crura longa, Struthioni Gru-
ibus, Palmipedibus nonnul-
lis, Olori, Anferi.

flexibile, vertebis com-
pactum Homini,

rigens osse perpetuo Lu-
po, Leoni.

Imperfectum, Collo propor-
tionale, Serpentum,

Collo

Collo privantur Pisces, quibus non manifesta gula.

Guttur, Aspera Arteria, Canna Pulmonis, Ἀσπὴρ Ἰσχυρὰ, die Gurgel/das Enfftröhr. Colli pars anterior cartilaginea vocem & halitum transmittens.

Circuli, Cannæ Pulmonis, κρότωνες. Hipp. σήραγγες, Bronchia.

Larynx, φάρυγξ, βρόγχου κεφαλή, Arteriæ asperæ pars summa, vocis instrumentum primum ac præcipuum, apparetq; in Collo tangenti durum.

Laryngis operculum, ἐπιγλωττίς, Sublingvium / lid. Ligula Lingva minor Plin. Anhelitus Lingula Adams' dāpfflin.

Gula, οἰσοφάγος, λαιμός, σφαχός, der Schlund / die Röhre / Canalis per quem cibus & potus in ventriculum descendit.

Thorax, θώραξ, ὄλμος, Truncus der Rumpff / tota ea pars Corporis quæ à collo ad Crura usq; seu pudenda trunca.

Pectus, στήθος, στήνιον die Brust / quod sub juguli clavicula est, prior Thoracis situs.

Pectusculum, στήνον, στήνιον, Media Pectoris pars, quò concurrunt Costæ, à summo ad Cartilaginem usq; illam ensiformem.

Cartilago ensiformis, Os ensiforme, ξιφοειδές, das Derscheblat.

Costæ, πλεῖστοι, spirituum partium munimentum, die Rippen / Laterum ossa.

Mamma, Mammilla, ὕβερ, μαστός, μαστός, τιττός, κόλπος, Sinus, Sumen à sugendo, Rumen veteribus, Brust/dutten / Lactis receptaculum.

Papilla, θηλή, Brustwercklin oder Dāpfflin / Strichen in vaccis, Capitulum Mammarum, per quod Lac transmissum eldicitur.

Mammæ obtinent Vivipara, quæ protinus animal vivum pariunt : in pectore.

Pectoris parte priore binas binis papillis Homines.

Sub armis duas Elephantia.

Inter, feminæ.

C 3

Binas

Binas papillis binis, Oves, Capræ.

Binas papillis quatuor, Vaccæ, Cervi.

in ventre.

Plures, quæ multos edunt fœtus, Sues, Canes.

Duas, quæ pauciores. Leæna, Panthera, Camelus cum papillis quatuor.

Mammis carent Ovipara omnia & Vivipara, quæ prius ova pariunt.

Præcordia, προκάσδιον, quod sub Mammillis est. Dicitur & carneum illud, quod sub pectore est carneum molleq; ad Os ventris, quæ quidem pars σφαγή & Αντικάσδιον dicitur, dic Herzgrube.

Viscera, ωλέγχνα, ἔγκατα, extra, Interanea, das Eingeweide, Visceribus omnibus natura carnea, sed sibi confimilis, πατέγχυμα Erasistrat. πρόσχευμα, veluti profusio. Viscera nulla habent Exsangvia.

Vitalia, Ευτοσιδία πνεύματα, Diod. Vitæ instrumenta, Organa vitæ inservientia, ut Cerebrum, Pulmo, Jecur, Cor.

Cor; Κῆρ, καρδία, das Herz, in pectore situm me-

dio, opertum involucro pingvi & corpulento, quod Venæ majori annectitur & Arteriæ, quæ Aorta. Externum ejus πυθμῆρ turbinatur in mucronem carnosum & firmiss. Κεφαλὴ καρδίας, amplior Cordis pars, quæ membranæ connectitur.

Cordis Ventriculi duo, inter quos medium quæsi quoddam septum. κοιλία, Cavernæ. Aliquando tres in majoribus Animalibus videntur. Quæ Animalia Pulmonibus carent, ea nullos sinus habent.

Auriculæ Cordis binæ, ὠτα, concavæ Ventriculis adhærent utrinq; Cordi, sicuti Aures Capiti, substantiæ cutaneæ.

Ossi quiddam simile omnibus inest. In minutis ad cartilaginis duritiem propè accedit: in majusculis perfecta cartilago est: in grandioribus cartilago ossea: in maximis os cartilagineum.

Cor mucrone turbinato in priorē partem tendit: contra in Piscibus, Homini infra laryam papillam mucrone in priora eminet; Animalibus reliquis medio pectore situatur. Pulmo,

Pulmo, πνευμῶν, πλεωμῶν, die Lunge / Spirandi officina, attrahens ac reddens animam; idcirco spongiosus ac fistulis inanibus cavus. Bifidus omnibus, at non æqualis ubivis distinctio. Venæ majori atq; Aortæ connectitur.

Pulmonem obtinent, quæ spirant, Pedestria sanguinea, Aquatilia nonnulla, ut Balæ-næ. Hoc carent, quæ branchias habent, ut Pisces.

Pulmo aliis sanguine tinctus adundantiore Dia, ut Quadrupedibus viviparis, quæ necessario per inter valla continua respirant.

aliis minus sanguineus est, ut Oviparis quadrupedibus, (& ex Viviparis, Lutræ & Phocæ) Serpentibus & Avibus.

Diaphragma, ὑπόζωμα, Arist. διάφραγμα, Septum transversum. Cels. Disseptum, Præcordia Nonn. das Zwerchfehl/die Leiste/die Kiste Lani-onibus. Tunica est musculosa Thoraci prætensa, Pulmonem & Cor à Ventre distin-guans.

Jecur, ἥπαρ, die Leber/

sanguinis officina sub Septo, à dextro latere positum. Pars convexa seu gibba, κατὰ ad Diaphragma seu Peritonæum est: Cava σπλην inferne Ventriculum tangit.

Iecinoris fibræ, ἰσχοί ἡπατος, Sipffel/ende der Leber.

Jecur: aliud sanguineo colore exhilarat, ut Avium quavundam.

Pallidiusculum est Quadrupedibus Oviparis & Piscibus nonnullis, ut Testudini.

adipem, Cartilagineis aquaticis nonnullis, ut Mustelæ fluviatili.

item: aliud

Continuum ut Hominis,

simplicius non fissum, ut Piscium, Quadrupedum, Oviparorum.

multiplex: divisum in pinas duas, tres, quatuor, sex, septem, novem. ut Lupi, sed ab una origine contentum.

duplicatum videtur esse, nec eadem origine continetur, ut Galei, Criceti.

Vehicula

Vehicula Fellis, κύσις
χολιδόχος, receptaculum fel-
lis, Gallenbälgin/Gallenbläs-
lin.

Hac destituuntur, **Quadrupeda** quædam **Vivipara**.

Aves quædam
Cetacea, **Delphinus**.

Plures habent, & quidem
major pars, idq; vel

annexum Hepati, seu sub
fibris Iecinoris delitescit, in
Homine, quadrupedibus, A-
vibus.

Intestinis adhæret Avibus
quibusdā, Piscibus nonnullis.
utrisq; & Hepati & Inte-
stino jungitur.

Lien, πλῆρ, der Milz/
lævo latere situs quasi Iecur
adulteratum, Differt.

quantitate

Magnus, perfectus, San-
gvineis **Viviparis**.

Minimus, imperfectus, a-
deo exiguus, ut sensum penè
effugiat, Avibus, Oviparis.

Colore.

Niger, fortioribus & cali-
dis Animalibus, ut **Leoni**, **Cani**.

Magis candicans humidio-
ribus & frigidioribus.

Sanguinei coloris, Piscibus
nonnullis, quibus Hepar
pallet.

Lividus, sub cæruleus in
Homine, Porcis.

Ventriculus, Κοιλία,
γαστήρ, pars in quam cibus de-
voratur, der Magen. : Septo
transverso subest. Os sub me-
dia Cartilagine Xiphoide,
reliqua pars sita sub Septo.
Fundus amplior, pars superi-
or quæ ad gulam arctior est.
In aliis ferè Animalibus in
anteriora ad hypochondrium
tendit. Ostium inferius πύλω-
ρος, quo Cibo exitus patet, ad
dexteram prope Iecur situm
in Intestinum desinit.

Simplex est **Viviparis** & u-
traq; **Maxilla** dentatis, isq; vel
Oblongus, Homini, Sui,
Cani.

Sphæricus magis **Quadrupedibus**, & Avibus nonn. &
vel

Membraneus, **Quadrupedibus**, Avibus rapacibus.

Callosus Avibus pulv. ut
Gallinis, **Anseri**, **Turdis**.

Multiplex.

Duplex **Criceto**

Quadruplex, **Quadrupedibus** **Cornigeris**, **Ruminanti-**
bus altera **Maxilla** dentatis.
cum appendiculis, ut Piscibus
quibusdam, iisque pluribus vel
paucioribus.

Intestina

Intestina, ἐντέρα, ἐγκοιλία
Das Gedärm / Eingeweide /
Chordæ Barb. Intestina flexu-
osis orbibus convoluta, in o-
mnibus Animalibus eadem
quatenus Intestina sunt:
Magnitudine, crassitudine,
replicamentis & anfractuū
(quas ἐλικας dicunt) nume-
ro distinguuntur.

Intestinum: *Maius* Rumi-
nantibus. *minus*, *simplex* simile
sibi omnibus suis partibus,
Piscibus.

Diffimile, & *quidem*.

arctius parte superiore,
latius inferiore Majori Ani-
malium parti.

laxius, quā ventri jun-
gitur, quā definit arctius,
ut Cani.

Anfractuosum, in orbes con-
volutum, Homini.

Δωδεκάδακτυλον, ἑκφυσις,
πύλωρος Der Magendarm /
Duodenum, primum Intesti-
num, principium Intestini,
priusquam in anfractus or-
besq; convolvatur.

Jejunum v'stq; Jecurdarm
sequitur flexuosis orbibus
convolutum, non ita tamen
implicitum, quia nunquam
quod accipit continet, sed
protinus in inferiores partes

transmittit.

Tenuius, tenue, λεπτόν,
ἐντέρον ἢ ἀπλοῦν; ariter / subti-
ler geschlanker Darm / in si-
nus vehementer implicatur.
Orbes verò ejus in dexterio-
rem partem converfi, & e re-
gione dexterioris coxæ finiti,
superiores tamen partes ma-
gis complent, dein cum crassi-
ore altero committitur.

Cæcum, τοφλόν Blin-
derdarm / á dextra parte inci-
piens in sinistram magis per-
vium est, in dextram non,
tumidum quiddam existens.
Hoc

Simplex, parvum in Ho-
mine vacuum: amplius in vo-
racibus Animalibus, Suibus,
Gliribus, Bobus.

Duplex, Animalibus rapa-
cibus, Avibus quibusdam, An-
feri, Olori Criceto.

Multiplex Piscibus nonnul-
lis.

Colon, κῶλον, Intestinum
plenius, Alvus der grosse darm
latè fusum ac sinuatum, ab
utraq; parte huc atq; illuc vo-
lutum, magis tamen sinistras
inferioresq; partes tenens,
contingit Jecur, Ventriculum,
Renem sinistrum.

D Rectum

Rectum, ἀπευδισμένον, δακτύλιος, der Afferdarm, Maßdarm/ breve corpulentumq; ad exitum excrementi rectā portendit.

σφύγκτις, musculus Ani, qui prohibet, ne effluent excrementa nobis invitis.

Pancreas, κλλιπρεας, Caro glandulosa & adiposa Pyloro adjacens.

Mesenterium, μεσασαίον, ἐπιχρῆδις, Lactes das mitten der Eingeweide.

Omentum, ἐπίπλοον, Membrana præpingvis. Intestinis obtenta, das Meslin/ Oritur de medio ventre, statimq; a septo transverso dependet. Maximum Homini- bus & Similib. Est corpus ex duplici Peritonæi complexu compositum, in quo venæ multæ sparguntur. Hoc magnum, parvum, pingve, macilentum.

Alvus, Venter γαστήρ der Bauch/ κατὰ infra Pectus est totum, quod a Sterno ad pudenda usq; porrigitur, connumeratis illis.

Abdomen, Sumen, Aqualiculus, Rumen á Mammis, ὑπογάστριον, ὑποκοίτη der unter Bauch pars quæ sub umbilico est usq; ad pubem.

Ilia Fæst. abina, quæ tenuissima chartæ pars est, quod circa Ilia cutis sit tenerior, Latera, Lumbi, die Seiten.

Genitale Ἀνδρῶν, Pudendum, verendum, die Scham.

Penis, Coles, Veretrum, Mentula, Virga, Priapo, σάδι, κανλός, σάμα der Schwanz/ Cervici vesicæ annectitur, foramine uno fermè directo pervium.

Genitale Marium vel

Intus reconditum Delphino.

foras pendet: antè Homini: retrò aliis.

Cartilaginofum carnosum- que Homini.

Nervosum Camelo. Cervo.

Osseum Lupo, Vulpi, Cani, Mustelæ.

Testes, ὄρχεις, σισυαί die Hoden/ seminalis humoris receptacula, quæ ex genitali Maribus pendunt.

Abditi

Abditi sunt, & vel lumbis adhærent circiter sedem Renum infra Septum, Avibus & Quadrupedib. Oviparis: vel in ultima alvi parte priore conduntur, Delphino, Elephanto.

Prominent penduli, & vel absolutè pendent Homini, Eqvo: vel non absolutè, sed alvo adhærent, ut Apro.

παράσῃται, meatus sunt, quibus deferitur semen à testibus ad ἑσθῆρα.

Vesica, κύστις dic Wasserblase/ultimo Ventrīs loco sub ossibus latis, quæ Ilium ossa dicuntur, meatibus, qui Ureteres dicuntur annexum, porrectis à Renibus ad Vesicam, pars nervosa, tenuis, exangvis, collo carnofo.

Vesicæ cervix, Collum Vesicæ, κανάλις, ἢ κύστις ἢ ἑσθῆρα. Blater Hals. Vesica carent Aves.

Uterus, Matrix, Loci, Vulva, μήτρα, δελφύς, ἡσέξα καὶ γυναικείον, κόλπος, dic Mutter/die Währmutter pars feminæ propria. Omnibus Animalibus intrò reconditus Uterus, quia injectum semen calore multo indiget, ut sus-

citetur, concipiatur, formetur, foveatur.

Cervix Uteri, Ostium τὸ σῶμα τῆς ἡσέξας, Muttermund.

Loci, Uterus in Homine, Vulva in reliquis Animalibus. Pars interior, spacium internum.

Acetabula, κεῖται, πλεκτάναι, κοτυλιδόνες, quasi cornicula & flagella cirrive. Ora seu meatus sunt vaforum ad uterum pertinentium, & in semen conceptum sese dispergentium, per quos fœtui affertur nutrimentum, & ipse Utero alligatur. In primis huc pertinet Vena umbilicalis, per quam infans in Utero alitur.

Sinus uteri, κόλποι Praeg. duas habet sinus Mulieris Uterus; multos quæ plures simul fœtus generant, ut Sus.

Vulva: infrà longius à septo juxta genitale supra alvum posita est, Mulieribus & Viviparis: vel lumbis adhæret, ut Piscibus. Oviparis.

Juxta septum transversum membrana constat & tenuis est, Avibus omnibus, Piscibus Viviparis, Quadrupedibus Oviparis.

D 2

anceps

anceps ratio, iis quæ animal edunt in lucem cum prius ova generarint, ut Cartilaginea, nam & lumbis adjungitur ea pars vulvæ, quæ ova continentur, & supra Intestina ejus ostium est.

Amnium, Ἀμνιον, fœtus involucrium tenue, quod ejus veluti sudores recipit.

Alanthoides, Ἀλαντοειδής, tunica media Amnio circumposita, à farciminis figura sic dicta, urinæ receptaculum. Subtilior primâ, rugosa & valde sinuosa, similis vesti sinuosæ. In Brutis tantum reperitur.

Secunda, Χωρίον, δευτέρου, membrana Alantoidem cingens. Prima & extrema tunica fœtus. In quibusdam brutis firmissimè Matrici adhærescit, in Homine non item. In Canibus & aliis Brutis habet eminentias, quæ sunt acetabula.

Umbilicus, ὀμφαλός, der Nabel / Concavum illud quod in ventris medio est.

Dorsum, ὄστρον, μετὰ φρενον, Tergum, der Rücken / tota posterior Corporis pars, à Collo usque ad Os sacrum.

Scapulæ, ἑμὸπλάται. Scapula operata Cel. Spatulæ, ossa quæ à tergo incumbunt. *Schulterblatt* / In Quadrupedibus, reliquis Pectoris ossibus ferè conjuncta sunt. In Homine longius distant à pectoris ossibus, & Dorso quasi innatant.

Humerus, ἑμὸς, *Schulter* / in Homine : Armus in reliquis Animantibus.

Acromium, Ἀκρόμιον, Humeri summitas, ubi cum scapulis jugula committuntur. *Κλῆις*, Iuguli ossa, inter quæ jugulum situm est.

Μετὰ φρενον, medium inter scapula, ad mediū Dorsum, ubi septi transversus locus.

Lumbi, ὀσφύες, πρὸ τῆς στήθους, infra e regione Ventris ubi septi transversus locus, die senden.

Dorsi Spina, ῥάχις, κλόνη, totius Dorsi media pars, superna usque ad Os sacrum, der Rückengrad. Spina rectitudinem & longitudinem continet Animalium, ex vertebri constat 24. excepto osse sacro, in Homine : sed in reliquis Animantibus, ex pluribus compacta est.

Costæ

Costæ, numero variant.

Homini 12.

Suibus 10.

Cornigeris 13.

Serpentibus 30.

Os sacrum, πλατὺ, ἱερὸν
ὄστρον, Os quod finit spodylos,

Uropygium, κόκκυξ, ὀ-
σπύγιον, der Arßpuck. Ossis
sacri extremitas, vel potius
spinæ extremum, ossi sacro
subtus adhærens, podiciq; su-
perné imminens.

Cauda, Coda Veteribus
ὄστρον, der Schwanz, quâ do-
nantur Vivipara & Ovipa-
ra: caret Homo.

Podex, δακτύλιος, πεν-
τὸς, pars excretoria, der Arß.

Crus, σκέλος, bipartita
compactio, utrinq; à Coxa
dependens, seu totum quod
ex femore genu, tibia, malle-
olis & pede cõstat, Schenckel.

Crura carnosa Homini:
nervosa ossulètaq; Reliquis.

Pes, πὸς, βάσις, der Fuß/
fundamentum totius Corpo-
ris, quo Animalia sustinen-
tur & incedunt.

Pedes: posteriores sunt o-
mnibus gressilibus: priores

Quadrupedibus, quorum lo-
co Brachia & Manus Homi-
ni, Alæ Avibus.

Digitati: Horum aliis Di-
giti sunt quatuor, Avibus:
quinque; Homini: priores quin-
que, posteriores quaterni, Te-
studini, Lynxi.

Solidi, Eqvo, Asino,

Bifulci, Cervo, Capræ,

Quæ Animalia pedibus ca-
rent: Incessu undant fluctu-
antqve, κυμαίνοντα. Et vel
flexibus, impulsus per ter-
ram feruntur ut Angvis: vel
corpus sursum flectentia pro-
grediuntur, ut Eruca quædam,
Incessu διασπασται utuntur (ac
si per limum trahi dixeris)
præcedente parte progredi-
untur, & quod reliquum est
Corporis, ad illud attrahunt,
ut Vermes terreni, Hirudi-
nes.

Articuli, Internodia,
φάλαγγες συνταλίδες, Gleich/
Gelencke.

Ungvis, ὄνυξ, Nagel/
corneum illud quod in extre-
mis digitis Animalibus ena-
scitur. Ungula in bifulcis &
solidipedibus, der Huf.

Ungues: Lati Homini, &
Mergo unico inter Aves,

D 3

Acuti

Acuti Avibus nonnullis.
Adunci Leoni, Urfæ,
Lynci, Aquilæ, Accipitri &
aliis rapacibus.

Imbricati Simiæ:

Recti Homini, Canibus,
Mergo.

Sensus Animalium.

Omnes sensus habent; San-
guinea. Mollia, Crusta in-
tecta.

Pauciores Talpæ, qui visu
privatur: Et cæci fodere cu-
bilia Talpæ.

Præcellunt: Olfactu Canes,
Vultures: Visu Aquilæ, Lyn-
ces: Gustu Simiæ, Gallinæ:
Tactu Aranea, Serpentes:
Auditu Anseres, Talpæ: *Cice-
ro 2. de Natura Deorum.* Omnis
sensus Hominum multo an-
tecellit sensibus bestiarum;
quorum ita clara judicia &
certa sunt, ut si optio Naturæ
detur, & ab ea Deus aliquis
requirat, contentane sit suis
integris incorruptisq; sensi-
bus, an postulet melius ali-
quid, non videam quid quæ-
rat amplius.

Respiratio Animalium.

Animalia omnia quæ ha-
bent Pulmones respirant. Et
hæc vel Loquuntur perfectè ut
Homines, qui differunt sexu,

regiõne, ætate: vel vocem e-
dunt:

variã, Animalia Vivipa-
ra, Aves.

canoram, sive Aves o-
scines.

exilem, Quadrupeda Ovi-
para.

sibillum longum Serpentes.
abruptum, per exiguum Te-
studines.

Ululatum, Ranæ.

Animalium generatio.

Generatio est facultas, quæ
Corpus vegetum ex apto se-
mine ad suæ speciei similitu-
dinem nascitur: ut Homo ex
Homine, Bos ex Bove. Volu-
it enim Natura eorum quæ
vita prædita sunt, alterum ab
altero perpetua successione
propagari.

Oriuntur Animalia quædã
spontè, nullo cognationis se-
mine antecedente absq; coi-
tu, ut Mures ex putredine, O-
strea & Insectorum multa.
Plurima procreantur ex se-
mine cognato sui generis per
coitum Maris & feminæ.

Sexus discrimen: nullum appa-
ret in iis, quæ vitam stabilem
gerunt, & testa integuntur.

Obscurum est in Piscibus, In-
sectis. Alterutram enim par-
tem non habent.

Manifestum

Manifestum, utriusq; sexus in pedestribus omnibus tum bipedibus, tum *Quadrupedibus*, Mollibus Crusta insecctis conspiciuntur.

Mas, ἄρσεν, appellatur quod in alterum semen immittit.

Major in pedestribus sanguineis viviparis.

Calidior, robustior, animosior.

Ejus partes superiores potiores, aptiores.

Cornua habet Cervus.

Calcaria, Gallus.

Dentes exertos Aper, Verres.

Colore prævalet in Avibus.

Femina, θήλυς, quod in seipsa semen prolificum mittit, & à Mare immissum recipit. Hæc.

Imbecillior, humidior, ad affectus pronior, infirmior, innervior, in educanda sobole acerbior.

Major Mare inter Pisces & Insecta. Habet præterea

Vocem exiliorem, tenuiorem,

partes inferiores, posteriores robustiores.

genitalia intus recondita,

Mammillas laxiores.

Sanguinem nigriorem crassiores,

pilos tenuiores.

Cornua ut plurimum nulla.

Coitus Animalium.

Οἷα, congressus seu concubitus Maris & feminae.

Hic considerantur.

Actus. Coeunt octavo mense Sues: quinto, sexto Pisces.

Anniculae, Oves, Caprae, Canes.

Biennes, Equus, Asinus.

Anno vigesimo Elephantum.

Tempus Anni: Certum, statum, frequentius Vernalium observant prope omnia volatilia, Pedestria, Natantia. Tunc enim temporis omnia ad universi renovationem conspire videntur Plantae, Stirpesq; omnes, Bestiae, siue nantes, siue volucres, siue serpentes, siue gradientes. Cuncta namq; tum gliscunt & in animantibus seminis copia vasa distenduntur.

Modus. Coeunt a versa, Pedestria sanguinea, Ovipara, quæ retrò mingunt, ut Leo, Lupus, Canis, Lynx, &c. Crustacea: Insecta.

Alia feminam Mare supergrediente conjunguntur, & dissimili modo: vel.

Complexu

Complexu mutuo supinarum partium, ut Serpentes, Muræ, Lacertorum genera.

admotis invicem supinis partibus copulantur, ut Pisces omnes exceptis cartilagineis.

Mare feminam superveniente ut Aves.

oribus invicem admotis, complexuq; mutuo brachiorum libidinem explent, ut Mollia.

Superfœtatio

Accidere solet quibusdam Animalibus, quæ post unum fœtum ex coitu conceptum rursus alium concipiunt à priore, unoq; aut altero die, vel etiam pluribus post primum emissum, suo tempore enuntur, quæ emissio secunda & veluti novus quidam partus, Superfœtatio dicta est.

Superfœtant frequentius Homines, Lepores, Sues, Cuniculi, quia post conceptionem Maris congressum appetunt.

Rarius aut nunquam reliqua Animalia gravida, quia post conceptionem Marem non appetunt, & seminis ma-

teria adfœtus nutritum assumitur.

Partus.

Pariunt & Animalium alia: *Animal* ut ζωτόνα Vivipara: & vel ilico inter se animal formant perfectum, quod foris incrementum recipit, ut Homo, Equus, Vacca, Ovis: vel non statim sed prius ova; mox animal in lucem edunt, ut Cartilaginea.

Ova, ut ὠτόνα, Ovipara, quæ edunt ovum: perfectum, quod nullum insuper capit incrementum ut Aves, Quadrupeda quædam Testudines, Crocodilus, Chamæleon. Serpentes plurimi: Imperfectum. Quæ postquam edita sunt augentur, ut Pisces squamosi, Crustata, Mollia, Ranæ.

Vermem primò, dein Ovi speciem accipiunt, ut Insecta quædam, quæ primò vermiculum pariunt, qui addito tempore accipit speciem Ovi, quæ chrysalis dicitur, tum ex eo animal gignitur.

Ovum ὄον, est id quod ubi in fœtura perfectum est, ejus ex parte principio animal consistit, reliquum verò alimentum

alimentum ei, quod gignitur, est, *Ein Ey.*

Vermis, *σκώληξ*, id ex quo toto, non ex parte aliqua totum, per subjecti fetus formationem incrementumque gignitur.

Item. Quædam pariunt brevi à Coitu tempore, Insecta maximè. Quædam longiori, & gerunt: vel dies quindécim, Sepiæ.

menses tres, Locustæ.

menses quatuor, Sues domæ.

quinque Oves, Capræ.

Sexaginta dies, Canes.

Decem menses, Vaccæ.

Undecim, Equæ.

• Semel in anno, magno sylvest. pars, Leæna, Vaccæ, Ursa.

Septus: Bis Hirundines, Sturni: Ter Chalcis: sexies Cyprini: singulis ferè mensibus Columbæ quædam domesticæ.

Fœtus, *situatur* in utero: extensus, Quadrupedibus. ex pedibus obliquus, Piscibus.

inflexus contractus Bipedibus, Homini, Avibus.

Nascitur naturaliter in Caput; contra naturam in Pedes inflexo circumactoque Corpore. Quo majus est a-

nimal, hoc minùs est fœcundum. Minuta numerosi fœtus sunt, adeò ut Acanthis minima Avicula duodenos pariat pullos: ita quæ minus valent pondere, numero sunt pensanda.

Hinc Animalia quædam fœtus edunt pauciores, *ὀλιγοτόκα.*

Unicum seu singularem Homo, Cerva, Vacca, Equæ, Camelus, Elephas, Ovis domestica.

Binos Leæna, Caprea.

Ternos Ursa.

Quaternos Vulpes,

Numerosos *πολυγονώπιστα*

Duodenos Sus.

Senos, septenos Cuniculi,

Porcellus frumentarius.

Septenos, Novenos, Denos, Feles, Canes.

Animalium usus.

Condita sunt Animalia. *I.* propter Deum, Ratione prædita scilicet Homines; qui ideò à Deo creati sunt, & in Mundo collocati, ut Creatorem suum noscèrent, & omnem vitam in eius gloriam referrent. Hic enim Verbi ac Spiritus sui potentia ex nihilo creavit Cælum & Terram:

E

hinc

hinc omne genus Animalia produxit, mirabili serie innumeram varietatem distinxit, suam unicuique generi naturam indidit officium assignavit, locumque attribuit & stationem, necessariis provodit, & ne suo interitu prorsus perirent, vim propagandi contulit: Demum Hominem formavit, eumque tam specioso decore, totque ac tantis dotibus insigniendo præclarissimum in eo suorum operum specimen edidit.

II. propter Hominem,
Reliqua Animalia ἀλογα omnia, quæ vel Corpori inserviunt.

I. Ad vitæ conservationem,
dum suppeditant Cibum & Pharmaca. Cibum vel simplicem, dum sunt alimenta tantum, ut Quadrupeda domestica, grandes feræ: Aves pulveratrices, Gallinarum, genera, Columbæ, Aviculæ montanæ: Pisces littorales, pelagii, saxatiles: vel medicamentosum, dum præterquam quod nutrant, Medicam habent facultatem, calefaciendi, refrigerandi, humectandi, siccandi, ut Caro Agnina, Leporina, Perdicum &c.

Hinc variæ exurgunt Alimentorum differentiæ, quæ ab Animalibus desumuntur.

Valentissime nutriunt,
in quibus plurimum est alimentum.

Omne animal quadrupes domesticum.

Omnis grandis fera, ut Cervus, Onager, Aper, Capræ.

Omnis grandis avis, ut Anser, Pavo.

Omnes beluæ marinæ, Cete.

Mediocriter alunt:
Lepores, Cuniculi.

Gallinaceum genus, Gallinæ, Perdices, Merulæ, Turdi, Aviculæ plurimæ.

Pisces omnes, qui salem non patiuntur, littorales, pelagici.

Imbecille alimentum dant: Aves montanæ, Fringillæ, Rubeculæ, Pari, Columbæ, Passerculi qui in turribus degunt:

Pisces saxatiles, Iulides, Blicæ, Scari, Turdi, Cressiones & alii.

Inter hæc vicissim alia aliis
valentiora, pro ratione

Soli

Soli seu loci, in quibus degunt.

Domestica, otiosa carnem obtinent humidiores & excrementitium, ut Oves, Anseres, præstant Castratorum.

Sylvestria seu feræ duriora sunt, minusq; excrementicia.

Pisces inter saxa, in arena leviores; graviores & deterimi, qui in stagno, lacu, palude, aut flumine immundo ac turbido vitam agunt.

Pabuli

Laudabilis copia, præstantiores evadunt.

Defectu, leviora.

Ætatis

Adolescentium præstantior, concoctuq; faciliior,

Lactentium seu recens natum mucosa, præhumida, excrementosa, ut Porcelli, Agnelli.

Pullorum cohortalium.

Pisciculorum media.

Senescentium, dura, nervosa, arida, concoctu difficilia, paucioris alimenti.

Partium, seu Membrorum.

Carnose pingves probè nutriunt.

Excarnes, ut Pedes, Rostra, Aures, Cartilagines, minimum præstant alimenti.

Nervose, ut Ligamenta & Tendones, succum gignunt lentum glutinosumq;

Quadrupedum caro circa labra glutinosum procreant, sed minimè crassum: verum facile concoquuntur, ut & Alæ.

Lingva carne est rariore & glandulosa.

Glandule sive pariter & friabiles, succum gignunt crassiusculum.

Mammæ ovæ & æ, dulces sunt, & à gulosis expetuntur, si probè fuerint concoctæ, ad Carnis naturam accedunt, sed crassum succum efficiunt, maximè si fuerint Animalis boni habitus.

Viscera concoctu difficilia, crassi succi & excrementosi.

Cerebrum pituitosum crassumq; nec probi succi, ægré concoquitur, tardeq; permeat, atq; a Stomacho alienum est, idq; haud modicè. Qvippe quod nauseam moveat & vomitum concitet. Idem tamen si probè concoquatur, alimentum præstat non exiguum. Avium Cerebrum præstantius.

Medulla Osium Cerebro dulcior, svavior, pingvior; si liberius edatur nauseam excitat ut Cerebrum, nutrit ut Cerebrum, facile putredinem sentit.

Renes ex urina virosum quiddam habent, duriore, concoctu difficiles, & vitiosum gignunt succum.

Testes Quadrupedum adultorum virus olent: Altilium Gallinaceorū svaves optimi sunt. Quadrupedum juniorum, Tauri, Hirci, Arietis saporis sunt ingrati, concoctu difficiles, mali succi.

Sanguis omnis concoctu difficilis, præcipuè qui crassus, qualis Bubulus. In cibo gratus Leporinus, Suillus, Gallinarum, Anseris, Cyprini.

Pingvedo omnis pauci nutrimenti est, potiusq; carnis quæ nos alit condimentum.

Lac cibo utile, Bubulum, Caprillum, Ovillum, probè nutrit, nec malum gignit succum, si non corrumpatur.

Animalia εὐχυμᾶ

id est, boni succi, quæ probum & laudabilem gignunt sanguinem.

Quadrupeda si benè concoquantur.

Aves mediæ materiæ, sylvaticæ, montanæ, quæ volatū se exercent.

Pisces saxatiles, & omnes ferè, præter palustres, lacustres, & aquarum limosarum.

Omnis venatio.

Caro omnis pingvis, recens,

κακόχυμᾶ.

Mali succi, quæ sanguinem efficiunt minimè probum, sed humoribus vitiosis exuberantem.

Quæ frigidiora & pituitosa calidiora & biliosa melancholico succo abundant.

Caro Ovilla, Caprina, Hircina, Arietina, Taurina, Cervina,

domestica permacra, falsa, fumo indurata.

Pisces

Pisces tenerrimi, minimé
duri, virosi, qvos stagna, la-
cus, limosi rivi ferunt, qvique;
in nimiam magnitudinem
excreverunt.

Εὐσώμαχα

Stomacho idonea.

Omnis venatio assa & elixa.

Pisces duri, saxatiles.

Caro bubula & porcina, qvæ
ætate media.

κακοςόμαχα

Aliena á Stomacho

Salsa

Pingvia

Cerebrum omne

Medullæ omnes.

Εύπεπτα

Facile concoqvuntur

Pisces maximé saxatiles

Avium genera collata cum

Quadrupedibus.

Carnes Suillæ, Vitulinæ,

Hædina, adolescentium.

Ova sorbilia.

Δύσπεπτα

Difficilius concoqvuntur:

Caro Caprina, Bubula, Cer-

vina, Sues senescentes, Anno-

sa omnia, Anseres, Anates,

Pavones.

Raja, Squatina, Trachuri,
Mulli, Cochleæ, Crustacea
omnia & mollia.

Αφυσά

Minimé inflantur:

Qvæ ex venatione, aucu-
pio acqviruntur.

Pisces

Conchylia

Ova mollia vel sorbilia.

Δύσφραγτα

Difficulter intus vitiantur:

Aves & ex potius duriores

Aurati pisces, Scari, Locu-

sta, Trutæ, Lucii,

Caro omnis dura, bubula,
macra, salsa,

Omnia falsamenta,

Cochleæ, Murices

Testacea.

Ευφραγτα

Facile corrumpuntur:

Lactentia omnia

Pisces teneri

Lac, Caseus vetus & ro-
cens.

Ιπαριμία γαστρί

Alvum moventia:

Lac, Lactentia omnia

Cochleæ, Ostrea, Pelori-
des.

E 3

Conchulæ

Conchulæ ferè omnes
 Salsamenta.
 Pisces omnes teneri,
 Pingvia,
 Aves natantes.
 Εφικτικὰ
 Adstringunt, cohibent :
 Ova dura, maximè assa.
 Aves minutæ, Merulæ,
 Turdi, Palúbes, Grues, omnes
 Aves quæ magis currunt
 quàm volant.
 Carnes assæ, Leporinæ,
 Cervinæ.
 Capræ, bubulinæ,
 Caseus vetustior.
 Διερητικὰ
 Urinam moventia.
 Lepus, Pectunculi.
 Turdi qui baccis juniperi
 vescuntur,
 Δεπλώοντα
 Tenuantia :
 Pisces saxatiles,
 Aviculæ montanæ,
 Animalia montana.
 παχύχυμα
 Crassio rem sangvinem
 procreant.
 Pisces Cetacei, Tunni,
 Angvillæ.
 Cochleæ, testaceum ge-
 nus omne.
 Mollia, Lorigines, Sepiæ
 Caro Cervina, Caprina,

Bovilla, Leporina, Porcina.
 γλισεῖα
 Lentum glutinosumq; suc-
 cum gignunt.
 Caro Suilla, Agnina,
 Tendines omnes.
 Partes circa Labra,
 Lingva.
 Medium inter tenuem
 & crassum.
 Gallinæ, Phasiani, Per-
 dices.
 Attagenæ, Merulæ, A-
 ves parvæ,
 Pisces littorales, Pelagi-
 ci, Gobii.
 Murænæ, Buglossi.
 περιττωματικὰ
 Excrementitia,
 Palumbi, Anseres, Aves, in
 paludibus aut stagnis victi-
 tantes,
 Caro porcina, Ovilla, o-
 mnis novellorum & domesti-
 corum Caro, & quæ otiose
 vivunt.
 Pisces lacustres aut fluvio-
 rum limosorum.
 Cetacea omnia.
 Απέριττα
 Minimū excrementi habent.
 Caro sylvestrium Ani-
 malium, quæ in siccioribus
 locis victitant, Colla Anima-
 lium; Caudæ & Alæ.

In

In omni autem genere ad salubrem victus rationem præferuntur Animalia quam exercitatissima, & quæ Cibo sicciore aëreque purissimo utuntur; iis quæ aut otiose degunt, aut humidiores alimentis aëre impuro crassoque vivunt.

Animalium præparatio
Perficitur ablatione, additione, immutatione.

Auferuntur Pelles, Coria, Plumæ, Squamæ, Sordes, Sapores ingrati, amarus, austerrus, salugo elixatione: Acræ mordacia aceto diluto. Assarum verò seu elixorum virus foetore, aut succi ipsius malitia; si quæ adsit, partim auferitur partim immutatur, & ab igne & ab iis, quæ cuique accommodata sunt, condimentis.

Pharmaca desumuntur ab Animalibus vel integris, ut Lepusculi integri uruntur contra Calculum.

Ex vulpe paratur quod vulpinum dicitur.

Passer Troglodytes integer crudus comestus Nephriticis succurrit.

Astacorum fluviatiliū ci-

nis morsui Canis rabidi medetur.

Lumbrici terreni integri præparantur ad varios usus.

vel eorum partibus, ut

Pilis, Leporis.

Pellibus, ut Arietina, Cervina.

Lana succida, cremata.

Pinguedinibus, Porci, Taxi, Avium, Piscium.

Carnibus, Viperæ.

Testibus, Castoris, Equi.

Cornibus, Cervi.

Ungula, Alcis.

Ungvibus, Lyncis.

vel excrementis, ut

Mel

Urina, Hominis, Apri.

Fel, acius & siccius Avium rapacium: imbecillius Quadripedum: mitius Piscium.

Stercus, Muris, Canis.

Moschus.

Zibethum.

Horum alia μαλακτικὰ durities emolliunt.

Adipes, Medullæ.

συμπητικὰ concoquunt

Oesypus,

Butyrum.

πυοποιτικὰ pus movent

Adeps vitulinus,

porcinus.

Butyrum.

διαφο-

διαφορικά per halitum digerunt.

Coagulum omne

Adeps Leonis,

Pantheræ

Aquilæ.

ἐπιπικὰ abstergunt

Cinis Lepusculi, Astaci

Testæ testaceorum

Lapilli Astacorum, Percarum.

Ossa Sepiæ,

Erinacei usti,

Lactis serum.

Καυσικά.

Cantharides,

Buprestes,

Pityocampe.

2. At vitæ commoditatem Animalia inserviunt Homini:

dum operas commodant Agricolis, ut Equi, Boves.

dum Mercatoribus subvehunt Merces, ut Asini, Muli, Equi, Cameli.

dum Mechanicis omnis generis materiam suggerunt:

Arculariis Glutinum,

Pannificibus Lanam Oves.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|------------|
| Cerdonibus | <table border="0"> <tr> <td rowspan="4"> <table border="0"> <tr> <td>Pelles</td> <td rowspan="4"> <table border="0"> <tr> <td>Oves</td> </tr> <tr> <td>Hirci</td> </tr> <tr> <td>Capræ</td> </tr> <tr> <td>Tauri</td> </tr> <tr> <td>Cervi</td> </tr> <tr> <td>Equi.</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&</td> </tr> <tr> <td>Coria</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Pellionibus</td> </tr> <tr> <td>Sutoribus</td> </tr> <tr> <td>Sartoribus</td> </tr> </table> | <table border="0"> <tr> <td>Pelles</td> <td rowspan="4"> <table border="0"> <tr> <td>Oves</td> </tr> <tr> <td>Hirci</td> </tr> <tr> <td>Capræ</td> </tr> <tr> <td>Tauri</td> </tr> <tr> <td>Cervi</td> </tr> <tr> <td>Equi.</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&</td> </tr> <tr> <td>Coria</td> </tr> </table> | Pelles | <table border="0"> <tr> <td>Oves</td> </tr> <tr> <td>Hirci</td> </tr> <tr> <td>Capræ</td> </tr> <tr> <td>Tauri</td> </tr> <tr> <td>Cervi</td> </tr> <tr> <td>Equi.</td> </tr> </table> | Oves | Hirci | Capræ | Tauri | Cervi | Equi. | & | Coria | Pellionibus | Sutoribus | Sartoribus |
| <table border="0"> <tr> <td>Pelles</td> <td rowspan="4"> <table border="0"> <tr> <td>Oves</td> </tr> <tr> <td>Hirci</td> </tr> <tr> <td>Capræ</td> </tr> <tr> <td>Tauri</td> </tr> <tr> <td>Cervi</td> </tr> <tr> <td>Equi.</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>&</td> </tr> <tr> <td>Coria</td> </tr> </table> | | | Pelles | | <table border="0"> <tr> <td>Oves</td> </tr> <tr> <td>Hirci</td> </tr> <tr> <td>Capræ</td> </tr> <tr> <td>Tauri</td> </tr> <tr> <td>Cervi</td> </tr> <tr> <td>Equi.</td> </tr> </table> | Oves | Hirci | Capræ | Tauri | Cervi | Equi. | & | Coria | | |
| | | | Pelles | | | <table border="0"> <tr> <td>Oves</td> </tr> <tr> <td>Hirci</td> </tr> <tr> <td>Capræ</td> </tr> <tr> <td>Tauri</td> </tr> <tr> <td>Cervi</td> </tr> <tr> <td>Equi.</td> </tr> </table> | Oves | Hirci | Capræ | Tauri | Cervi | Equi. | | | |
| | | | Oves | | | | | | | | | | | | |
| | Hirci | | | | | | | | | | | | | | |
| Capræ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tauri | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| & | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coria | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pellionibus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sutoribus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sartoribus | | | | | | | | | | | | | | | |

dum vestimenta præbent, ut

Hirci, Cervi, Alce

Vituli, Oves, Martes

Vulpes, Camelus, Eruca sericea.

Animalia tandem

Animum

informant. Sunt enim.

Testimonia inestimabilis potentia, sapientia, iusticia, bonitatis Divina. Vult enim Dominus, dum hæc in Creaturis veluti in speculo contemplamur, non tantum eas fugiente vento percurrere, & evanido intuitu: sed in ea cogitatione diu immoremur, eam serio ac fideliter Animis revolvamus, memoriaq; identidem repetamus.

Fidei documentum, quamvis non præcipuum, Naturæ tamen ordine primum, meminisse esse Dei opera, & simul quem in finem a Deo condita sint, pia mente reputare.

Incitamentum, ut nos ad ipsius Creatoris fiduciam, invocationem, laudem, amorem excitemus.

Exempla Virtutum, Omnia, Sobrietatis & Continentiæ.

Leo Magnanimitatis.

Taurus Fortitudinis.

Serpentes Prudentiæ.

Ciconia

Ciconia Humanitatis.
 Columba Simplicитatis.
 Canis Amoris & Fidelitatis.
 Agnus Mansuetudinis.
 Bos & Asinus benefactorum grata memoria.
 Gallus Vigilantiæ & Liberalitatis.
 Formicæ Diligentia & Industria.
 Pavones Pulcritudinis.
 Pulli promptæ Obedientiæ.
 Natura enim in iisdem Brutis quasdam virtutum in-
 sevit imagines, ut ex iis eti-


am Homo ad virtutum cultum longè magis excitetur.

Exhilarant, dum voluptati ancillantur, veluti
 Equi generosi, Ursi saltantes, Canes Melitæi, Pavones,
 Psittaci, Luscinia &c.

Aliqua enim voluptas seu
 Animi recreatio in hac miseria, quasi vitæ condimentum,
 à summo Rerum Opifice concessa Hominibus.



F LIBER



LIBER SECUNDUS.

Vivarium :

CONTINENS ANIMALIA

Terrestria seu Quadrupeda

SILESIÆ

A Nimal quadrupes

Τετράπους.

Τετράκωλον,

Ζῷον τετράποδον,

Ein Vierfüßsig Thier.

Quadrupes, animal est substantiæ inter aeream & aqueam mediæ, cum terrena crassi participantis, pilis obductum, quaternis pedibus incedens, ut Leo, Bos, Mus.

Partes Quadrupedum
cum Homine communes, at nonnihil differentes.

Caro: Pedestrium Carnes duræ sunt, & excrementitiæ: si verò concoquantur, probum succum gignunt, & potentissimè nutriunt. Differunt tamen pro ratione victus, loci, generis, partium.

Domesticorum humidi-

or est, & excrementitia magis.

Agrestium durior, minus excrementosa, plurimi alimenti, & succi mediocris.

Præstant Castratorum.

Sanguis Schweiß vulgò, Suillus aliis præfertur, Leporinus suavissimus.

Lac, γάλα, Milch/est benigni alimenti superfluum in Mammillis ex sanguinis coctione genitum.

Differt: Sapore.

Gratum, Caprinum, Bubulum, Ovillum.

Ingratum, Suis. Canis, Uris.

Consistentia:

Craissimum & pingvissimum Bubulum, Ovillum.

Serosum, Camelinum, Asininum.

F 2

Mediocre

Mediocre, Caprinum.

Anni tempore.

Vernum dulcissimum, li-
quidiss. copiosissimum.

Æstate media mediocre.

Pascuis,

Lætis, dulce, probum.

Vitiosis, acre, acidum, au-
sterum.

Partu,

A partu dulcissimum.

Procedente tempore cras-
sescit.

Adeps, pinguedo subeu-
tanea, scissatit / quæ ad
ignem facile liqvescit, & dif-
ficilimè rursus concrevit,
cogiturve. Reperitur in Ani-
malibus utrinq; dentatis non
Cornigeris & multifidis, ut in
Sue, Urso, Taxo, Cane.

Servatur in coquinarium
usum ad condiendos Cibos,
tum ad pharmacian.

Calefacit, humectat, emol-
lit, lenit, rarefacit. In Cibis
sumta Ventriculum offendit,
appetentiam dejicit, pituitam
auget, parum nutrit, succum
illudabilem gignit, facile in
bilem vertitur & in vapores
caput perentes.

Medulla, das Marck ex
ossibus, Cerebro dulcior, sva-
vior, pingvior: largius sum-
ta Ventriculi appetentiam de-
struit, pituitamq; gignit: si ta-
men probè conticiatur valen-
tissimè nutrit, magisq; Ori
placet, quàm spinalis. Medet-
ur scirrhus in Musculis, tendi-
nibus, ligamentis, visceribus.

Optima Cervina, Vituli-
na, Boum juniorum, Capri-
na: Acrior, siccior Hirco-
rum, Taurorum.

Spinalis medulla,
Marck aussm Rückgrad/ pitu-
itosum ac crassum generat
succum, ægrè concoquitur,
Ventriculo nocet, nauseam
mover. Robustis tamen ven-
triculis concocta bonum præ-
bet alimentum.

Ossa.

Spina Dorfi. quæ Qua-
drupedibus transversa impo-
sita est, & pedibus posteriori-
bus incumbit: in Homine e-
recta est, & in os sacrum desi-
nit.

Nervi, alii ad exquisi-
tum sensum, alii ad fugam
tantum & aversionem tri-
stantium, quales sunt multi
in ventri-

in Ventriculo.

Cartilago.

Fel, χαλὴ Diofc. Calefacit, mordet, scindit, extrahit, discutit. Fel Quadrupedum subditum, Alvi defectionem Infantulis molitur. Felle carent Equus, Mulus nonnullus, Asinus, Cervus & Mures nonnulli:

Caput, κεφαλὴ der. Kopff.

Cerebrum, ἐγκέφαλος das Gehirn/ pituitosum crassum gignit succum, ægrè concoquitur ac tardè permeat.

Aures, ὄφρ. Harum Cartilago sicca est & minimè nutrit.

Nares, quibus Maxillæ longæ in acutum exeunt, in Rictu appellato continentur: Cateris explanatius magisq; difertè ad Maxillas junguntur.

Maxillæ, longæ jumentis rotundæ Simiis.

Os, magno hiatu rescissum Cani, Leoni, omnibus

quibus dentes ferrati: mediocre Suum generi.

Dentes: exerti χαυλιόδοντες Verri, Apro, Elephant.

ferrati καρχαρόδοντες.
Cani, Leoni.
continui, Eqvo, Bovi,
acuti primores
plani interiores.

Animalia plurima utrinq; dentes habent: altero ordine carent Cornigera, & Camelus.

Lingva dura, crassa & minimè absoluta: hinc fit ut vocem parum explanare possint.

Collum, Gula, Arteria, eodem situ quo Hominis.

Pectus magna ex parte coarctatum non latum ut Homini: inde eo loco Mammæ non habent.

Thymus, θυμός, Glandium die Milch/ corpus glandulosum ad septimam Spinæ vertebram situm, in vitulis esui jucundum.

F 3

Mammæ

Mammæ *u* *tsi* propriè
Cuter/A Lacte habent dulce-
dinem comparatam, Anima-
lis boni habitus abundè nu-
triant, & probum succum ge-
nerant, si rectè in Ventriculo
concoquantur, at crassiores.
Minimè verò probi & senes-
centis, succum procreant cru-
dum & pituitosum.

Pulmones, pars spongi-
osa & fistulis inanibus cava,
concoctu facilis, minus alit
Jecore, & pituitosum gignit
alimentum.

Cor, durioris substantiæ,
difficilis concoctionis, at non
mali succi.

Ventriculus, Intestina
duriora sunt, concoctu diffici-
lia: succum gignunt, si con-
coquantur, non omninò in-
culpatum, sed frigidiores,
crassiores & crudiores.

Jecur, Quorundam non
omninò malum. succum pa-
rit crassum, tardius permeat
& ægrè concoquitur.

Lien: rotundus Bisulcis
& Cornigeris, ut Capris, Q-

vibus & reliquis omnibus,
præter Boves.

Prolixus multifidis, Muri,
Canis.

Medius Solidipedibus, E-
quo, Mylo, Asino.

Sapore est insuavi, ob acer-
bitatem manifestam, chy-
mum gignit vitiosum, me-
lancholicum. Suillus minùs
malus est, aliquando Paupe-
rum cibus.

Renes, duriores, conco-
ctu difficiles, nec laudabile
dant alimentum.

Vesica, dic Blase/ Blat-
ter.

Genitale, antè plurimis:
retrò aliis.

Testes, saporis ingrati,
concoctu difficiles, virosus
quiddam sapore referunt.

Cauda, durior est, & mi-
nus excrementitia.

Crura omnibus quatuor.
Prioribus quædam Multifida
vice Brachiorum utuntur,
ut Leones, Lynces, Ursi, po-
sterioribus repugnant.

Digitis

Digitumultifidis aliis priores qvini, qvibus ex rapina victus, ut ungvis numero-
rioribus facilius obrepant ad superiora, veluti Leoni, Lupo, Cani, Lynxi, Testudini: posteriores qvaterni.

Reliquis cum priores tum posteriores qvini.

*Partes Quadrupedibus
peculiares & proprie.*

Seta, χαίτη,
eqvina Rosshaar.
suilla Sembursten.

Σείξ crassior & procerior
Iana, seu multorum pilorum
quasi collectio, Villus, ut in
Leonibus, Canibus nonnul-
lis / Zotten.

Juba, λοφία, Crines a col-
lo penduli, Haarsacken / in
Eqvo, Leone.

Lana, ἔξωρ, Wolle in O-
vibus.

Aruncus, κρύκας, vil-
lus a Caprarum Mento de-
pendens, Ziegenbarth / Geiß-
barth.

Tergus, Corium, Pellis,
σκύτος σκύτιον, δέρμα, δερμα,
exuvia proprie a carne sepa-
rata, die Haut / Leder / das
Fehl.

Pellis agnina, Αγρανίς,
ελωίς Hipp. Lambsfehl / Lemmer-
Haut.

Pellis caprina, Αίγίς,
αίγην, ἱέραξ Hipp. σέφορ αἰγίου
Geißfehl / Bockschaut / Bock-
fehl.

Pellis ovina, οἶς Schaff-
fehl.

Pellis Suilla, Suina πο-
σίη, Schweinleder / Schweins-
haut.

Pellis cervina, νεῖς,
Hirschhaut.

Palearium, locus ubi
conditur palea.

Palear, Αἰδέτωρ, pellis
e Boum gutture dependens,
die Wamme In bove genero-
sitatis signum,

Rostrum, ῥύγχος, πρὸς το-
μὴν ῥίffel / Gerrißel. In Cer-
vis die Schnoge: in Canibus
Hundeschnoge,

Promulsis

Promuscis, προβοσκis,
Manus Elephantis, Schneise/
Nüssel/ oder Heflands Nase.

Cornua, Κέρατα. Hör-
ner/ In Cervis, Gehörn/ Hirß-
geweih.

Adminicula, Αμυντήρες,
Arist. Stangen.

Rami Cornuum, ῥίζαι,
σώσδυρες. Hornäste/ Zanken
an Hörnern.

Cornua simplicia,
παῖταλοι, Subulæ, tubercula
Cornuum recta.

Quadrupeda alia mutila
sunt sine Cornibus, Leo, Ur-
sus, Canis :

alia Cornuta, Cornigera,
κεράδ' ἴνα : eaq; vel

Monocornia, quæ unicum &
simplex cornu habent, in ca-
pite Subulo, in fronti Mono-
ceros, in Naso Rhinoceros.

Bicornia, duo divisa : Recta
in palmos & digitos Platyce-
rota : in ramos sparsa, Cervi,
Capræ.

Obliqua non ramosa : Prona,
convoluta in anfractum, A-
rietes.

in dorsum adunca, Rupi-
capræ.

Infesta Tauri.

in adversum Damæ.
erecta & rugarum quasi
liarum ambitu contorta,
Strepficeros.
Contraria, Boves.

Ruma, Μήρυξ, Rumen
veteribus μῆρυξ, eminens
sub Mento Gutturis pars, quæ
Cibus in alvum demittitur,
& admissus a certis revocatur
Animalibus, Gurgel/ Kropff/
in wiederkehrenden Thieren.

Venter, simplex Den-
tatis in utraq; Maxilla; am-
plior, Sui, Urso; arctior, Leo-
ni, Cani.

duplex, Criceto
multiplex, Ruminantibus
Cornigens altera maxilla
dentatis, Hæ enim quaternos
habent sinus. Gula incipi-
ens ab Ore deorsum tendit ad
Pulmonem Septumq; trans-
versum, hinc se ad Ventrem
applicat majorem, quæ κοιλία
μεγάλη, dicitur, & parte inte-
riore asper interceptus est; ac
prope Gulæ commissuram, si-
num sibi annexum habet,
quem ex argumento κερύφρα-
λερ, id est, reticulum vocant.
Est enim Ventri extrinsecus
similis, intus reticulis capilli
Mulierum implexis magni-
tudine multo quàm venter
minor

minor. Hunc excipit Omasum, ἑχίνος, parte interiore asperum cancellatum, crustatum magnitudine Reticuli. Abomasum ἄνυσσος, venter ab eo alius jungitur magnitudine amplior Omaso, forma oblongior Cancellis intus & crustis multis magnis & lævis inornatus: mox intestinum sequitur.

Duriore sunt & difficilius perficiuntur.

Armus, ἄμω, qvod in Homine Humerus, Schulter/Spale/ Saffe.

Suffrago, ὀπίθια, μεσοκύνιορ κύωρ. in posterioribus Quadrupedum pedibus, qvod in prioribus Genu dicitur, Wieder oder Hinterbug.

Astragalus, os illud ultimum pedis est, qvod tibiæ Cruris annectitur.

Ungula, ὄνυξ, Ungvis, Ein Klawe/ Huf/ Horn.

Ungula solida, Eine gange Klawe/ so vnzerpalten/ Eqvo, Asino.

Ungula scissa, χαίλη, bisulca, bifida, Zerpaltene Klawe.

Falcula, Plin. Aduncula ferè vngula, ὀπλὴ Kromme Klawe.

Corona, στέφανος, Ungulæ exortus, Ungulæ commissura.

Chelidon, χελώνη, Cavum Ungulæ, Straale.

Hirundo, Imperigo, λαχών, ἢ χελιδών, Squamula in Cruribus anterioribus Equorum sub armis nata,

Quadrupedia alia:

Ἀσχιδὴ ἢ μώνυχος, Solidipedia, infisso sunt pede, seu solidas vngulas habent, ut Equus, Asinus, Mulus.

Fisso sunt pede, Ungvifida: eaqve vel

δισχιδὴ, δίσχηλα Bisulca qvæ χαλὰς, id est, forcipem pro vngula habent, ut Cervus, Oves, Capræ, Alce, Bos, Sus.

πολυσχιδὴ, πολυδάκτυλα, Multifida, qvæ multiplici pedum fissura digitantur, ut Canis, Leo, Lupus, Lynx, Ursus, Sciurus, Mustela, Felis.

Cauda οὐρά, ἀλκία Nic. Kēκος. der Schwanz.

Muscarium, σόλη, Equi, Cauda, Rosschwanz.

G

Tenor

Tenor σίλας

Cauda prolixior pilis longiscum tenore brevi Equis : brevioribus cum tenore longo Bobus.

brevior, perexigua Vrsi, lata longiuscula ad Cubiti mensuram, Ovibus Syriæ.

Coagulum πιτυλ, Diosc.

Σιππ/ Kiemwogen/ Käse Siip/ Sap/ est concretum in lactentium quocunq; pullorum Ventriculis lac, quod omnia Ruminantia & inter dentata utrinq; , Lepus, habent, non in magno Ventre, sed in Omaso. Coagulum omne aëris est & digerentis potentia; ob id calefacit & siccatur, dissipata coigit, coagulat, & coacta dissolvit. Quo vetustius eo præstantius.

Sebum, Sebum, σέας, Adeps solidior, Unschlet/ Ungehn/ qui difficulter funditur, & fulus celerrimè coit ac congelatur, multoq; apparet pingvedine durior, Siccior est Adipe. Hoc propriè Ruminantia habent.

Os Cordis, Cartilago Cordis, Heræ Creus/ Cordis ossiculum. Radix Arteriæ magnæ & Venæ Arterialis,

Corpus est cartilagineum, quod venæ arterialis & magnæ arteriæ radices committit, & temporis progressu indurescit. Reperitur in grandioribus Animalibus, Cervis, Equis, Bobus.

Fimus, Κόπρος, Απομίς Diosc. Mist/ Kaat.

Nihil projectius excrementis Animalium, & tamen stercoreandis agris præcipuum habent usum : ita nulla res est tam nihili, quæ non aliquâ proffit, si noris uti.

Quadrupedum Cibus.

Quadrupeda vel sunt :

Omnivora, ut Ovipara, Testudines.

Vescuntur herba, humiliori Oves; altiori, ramis, germinibus Capræ.

Herba & frugibus, Boves, Cervi, Equi, Sues Leones.

Carnibus, Leones, Lupi, Lynces, Canes.

Piscibus, Fiber, Lutra, Ictis, Felis.

Aëre, Chamæleon.

Potus,

Potus.

Aqua frigida gratissima Naturæ, quam semper, inquit Plinius, Bruta prosequuntur.

Coitus.

Coitum perficiunt Quadrupeda Vere ut plurimum, æstate etiam & autumno quandoque.

Cum ferocitate, Leones, Equi, Tauri, Ursi, Lupi, Arietes.

Sine ferocia, quæ sapius coeunt, & cum hominibus degunt, Sues, Canes.

Partus.

Alia sunt Vivipara, ζωτόνα quæ animal & concipiunt & in lucem edunt, ut plura Quadrupedum genera. Ovipara ὀοτόνα, quæ prius pariunt Ovum, ut Crocodilus, Testudo, Lacerti.

Mores.

Alia sunt:

Manſveta, Pecora, Pecudes, βοσκυατα, δειματα, quæ pabulo terræ vefcuntur: ὑποζυγια, Veterina & jumenta, ζῶα generaliter.

Armenta ſunt majorum Animalium genera, ut Boves Cervi, Taurorum cætus.

Greſes ſunt minorum Animalantium terrenorum, Homini commodorum, quales ſunt Oves, Capræ.

Jumenta, quæ operam noſtram adjuvant, ut Equus, Bos, Aſinus, Camelus, Elephas.

Immanſveta, θηρία, Beſtiæ, Belluæ, Feræ, exq; vel

Cornuta, ut Cervus, Bifons, Urus.

Acornes, ut Tigris, Leo, Urſus.

Lupus, &c. quæ procul ab Hominum confortio fugiunt, & in ſylvis, deſertis & montibus habitant.

Quadrupedum utilitas.

I. Operas commodant, Vehunt, trahunt, arant, Equi, Boves.

Onera ferunt, Mulus, Aſinus, Camelus.

G 2

vigiles

vigiles sunt nocturni Canes
villatici, pecuarii.
venationi inservunt, Canes
venatici, Cursores, vesti-
gatores, Leopardus.
Mures inquirunt & capiunt
Feles, Erinacei, Mustelæ.

2. Alimoniam dant.

Carnes: Domestica, Bo-
ves, Oves, Capræ, Porci.
Feræ, Cervi, Capræ, Apri,
Lepores, Cuniculi.

Lac, Vaccæ, Capræ, Oves.

Butyrum, Vaccæ, Oves.

Caseum, Vaccæ, Oves,
Capræ.

3. Medicinæ inserviunt.

Integra, Lepusculi, Eri-
nacei, Catuli, Vulpes.

Partes eorum externæ,
Pili Leporini, Lana Ovium
succida, Pellis Arietis, Pria-
pus Tauri, Cornu Cervi,
Monocerotis, Ungula Alcis,
Axungia Porci, Cuniculi,
Leporis, Sebum Hircinum,
Caprinum, Medulla Hircina,
Vitulina.

Internæ. Cerebellum
Leporis, Pulmones Vulpis,
Arietis, Cor Leporis, Hepar

Lupinum, Coagulum Hædi,
Leporis, Fel Tauri, Lumbi
Scincorum, Testes Castoris,
Vesica Suilla.

Excrementa, Moschus,
Bezoar, Album græcum, Mus-
cerda.

4. Corpus investiunt.

Pilis Fiber, Camelus,
Lana, Ovis.
Pellibus Martes, Lynces, Lupi.
Tergore, Equi, Boves, Cervi,
Capræ, Damæ, Alce.

*5. Scriptoribus chartas
præbent.*

Oves
Vituli.

6. Musicæ opem ferunt.

Intestina Ovium, ex qui-
bus chordæ finguntur pro Te-
studinibus.

*7. Tempestatis sunt
augurium.*

Asinus quatiens Aures tempe-
statem indicat.
Boves contra pilum se lam-
bentes pluviam arguunt.
Lupus ululans tempestatem
sentit,

8. Agros

8. *Agros impingvant & hortos.*

Boves,
Oves,
Capræ,
Sues.

*De Quadrupedibus in specie.**Alce.*

Αλκη.

Equivervus *Allen.*Bilons *Jul. Cas.*

Alce, Asinus sylvestris

Ein *Elch*

Elend à miseria, quod ei
quotidiè Comitialis Morbus
ingruat.

Animal est timidum, gregarium & bisulcum, medium inter Equum & Cervum, colore ex casto nigricante, pilis oblongis & duris. Mari cornua (quæ quotannis amittit) solida, colore qui Cervinis, longa ferè duos pedes, non ramosa ut Cervorum, mucronibustamen aliquot divisa, do-drantem lata, scabellis idonea, Armi potius quàm Cornu figura.

Magnus ejus numerus in sylvis Borussia, Lituania & Hungaria, Pelles & Ungulae frequenter ad nos feruntur.

Capta vel mediocriter vulnerata statim expirat,

*Alcis ungula.**Elends Klawe.*

Commendatur dextra posterioris pedis, Ferunt sapissimè Caduco morbo corripì, nec prius levare ab eo, quàm dextra posterioris Pedis Ungula Auriculam sinistram confri-cuerit.

Frequens & nobilitatum apud Feminas nostrates contra Epilepsiam amuletum.

Suspectum enim vel appositum solùm Infantibus, eos ab accessione liberare, etiam spumantes & recidivas inhibere, fortis persuasio.

Ramenta seu scobem sæpè adversus eandem noxam propinant per se, vel aliis admixtis.

Potu partum accelerat.

Pars ejus annulis inclusa hodie frequenter portatur, ut amuletum laudatum,

G 3

Ex

Ex pelle fiunt thoraces. Adeo enim densa est & solida, ut vehementiores ictus punctim casimq; factos evertat, & ferrei thoracis instar expectatur.

Aper

Aper quasi Afer sive Asper quod in asperis versetur.

Verres sylvaticus, Porcus agrestis mas, ein Wildschwein/ Hauber/ Leuffer/ Haubtschwein.

Sus fera, ὁ ἄγριος
Scropha sylvestris.
Wilde Sau, Kanse.
Sehrmutter.

Porcellus sylvestris
Ein Frischling.

Fera cuius nota, quam non solum Natura obdurata pelle pilisq; hirsutis vestivit; verum etiam ipsa luto & resina quodammodo se loricat, ne telis facile laedi possit, Unde nisi lethale vulnus acceperit Aper, Venatorem conculcat, si ipsum ferire nequiverit.

Dentibus armatur magnis & recurvis, ad incidendum

aptis, Vulgo Wehren/ Wassen/ Hawjahne. Ante biennium in Giersdorff binos notavi, qui adeo excreverunt, ut circulum ferè expleverint toti in se reflexi. Ondus.

Fulmen habent acres
in aduncis dentibus
Apri.

Feminae, Apri non item, aut raro: unde Apri percutiunt, feminae mordent.

Passim insylvis vastis & montibus oberrant. Glandibus vescuntur quercinis, nucibus faginis. Radices Spondylii, Carvii, Angelicae, Filicis maxime appetunt, quas rostro aptissime effodiunt.

Sus fera semel in anno tantum & quidem hyemis principio coit. Vere parit petens maxime invia, praerupta, angusta & opaca. Numerus, partus & ferendi tempus idem atq; in urbanis suis est. Apri hyeme, cum fuerint faginati glandib. & Fagi fructu, capiuntur retibus tensis, canibus, venabulis, lanceis & bombardis, cum auxilio venatorum.

Care

Caro Aprugna inter ferinas optima, Suis cicuris seu domesticæ, cum propter exercitium, tum ob cibum sicciorem & aerem purum ac tenuem quem inspirant, anteferenda. Hyeme præstat. Sale conditur additis Juniperi baccis, & doliolis reservatur per integrum annum. Frigida est & viscosa, facilis concoctionis, citò descendit, multum nutrit: at succum gignit crassiorem & viscosum.

Elix conditur liqamine ex Vino, Melle, Zingib. Cariophyll. Mac. Pipere, Croco, Passul. & amygdalis.

Caput elixum probè, frigidum cum aceto in delitiis, Magnatum mensis apponitur.

Jecur Apri recens, si arefactum teratur ex vino, contra Serpentum morsus bibitur, & Alvi fluxus restringit.

Fel Lienem sedat, & stutinas discutit.

Fimus ad rupta & convulsa ex aceto utilis. Ex aqua aut vino potus rejectiones sanguinis sistit, vetustum laterum dolorem mulcet.

Vesica assa in cibo sumta, sive tosta ex vino sumta, adversus Urinæ incontinentiam valet, Vesicæ dolores tollit, & mingentibus in lectum opitulatur.

Urina Calculos Vesicæ comminuit & expellit.

Vesica Apri cum lotio, addita pingvedine, in fumo suspensa, ut unguenti crassitiem acquirat: tunc si illinatur Herniis mirificè prodesse, Venatores observarunt.

Dens Apri vi pollet adstringendi maxima. In pollinem tritus ex aq. Card. ben. Pleuresi incipienti medetur.

Drachmæ pondere ex ol. Amygdal. dulc. & saccharo Candi, præsentaneum & arcanum in Angina remedium.

Aries.

ἄριος ὀχέτος, ἀπὸ τοῦ ἄριος.

Aries ab impetu ferendi subinde repetito; vel ab ara, quod Aris imponi ad sacrificium solet.

Aries corniger.
Ovis mas.

Wieder/ Hodenwieder.
Eichhammel/ Står. sil.

Masculus

Masculus est Ovium & dux gregis, qui integer retinetur, & ad generandam sobolem Ovibus admittitur. Convoluta in anfractum Cornua ei ceu cestus Natura dedit. In modum circuli enim nonnullis replicantur.

Blaterat hinc Aries, & piabalat Ovis.

Ad coitum commodissima ætas a secundo anno usque ad octavum. Singulis Ovilibus singuli duces constituuntur, qui quoties suo nomine a Pastore vocantur antecedunt, quod ab ineunte ætate facere assuescunt.

Ad quindenos annos interdum vitam protrahunt.

Caro Arietum, minus quidem humoris & lentoris obtinet, quam Ovilla: verum durior, deterior & concoctu difficilior. Præstat junioris seu anniculi, utpote moderatæ temperiei, suavior, concoctu facilior, & melioris succi. Improbatur in senecta.

Sebum, ambustis medetur, scabiem sanat, Cicatrices replet.

Ad mentis alienationem.

Caput Arietis nigri non-

dum Venerem experti, unico ictu amputatum, Cornibus tantum demtis, integrum cum pelle & lana elixabis: tum apertò eo Cerebrum eximes addendo:

Cinnamomi optimi,

Zinziberis albiss.

Nucis miristic.

Caryophyllor.

Macis an. Vnc. s.

Commisce subtilissimum in pollinem redacta cum Cerebro in patella ad prunam non magnam diligenter agitando, ne aduratur. De hoc per triduum Aegro quotidie jejuno dabis cum pane, vel in ovo, vel ex jure, utcumque, modo devoreretur ab ægro, duabus ante prandium horis. Servetur loco obscuro non lucido: diætâ sit conveniens.

Pulmo Arietis recens calidus Capiti, phreneticis utiliter imponitur: Livores, suggillationes & nigras cicatrices emendat, & a calceamentis læsos seu attritos pedes, minutim concisus & impositus sanat.

Fel cum Sebo, Podagris illinitur.

Pellis recens detracta, suggillata delet imposita. Ex hac
ad

ad Rupturam & Scrotitumores paratur in Officinis, Emplastrum è pelle Arietina; cuius descriptio extat apud Gvidonem in Chirurgia magna tract. 7. doct. 2. cap. 7.

Lane Arietinae nidor, uterum prolapsum in suum locum restituit.

Sanguinem sistit, Succida usta cum sigillo Lemnio, loco aspersa.

Pectine ex cornu Arietino Caput pexum, à proprietate ad Capitis dolorem valere, maximè in causa frigida, auctor est Gvainerius.

Ovis.

Ovis veteribus.

πρὸς & Top.

Pecus Plini.

Ein Schaff.

Ovis victu fera videtur, ingenio tamen & moribus mansueta, Quadrupedum mitissima ac placidissima. Mollissimum est pecus & frigoris impatientissimum, nec minùs æstivi vaporis. Lupum naturaliter timet & horret. Morbis plurimis infestatur, maximè scabie.

Pascua Ovillo generi utilia sunt, tenuia, altiora, arida, quæ vel in nevalibus, vel

in prætis siccoribus excitantur, faciuntq; lanam meliorem & molliorem. Ubra verò & humida loca, noxia sunt; sylvestria damnosa lanis. Herbas radicitus carpunt, & arboribus plurimisq; plantis exitiales sunt. Hyeme pascuntur Cofdo, sæno, stramine Avenæ, Pisorum, Quercus, item Ulmi, Betulæ, Fagi, Tiliæ, Fraxini frondibus repositis.

Pingves fiunt potissimum ex potu: quamobrem æstate ad pabuli condimentum, canalibus ligneis, Sal cineribus permixtum Opiliones præbent in meridie, quinto quoq; die, ut sitibundæ plus aquæ hauriant. Sic enim pecus incolume & pingvius redditur.

Coitus omnibus ab Arcturi occasu, id est à 3. Idus Majas, ad Aquilæ occasum id est 13. Calend. Augusti. Terno aut quaternario coitu implentur. Ferunt utrum quinque mensibus, dies 150. Maxima ex parte singulos pariunt, sed aliquando & binos & ternos. Fecundæ sunt ad octavum annum, & si benè curentur, usq; in undecimum. Vita ad duodecim annos,

H

Animal

Animal est Ovis utilissimum, lacte nutrit & carne: Lana & Corio vestit & calceat: Scriptoribus præbet chartas, & chordas Testudinibus: fimo agrum impingvat.

Caro ovilla, το ογολά-
τερας, Schaffetsch/exerementitia est, superfluitatum plena. Succum gignit pituitosum, lentum, pravum. Ventriculo nocet frigido humido, excrementitio. Melior est annicula. Ab Agricolis salitur & infumatur.

Pulmo Ovillus Maniacis & Lethargicis prodesse videtur, calidus circa Caput alligatus.

Cerebrum cum Melle dentientibus Infantibus illinitur.

Sanguis potus, Comitilibus commendatur.

Fel Auribus purulentis cum lacte muliebri instillatur.

Sebum ad ignem liquefactum, ambusto linteolo impositum sanat: cum alumine partib. frigore ustis illinitur: cum cinere Capill. Ven. permixtum luxatos articulos restituit. Ex vino rubro sanguinem sistit, diarrhæam, dysen-

teriam & tormina ventris infusum curat.

Omentum in sartagine frixum, ventri calidè impositum, Colicæ medela.

Lac Caprino crassius est, minusq; serosum, dulce & præpingve: magis alit, non autem usq; adeo utile Stomacho.

Potum calidum, adversus omne venenum commendatur. Recens mulctum gargarizatu, faucium inflammationes mulcet.

Dysentericos juvat, filicibus ignitis in id demersis. A jejuno potum ad pestis præervationem valere fertur.

Butyrum candidum sit, deterius bubulo; facile rancidinem acquirit.

Caseus ovillus Schaffetsch Pingvis est, sapore svaavis, & boni succi: ob id ab Exteris commendatus, haud minus quàm Parmensis aut Batavorum, quibus svavitate haud inferior. In Nobilium aulis optimi sunt ex lacte integro, non demto flore, & addito vaccino, ut nonnunquam fieri solet. Condiuntur aliquando Macis, Majorana &c. Quo recentior eo melior, Vetus durior est.

or est & difficile digeritur. Comestus, vel ex vino potus, Dysentericis auxilio est.

Stercus ovillum (σύνθεσις, Pilulæ stercoranæ Ovi-um Schaffsörbern vulgò) ex aceto sanat Epinyctidas, Clavos, pensiles Verrucas, Thymos, & ambusta igni, Rosaceo Cerato exceptum.

Lana succida (ἰσχυρὰ, ἔγρια δισυμπερὰ, ἔγρια Diof. schmutzige Schaffsvolle / schweissichte Wolle, pingvis, sordida, quæ sordibus, sudorio & succo est imbuta. Æstate colligitur é collo feminibusq; mollis sudore referta.

Calefacit per se, emollit, replet, lenit dolores Capitis, Stomachi, aliarumq; partiũ, cum aceto & Rosaceo imposita. Subvenit inter initia vulneribus percussis, contusis luxatis, desquamatis, lividis, nervis dolentibus, Ossibus fractis, aceto, oleo aut vino imbuta.

Lana succida cremata seu usta, gebrandte vnslatige schmutzige Wolle. Vim habet acrem, mordacem, calefactoriam, quæ citò operatur & penetrat. Ea propter confert humidis, mollibus tumoribus,

ulceribus inveteratis & fíccat vehementer, Crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Illinitur vulneratis, attritis, ambustis, & in fistulas auresq; suppuratas inditur. Lavatur ad Oculorum medicamenta. Modum urendi vide apud Dioscorid. lib. 21. cap. 67. & Hollerium Instit. Chirurg. lib. 3.

Ocēypus, um, (ὀκύνος Diof. quasi ὀδὸς ὑπογ, Hysopus humida, Isopus humida offic. Wollenschweis / schmus. Est succidarum Lanarum pingvitudō. Excalefacit, explet ulcera & emollit, præsertim sedis ac vulvæ cum butyro & Meliloto Resolvit, dolores sedat. In vellere appositum Menses & partus evocat. Aurium & Genitalium ulcera cum adipe Anserino sanat.

Verberum vulpera & vibices Pellibus ovium adhuc calentibus obliterantur, idq; nocte ac die una.

Pelles detractis pilis á Cerdonibus parantur, & aliquo colore tinguntur, ad Calceos, chirotecas, marsupia. Fiunt ex his etiam membranæ, maceratis in aqua cum Calce & postea extensis.

H 2

Ovis

Ovis rejicula.

Ὀὐς ἀποβολιμαῖος
Muswirfling.

Ovis quæ non parit, id est,
quæ ætate vel morbo gravis
est, aut saltem minus idonea.

Agnus.

Ἀγνός, Ἀγνός, Ἀγνός

Ἀγνός Geiz.

Ein Lamb

Agnellus Ἀγνίσκος

Lemblin

Lemmerlin

Fœtus est ovis, qui annum
nondum egressus. Agnus ali-
us Vernalis, alius Autumnal-
is. Vernales qui nascuntur
Vere, majores, robustiores &
pingviores sunt.

Agnus subrumus, Ἀγ-
νός γαλαθινός, νογινός Ho-
mer. Agnus lactens, Lacteolus
Ein Seuzlemblin / Brad-
lemblin.

Agnus cordus, ὀφίγονος,
serotinus tardeq; natus Ein
spates Lamb / Spätling.

Agnus separatus, Ἀγ-
νός σκεῖται abgehaben Lemmer
qui à Matribus jam separati
pascuntur.

Caro Agnina modicè
est calida & humida, pituito-
sa, lentore & mucore referta.

Nutrimētū præbet calidum
& humidum, sed pituitosum.

Editur elixa & assa. Coxæ
assæ meliores, sèves & salu-
bres.

Coagulum omnibus ve-
nenis ex vino adversatur,
Lac concretum seu sangui-
nem ex aceto dissolvit. In a-
qua solutum & Naribus illi-
tum, sanguinem compescit.

Pulmo Intertrigines, quæ
à calceamentis fiunt, sanare
creditur.

Agnus monstrosus biceps
Ein Zweisöpplich Lamb.

Natus hic in pago Plack witz
districtus Leobergenfis: at
mox expiravit.

Vervex

Vervex à viribus, quod cæte-
ris sit fortior, vel quod sit vir
& mas.

κρίος ἐκ τετραμῆνθ.

Ein Hammel / geschnitte-
ner Hammel / Heilwieder/
Frischling Nonn. Scheps
vulgò.

Aries est castratus, cui in-
versi & exempti sunt testiculi.

Castrantur Agni: non mi-
nores antequam calores
aut frigora se exegerint.

Vervecina

Vervicina caro optima est. Melior & salubrior Ovula & Arietina, sapore grata & svaavis, sive elixa sive assa. Conditur elixa Salvia, Rosmarino, Petrof. Carvi, Cepis, Brassica crispa, Zingibere, aceto. Calefacit & humectat ad temperamentum tendens. Corpus alit & sanguinem generat bonum.

Hyemis initio integri trunci sale macerati, fumo indurantur, & sic per integrum annum ferè servantur.

Insessus ex Capite, pedibus Intestinis aqua fluviali sufficienter decoctis, quo ad carnes discedant, paratur tabidis, emaciatis & contractis conveniens sapius facto experimento.

Asinus.

Οὐδ' παρὰ τὴν ὀνησίην γνὼδ
Hominum opera juvet.

Κίλλος,
Escl.

Animal vulgatæ notitiæ, corpore macilento & deformi, gerulum, plagarum & penuriæ tolerantissimum. Auribus & vocis ignavæ sonitu

seprodit. Cor ei magnum, & felle caret. Dentes priores, ut Equus, trigesimo amittit mense, proximos sexto postea mense, neq; etiam tertios quartosq; eodem modo.

Afellus minor,

Afellus degener & vulgaris Colum.

Afellus Dossuarius Varron.

Ein Mühl Esel / Saef Esel.

Color ei murinus.

Asinus admissarius

speciosior esse debet, ut scil. amplioris sit Corporis, Cervice valida, robustis ac latis costis, pectore musculofo & vasto, feminib. lacertosis, Cruribus compactis, coloris nigri vel maculosi.

Exiguo & qvalicunq; pabulo contentus, non solum fruge & herba, sed foliis spinisq; vel pecticis salignis vescitur, vel abjecto faice samentorum, laboris & famis maximè patiens.

Parit duodecimo mense, singulatim magna ex parte procreat prolem, Ea namq; Natura est, ut unum pariat, nonnunquam etiam gemellos.

H 3

Vica

Vita eis amplior 30 annis,
& femina vivacior Mare
est.

Asini carnes pessimi sunt
succo, & concoctu difficili-
mæ, Stomachum lædunt, &
edendo omnino insuaves; ob
id à Culinis abdicantur.

Adeps, cicatrices Gor-
pori concolores reddit.

Fimus, vndequaq; flu-
entem sanguinem cohibet. o-
doratus, & expressa humidi-
tate in Nares injecta & reten-
ta. Cinis ejus, dysentericis &
Cœliacis medetur.

Ungulæ cinis per dies
multos binis cochlearibus po-
tus, Comitiales adjuvare pro-
ditur, oleo subactus strumas
discutit, & illitus pernionibus
utilis. Ulceribus commodè
inspergitur.

Ejus nidore Comitiales ex-
citantur, & utero suffocata.

Apes ex Asini cadavere
nasci, falsum est.

Asina.

ἡ ὄνος.

Cin Eselin.

Asinæ lac, Lac Asininum,
EselsMilch.

Hoc, sicut Lac omne feri
exuberantia superat: sic cate-
ris pingvedine cedit. Tenu-
issimum est & minimè coa-
gulatur, & quoquo versus
ocysimè digeritur in corpus,
verum parum nutrit. Remè-
dium optimum Asthmaticis,
tussientibus, sanguinem ex-
screantibus, Hydropicis, Lie-
nosis & Hecticis.

Non enim est Lac, inquit
Avicenna, quod Hecticis
æquè conferat, ac Asinorum.

Hodio ejus usus apud nos
prorsus inolevit.

Mulus.

ἡ μῆλον.

ὄρενς.

Cin Maul, Maul Thier

Maul Esel

Μῆλον ὄρενς

Mula femina.

Coloris est nigricantis, vi-
ribus in labore eximium, &
sterile: τὸ ὄλον ἡμίονον γένος
ἀγονον.

Ex Eqva gignitur & Asi-
no, mense duodecimo.

Mulæ veloces in cursu, du-
ritia eximia pedum; verum
strigoso

strigoso Corpore, indomito animo, sed generoso.

Vivit ad multos annos.

Ungula ex oleo Myrtio Alopecias delet.

Cinis potus steriles reddit.

Urina cum luto suo illita clavos Pedum curat.

Stercus Mulinum combustum, tustum, cribratum, ex vino immodicum Mensium fluorem sistit, & dysenteriae opitulatur.

Bos.

Βοῦς.

Ein Rind/

Rindviehe.

Vocabulum est commune, Taurum & Vaccam comprehendens. Dentes habet Bos ut reliqua cornigera continuos, bimusq; dentes amittit, non tamen uniuersos. Renes quasi ex multis Renibus exiguis constituti. Lien pro sui magnitudine in longitudinem auctor. Caudæ tenor longus, Pili perbreues. Ruminat & Ungulam habet bifidam.

Pro regione cæliq; statu, & habitum Corporis, & inge-

nium Animi, & pili colorem mutat.

Vescuntur Boves & fruge & herba: pascuntur etiam commodissime in montibus, nemoribus, ubi virgulta & frondes multæ. Pingvescunt iis quæ flatus cient, ut Ervo & faba, pisus.

Bibunt sorbendo, & clarum bibere gestiunt.

Mortalibus magno usui sunt, Aratione, vectura, lacte, Butyro, Caseo, Carne, Corio. Eam ob causam apud Veteres tam capitalis habebatur, qui bovem temere & absq; causa, quam qui hominem occidisset.

Cornua apta sunt Pectinibus, subductoriis, & tubis quibus bubulci & Venatores utuntur.

Ossa tesseris & cultello- rum manubriis apta.

Taurus.

Ταῦρος,

Βοῦς τέλειος ἢ ἐνόσχης,

Taurus non castratus.

Ein

*Ein Stier / Farr /
Farr Dchffe / Bihe Dchffe /
Drummer.*

Mas est in genere bubulo,
& Vaccarum admissarius, na-
turæ robustæ & validæ, qui
tamen in libidinem usq; adeo
concitatus & furens, non sæ-
pius quàm bis in scendis, con-
ceptu verò ipsius Vaecæ mo-
destus castusq;, nihil ulterius
tentat,

Vitam extendit ad annos 20.

Caro Tauri crassa est, &
melancholicæ naturæ, diffici-
lis coctionis, & prævum gignit
succum.

Sanguis crassior Suillo,
& nigerrimus, celerrimè
omnium coit durescitq;. Dis-
cutit mollitq; tumores cum
polenta illitus. Singulari ope
dysenteriiis, mensuris & in-
ternis hæmorrhagiis prodest.

Ad hæmoptoisin cum ace-
to modico, efficax habetur.
Calidus ossa fracta ferrumi-
nat.

Adeps Suillo calidior &
siccior, nonnihil adstringit,
Podagris medetur & scirrho-
sis affectibus. A Renibus lau-
datissimus colligitur.

Priapus Tauri rubri ari-
dus, tritus, & præsumtus Mu-
lieri aurei pondere fastidium
coitus affert, Dysentericis
utilis.

Fel Menses trahit, ulcera
maligna purgat, Sedis ulcera
sanat, & ad cicatricem usq;
perducit. Auribus fractis &
purulentis cum muliebri aut
caprillo lacte instillatum me-
detur, & sibilo earundum ex
Porri succo. Anginis cum
Melle utiliter inungitur.

Vrina si cum Myrrha
instilletur, Aurium doloribus
occurrit.

Lapis in Vesica aliquan-
do reperitur, in pulvere per
se, vel cum succo Ruta Nari-
bus attractus, Caput purgat.

Astragalus ἀσράγαλος,
Diosc. ustus cum vino dentes
vacillantes confirmat. Cum
lacte potus, lumbricos rotun-
dos educit.

Fimus tumores & duri-
ties discutit, suffitu prociden-
tes Vulvas reprimat. Accensi
nidore Culices abiguntur.

Τα γόνου α, Diosc. κώμα
ξύλον α, Tauri glutinum
Gluten taurinum.

Leim / Discher Leim.

Olim

Olim ex lentore mucoso Tergoris bubuli excoquebatur. Plinius ex Taurorum auribus & genitalibus fieri dicit. Hodie ex omnium Quadripedum pellibus conficitur.

Vulneribus prodest Melle aut Resina. In aceto resolutum Impetigines Leprasq; Cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumq; erumpere non patitur.

Vacca.

Bosq; Bos dicitur.

Bos lactaria.

Eine Kuhe/

Melckkuhe.

Forda, Horda ferens Bos est fecundaque, dicta a ferendo *ein Kalbe/ Tragende Kuhe.*

Taura ein gelde Kuhe.

Vacca probantur altissimæ formæ longæq; maximis uteris, frontibus latissimis, Oculis nigris & patentibus, cornibus venustis & lævibus & nigricantibus, pilosis Auribus, compressis malis, pallearibus & caudis amplissimis, ungulis modicis & Cruribus.

Eas, quarum maculosæ sunt pelles, lacte abundare vulgo persvasum est.

Fert Vterum Vacca novem menses, decimo parit, &

quidem singulum, raro geminos.

Tempus admissuræ optimum, medium Veris, aliis Autumno. Cum appetit coitum (appetit autem non diutius quam tres horas) tunc, quam maximè potest, mugitum edit: si non citò admittatur Taurus, naturam claudit, & in alium mensem differt. Uno initu impletur.

Mammas binas inter femora habet quaternis papillis ut plurimum, *mit vier Strichen.*

Vivit magna ex parte annos quindecim: aliquando apud nos decem & octo, & viginti, si corpore benè sint habito,

Carnes vaccinae *Kühfleisch* præter succi pravitate, etiam sexus ratione frigidiores sunt; Agricolas tamen & laboriosos commodè nutriunt.

Ubera das Euter elixa & laminatim incisa torrentur in craticula: & vel sale aut aromatib. Zingib. seu pipere respersa, vel butyro frixa eduntur, saporis non ingrati, at concoctionis difficilis.

Ungularum anteriorum ambustarum cinerem epotum

I

Nutricibus

Nutricibus lactis copiam præbere, Rhazis autor est.

Lac vaccinum.

γάλα Διός.

Milch/Rühmilch.

Lac Vaccinum, quorumlibet aliorum Animalium crassius ac pingvius judicatur; ob id Corporis molem & obesitatem adipisci volentibus accommodatissimum, alimentum cum pauperculis tum divitibus commodissimum, ad pultes & fercula aptum.

Utiliter bibitur diarrhæa, dysenteria & tenesmo laborantibus, si in eo filices aut chalybs decoct. fuerint.

Recens efficax est contra rosiones & ustionesq; ab exitiabilibus medicamentis factas, uti à Cantharidibus, Aconito, Laureolo, Esula &c.

Renum & Vesicæ dolori convenit.

Gargarizatu exulceratis faucibus tonsillisq; prodest,

Stomachum tamen non afflicti & Intestina inflatione vexat. Nocet Splenicis, Hepaticis, Comitialibus, Vertiginosis, febricitantibus & capite dolentibus, attestante Medicorum principe Hippoc. aphor. 64. lib. 5.

Lac prabere Capite dolentibus,

febriculosis, & quibus hypochondria elata aut murruriantia, & siticulosis, malum.

Lactis pingvedo, flos Lactis.

Αφρογάλα, ὀπὸν

πλάσ τοῦ γάλακτος

Caput seu spuma Lactis.

Cremor Lactis.

Saum, Raum

Milchraum.

Lac est pingvissimum dulce, palato maxime arridens, ad nutriendum & moderate penetrandum idoneum.

Condimentum variorum ciborum. Ad intinctus etiam mensis cum carnibus assis, maxime turdis, imponitur, inspersis aromatibus Zz. Caryophyll. Cinnamom, Cymino & sale: verum nimius & frequens ejus usus ob pingvedinis copiam, ventriculum relaxat. cuncto supernatat cibo, nutrimentum ejicit, antequam concoquatur, Vapores in Caput mittit, crassum generat succum. & febribus materiam prabet. Dentibus quinetiam nocet gingivisq; usus assiduus, quippe has humiditas reddit, dentes putrefactioni obnoxios.

Frangula cortices interiores

res crocei in lactis cremore decocti, ad unguenti consistentiam, papillarum rimas in Mulieribus litu sanant, & scabiem citissime curant, vulgato ac frequenti usu.

Butyrum.

Βούτυρον Diosc.

Butter.

Paratur ex lactis pingvedine diligenter agitato & concusso in yasis lacte, donec pingve separetur; dein abluitur aqua pura sæpius, & addito sale ad usum reponitur.

Culinis & mensis Silesiæ nostræ nihil frequentius. Quocunq; enim oleo magis tum nutrit, tum cibos condit; quò fit ut obsoniis additum, olei atq; adipis vicem merito penset.

Calidum est temperatè naturâ pingve & oleosum, facultatisq; concoquentis, paullulum etiam habens digerendi potentiæ, in mediis nimirum Corporibus, secundum duritiem & molliem.

Mollit, lenit, polit, laxat, resolvit, coquit, hebetudini Oculorum præsertim a siccitate prodest. Cicatrices & Albugines exterit, declinationem calidarum fluxionum juvat.

In mollibus Corporibus phle-

gmonas concoquit & digerit perfacile. Bubones & parotides juvat, gingivas extenuat, Dentitiones Puerorum gingivis illitum, & omnes alios in ore affectus phlegmonosos, posteaquam fluxio restiterit, digerit pariter & concoquit.

In cibo cum amygdalis mundis & saccharo pituitam digerit, tussim frigidam & siccam tollit. Pleuriticis & Peripneumonicis affectibus commodum.

Recens etiam contra bestias, quæ virus ejaculantur, venenæq; & foris illitum & per os sumtum, efficax est.

In Aëris pestilenti constitutione, quotidiè cum panis buccella una atq; altera devorata notum prophylacticum.

Illud observandum, Butyrum biliosis & calidioribus Naturis, & febricitantibus non æquè competere, quòd facile in bilem convertatur. Insuper, immoderatione usu, ob superabundantem & humiditatem & pingvitudinem, Ventriculum resupinare ac subvertere, & ad vomitum incitare. Neq; ultimo post alios cibos loco (quod frequentius apud nos fieri solet) ingerere convenit, quippe cum humidum sit ac lubricum, facileq; subduci queat in

superficie natans corrumpitur :
ob hoc ipsum ante alios cibos
sumendum est, ita enim citius
subducitur & aliis cibis viam
munit.

Butyri fuligo,
Butter Raum.

Exiccat, abstergit, fluxio-
nes cohibet, & ulcera celeriter
ad cicatricem perducit. In
medicamentis Oculorum u-
tilis.

Lac ferosum, agita-
tum, ebutyratum, acidum.

γάλα ὀξύδες

ὀξύγαλα Nonn.

Butter Misch/

Rühr Misch/

Schlötter Misch.

Colligitur, postquam bu-
tyrum fuerit separatum, A-
gricolis & validis Corporibus
edulium utile & frequens,
æstate præsertim. Sumptira-
tum Corpora maximè im-
pinguat.

Crassi est succi. Refrige-
rat, humectat, emollit, alvum
lubricat, flatus gignit. Con-
fert calidiori Ventriculo &
feblicitantibus: frigidiori e-
contra adversissimum.

Caseus bubulus,

Τυρός Βίος.

Ein Käse / Kindern Käse.

Paratur ex crassiore Lactis
substantia, admisto Coagulo,
& expresso inde sero, salito
& exiccato.

Fiunt variis modis: vel
enim ex lacte tenuiore dem-
to flore parantur: vel ex la-
cte cum cremore seu pingve-
dine finguntur, sine aromati-
bus: aut variis herbis, Satureja,
Salvia, Majorana, Rosmari-
no, Sambuci floribus, Macis,
Caryophyllis, Croco &c.
condiuntur.

Lac nonnihil calefit, dein
coagulum demittitur, ut scin-
datur, tandem serum separa-
tur, & reliquum in Orbis for-
mam redigitur.

Probatur recens in cibo,
neq; acris, qui noxam Ven-
triculo non inferat faciliusq;
concoquatur.

Non Argus, Largus, non Ma-
gdalena, Mathusalem,

Non Abacuc, Lazarus, Ca-
seus iste bonus.

Frigidæ est naturæ, adstrin-
git, crassos gignit humores,
ægré concoquatur, Calculo-
sis & otiosis maximè noxius.

Rustica gens, & pauper cu-
la plebs, hoc indifferenter sine
noxa quotidiè in cibo frui-
tur; quam probè nutrit &
alit,

Caseus

Caseus & Panis, sunt medicina fanis.

Si toti humanæ naturæ malus esset; omnes utiq; læderet: sed contrarium longa observatione constat. Igitur haud offenderit, si recens in fine mensæ non multum salutus, pro sigillo stomachi assumtus fuerit.

Schola Salernitana.

Ignari Medici me dicunt esse nocivum,

Sed tamen ignorant cur nocumenta feram.

Experto reor esse ratum, quia commoditate

Langventi stomacho caseus addat opem.

Caseus ante cibum confert, si defluat alvus,

Si constipetur, terminat ille dapes.

Ad fundum Stomachi dum sumta cibaria trudit,

Vim digestivam non minus ille juvat.

Si Stomachus langvet, vel si minus appetit ille,

Fit gratus Stomacho conciliansq; cibum.

Vetus, qui linguam parumper vellicat, quamplurimis gravior redditur, omnium pessimus est. Cæteris enim

magis adurit, sitim excitat, & difficilius perficitur. Calculum in Renibus gignit, Iecur obstruit, alvum cohibet. In calidis naturis atram bilem gignit.

Caseus recens mollis impositus, Podagricorum dolores ex calida causa mirifice lenit.

Acris Arthriticorum tophis cum croco bene facit.

Caseus pressus, Ein Zwersch Käse.

Sacculo inclusi lineo torculari fortiter premuntur & siccantur. Cæteris ferè præferuntur.

Caseus oxygalactinus Ein Quark/ Sil. Caseus acidiusculus.

Ex lacte constat frigido, addito Coagulo, & per triduum reponitur loco ut acescat tepido, dein per sacculum lineum fero secreto, & semine Carveo, Croco, Satureja, Macis &c. additis, in variam formæ effingunt formam, vel tricipitem, vel in Pyri longiusculam seu turbinatam, vel in rotundam, aut utrinq; acuminatam. Addunt aliæ Caseum friatum, siccum, & cum pingvedine lactis add. sem. carveo, Croco aut Caryophyllis in massam redigunt.

I 3

Præstan-

Hoc circumlinuntur Apum alvei, felle permixto taurino arbores si teredine infestantur. Vincis utile.

Aqua destillata ambusta sanat, Inflammationes mitigat & Podagricos dolores imposita.

Vitulus.

ὁ μόσχος, Ἰταλός, πέταλος olim.

Vitalus à vitulando, id est, lasciviendo. Em Ralsb.

Bos novellus, Vitulus subrimus, qui adhuc sub matre est.

Em Dehse alsbim so noch sauget.

Vitula, Bucula Βοῦσσις ἢ μόσχος, Em Ralsb alsbim.

Bos lactens, tener, imbellis, ferox.

Caro Vituli lactentis, μόσχειον κρέας, quatuor vel quinque hebdomadarum, mollis est & humida, facilioris digestionis, tutius quam bubula editur. Temperati enim & probi alimenti existit, succum generat bonum, & probe nutrit.

Assaria Renum, Em Nieren Braten.

Venter cum Intestinis, Das Gefröse.

Elixatur aceto, Vino, & a-

romatibus conditus, primis mensis offertur, ferculum palato gratum.

Caput Vituli ferventi aqua pilis demtis elixatur, & aceto, pipere integro, Zingibere, Lardo fixo conditum apponitur. Em Ralsbes Kopf. Succum gignit glutinosum & pituitosum.

Ossa ejus combusta in polinem redacta, ad catillos Metallorum probatoribus idonea.

Ex Pulmonibus, additis Veronica, Betonica, Salvia, flor. Violarum, Macis &c. aqua elicetur, phthisicis & tabidis salutaris.

Medulla Vitulina vim obtinet indurata & scirrhusa Corpora emolliendi, sive musculus, sive tendonibus, sive ligamentis id accidat, sive etiam visceribus.

Igni sacro Stercus Vitulinum recens illinitur.

Juvenius.

Ταυεῖδιον.

Em Sterckechin/Zeit Dehse. Bos junior, qui jam vitulus esse desit, à juvando, quod jam Dominum in agro colendo juvare possit.

Juvenca.

νόστις, πόσις, Junix tenera atatis, Em Ralsb,

Bos

Bos femina, quæ jam cessavit Virula esse, nec dum tamen ad summam magnitudinem pervenit.

Taurus castratus.

Βούς ἐκτομίας,

Bos,

Ein Ochse/geschnitten Ochse.

Tempus castrandi Anniculis est, alioquin minores deformioresque evadunt.

Præstantiores sunt juniores, pingviores. Commendantur à teneritudine & suavitate Carnis, Polonici, qui quotannis ex Litvania & Polonia adducuntur.

Caro bubula, κατὰ βόειαν. Βούβηλα, frigida est & sicca natura, nec adeo prævi succi & difficilis concoctionis, ut quidam prodiderunt. Corpora enim nostra alit commodissime, & alimentum præfertim laboriosis suggerit firmum, nec dissipatum facilem, roburque & sanitatem tuetur.

Hyeme & Autumno accommodatior ejus usus.

Vetulorum & macilentorum Carnes insuaves sunt, ægre concoquuntur, & succum procreant crassum, turbidum & Melancholicum.

Πνεύματι πρὸς χονδρύνειν, der Brustkern/ das Bruststück /

solidior esu graviorque est propter pinguedinem.

Assaria in fictili percocta, Ein Topffbraten.

Assariam Lumborum sine ossibus, quæ tota in vase reponatur, affuso aceto cum sale & baccis Juniperi, & sic vel horis aliquot, vel etiam diebus macerata, cum jure illo admixta aqua lixatur, donec modicum ejus juris supersit, quo medio ferè consumto additur aliquod Butyri cocti. Sic & tenerior, & palato gravior evadit.

Pedes in canario elixi, frigidi cum aceto manduntur.

Circa festum Galli & Simonis Iudæ, Nostrates Carnes sale maceratas in camino suspensas fumigant, ramis viridibus Juniperi accensis, dein reponunt, & sic integro anno incorruptas servant, Aestate operariis & Agriculis cibis commodus.

Sebū, σίος ἐστωπ, Unscher. Siccus est adipe, nec fuditur facile aut liquefit, estque fragile & ad liquefactionem coit, atque concrevit iterum. Valet ad rofionem in Intestino recto aut Colo, nec non difficultatem Intestinorum aut Tenesmum experientibus accommodatum.

Medulla

Medulla taurina colligitur hyemis initio. Calefacit, mollit, rarefacit, ulcera explet. Nervis induratis confert. Tertiò loco post Cervinam & Vitulinam laudatur.

Os é corde Tauri, Creutz. In auser hergen Sæpe in corde Boum, maximè Taurorum, cartilago sive ossiculum continetur, Cervino non dissimile, quod Lanii Vratislavienses diligenter colligunt, & passim pro ossiculo é corde Cervi Pharmacopœis imperitis obtrudunt.

Lapilli in folliculo fellis nascuntur, quandoq; crocei coloris, friabiles, poti Vesicæ Calculos comminuunt, Ictericæ medentur, & triti Betæ succo immisti in Errhinis, Comitialibus subveniunt, & visum mirificè acuunt.

Coria veteramentaria

κατὰ μὲν αὖτὰ Diosc.

Alte Schusslecke.

Crematorum cinis ambusta igni, Intertrigines, nec calceamentorum attritus sanat.

Fumus Naribus acceptus

efficacissimus ad Vulvæ strangulatus remedium.

Eodem serpentes fugari, Aeremq; pestilentem emendari compertum est.

Camelus.

καμήλο

Camelus Bactriana.

Ein Camel/

Camelsthier.

Animal inter bisulca maximum, longo & gracili collo, capite exili, altis cruribus, amplo pectore & villosis, tuberculis in Dorso binis, ut ephippia eminentibus, Colore fusco vergente ad flavedinem, pelle dura, inimicum & infensum Equis. Ab incesto coitu alienissimum.

Dentium superiore ordine caret, & ut Bos ruminat.

Toto tempore, quo rei Veneræ cupidine incitatus gestit, sibi usq; ab omnibus animalibus timet, ut solitudines petat; & id temporis ab omnium consortio separatus solam feminam affectetur.

In Arabia frequens, rara Silesiæ, nec nisi aliquando in aulis Principum visitur.

Pascit

Pascit herbas & fruges,
Hordeo delectatur.

Unipara est, & uterum fert
decem menses.

Vivit diu, plusquàm quinquaginta annos.

Duplex in ministerium habentur Cameli, vel oneri ferendo accommodantur, vel ad pernicitatem leves.

Caro dulcissima ab humana, ex Sacris literis cibo interdicta.

Camelus Dromedarius.

κάμηλος δραμάς á cursu & velocitate.

Camelus Dromas Gesa.

Camelus Arabica

Ein Dromedar

Dromedir.

A Camelo, saltem gibbo in medio Dorso elato differt. Cursu mirabili viget.

Aliquando spectaculi causa circumfertur.

Ex pilis Dromedariorum & Camelorum, qui mediocriter molles & crispi sunt, panni conficiuntur Camelotti dicti. Schamsot.

Canis.

κύων á κύειν id est amare.

κύλαξ

Ein Hund.

Canis femina ein Zuger Hindin.

Animal est latrabile κυλάν δραπορ, homini fidelissimum, á canendo dictum, quod noctu in custodia & in venando signum det. Qvis hominum clariús, aut tantá vociferatione bestiam vel feram prædicat, quàm ille latratu? Qvis famulus amantior Domini? qvis fidelior comes? qvis custos incorruptior? qvis excubitor inveniri potest vigilantior? qvis deniq; ultor aut vindex constantior? Columell. lib. 7. cap. 12.

Ambrosius: Nullum animal tam tenax esse beneficii potest ut Canis, & memor gratiæ, quandoquidem pro domino suo & latrones insilire, & extraneis nocturnos accessus noverit prohibere, mori pro dominis, & commori dominis sunt parati; sæpé etiam illatæ necis evidentia Canes ad redarguendum reos indicia prodiderunt.

Mira ei docilitas, utpote qui nutus domini sui novit,
K nemine

nemine alio id animadvertente.

Ob calidiorem & siccio rem Cerebri constitutionem maxima odorandi sagacitate præditi sunt Canes, ut etiam vestigia ferarum & Domino rum longo post intervallo persentiant.

Coëunt averfa parte, & uno coitu implentur, uterum gerunt novem hebdomadis aut diebus 61. 62. 63. Pariunt quinque, sex, septem, 8. 9. 10. & quidem cæcos: ante septimum aut nonum diem non cernunt.

Siccæ est temperaturæ.

Lac primiparæ perunctum facit glabescere: contra venena Antidoti vicem obtinet. Instillatum sedat aurium dolores.

Axungia canina, *Hundschmer* / ex aceto seu Cerevisia bibitur adversus casum ex alto, ad contusa & rupta, vulgi experimento. Aures exsurdatas reparat, earumq; et & podagræ dolorem tollit. Scabiem Manuum sanat, & pruritus lenit inuncta.

Fel Canis nigri cum appropriatis ex pulvere sumtu, Epilepticis facto periculo mirè conducit.

Urina pruritus & Lepras cum nitro expurgat; vetus, ulcera Capitis manantia, furfures, Psoras & fervidas eruptiones multo magis abs-tergit.

Stercus caninum.

Album græcum Officinarum.

Hundstaath / Hundsdreth.

Colligitur ab iis Canibus, qui solis ossibus per triduum nutriti fuerunt; ob id durum, album, neq; graviter olet.

Siccatur & lævigatur, per cribrum medicinale trajicitur, & ad usum servatur.

Digerit, constringit, siccatur sine morfu.

Fistulâ Gutturi insufflatum valentiss. est remedium in crustis Oris & Angina, in Paristhmiorum Phlegmone, & Tonsillarum magna inflammatione,

In

In Dysenteriiis ex lacte Caprillo probè cocto, & chalybe seu ignitis lapidibus ustulato.

Prodest & summè inveteratis & malignis ulceribus inspersum, vel Emplastris ad id facientibus commistum

Ventri illitum aquas trahit, hydropicis utile.

Calvariæ cinis ulcera desiccet, sedis vitia, rhagades & Testiculorum tumores curat.

Dentium cinis cum Melle vel Butyro illita Mandibulis Infantium, facilem reddit dentitionem.

Pellis benè macerata & comparata cum materia adstringente galla, alumine &c. gestata, plurimum facit ad præcautionem Podagræ. Chirotecæ ex hac paratæ, Manuum leniunt pruritus.

Canum variæ sunt differentia, moresq; diversi.

Mille Canum patriæ, ductiq; ab origine mores.

Cuiq; sua. *Gratius.*

Canis domesticus.

Κύων ὀικίτης, Οἰκόδογος
Canis villaticus Adclamator
Ein Haushund/ Forbergs-
Dorffriede/ Hund
Wacker. Wachhund

Adversus Hominum insidias eligitur, & villam, quæq; villæ juncta sunt, custodit.

Canis pecuarius.

Κύων ποιμαίνων
Canis pastoralis
Ein Schaffriede/ Nieder-
Bich-Hund.

Qui incurfus Luporum & Abigeorum cavet. Domi observat stabulum, foris pecora pascencia.

Canis Anglicus.

Μολοσσός.
Canis Britannicus,
Molossus
Ein Englischer Hund.

Non specie tantum & decore, quantum viribus pollet & taciturna solertia.

Robustus est, magnanimus & fortis.

Canis aqvaticus.

Λάσιος λαχνώσης

Canis villosus, aqvaticus.

Ein Wasserhund

Schieshund/

Zottechterhund.

Qvi Aves bombardâ percussas, ex aqvis reportat.

Canis venaticus.

κύων δρευντικός

Canis velox, gallicus.

Cursor.

Ein Wind/Windspiel

Jaghund/Flieger.

Qvi latebrâ ejectas & fugatas feras persequitur, & vel mordicûs comprehensas retinet.

Canis vestigator

κύων ἰχνευτικός

Canis sagax, odoratus, odorisequus.

Ein Spierhund.

Mediocris est magnitudinis, cujus in venatu solertia & sagacitas plurima, Naris enim sagacitate & odore scrutatur & explorat, & vel prodit inditio, vel de latebris

pervestigatas exturbat feras.

Vertagus

Ein Streuber.

Pauló minor cane sagaci, qvi explorat feras.

Canicula cavernarum.

Ein Lochhundlin/Rüchhundlin/Schliefferlin/Dachshund.

Subit Vulpium ac Melium cavernas, & moribus ad exitum cogit.

Canicula sangvinea.

Ein Bluthund / der dem Blute nachspüret / Leitshunde / die man an starcken Koppeln allezeit leiten mus.

Qvi feram fauciatam ac vulneratam scrutando prodit.

Canicula avicularis.

Ein Federspiel / Ablaghund verlegen Hund.

Canis

Canis Melitæus.

Κύων μελιταῖος.

Ein Lusthündlin
Spielhündlin/
Jungirawhündlin.

Catellus est, qui animi
caussa nutritur, & ad lufum
Muliercularum duntaxat.

Ab infula Melita, ubi in de-
litiis fuisse Canes Melitæos,
Athenæus scribit.

Catulus.

Catellus, Catella

κυνέσιον σκυμνος
κυνίδιονEin Hündlin/ Junghündlin
Gwelff.

Catulus lactens ventri ap-
positus malum Colicorum ad
se trahit, doloresq; Colicos
levat. Ventriculo frigido &
langventi calorem & robur
fotu afflat. Ingravescēte
dolore Podagrico ad pedem
affectum positus, non tantum
calore suo diffilat materiam &
digerit, sed mali vim ad se
pertrahit, ita ut interdumq; voq;
mori sit animadversum.

Axungia Catuli articulis reso-
lutis auxiliatur, si ea Spina
Dorsi & artus illinantur.

Canis rabidus.

Κύων λυσσώδης

ein törichtcr/rasender Hund/
wütender tauber Hund.

Canis magis æstate Cani-
culæ ardoribus, & hyeme fri-
goribus vehementissimis in
rabiem agitur, quam reliquis
temporibus ab atrabiliis
excrementis: perusto nimi-
rum æstate eorum sangvine,
hyeme verò frigoribus con-
creto.

Insidet virus in saliva cali-
dum & siccum, malignum ve-
nenatum & contagiosum.

Indicia sunt: Corpus
gracile siccum: Oculi rubent:
Cauda demissa: spuma ex
ore fluit: Lingva foris porri-
gitur tanquam bile colorata:
Obviū quemq; insilit, citraq;
rationem occurrit: gradu in-
cedit lento: Aures demissæ:
Vox abscissa: Caput stupi-
dum &c.

Morsi á cane rabido

λυσσώδης κῆτος, ὑδρόφοβος.

Vulnus apparet manifestum.

Taciturni sunt & cogita-
bundi.Somnus inquietus cum pa-
vorib. nocturnis.

Κ 3

Aspectus

Aspectus ferinus cum sub-
murmuratione.

Solitudines deligunt, Lu-
cem & candida oderunt.

Facies & extremæ partes
rubent.

Aquam expavescunt: Ner-
vi convelluntur.

Siti deficiunt; & tandem
miserabiliter moriuntur.

Antidota.

Cancrorum fluviatilium
cinis cum Gentiana & Thu-
re.

Rasura Taxi Arboris.

Gentiana, Aristolochia.

Lumbrici terreni preparati.

Fraxini summitates, Ca-
storeum.

Jus Hirundinum coctarum
potum.

Theriaca Andromachi.

Mithridatium.

Diateffaron.

Antidotus Mattioli.

Aqua nostra Theriacalis.

Vulneri: Oxalis trita &
imposita.

Verbena

Sigillata Strigensis.

Bolus Armenus.

Theriaca.

Pili Canis rabidi im-
positi.

Capreolus.

Δορκός Arist. á δέγκω, id est,
acutè video.

Δοξέ, Δορκάλις.

Caprea Plin. & Recent. quòd
qvandam Capræ similitudi-
nem habeat; vel á carpendis
virgultis.

Ein Reeh Sil.

Reehböck Lin.

Reehgeiß.

Corpore Cervum refert,
nisi quòd minor sit. Cornua
exigua, ramosa, Cervinis fe-
ré similia, nec singulis annis,
ut Cervis, decidua. Timidus
est & cursus velocissimi, no-
cturnæqvè cernere ac interdum
creditur.

Passim in sylvis vastis &
montibus versatur. Hyeme
Rubi folijs virentib. frui-
tur.

Capitur ut Cervus.

Caro Capreoli ex velocita-
te motus & cursu assiduo, á su-
perfluis humiditatibus exone-
ratur, teneriorq; & concoctu
facilior redditur seu efficitur,
ejusq; saporis & odoris gravi-
tas tollitur. Corpori bonum
alimentum exhibet, & minús
excrementium; quamvis san-
guinem ad atram bilem ali-
quando tendentem creet.

Conveniens

Conyeniens Cibus Pituitosis, Colicis, Dyfentericis, Comitialibus, ob siccandi vim. Obstruit tamen alvum.

Præparatur ut Leporina & Cervina. Coxæ Nechkeusen affantur, superfuso liqvine ex vino saccharo, Amygdalis, Passulis & aromate cōdito, pro delitiis habentur.

Jecur tostum comestum, Oculorum acie reficere creditur.

Fel Auribus instillatur, cum ol. Ros. earum strepitus & sibilum demit. Cum Melle Oculis illitum nāvos & ungves discutit, visumq; reficit.

Stercus ex vino albo potum, contra Jctericitiam præsentaneum remedium.

Pellis depilata præparatur ad indumenta & tibialia. Præfertur Hircinæ.

Ex cornibus candelabra fiūt.

Catus domesticus.

ὁ γαλεῖτης

Ἀλουργῶ, παρὰ τὸ ἀϊόλλειον τὴν οὐρὰν ἀβλанда Caudæ vibratione.

Catus qvafi cautus, a solertia & astutia in venandis Muribz.

Felis, Feles, Cattus murilegʷ.

Ein Kase/Katter.

Animal est nocturnum, familiare ac domesticum, specie Leoni non absimile, præser-

tim facie, dentibus & unguibus. Auriculæ acutiores. In tenebris illi fulgent radiantq; oculi. Lingva imbricatæ asperitatis, & limæ similis, attenuansq; cutem hominis. Femina libidinosa sunt & salaces: itaq; Mares ad coitum ipsæ frequenter alliciunt, invitant, cogunt, puniunt etiam, nisi pareant.

Tot numero pariunt, quot Canes.

Muribus est infestus & Avibus. Lepusculis quoq; insidias molitur, Pisces mirè appetit, quibus tandem & vescitur.

Ad decem annos vitam suam extendit.

Differt colore. Alius enim rubet, alius candicat, griseus alius, alius niger prorsus, alius deniq; coloris varii.

Caro Cati laxa & mollis hæmorrhoides sanat, salita, rufa & imposita, extrahit sagittas, tela, aculeos, spicula.

Qui de Cerebro masculi Cati ederit, dementatur ferè. Meatus enim Cerebri obstruit, ut spiritus Animales impediat, ne ad posteriorem ventriculum transeant; unde exclusa memoria sine mente efficitur Hinc proverbium enatum in Amentes.

Er hat Katzen gehirn gessen,

Curantur Lemnia terra ex aq. Majora. Diamosch. dulc. cum Vino, Pulv. bezoartico nostro preciofo, & aliis qvibus spiritus reficiuntur.

Axungia Cati castrati, mirifice Articulorum affectibus prodesse, experientia comprobatur.

Spinam aliudve qvid faucibus adhærens, Felis fimo extrinsecus perfricato, aut reddi aut relabi tradunt.

Stercus Cati æquali pondere Sinapis ex aceto illitum, Alopecias curat, & Podagricos juvat.

Sanguinis guttulæ tres ex venula sub cauda aperta Cati maris, cum Malvatico potæ, Caducum penitus curant, ut per vitam non redeat, Nobilibus qvidam observavit.

Catus sylvestris.

γαλῆ & γῆρα Arist. Gaz.

Felis sylvestris.

Ein Wilde Raue
BaumNeuter.

Major est domestico, pilo ex arisco fulvescente sed variato, nigræ undulatim intermixta.

Vivit in montibus & sylvis ex captu Murium, Avicularum & Lepusculorum &c. Arbores scandit prædæ gratia.

Aliquando retibus Leporibus tensis capiuntur: frequenter bombardarum globis impetuntur.

Caro mollis & humida, qvâ Qvidam in cibo utuntur, capite & caudâ abscissis.

Axungia calefacit, emollit, discutit. Ad Contracturas & Articulorum affectus reponitur: haud contemnendi usus.

Pellis mollis & pingviscula, paratur a Pellionibus ad calefaciendum Ventrículum frigidum, appetitumq; excitandum, instar scuti stomachici, verum Oculos debiliores offendit. Arthetici Articulis imponunt.

Cercopithecus.

Κερκοπίθηκος

Κῆρος Aristol.

Simia Maris

Ein Meerfage.

Ludicrum & actionum Hominis æmulum animal, Simiæ dissimile voce, pilo Asinino, nigro

nigro Capite, Cauda proluxa.

Cercopithecus generat Africa.

A Nobilibus aliquando aluntur.

Cervus.

δ ἑλαφος παρὰ τὸ τοῦ ὄφθεις ἑλᾶν qvòd serpentes capiat.

Cervus ἀπὸ τῶν κεράτων ἁ cornibus gerendis.

Ein Hirsche/Hirsh.

Cerva ἡ ἑλαφος Eine Hinn/Hinne/Hindin.

Genus Animalium sylvestr. simplex, & omnium rerum miraculo stupens, cursus velocissimi, & ingentibus armatum cornibus.

Magnitudo ei Asini, Corpus fulvum, aliquando candidum. Collum gerit procerum atq; erectum, summasq; cacuminat Aures. Crura habet gracilia. Dentium ordine superiore caret, & ruminat. Nam ita divisæ apparent, ut quadruplices videantur: Cor pro ratione magnum, Felle vacat.

Femina minor Cervo, Cornuum inops mutilaq; est, visu acuto, scissa ac veluti divisa

Aure est. Ubra qvaterna ut vacca habet.

In Silesia nostra Cervi hodiè minùs qvàm olim abundant, qvia sylvæ ob Incolarum frequentiam indies minuuntur.

Ad sex annos rami augentur, Vanum est credere, Cervorum ætatis annos dignosci posse ramorum numero, qvòd singulis annis unum superaddant. Qvippe cùm longævi admodum sint, si qvotannis ramorum numerus augeatur, profecto iis, qvos ultra centum annos vixisse narrant Autores, Cornua qvercubus & pinis majora fuissent. Senectutem indicant Dentes, cùm aut pauci inveniuntur, aut nulli.

Omnibus annis statuto Veris tempore, mense scil. Aprili Cornua amittunt. Quo facto occultant sese interdium velut inermes, idq; asperis opacisq; faciūt locis, ut Muscarum radiis vacent. Et qvandiu carent iis, noctu procedunt ad pabula, donec recipiant Cornua, qvæ primùm qvasi Cute vestita, & molli lanugine hirtiuscula emittunt: sed cùm creverint, Soli exponunt, ut excoqvantur & siccescant.

L

Coitus

Coitus ab Arcturo, mense Augusto & Septembri circa diem Egidii, hinc venatores dicere solent :

Auff Egidii tritt der Hirsch in die Brunst.

Implentur paucis diebus, & ab eodem multæ, Uterum ferunt octo menses magna ex parte unum, aliquando geminos pariunt.

Libidinis tempore efferantur, & certant pro feminis, seq; mutuis interdum vulneribus vel Mortis periculo conficiunt.

Caro cervina, τὸ ἐλάφειον, Hirschwildpret/Calida est dura & sicca, Bubulæ similis. Tardè enim concoquitur, parū alit, ac bilem atram auget, & vitiosum sanguinem gignit.

Hyeme, tutius sumitur quàm æstate, meliusq; ab innato calore superatur. Nisi enim probè concoquatur, crassum humorem generat, Jecurq; & Splenem obsepit obstruitq;. Quinetiam Corpus tremulum atq; infirmum

evadere, ex frequenti & immoderato eius usu traditur.

Libidinis tempore, vitatur & fœtet, Extremitas Caudæ venenata creditur.

Sanguis, Alvi fluxiones cohibet, ex vino sumtus venenatis sagittis refistit.

Pulmo Phthificis utilis, cum gula subarefactus in tumo, deinde tusus, ex Melle tussim sanat.

Sebum siccantis est naturæ, calefacit, lenit. Intertrigines lenit, infarcit, sanat Labiorum fissuras.

Medulla, ἐλάφειος μυελός, omnium laudatissima, calefacit, mollit, rarefacit, ulcera explet, venenata fugat peruncta ut Serpentes: indurata & scirrhusa Corpora emollit, sive Musculis, sive tendinibus, sive ligamentis, sive etiam visceribus id accidat. Curat ambusta. Conducit omnibus inflammationibus, præsertim Vulvæ.

Pudendum Cervi.

Αἰδοῖον ἐλάφου Diose.

Genitale

Genitale Cervi

Sanguine probè expresso, abluitur vino aut aqua destillata; deinde in furno probè exiccatur & reponitur.

Cum vino generoso incitat Venerem, remorantibus urinis auxilio est, & dysentericis salutaris.

Adversus pestem & Morbum Comitiale a Nonnullis prædicatur.

Testiculi Cervini sicci ex vino poti, concubitus cum voluptate excitant.

Cornu Cervi.

ἐλάφου κέρας Diose.

Cornu Cervinum

Hirschhorn.

Cornua gemina majora
Ein Gehörn/Hirschgeweih.

Cornua tenera & simplicia Mordhsolben. In cibum Nobilium & Principum veniunt. Aqua ex his destillatur, contra venena & morbum Comitiale magni usus.

Rami majores Stangen,

Rami minores Ende/ Zim-
cken.

Adminicula, Ἀμυντήρες vocantur rami, qui imis Cornibus prominent ante frontem, quibus in pugna utuntur juniores: senes autem carent.

Integra ligneo Capiti inserta, Divitum & Nobilium parietibus affiguntur, cum ornamentigratia, tum ut usum præbeant suspendendi a ramis, quæ quis voluerit.

Adusum Medicum commendantur collecta intra festivitates Mariæ, id est intra xv. August. & viii. Septembris; quod his temporibus Cervus se perfectissimè habeat, & constet ex omnibus partibus absolutè.

Frigidæ & siccæ sunt naturæ. Profunt Dysenteria, excreantibus sanguinem, Cæliacis, Regio morbo, Vesicæ doloribus, feminis fluxione Vulvæ laborantibus, cum liquore appropriato.

ἐίνυμα, Ramentum, geschabet Hirschhorn.

Rasura in aqua decocta & pota, mirabiliter Lumbricos

L 2

Ventris

ventris enecat & expellit. Crede mihi, primas istas Cuspides contra venena plus prodesse, quàm vulgare Vnicornu, præsertim si asterisci notam habuerint.

Cornu Cerviustum,
G. brandi Hirschhorn

Uritur fictili novo crudo, luto circumlito, ad candorem, in fornace figuli, & præparatur lævigando in porphyrio ad usum. Maximè confert in febribus malignis, ubi fluxus adest, & vermes etiam Intestina lancinant. Ex vino curat Icterus. Oculorum ulceribus & defluxionibus salutare remedium. Dentes vacillantes confirmat. Mirabilem vim tribuunt Nonnulli renascentibus Corniculis Cervorum, ubi primùm extuberrant, & quasi plumata lanugine integra concoquuntur, dum mollitie diffuant ad accopa.

Os è corde Cervi.

Cordis ossiculum,
Carrilago Cordis Cervini
HirschCreustlin/
Creus ausim Hirschberg.

Corpus est cartilagineum, quod in sinistra basi Cordi, ab orificio Arteriæ magnæ &

Venæ arterialis, duorum semicirculorum penè figura, sese mutuo externo ambitu contingentium, consistit.

In senioribus Cervis, nec omnibus, nec saltem intra Mariæ festivitates, ut vulgi opinio est, reperitur.

Passim bubulum in Officinis pro Cervino usurpatur: quàm rectè, doctis & in arte exercitatis dijudicandum relinquo.

Omnibus Cordis affectibus confert genuinum. Occulta proprietate custodit partum, & prægnantibus mirè confert. Partum facilem reddit, Cordis Palpitationem, tremorem, Lipothymiam avertit. Omnibus venenis maximoperè adversatur. Antidotis, Theriacalibus & cordialibus Confectionibus miscetur.

Calcaneus Cervi.

Ἀσράγαλος Ἐλάφου.

Ελάφιον, κώνιον, Hesiod.

Talus Cervi,

Hirschsprung.

Dysentericis pulver. ex aqua appropriata utilis.

Bezaar Elaphinum.

Bezaar Cervinus. Bezoar lapis Non. falsò.

Lachryma

Lachryma Cervi lul. Cæs.
Scal.

Moschus est infra Oculos Cervi juxta angulos lachrymales genitus, colore Citri, odore vini, Castaneæ magnitudine. Ante centesimum annum in Cervo nulla est, post eam ætatem accrescit ad Oculi canthum, ipsis ossibus, atq; in os protuberans concrescit, ea duritia, quæ Cornu superet, Quæ parte prominet, rotunda est, insigni nitore coloris fulvi, non sine vestigiis atriorum venularum. Tanta lævitate ut tactum ferè effugiat: ita enim sese subtrahit, ut propemodum seipsam movere videatur, Hæc Jul. Cæs. Scal.

Vim habet siccandi & adstringendi: Adversus venena remedium præsentissimum. Peste correptis datur cum vini momento: unde tantus cietur sudor, ut penè totum solvi Corpus credas. Fabæ unius magnitudine ex vino robro sumtum, mirum in modum commodat, & appropriatum est dysentericis remedium.

νεβρις, δ' ορσά' ελάφου.

Pellis Cervina Hirsch

haut / aptatur dentis pilis ad Thoracis femoralia & chirotecās.

Feminæ ea ventrem cingunt, Colicæ mederi & partum accelerare affirmantes.

Hinnulus abhinniendo.

νεβρις, ελάφου

Κεμὰς

Ein Jung-Hirs / Hind

Hindtsalb.

Cervus juvenis seu filius, Animal imbelles & debile, acutissimi visus, & velocissimi cursus.

Coagulum contra Serpentium ictus valet, & quales cum Leporino vires sortitur.

Carnes habet teneras & digestibiles, propter motus frequentiam.

Inunctus ejus sebo vel sanguine, à serpente illo die non tangitur.

Cervus Subulo.

Subulo plur.

Brocardus.

Cervus bimus.

Ein Spieß-Hirsch.

Subulones sunt Cervi, quibus Cornua sunt simplicia minimeq; ramosa, ad subularum similitudinem.

L 3

Anniculis

Anniculis nondum Cornua nascuntur, nisi quod initii gratia, sit initium quoddam protuberans, quod breve hirtumque est. Bimis cornua primum oriuntur simplicia & recta, ad subulae formam. Trimis trifida; atque deinceps ad hunc modum procedit numerus usque ad annum sextum.

Carnes meliores sunt Cervinis antiquis, faciliusque perficiuntur.

Citellus.

Mus Noricus, Agric.

Ein Ziesel
Ziesel.

Animalculum Criceto minus, instar Mustelae domesticae, longum & tenue, Cauda admodum brevi, colore cinereo seu dilutiore. Caret auribus, sed meatus habet. Dentes murium dentibus similes.

In agris Boemiae frequentes, terram excavant, & pro hyberno alimento fruges comportant.

In cibum repliuntur recentes, tum in fumo siccati.

Ex hujus pellibus olim fiebant pallia feminarum Silesiae, vulgo Weiber Kirschen.

Cuniculus.

Κύνιλος, γιόγυχος
λαγιδάξ, δασύπους Arist.

Lepus minor

Ein Künigle/Künele
Kannichin.

Animalculum Leporini generis, sed minus, coloris albi, nigri in cinereo fusci, leporini aut varii, nonnunquam candidi, nigris aut rutilis maculis stellati: cetera Lepori non absimilis.

In Angliae, Hispaniae, ac Balearum insularum sylvis, lucis ac nemoribus, ingens Cuniculorum copia. Apud nos non nisi domestici sunt, & in domibus aluntur.

Magna ex parte sub terra, quam perfodiunt, in cuniculis vitam traducunt. Progrediuntur mane & vesperi, & vescuntur herbis, gramine, trifolio aliisque plantis, reliquo tempore fere latent.

Miré

Mirè brevi multiplicantur ob crebros partus. Omni enim mense pariunt & super-
fœrant, ferè circiter quinos aut senos, aliquando singulos. Statim à partu requirunt Mares, & nisi admittantur, indignantur aliquando. Lac præbent Catulis per dies 21, ferè.

Caro horum dulcis candida, ori grata, melior & facili-
or Leporina, Stomacho utili-
tilis.

Cerebrum venenis resistere creditur.

Cuniculus totus exustus cum Costo & Folio medetur faucium inflammationibus der Breune.

Axungia articulis & nervis induratis utilis.

Dama vulgaris.

Ἀρκὰς πλατυκέρας Diosc.

Caprea Platyceros à cornuum latitudine.

Dama recentiorum.

Ein Dämslin/Dämsling
gemein Damhirsch
Dänhirs.

Capræ est magnitudine,

colore Dorcadis, Capreolo major. Accedit enim ad corpulentiam Cervi. Cornua habet lata parte superiore, & ramosa, & cervices juba-
tas.

His abundat Borussia : In Silesia aluntur in theriotrophis Magnatum.

Caro in qualitatibus Capreolo similis, modici recrementi. Sangvinem generat atrabilarium, hæmorrhoides mover.

Elephas.

ἐλέφας Diosc.

Elephantus

Elephant/Delfant.

Ferarum Quadrupedum vastissimum, mitissimum & placidissimum, si circuretur, evadit.

Caput ei magnum, Collum breve, Aures verò undiq; duorum palmorum amplitudine. Nasum, quæ peculiariter προσοσκία promuscis appellatur, longissimum habet, concavum, grandis tubæ instar, gracilem, flexilem, mollem, qui infra anteriores dentes ad terram fermè promittitur, quo pro manibus utitur.

Eo

Eo namq; Cibus tam siccos quam humidos colligit, capit & in os perinde ac manu ad-movet. Dentes illi utrinq; quatuor intus, quibus conficit cibum, atq; in farinae speciem molit. Os gerit Pectori proximum, ut quod cum suillo ineat similitudinem; e cujus superna parte Dentes duo prominent præcipue magnitudinis, qui proni cuspede deorsum vergunt. Decidunt & renascuntur quibusdam temporum intervallis. Pedibus nititur rotundis, disci instar, latitudine duum triumve palmorum, quos callosa materia obducit. Ungulis quoque circum rotundis, mediocrium Concharum magnitudine. Crura ei magna ac fortia (priora posterioribus longiora) uno tantum osse indivisa constant, sed genua flectunt, utpotè & cætera Quadrupeda. Cauda bubuli trium palmorum circiter longitudine, rarissimis pilis referta. Corio integitur Bubalino simili, cancellatorarissimis horrendæ pilis, coloris cinerei.

Viscera Suillis proxima, sed majora. Genitale parvum simile Eqvino. Testes intus conditi. Mammas femina

habet binas cum papillis duabus, non in pectore, paulo citra sub armis,

Adolescit ad sexdecim palmorum altitudinem. Uniparum est.

Coituri petunt solitudines, ineunte Vere circa annum 20. Uterum fert sex menses & annum; per triennium sec. Arist. Parit posterioribus Cruribus subsidens innitensq; manifestum cum dolore.

Elephantos fert Aphrica, Mauritania, & Æthiopia: sed maximos gignit India & Zelia.

Vicitant arborum tam frondibus quam fructibus. Gaudent omnibus, circaq; fluvios vagantur, quos lubenter intrant Bubalorum more, Hyemis ac frigoris impatientes.

Trécentos annos vivere, autor est Basilius.

Alii Mares vitam extendere ad annos 200. Alii 120. ajunt.

Ingenio & intellectu Homini-bus proximi sunt: siquidem patrios sermones intelligunt, summam præstant obedientiam, prudentiam servant, & religionem præseferunt.

runt. Solem namq; & Lunam venerantur.

Elephantum vivum Silesia vidit.

Ebur.

ὁ δὲ πρὸς τὴν μάλλον κίερα ἐλέφαντος.

Dens Elephantis,
Cornua Elephantis, *Aelian.*
Elephanten Zahn/
Elffenbein.

Ebur, dentium Elephantorum materies, non ossium, quorum nullus in medicina existit usus, officinis notum, Siccandi & adstringendi vim obtrinet. Confert diuturnis obstructionibus. Cordi & Hepati robur addere creditur tota substantia. Albas Menstruum fluxiones ex seminis Lactuæ cremore cum aqua, in qua chalybs extinctus, extracto, sistit. Regio Morbo laborantibus ex vino aqua Cichorii aut Lupulorum datur: cum hydromelite, Epilepsia.

Singulariter ad vermes in febricitantibus valet.

Mulieres hujus potu ad concipiendum foetum aptissi-

ma redduntur.

Cum Metridato sumtum, non parum Memoriae inservit.

Illitum cum Melle abstergit, Paronychia sanat.

Ebur ustum,
σπόδιον,
Spodium Offic.
Gebrandt Elffenbein.

Plus siccat rasura Eboris. Cum aqua plantaginis curat Sangvinis fluxum & Diarrhæa; nec non Hepatico fluxui & Dysenteria; utile.

Equus.

ἵππος.

Equus ab æqualitate seu paritate,
Ein Pferd/
Ross.

Equus admissarius,
καβάλλος, ὁ χεῖντος ὁ χῆτος.
Ein Gaul/
Spring oder Schelhengst.

Emissarius, qui sobolis gratia admittitur ad Equam.

M

Equa

Eqva

ἢ ἵππος, ἵππας
ἵππος δὴ λέα

Ein Stude, Merch/
Mutterpferd/
Fole.

Canterius quasi carenta-
rius, quod semine careat.

Eqvus exectis testibus.

Ein Balach
Minch
Hengst.

Inter Quadrupedes animal
nobilissimum, vitæ humanæ
multis modis utilissimum, in-
genii simul & Corporis viri-
bus præstans. Cervix juba
ornatur, & pili in juba largi.
Dentes ei continui numero
40. in senectute candidiores
fiunt.

Septimo anno omnes æ-
qualiter expleantur, & ex eo
cavatos gerit, nec postea quot
annorum sit, ex Dentium
mutatione comprehendi po-
test. Ungulas habet in pedi-
bus solidas. Proprium ejus
hinnire.

Pabulum ei convenit duri-
usculum, & quod non inflet,

ut Avena: aliquando & Hor-
deum. Alitur etiam stramen-
to, fæno, herba. &c. Gau-
det pratis riguis & paludibus.
Bibit enim aquas libentius
turbidas & crassas; quæ si cla-
ra est, interturbat cum ungu-
lis suis.

Salacissim. omnium tum
fœminarum, tum Marium E-
qvus est, excepto Homine.
Coire incipit bimus, tam mas
quàm femina; sed hoc in
paucis fit. Plurimum autem
trimatu coeunt, & proficiunt
subinde in generando, ut pro-
les præstantior ad annos us-
que 20. procreetur.

Coitus fit verno Æquino-
ctio. Ab hoc fit admissio usque
ad solstitium. Non certo di-
erum numero impletur; sed
aliquando uno, duobus aut
tribus, aliquando pluribus.
Mense duodecimo, die 10.
nasci ajunt. Pariunt magna
ex parte singulos, raro gemel-
los. Gravida stans parit.

Vivit mas magna ex parte
annis circiter 35. femina plus
quàm 40.

Lac

Lac Eqvarum Epilepticis, Phthificis, tussientibus à veteribus commendatur: hodie ejus usus contemnitur.

Pingvedo Partis medix inter Aures Kampffschmied Luxatis articulis commodissime illinitur.

Testes Equi castrati frustillatim concisi, & in fumo siccati, pulv. & in vino poti, quantum tribus digitis datur, idq; si opus fuerit, bis aut ter repetatur, ad Secūdinas pellendas præsentissimum remedium; & plurimis jam deploratis profuit. *Ges.*

Saliva triduo pota tussim sanat; ad fervorem faucium commendatur à Rusticis.

Ovum unum atq; alterum Equi avena pasti, aceto aut vino dissolutum, & per sindonem colatum, addito succo Veronicæ, in Colica & Pleurisi auxiliare à Mulomedicis prædicatur remedium. Crematum cum aceto sanguinis eruptiones cohibet; etiam recens olfactum. Cum ol. Rosato instillatur ad Aurium dolores.

Dentes usti Dentifriciis miscentur ad dealbandos dentes.

Ungula suffitu mortuos Partus ejicit.

Capilli usti sanguinem cohibent:

Ex fetis Caudæ finguntur laquei, quibus, appensis baccis Sorbi aucupariæ Autumno, in montibus & sylvis, Turdularum, Merulorum, Turdorum & Rubecularum infinitus muneris capitur, cum aliunde in hæc montana advolarunt.

Lichenes Equorum.

Λειχήνες ἵππων *Diosc.*

Sunt in Equorum genubus & super ungulas indurati calli, in earum flexu nati, qui ad quemlibet morsum Animalium commendantur.

Hippolithos.

Lapis in equo natus,

Rosstein

Ros Bezoar.

Ante annos paucos civis & vir consularis Chilianus Othmannus Vratislaviæ aluit Equum, qui per secessum plures lapides læves, ac si politi esset,

M 2

Bezoarticiis

Bezoarticeis Indicis non dissimiles reddidit: tandem Eqvo mortuo, singularis reliquis major & pulchrior Intestino hæsit, cuius magnitudo Limonii mali non exacte rotundus, sed adeo lævis ac si arte ex-politus esset, lapidem Bezoar dictum ferè representans. Hanc Magnus ac nobilissimus Dom. Abrahamus à Jencowitz, Capitaneus Vratislaviensis mihi cum Bezoar Persico pulcherrimo & maximi valoris, aliisque gemmis Cratonianis ostendit.

Equus refractarius
Haremsitz Ros.

sternax das gerne abwirft.
calcitro, calcitrosus schlend Ros.

cespitator das anstosset.
succussarius das hart drabet.
gradarius, Asturco Zeltner.
spadiceus Braun Ros /
Dreumling

glaucus ein Schimmel
ruffus ein Fuchs.
niger ein Rappe.

Scutulator Ein Apfelgrauer
Hengst propter orbes quos habet candidos.

Eqvuleus.

πῶλον, ἢ πᾶλον
Eqvuleus, Pullus eqvinus
Ein Füllen / Muttstüllen
Hengstlin / Rößlin.

Medulla Crurum Eqvulei
tendines induratos emollit,
Contracturæ medetur illita.

Hippomanes.

τὸ ἵππομανές
Pferdgist.

De Hippomane Amoris rabie insaniaq; variæ sunt Auctorum sententiæ.

Aristoteles hist. Anim. lib. 8. c. 24. Qvod Hippomanes vocant, hæret quidem fronti nascentis pulli, ut narratur, sed Eqvæ perlábentes abstergentesq; id abrodunt Hinc Virgil. 4. Aeneidos.

Quæritur & nascentis Eqvi de fronte revulsus,
Et matri præreptus amor.

Idem Arist. 6. Anim. c. 18. Eqvæ tempore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent, jactant caudam crebrius, vocem imitant, non quod pullis nascentibus adhæret. Accipiem humorem difficile esse ajunt,

ajunt, quod paulatim admodum labitur. *Virgilius 3 Georg.*

Hinc demum Hippamanes vero quod nomine dicunt Pastores, lentum destillat ab ingvine virus.

Plinius lib. 8. cap. 42. Proditur Eqvis amoris innasci veneficium, Hippomanes appellatum, in fronte Caricæ magnitudine, latiusculum, orbiculatum, colore nigro seu fulvo: quod statim edito partu devorat foeta, aut partum ad ubera non admittit, si quis præceptum habeat.

Petrus Gyllius ex Aeliano, Porphir. etc. lib. 4. c. 21. Carunculam unâ cum pullo enatam, alii in fronte insitam esse, alii ad lumbos, alii ad genitalia adhærescere ajunt; eam sanè nuncupatam Hippomanes, primum ut Eqva peperit, continuo devorat, & Dei benignitate misericordiam in eqvinam stirpem occultat, ne si, ut ferunt, id ipsum usque ad extremum vitæ diem pullus semper insitum in se perseveraret habere, ad effrenationem impotentis Veneris, tam mas quam femina rueret, & libidinis rabie eqvinum genus

funditus periret. Quod quidem ipsum penitus cognitum Pastores habent, ac si quando ad amatorias insidias egeant, ut ipsum ad cupidinem Veneris inflamment, diligenter observant, quando Eqva ventrem ferens pariat, atque statim à partu pulli, à pullo abscindunt, & in Eqvæ ungulam injiciunt Nam in hanc abditum & conditum optimè servatur.

Dicam, quid ego observaverim: Pullus eqvinus dum nascitur, ore gestat nonnihil prominentem molem carnem, oblongam, molliusculam, fungosam, coloris fuscæ, aliquando ex livore rubentis, palmæ latitudine, longam fere dodrantem, Lienis formam similem, unde ab Hipponomis vulgò *der Miltz* appellatur. Hanc nisi Curator in continenti detraxerit, pullus non Eqva deglutire solet, ex ea Lienem nasci asserentes. Ea propter Nonnulli summa diligentia partus tempus observantes, eam citissime præripere antequam devoret, solent, ea persuasione ducti, ablato Liene (ut vocant) Eqvos tandem fore cursus ve-

M 3

locissimi

locissimi, nec facile posse defatigari, sollen leuffer werden.

Sin veró arbori frugiferæ suspendatur, gradarios fieri credunt. Alii hoc modó præparatum Caduco correptis propinant, non frustrato usu.

℞. Lienis eqvini, (den Miltz welchen die Stullen auff der Zungen bringen / sic loqvuntur) vino dilig. abluti & exicc. vnc. .i

Corall. rub. præpar.

Sem. Pæoniæ

Visci quercini,

Aristoloch, longæ ver. ana vnci f.

Misc. f. omnium pulvis.

Dosis á drach. f. ad drach. 2. ex aqua appropriata.

Num sit Hippomanes Venterum, vim habens alliciendi ad libidinem, atq; amatoriam flammam excitandi, Doctis iudicium committo.

Fiber.

Ab extrema ora Varroni: quoniam dextra & sinistra fluminis maximè videri solet.

Κάσως, á castrando, quia ob castrationem maximè quæritur: vel παρὰ τὸ γαστήρ,

quód totus propemodum nihil sit quám Venter.

Κύων ποτάμιος,

Canis fluviatilis

Ponticus, Plin.

Ein Viecher.

Animal est ἀμφίβοτον terra & aqua ambigens, specie Lutræ, pedibus prioribus Cervinis, posterioribus anserinis, quibus, cum natat, in aquis remigat, pelle cinerea declinante ad nigredinem. Cauda Piscium oblonga, lata & cartilaginea, squamistamen non obducta, admodum pingvis, lata ferè palmum, longa dodrantem, quâ fluitans vice gubernaculi utitur, Pellis ejus cinerea est ad nigredinem tendens, pilis nitidis mollioribus. Horrendi est morsus adeo, ut & arbores juxta flumina dentibus ceu ferro cadat, ut hominis parte comprehensa non resolvat morsus, quám ossa fracta concrepuerint.

Casas sibi in fluminum ripas, veluti ad Viadrum, Barthara, construit cum aliquibus gradibus, ut aqua fluminis crescente ascendat, & descendente descendat.

Victum

Victum capeſſit ex Can-
cris & Piſcibus. Fructus quoq;
folia & cortices Arborum,
veluti Alni, Salicis &c. avidè
comedit.

Pellibus utuntur Pelliones
ad tiaras, pileos, veſtes, qui-
bus Paralytici & Podagrici
commodè veſtiuntur.

Caro ejus amara eſt, cibo
inutilis, præter caudam & po-
ſteriores pedes, qui nobilium
ſunt delitiæ. Elixantur, & ali-
quo jure denſuſculo additis
aromatibus conditi, Menſis
afferuntur. Svaves ſunt te-
neri & præpingves. Guſtatu
Piſcium carnes ut Angvillæ
maximè ſapiunt.

Dentes Crocei, ſi inde bibi-
tur, Iſtericis & Quartanis
febris profunt.

Axungia Articulis reſolutis,
ſtupidis, convulſis.

Caſtoreum.

Κασόριον,
κάσος οὐδ' ὄχις,
Dibergetil.

Genitalia ſeu teſticuli ſunt
Caſtoris bini, uno ortu mem-

brana connexi, ſubſtantia in-
tus flava, ſolida, Cera ſimili,
odoriſ gravis, guſtus acris,
naturalibus tunicis interſe-
pta.

Vanum eſt credere, Fibras
ſibi Teſtes ſeu partes genita-
les dentibus amputare, cùm
venatu urgentur, ob hoc ſe
peti gnari, Nunquam enim
compertum in his, qui noſtra
ætate capiuntur.

Dento Melleo liquore &
pingvedine in aère ſiccatur.
Durat ad annos octo.

Dioſcorides laudat Ponti-
cum; nos utimur Polonicis.
Rejicitur pingve, putridum,
rancidum.

Medicamentum celebre, &
multi uſus.

Tenuium eſt partium, gu-
ſtu acre, mordax, odoriſ gra-
vis, virus redolentiſ. Cale-
facit 3tio. & ſiccatur 2do, reſeſ-
ſu. Penetrat, digerit, aperit,
moverit ſternutamentum, Par-
tus ac Menſes ciet, Venenis
adverſatur, Medetur abſceſſi-
bus frigidiſ, ulceribus mali-
gniſ, & Nervorum vitiſ.

Sumtum

Sumtum & odoratum Comitibus, nec non utero suffocatis auxilium peropportum. Lethargicis, Paralyticis, Tremulis Spasmo, Opisthotono, Ischiadicis, Resolutis & Vertiginosis conducit. Inflationibus & torminibus ventris, item Stomachicis opitulatur.

Humor melleus difficile exiccatur, & inutilis intra Corpus, ut & pinguedo quæ facile rancescit. Extrinsecus commodè usurpatur, & oleis ac unguentis permiscetur.

Herinaceus.

Εἰνός χερσίδος, Diosc.
Αναγνώστω.

Echinus terrestris, Matthiolo.

Ein Zigel/
Eigel/
Hechel.

Animal est terrestre. Cuniculi magnitudine, specie porcina, aculeis undique vallatum ut Hystrix, præterquam in ima parte, ubi lanugo mollis, rara & innoxia.

Duum est generum. Differentia cognoscitur ex rostro. Alter, cui caninum Caput,

Echinus caninus, Hunds Zigel: alter, cui proboscis, qualis in suum genere, Suarius, seu Suillus, Schwein Zigel nuncupatur.

In sylvis & sepibus dumosis versatur.

Raro exit nisi noctu.

Vescitur Muribus, Juglandibus, Nucibus faginis, Malis, Pyris, quæ aculeis suis infigit, & in domicilium suum reponit.

Hyeme in caveis arborum occultatur.

Undique spinis suis se claudit propter insidias: at in aquam calidam immissus, ea delectatus sese aperit ac dilatat.

Frigidi est temperamenti, excrementis compluribus redundans, quibus aculei nutriuntur: idcirco ejus carnes in Medicamentorum potius quam in Ciborum usum expetuntur. Cum enim terrestris sit, ægré concoquitur, & minimum sanè præbet alimenti:

Caro Stomacho prodest, Ventriculum lenit & provocat. Eadem manducata, vel desiccata, pota, Elephanticis, Cacheticis, Convulsioni obnoxiiis, Nephriticis & Anasarca

farca laborantibus auxiliatur: quia valenter digerit & excicat.

Efficat quinetiam, ne Pueri lectos permangant. Urinam enim tantoperè retinet in Cibo sumpta, ut si assidue quis ederit, urinæ difficultatem incidere periclitetur; Avic. & Rhaz.

Fel pilos evulsos in palpebris incommodos enasci non patitur.

Cinis extergit, digerit: ad ulcera sordida carnemque in ulceribus excrescentem valet.

Cinis Corii & Capitis cum pice liquida Alopecii utilissimè illinitur.

Integer ustus in pulvere potus, singulari proprietate in lectum mingentibus medetur.

Hircus.

Αἷς ἀγρῶν.

Ἰσάρος

Caper admissarius.

Ein Boek

Geisboek

Rammelboek.

Vir gregis, dux & maritus

Caprarum, animal bellicosum & lascivum. Pilo est molliore atque longo, Cervice & Collo brevi, gurgulione longiore, Cruribus crassis, Auribus prægrandibus & flaccidis. Aruncus seu villus ejus Mento dependet.

Caper optimus est cui sub Maxillis duæ verruculae albæ collo dependent, amplissimi Corporis, Cruribus crassis, plena & brevi Cervice, flaccidis & prægravantibus Auribus longisque, exiguo Capite, quam maximè simus, nitido, nigro, densoque atque longissimo pilo, & potissimum albo.

Mas vel Mensium septem, satis habilis est ad procreandum. Celeriter enim & ante sex annos senescit; quod immatura Veneris cupidine primis Pueritiæ temporibus exhaustor sit.

Hircorum Caro minimè quidem humida, pituitosa ac lenta: ob fetorem tamen ingrata, & Stomacho inimica, ægre concoquitur, & ad fucum bonum generandum parum idonea.

Hepar, Canis rabidi morsui utiliter imponitur.

N

Pellis

Pellis hircina *Ἰρκα, Ἰρκαία*,
Eine Boekshaut/ ab Alutariis in
vestimentorum usum aptatur.

Anno 1602. Villicus quidam
in pago Fischbach Hircum aluit,
qui lac ex ubere reddidit papillis
duabus. Idem accepi accidisse in
Pleswitz.

Capra.

Aἶς. Capra quasi Carpa, quod
virgulta carpat, vel quod capret
aspera, a crurum crepitu.

Ein Geis. Ziege.

Femella hujus generis Animal
ruminans barbatum, Cornibus re-
tortis & acutis, ex Arbuscularum
fruticumq; foliis & corticibus vi-
ctum quærens; nec Rubos aver-
satur, vel vepribus offenditur. Ca-
ret superiore Dentiū ordine. Lien
ei rotundus. Mammæ inter femo-
ra. Omnibus dependet Mento vil-
lus, quem aruncum, specillum seu
barbam Capræ vocant.

Capella probatur similima
Hirco, ubere maximo & lactis a-
bundantissimo.

Quinq; Mensibus ingravescit
fœtu. Tempus admissuræ per Au-
tumnū, ut propinquante Vere
pariat. Si generosa est, frequenter
parit duos, nonnunquam trigemi-
nos, quaternos etiam sed raro ad-
modum, veluti hoc anno in pago
Plackwitz prope Leobergam ob-
servavi.

Ad undecimum vivit annum.

Gaudet montosis potius quàm
herbidis campis: ob id in montibus
frequentes sunt. Morsus earum ar-
boribus exitialis. Ineunte æstate &
circa ejus medium Capræ melius
agunt, & longè seipsis in Cibos
præstantiores evadunt, ob Arbo-
rum & Fruticum surculos & ger-
mina, quæ iis idoneum præbent
alimentum; proinde habitiores ac
pingviores, nobisq; alendis accom-
modatiores fiunt.

Capra temperamento longè est
siccor quàm Sus, minùs tamen sic-
ca quàm Bos.

Caro ejus calefacit & siccatur, atq;
præter succum vitiosum etiam a-
crimoniam habet.

Sanguis hydropicis confert: uri-
nam enim excernit.

Butyrum Capræ potum, & ex-
trinsecus umbilico illitum, tormi-
na ventris solvit.

Adeps modicè siccatur & adstrin-
git. Emplastica vim obtinet, a-
crimonias obtundit. In pulve ex
Alica Phthisin & Tussim sanat:
in sorbitione convenienti Intesti-
norum vitiiis magnoperè prodest.

Fel cum lana umbilico imposi-
ta, Lumbricos necat ventris.

Vesica usta ex vino pota, urinam
retinere non valentibus medetur.

Cornu ad albedinem ustum, den-
tes egregiè abstergit, & gingivas
corroborat, earumq; turgentium
dolorem reprimat.

Lac

Lac caprillum.

GeißMilch/ - ZiegenMilch.

Inter cætera Lactis genera moderatè se habet, cum non admodum pingve crassumq; sit: ob id medium quoq; esse censetur, quod in Corporibus nostris præstat, Stomacho accommodatissimū, alvumq; minus cæteris tentat.

Bibitur efficacissimè Phthisicis, Hæctica laborantibus, consumptis ac emaciatis, recens ubi multum fuit tepidum.

Datur Melancholicis, Comitibus, Paralyticis, Arthericis, & Lusciis. Cum sale & melle citat alvum.

Omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim Fau-
cium, Pulmonis, Interaneorum, Renum & Vesicæ.

Cum Oryza, Panico, Milio, sive Calculis fluviatilibus ignitis, Dysentericis, Celiacis, biliosis alvi fluxionibus conveniens medicina.

Cum hordeacea prisana aut alu-
ceo cremore, magnoperè Intestino-
rum rosiones mittigat.

Si in eo decoquantur rad. Fili-
cis majoris, vel Chamomilla & fa-
rina: impositum mirificè inflam-
mationes partium, vulgòustionem
frigida vocant, Den Kalten
Brandt, compescit.

Serum Caprillum.

Lac schiston Med.

Ziegen Molken.

Lacti Caprillo cum fervet, ace-
tum affunditur vel Oxymel, quod
dein igni ablatum refrigeratione
dividitur, ad pharmacorum usum.

Abstergit, purgat, alvum laxat,
sangvinem purgat, acres humores
contemperat, & pharmacis viam
ad purgandum Corpus aperit.

Hepar & sangvinem refrigerat,
sitimq; febrilem extingvit, si A-
cetosa ei incoquatur, aut syrupus in
eo dissolvatur.

*Casus Caprillus.**Ziegen Käse.*

In cibo utilis; boni saporis, fa-
cilius deicitur quam bovillus, mi-
nus nutrit. Lactis copiam auget
Mulieribus.

Mollis ac recens impositus,
omnes punctiones ac dolores re-
primit, cum Melle subactus &
impositus linteo aut panno desu-
per tectis, sugillationes, livores,
celeriter abstergit: Idem ad fer-
vorem & punctiorem Oculorum,
Capitis & Pedum dolorem com-
modus.

Fimus caprinus

ο πρὸς ο πρὸς αὐτὸς

- Geißstaath

Ziegenforbern.

Acris est & digerentis fa-
cultatis, abstergit. Convenit
in omnibus duris & scirrhis
tumoribus

N 2

tumoribus sive Lienis, sive etiam aliarum partium. Utimur & Splenicis, & ad Aquam intercutem.

Ustus tenuiorum fit partium. Additur commodè extergentibus & digerentibus Cataplasmatibus ad Parotides & Bubones.

Caprina pellis *Αἴγιο, & ἄγριο* ein Ziegenfell cum villis suis paratur & expolitur à Pellionibus ad Vestitum Mulierum.

Pili ad funes à Restiariis colliguntur.

Hædus.

*Ein Ghe
Zieglin
Rüßlin.*

ἑξήμηνος mas usq; ad tertium aut quartum Mensem.

χάμαια Capella usq; ad unius anni ætatem.

Hædus & *ὁ τῆς ἡδονῆς* ab edendo vel à delitiis, est adhuc tenellus ex Caprarum genere, petulans, pingvis.

Carnes hædinæ ad conficiendum perfectis Capris meliores, & tuendæ valetudini accommodatiores, parum recrementi in se habent, facilimè concoquuntur, moderatè nu-

trunt, sangvinemq; bonum calido & frigido contemperatum gignunt.

Præstantiores, & probioris succifunt, maximè bimestres aut trimestres lactentes adhuc. Adultiores enim primam gratiam amittunt.

Delicatis, & otiosæ vitæ deditis conferunt. Assæ vel elixæ svaues & salubres sunt. Sangvis hædinus spuentibus sangvinem valdè commodus.

Coagulum Hædi *Zieglin Käserinne*, pares vires habet cum Leporino. Contra Aconiti potum in vino, & concretum Lac in aceto assumitur. Dysentericis prodest, & Menses immodicè fluentes sistit.

Sebum minus calefacit & siccat hircino, unde & melius ad oris rimas.

Unguentum Pomatum & Pomorum Borsdorfianorum decorticator. & in partes divisorum num. quinq; , Caryophyllis infarciantur, & in Rosarum liqore moschat. quatrduo macerentur:

adde

Adipis Hædi rec. *℞. i.* fervefiant simul in Baln. Mar. donec omnia

nec omnia albescent, sapius cum prædicto liqore abluatur, ut totum fiat album. Aromatizetur Moscho, & in vase vitreo reponatur.

Aliud Polychrestum

℞. Omenti Hædi aq. Rosar. macerati. ℥. 5. Caphuræ vnc. 1. f. fiat unguentum. Ad fissuras Labiorum & Narium & Papillarum utile. A Mulieribus tum aliàs, tum ne facies à Sole aduratur, expetitur.

Pelles ad tunicas Infantium aptantur.

Capr.

ῥεῖον

Hircus castratus

Ein geschnittener Doek.

Mas est, cui exempti sunt testiculi.

Hujus Carnes præsertim juniores ceteris præferuntur.

Sanguis Hircinus.

ῥεῖον ἀνδρῶν

Manus Dei aui

Doek ablut.

Colligitur è jugulato juvene Hirco, qui postremis diebus diureticis altus fuerit: medius excipitur, relicto eo, qui

primus fluit & postremus: fictili vase excipitur, insolatur & exiccatus fideliter reservatur.

Calculos frangit, sanguinis grumos dissolvit, ex vino tenui potus & illitus. Contra toxica efficax.

Frequens usus Plebeculæ, tum iis qui Ruri degunt, & aliis auxiliis carent,

Leo.

λέων

Ein Löwe

Leona eine Löwin.

Rex quadrupedum, cordatum, magnanimum ac nobile Animal, Corpore longo, Pectore robusto, medio ventre gracili.

Cervicem habet jubatam: Pelle tegitur fulva, antè villosa, postè brevibus & confertis pilis intertexta. Oculi ei charopi, species Oriofeli similis. Quinq; digitos in pedibus anterioribus, quatuor in posterioribus habet. Ossa ei sunt durissima, & penè non medullosa. Longa cauda quam sæpè quatit. Interiora omnia Canibus similia.

Proprium ejus rugire.

N 3

Aversus

Aversus coit, urinasq; retró reddit.

Producit Leones Africa, India & Tartaria magna. Gaudent excelsis montibus. Ad has terras aliquando spectaculi causa afferuntur.

Aluntur vivi Pragæ in aula Imperatoris.

Præda vivit. Vescitur carne ritu cæterorum sylvest. ferratorum, sed cibo incontinenter admodum utitur, multaq; devorat sine ullo dissectu: mox nihil triduo aut certe biduo edit.

Longa Leonum ætas. Animal calidiss. & siccissimum, quod probant nobilitas, fortitudo cum audacia & iracundia.

Adeps in calore primas obtinet, & magis digerit. In veteratis tumoribus atq; scirrhis, induratisq; Nervorum tumoribus ἀγκύλας Græci vocant, maximè convenit, sanat adusta nivibus.

Leopardus.

πανθήρ, παρδαλῖς
λεοπαρδαλῖς
Panthera Plin.

Rardalis, Pardus
Pantherstier
Leopard, Leppard.

Animal, ut Quibusdam placet, sui generis, ex Leone & Pardo generatum, colore sub-ruffo. Caput habet simile Feli seu Leoni, Pellem variatam maculis nigris, & velut Oculis nitentibus ac χαρόποις distinctam, non multo majus Cane venatico, Corpus longū, Oculi splendore radiant. Dentes ferrati. Mammæ in medio ventre duæ cum papillis quatuor. Crura compacta & firma.

Asiæ, Africæ, Syriæ notum animal. Cicuratur aliquando ad venandum ut Canis, cum sit bestia crudelissima, nunquam tamen prorsus dejicit feritatem.

Pragæ ad venandum cum aliis bestiis nutritur.

Fragranti odore cætera animantia ad se allicit, & eximia sagacitate & celeritate & animi magnitudine prædita est. Diligit vinum, & inebriatus capitur.

Adeps feras scabies & impetigines tollit.

Lepus

Lepus.

λεγόμενος
λεγόμενος χείρας & δίο. & πὸ
τοῦ λαίου.

Lepus quasi levipes á cursu
velocitate.

Lepus maior
Lepus terrestris
Ein Hase.

Animal cuius notum, cur-
sus velocissimi, timidissimi
& fecundissimi. Caput ei
agile, breve, rotundum. Collum
angustum, rotundum, molle,
oblongum. Aures sublimes lon-
gæ. Villi breves, molles, leves.
Crura posteriora longiora pri-
oribus, itaq; facilius ascen-
dunt quàm descendunt. Dor-
sum pullum seu cinereum,
Venter albus, Oculi glauci,
Cauda brevis. Cor magnum.
Jecur sæpè adeò fissum, ut
duplex seu binum crederetur,
cui inhaeret bilis vesicula lon-
giuscula.

Fruitur in cibo gramine,
herbis, segetibus hyeme. Per-
niciēs Pomariorum. Hye-
me enim dura & aspera ar-
busculas solet decorticare,
nisi stramine muniantur.

Dormit apertis oculis,

nec alio quàm fuga se tutari
scit.

Ruminare quoq; illi in
more est.

Coeunt Lepores & pariunt,
vulgo sexen/quoquo tempore,
dumq; utero ferunt, superfœ-
tant, & singulis mensibus præ-
ter hyemem generant, ut plu-
rimum binos, rariùs ternos :
aliquando quini reperti sunt;
unde tam innumera fœcundi-
tas. Nam etsi femina lac-
nupernatis præbeat, nihil ta-
men prohibet, quin eadem
repetat coitum, & lactans ge-
rensq; utero, denuò concipiat
fœtum.

Vana est persuasio, Eis u-
trumq; sexum & utramq; gi-
gnendi vim inesse, & omnes
Lepores æqvè gignere, ac si
essent hermaphroditi, seu u-
triusq; sexus participes.

Capiuntur præcipuè Cani-
bus sagacibus, & retibus arato-
riis post messem statim, & ri-
gente bruma usq; ad Marti-
um, ubi parere incipiunt.

Isaacus Leporinam carnem
pro pharmaco potius quàm
alimento habendam cen-
set.

Frigida

Frigida est & sicca (2. gradu) temperatura, ægrius concoquitur, & sanguinem gignit crassiorem; at non improbi succi, maximè si probè concocta fuerit.

Iis qui Corpus exiccare volunt, utilis. Prodest Phlegmaticis & obesis Corporibus, urinam proritat, & alvum cohibet.

Nobilibus est in delitiis, & in splendidis epulis apponitur, ut verè dicere possimus cum Martiale:

Inter Quadrupedes gloria prima Lepus.

Offertur assa, Lardi ligulis & Rosmarino seu Cinnam. & Caryophyll. transfixa: vel elixa in jure nigro, cum liquamine ex aceto, sanguine proprio, lardo, pipere, Caryophyllis præparato.

Præferuntur Lepusculi seu juniores.

Verum nimius ac frequens ejus usus, obstructions Hepati ac Spleni efficit, Pulmoni; nocet, multa movere somnia eaq; tristia, & immodicis torquet vigiliis.

Melancholicis & emaciatis minus salubris. Confert Dysentericis assata sumta.

Cerebrum inassatum mandi-

tur juvandis tremoribus, qui ex mala affectione Corporis contracti sunt.

Affricum gingivis facilem Infantibus dentitionem præstat.

Oculus recens somnum conciliare fertur appensus, vulgi persuasione.

Cor Leporis à Neotericis contra Quartanam, ut singulare & certum remedium prædicatur, si nimirum præmissis universalibus, tertia pulveriz. Cordis pars ex vino albo seu aqua stillat. Cardui bened. calefacta, Agrotanti in ipsa paroxysmi invasione offeratur; idq; ter hoc pacto repetatur, nempe in reditu secundæ & tertiæ accessionis.

Jecur arefactum Jecinorosis utiliter exhibetur potandum.

Renes sicci & inveterati pondere Scrup. 4. ex vino aut alio appropriato liquore, Calculosis propinquantur.

Sanguis vulgò die Muncke dulcis ac sapidus, dulcedine & concoctionis facultate, sanguinem Avium superat.

Fel Oculorum argemas nubesculasq; delet saccharo exceptum.

Uterus

Uterus seu *Matricula* substantiæ membranosa undiq; venulis respersa, *Hæmorrhoides* sinu vino abluta, resiccata, trita potui data, quando Mulier fuerit à menstruis purgata, conceptionem promouet.

Pinguedo *Hæmorrhoides* calidæ est naturæ. Corpori infixa extrahit, rumpit abscessus. *Cantharidibus* tritis permixta *Escharas* molitur, & *Vesicas* excitat. Dolori *Dentium* mederi, post *Aures* si ponatur, vulgi notum experimentum, vulgò *Zahnpflaster*: at *Auditiui* noxium.

Saltus Leporis, *Talus Leporinus* *Plin.* improprie, *Poplitis* officulum *Hæmorrhoides* quod ea parte ceu basi inter saliendum nitatur, *Officulum* est in genu posteriore vel suffragine potius, quod geniculi patella esse videtur. Ex aceto sumtus, *Calculosis*, ex vino cum *Mace* *Colicis* prodesse fertur. *Prægnantibus* pauperculis ad facilitandum partum ex vino, aqua *Pulegii* vel *Artemisæ* datur.

Fili Leporini sanguinem sistentibus linimentis miscentur.

Fimus rupta *Intestina* sanare valet. *Ambustis* medetur: *Impetigenes* curat cum aceto.

Caput Leporis totum ustum cum *Melle Anthosato* dentes abstergit.

Pedes scoparum usus præbent, ad pulverem detergendum, & verrendas quisquillas.

Pellis Leporina ein *Hasenbalg* mollis est, calefacit & roborat; ad indumenta aptatur. *Manicæ* & *caligæ* parantur utiles *Articulariis* membris.

Lepusculus.

λεγιδιον

μικρον λεγιον

Catulus Leporum.

Ein Häslein

Jung Hase.

Leporum fœtus ventre extracti, vel uberibus ablati, integri cum pelle, fictili exsuntur, *Urinæ* vitiiis apprimè competentes, adeo ut *Calculos* ejiciant.

Coagulum Leporis, λεγιδιον *Hæmorrhoides* / *Hæmorrhoides* / *Gerinsel* / *gerummene Milch* im *Magen*.

Lactis est substantia in juniorum Leporum ventriculis concretum.

O

Omnium

Omnium est præstantissimum, Acris & digerentis facultatis, ac nimirum etiam exicatoriæ.

Sanguinem concretum in grumos dissolvit, venenis resistit, venenatorumque moribus, Cœliacis, dysentericis, & feminis vulvæ fluxione laborantibus, ac rejectionibus é Pectore, in vino auxiliatur.

Comitalem ex aceto singulari experimento curat.

Lupus.

Λύκος

Lupus quasi Leopus

Canis sylvestris Nonnullis

Ein Wolff.

Lupa Eine Wölffin.

Ferox est bestia, rapacissima, fraudulentissima, voracissima, & propemodum insatiabilis, sed amans sobolis. Figura Cani magno pastorali non absimilis. Color varius, frequentior canus, aliquando candidus, raro nigricans. Pilis undiq; riget. Cervix solida, crassa, Dentes teretes acuti. Oculi splendent noctuque lucem jaculantur.

Fera montibus nostris & sylvis vastis frequens, Capris & Ovibus infestissima, sæpe homines adoriri solet.

Pilos & Ossa devorat, & multa solida: etiam terram urgente fame.

Cœunt ut Canes, toto anno non plus quam duodecim diebus. Virgas habent offeas, & coitus tempore gregatim incedunt. Fert ut Canis, tum tempore, tum etiam fetus numero.

Cœculas in Renibus eorum nasci, falso quidam prodiderunt, cum αὐτοψία aliud doceat.

Lupi caro frigida, foetida, sicca, crassa, cibo inutilis, utpoté spiritus & humores corrumpens.

Hepar præparatum, violarum odorem spirat, Omnibus Hepatis vitis tota substantia convenit: Siccatum cum vino utiliter exhibetur Hydropticis, Tussientibus & emaciat. Jecinoris dolores ex Mulso reficit.

Αἰνυγία

Axungia calefacientis & digerentis est naturæ. Unguentis articulariis admiscetur. Si ea fricentur Oculi, contra Lippitudinem prodest. Vulas emollit.

Si ejus Corio, aut colo intestino constringatur venter Colica laborantis, Agerq; corio sapius infideat, prodesse multum scribunt. Idem præstare ajunt, si per Colum potus hauriatur.

Dens Lupi in magnis operibus habetur. Adalligatus Infantium pavores prohibet, & earum gingivas exterit confricatus, quo Dentes facilius proveniant.

Ex pellibus sunt vestimenta contra frigoris vim, nec ulla sordes admittunt.

Catulorum Luporum adhuc cæcutientium pellis præparatur, Ventriculo & Colicæ usui: Lupi in fame præcipue sæviunt. Interdum in rabiem aguntur.

Anno 1588. mense Xbri accidit in pago Giersdorff, non procul à thermis Hirsbergensibus disito, ut femina rustica, pro more illius loci, circa crepusculum ad vicinum cum colo mearer, laternamq; manu gestaret. In itinere fortè

fortuna Lupus rabie sæviens, ex vicinis montibus illi occurrat, ex manibus laternam arripens, dentibus eam ad lapidis ictum cum candela deportat. Vicini rustici clamore commoti, feminae suppetias ferre volentes, à Lupo, qui rabie sæviens modò huc modò illuc vagabundus erat, multis modis fuerunt læsi, donec tandem prope templum istius pagi fuerit occisus. Duo ex illis ob vulnera seu morsus, paucis post diebus fuerunt extracti: reliqui post longum tempus, beneficio pharmacorum iterum convalescerunt. Pelle detracta, & stomacho refecato, nihil præter gramen fuit repertum, quod nimia fame coactus ingesserat.

Lycaus mons, Lycoreus der Wolfsberg/ mons prope Goldbergam altior & sterilis.

Lutra.

à lutando.

Ενδοξος

Κύων ποταμίου Aetii

Lytra à λυτρον quod est dissolvere.

O 2

Lutrix

Lutrix,
Canis fluviatilis
Ein Otter/
Fisch Otter. sil.

Animal amphibium, astutum & malignum, é Fibrorum genere, longius latiusq; Cato, minus Fibro, colore fusco, ad Castaneum deslectente, cum nitore. Caput ei oblongum instar Putorii, collum crassius: Crura breviora: Pedes canini, Cauda longa, pilo brevi, molliore, dentibus acutis, morsus acerrimi. Renibus donatur multis racemi modo conglobatis, ut ferum, quo abundant, facilius trahere & secernere possint.

Frequens in montanis ad ripas fluviorum & piscinas. Vivit ex captu piscium, quos mira agilitate & astutia venatur. Amplius quàm duo miliaria, sursum contra aquæ defluxum tendit. Diu sub aqua se continet, quamvis respiratione indigeat.

Plures Catulos suis uberibus lactat. Hominem mordet, nec desistit, ut ferunt nisi fracti ossis crepitum senserit.

Pellis causa capitur Canibus aquaticis, hyberno præ-

sertim tempore sub glacie: nec non decipulis ferreis, vulgò Otter Eisen. A Pellionibus præparatur, quâ incisâ fimbrias Vestimentorû exornant, maximè Mulierum, & circa Collum. Sæpè vanit pellis elaborata tribus, quatuorve taleris.

Caro ejus frigida & sicca improbatur. A pauperculis nonnunquam in cibum paratur.

Axungia seu pinguedo non coagulatur frigore, sed instar axungie piscium fluida, Partibus convulsis, contortis illinitur, & Arthriticis unguentis miscetur.

Iecur, quod octonis lobis deprehendi, diebus aliquot aceto acerrimo maceratum, in furno ficcatum, mirum in modum Dysentericis succurrit.

Pilei ex pellibus Lutræ adversè Paralyfin, Vertiginem, & Capitis dolorem salubres censentur, & calceamenta Podagricis utilia.

Lynx.

Λύγξ, Arist.
λυγός.

Lupus Cervarius,
Lupus Armenius

Lycopantheras

Lycopantheras

Ein Luchs

Lur /

Hier Wolff.

Acerrimi morsus Animal, oblongum, brevibus Cruribus, pelle indutum infra albicante, supra ex fulvo subpurpurascens, sed maculis notisq; varia, quæ speculorum instar radiant, pilis mollibus confertis longisq; obsita, qui in ventre longiores sunt & pilosiores, sed rariores. Oculi splendent, & ceu igneo fulgore rutilant. Facies formosa, Caput exiguum, Auriculæ curvæ, apicibus nigris villosis, trium digitorum longitudine fursum erectis ornantur. Lingua spinosa, aculeis referta, Limæ similis.

Ungvibus armatur candidis acutissimis, quinque anterioribus, & quaternis posterioribus. Patellæ ossea oblonga, Amygdali adhuc integumento duro inclusi figura, sed multo major in posteriori flexura. Anteriori deest, cuius vicem supplet officulum minutum fabæ magnitudine & figura. Colli item musculo inferuntur alia duo officula, oblongiuscula sinuata,

furculis similia, per tendinem tandem conjuncta apicibus posterioribus, ossi pectoris annectuntur. Ventriculum obtinet rotundum amplissimum.

Agilis est, profilireq; longius potest. Clarissimè omnium Quadrupedum cernit.

Rapax instar Lupi, sed calidior. Hominibus & Pecudibus insidiatur. Latet in Arboribus, ut in prætereuntes Pecudes defiliat.

Invadit Lepores, Cervulos, Capreas, Porcellos sylvestres. Omnia dentibus frangit protinusq; devorat. Infatiabilis enim est, utpotè cui à ventre per Intestina minus circumvoluta, transeunt Cibi.

Minus frequentes sunt Lynces in Silesia nostra, & non nisi altissimorum Sudetorum recessibus aliquando visuntur. Memini binos retibus, quæ Leporibus retenderant, in Furstenstain captos fuisse.

Ante biennium Lynce[m] feminam in montibus supra
O 3 castrum

Castrum Kynast, á Venatore interfectum, generosus Dom. CHRISTOPHORUS Gotschius mihi communicavit, cujus ventriculum cum secuissem, porcellorum ferorum, & Leporum carnibus infarctum offendi, quos cum pelle & ossibus con fractis devoraverat.

Axungia Lynceis articulis resolutis, Convulsis, luxatis commodé illinitur.

Pelles hodié in maximo precio habentur. A Baronibus & magnatibus saltem in vestimentis ostentantur: at pili oculis molesti.

Ungues Lyncei Luchsflawen argento & auro includuntur, adversus Comitialem & Spasmodum infantibus appenduntur. Præfertur, qui in dextro pede pro pollice est.

Fabulosum est, Urinam Lynceis durescere, & coire in lapidem quem Lyncurium vocant.

Carnes inutiles sunt, & á culinibus abdicantur.

Martes.

ῥαδέϊον Arist.

Martes Gesn.

Martarus

Martarellus.

Ein Marder

Marter.

Animalculum figura Mustelæ, magnitudine Cati, longius tamen, & brevioribus Cruribus, superné fulvum cum quadam fuscitudine, inferné album aut flavum.

Duo ejus sunt genera.

Martes saxatilis.

ῥαδέϊον οἰκίον

Martarus domesticus

Martes tectorum, domorum.

SteinMarder

HausMarter

DachMarder.

Paulo longior est Fele, pilo ex fulvo vestitur subnigricante, excepta Gutturis parte, quæ albicat.

Habitat in saxorum rimis & cavernis. Mures & Aves persequitur. Apud nos raro oppida accedit, veluti in Helvetia.

Martes arborea.

ῥαδέϊον ἄγστον

Martes

Martes sylvestris
Martes Arborum
Mustelæ quartum genus

Agricole.

BaumMarder
FeldMarder
WilderMarder.

Corpore constat aliquan-
tum longiore, gutture flaven-
te, & pilo contegitur magis
fusco, tactuq; molliore.

Sylvas incolit, raroq; eas
deserit. Passim in altis Mon-
tium sylvis oberrat.

Hæc etiam duplex.

Martes fagina.

Martarus faginus
Buch Marder.

Qui in sylvis fageis versa-
tur & vitam agit.

Martes abietina.

Martarus abietinus
DammenMarder
FichtenMarder.

Quæ in Abiegnis seu Pice-
astris degit. Nidum super
Abietes Sciurorum instar
struit.

Aspectu cæteris est pulcrior,
& bonitate præstat, preciosiôr-
que si plures pili candidi cum
fuscis permixti fuerint, brevis

licht schwarzlicht mit viel Sil-
berharen. Hyeme meliores
sunt quàm æstate.

Pelles preciosæ habentur,
& à Magnatibus ad hyemales
vestes suffulciendas expetun-
tur.

Monoceros.

μονόκερος.

ὁ μονόκερος διὰ Phil.

ὄνος ἄγριος καὶ ἰνδίκος Aelian

ὄνος Arist.

Alicornus Fallop.

Onager Indicus

Asinus Indicus.

Ein Einhorn.

Unicornu, cum sit jam no-
bilitatum apud Magnates, no-
biles & divites Silesiæ, contra
gravissimos Morbos præfidi-
um, meritò, licet patria nostra
Animali, unde hoc procedit,
careat, hic inferendum judi-
cavi.

Variae sunt Autorum de
Monocerote sententiæ, quas
hic recensere supervacuum
existimo, & ab aliis aliter de-
scribitur, sive quoniam diver-
sæ sunt unicornes Animantes
ut constat; sive, quod Aliqui
notas diversorum tanquam
unius confuderunt.

Plinius

Plinius lib. 8. Natur. histor. c. 21. in hunc modum describit; quod sit fera asperima, reliquo Corpore Eqvo similis, Capite Cervo, Cervice oblonga, jubare raro, ex altero latere dependente; Crura habet gracilia ut Capræ, bifidis ungulis, Pedesq; posteriores pilosos: Caudam Apri, unicum cornu nigrum in media fronte, Cubitorum duorum triumve eminens, atq; in acutissimum mucronem desinens.

Gignitur, ut Autores referunt, in Arabia, Assyria, & Indiæ intimis ac desertissimis regionibus.

Cornu Monocerotis.

Cornu Alicorni Fallop.

Cornu Unicornis

Einhorn.

Unicornua duo Venetiis in D. Marci thesauro ostenduntur. Habet etiam Unicornu Angliæ Regina, & D. Dionysii Fanum in Gallia, nec non Argentinenses. Cornua sunt anfractuosa, & spinis convoluta, tanquam duobus filis aut funiculis in se contortis.

Crato Dentem Elephantis seu Ebur credidit.

Gabriel Fallopius non esse Cornu, sed speciem quandam terræ ex Apulia delatæ, quæ tamen contra venena sit efficax. Forsan verum non vidit.

Rarum quidem est verum & genuinum, ac magni valoris, & sapissimè à Mercatoribus & Agyrtis, alterius Animalis os, aut Piscis dens, seu Marga mineralis pro legitimo vānit.

Legitimum Unicornu, esse de Animali quodam, qualecunq; id sit, & pollere contra venena, hætenus multoties, pleriq; cum Magnates, tum Medici præstantissimi explorarunt; facileq; à Minerali discerni potest.

Ante quadriennium, cum Magnus Dom. Christophorus à Monevit supremus Lityviæ Mareschalcus, Thermas vicinas Hirschbergenfes, valetudinis recuperandæ gratiâ, frequentasset, meaq; opera usus esset, frustulum Unicornu duorum dodrantum ferè mihi monstravit, particulaq; cum ungula Alcis &

Balsamo

Balsamo Judaico vero me donavit affirmans integrum aliquando ad fines Podoliæ suæ ditionis fuisse Unicornu repertum.

Probs. Scobs ejus cum Arsenico detur devorandus Gallinæ, Columbæ, aut Cani, si superstes manserit, verum & legitimum unicornu pronuntiabitur.

Vulgares in vinum projiciunt, & si bullas vinum emiserit, probum esse affirmant: at falluntur, cum & alia ossa iusta id præstent.

Adversus Pestilentes affectus & venena efficacissimum verum Unicornu; ob id bezoarticis medicinis frequenter additur. Cordiale est. Ad syncopen febrium in paroxysmo cum vino datur.

Lumbricos Puerorum interimit & Dysenterię populari opitulatur.

Arsenici antidotum præstantissimum, & aliis additum, Cor à peste & omni contagio præmunit.

*Mus domesticus
minor.*

Mūs Diose.

Mūs κατωκιδίος

Μύς μικρός

Mus domesticus minor

Musculus

Cine Maus

kleine Maus.

Bestiola est domestica panis cupida, corpore parvo, colore nigricante, cauda longiuscula, quæ omnia rodit, inquinat & inutilia reddit.

In domibus oberrat & horreis, Autumno quoque in agris. Frumento & Pane vescitur, Caseos quoque & Carnes fumo induratas arrodit.

Salacissimi sunt Mures & vitæ brevissimæ. Capiuntur variis Muscipularum generibus, Caro eorum calida est mollis, & pingvis nonnihil.

Dissectus & impositus extrahit aculeos, spicula, sagittas &c. curat plagas Scorpionum, extrahit venenum & podagras lenit.

Cinis Muris cum Melle instillatus aut Rosaceo decoctus, Aurium dolorem sedat, Carnes cum crudo Ovi luteo Oculorum inflammationi medentur. Capita Murium

P

Alopeciam

Alopeciam curant. *μυρδοξος* Muscerda, seu Stercus Murinum Meuseforth/ detritum cum aceto & illitum furfures Capitis abstergit & Alopeciiis medetur, cum thure & Mulso Calculos expellit.

Cum Melle supponitur infantibus, ut Alvi dejectionem moliat.

Mus albus.

μυρδ λευκός
Ein weisse Maus/

In domibus aliquando candido colore tinctus oberrat.

Hujus generis nonnulli, coloris candidissimi, sed oculis rubicundis & micantibus, in arce Lignicensi non singuli tantum, sed & bini interdum simul, capti sunt. 1603.

Mus rubens.

Ein rot Meuslin
Brand Maus.

Hoc anno in arce Boberstein Mus captus fuit ex obscuro rubei coloris, cui a vertice per Dorsum longitudinem ad Caudam usque, linea nigra protendebatur, ventre albo, denticulis croceis.

Mus muscatus.

Ein Tiefem Maus/

Tiefem Meuslin/

Similis est vulgari domestico, præter odorem Moschi quem spirat.

Rarius occurrit.

Mus araneus Gesn.

Μυράλιν Diose.

Mus domesticus minimus

Sorex nonnullis

Ein Zif Maus

Epi Maus

Muser.

Domestico est similis sed minor, colore magis ad fuscum tendente; Cauda brevi & rostellum admodum porrecto & acuto, Ocelli minutuli & nigri, ut vix conspici possint. Dentes tenues duplici ordine nati in utraque maxilla in bifidos mucrones desinunt.

In domibus, ut cæteri, oberrat, at minus frequens.

Hunc Feles quidem capiunt, & occidunt, sed ut venenosum non edunt.

Morsus ejus venenatus creditur.

Dissectus & impositus suis morsus veneficia luit.

Ustus cum axungia Anserina

rina permixtus affectibus Sedis experimento singulari adhibetur.

Mus araneus detracto pelle, demtis visceribus & Capite truncato pulveriz. ex aqua flor. Tiliæ propinatur Epilepsia correptis in paroxysmo.

Mus domesticus major.

ῥάσῃς, ὕδαξ.

ῥισκος.

Rattus vulgo

Glis Veterum *Quibusdam*

salso.

Rattus terrestris.

Ein Ratte/

Rat.

Quadruplo ferè major Mus domestico minore. Corporis magnitudine Mustelam assequitur & exæquat. Pilis est subnigris, Cauda procera, nec admodum gracili, nec prorsus nuda pilis.

In domibus discurrit & stabulis hyberno tempore, frugum & leguminum pestis & perniciēs, invisus Homini- bus.

Aliquando in arboribus concavis interdiu later, noctu catervatim ad horrea & domicilia vicina excurrit.

Capiuntur muscipulis &

Arsenico farinæ permixto enecantur.

Feles captis Caput abripiunt, relicto reliquo Corpore.

Venenum in cauda gestare dicitur.

Urina ejus, si nudam aliquam Corporis humani partem attigerit, præsertim cum libidine accenditur, Carnes ad ossa putrescere facit, & difficile vulnus cicatricem admittit.

Mus aquaticus.

Μῦς ὕδαξ

Mus aquaticus Agric.

Rattus aquaticus.

Ein Wasser Maus/

Wasser Rat.

Ei magnitudo ferè Muris agrestis colore nigro, Cauda brevior.

Amphibion est animalculum & herbofis Amaium ripis frequens.

Radicibus vivit & pisciculos vorat, veluti Gobiones fluviatiles, Alburnos, fœtus Lucii, Salaris, Barbi, aliorumque Piscium.

Morsu ferox est. Sape manus Piscatorum mordet, cum ex foraminibus riparum Cancros fluviatiles extrahere volunt.

Mus agrestis.

Μῦς ἄγριος
Mus sylvestris
Mus campestris
Mus subterraneus *Agricol.*
Nitedula *serui.*
Ein Erdschluffel
Erdschluffel
Erdlahren
ErdMaus
AckerMaus
ScharrMaus.

Magnitudine Talpam ferè æquat, coloris fusci, nigris in facie maculis.

Pestis maxima segetum & hortorum.

Omnis generis radices & fruges congerit. Aliquando hyeme sæviente sub nivibus tenellas arbusculas prope radicem ac Lepus arrodit.

In cinerem redactus & cum Melle Oculis illitus eorum obscuritatem aufert, visumq; acuit.

Mus sylvaticus.

Μῦς ἀγροῦ
Mus Avellanarius *Gesn.*
Mus Corylinus
Mus sylvestris, *agrestis.*
Sorex *Plinii.*

Longitudo ei dodrantalis. Color murinus per tergum & latera magis rufus præsertim in Capite. Auriculæ magnæ, glabræ, Venter candidus, Nares & pedes rubicundi. Cauda tota hirsuta, barba partim alba, partim nigra. Oculi majusculi eminentes, nigrimi.

Arbores scandit, semina Pyrorum & alios fructus, imprimis Nuces Avellanas pro hyberno pabulo congerit. Autumno Turdelas & alias aviculas per laqueos in sylvis captas insequitur, in quibus sæpe implicatur & retinetur. Quod ipsemet Puer aliquoties observavi.

Hybernis mensibus in terra se recondit, eosq; dormiendo transigit.

Venenosum esse sunt qui existimant.

Mustela.

γόλη *Diosc.*
ωνοδύλη

Ein

Ein Wiesel/
Wiesele/
Witch Meuslin.

Vulgaris noticiæ animal-
culum subdolum miræ saga-
citat, & qvanquam Corpo-
re parvum, animo tamen in-
victo constat atq; feroci. Cor-
pus habet tenue & in longius
ductum. Caudam brevem,
primores dentes breves, non
sicut Mus longas, plerunq; in
Dorso & lateribus rutila, raro
subfulva ac nigra, in Guttu-
re & Ventre semper candida.
Genitale osseum.

Ripas & cavernas inhabi-
tat. Circa stabula & horrea
sæpe oberrat, mures persequi-
tur, & cum Serpentibus pu-
gnat; ob id à Rusticis amatur.
Catulos sedulo nutrit, & de
loco ad locum sæpe transfert
ne invenientur.

Mustela domestica.

γῆλα καὶ τοῖς ἰδιῶ
Mustela domestica, mini-
ma.

Ein Haus Wiesel.

Saterio similior quàm Mu-
ri, minor sylvestri, inferne al-
ba superius rubra,

Gallinis infesta: & earum
Ova absorbet.

Mustela campestris.

Mustela sylvestris
Mustela agrestis
Ein Feldwiesel

Pauló major est domestica,
& in agris ac vepribus degit.

Halitus ejus creditur vene-
nosus.

Exiccatur non ad cibum
sed ad medicinam.

Caro ejus calefacit, digerit
& siccatur valenter. Cum vino
sumta juvat Epilepticos. Ad-
versus omnia Serpentium ve-
nena felix remedium.

Ad Podagram & articula-
rios dolores acopon mirabile.
Facit & ad diurnum Capi-
tis dolorem, materiam ad su-
perficiem ducens.

Fel cum succo faniculi ad
Oculorum argemas & nube-
culas adhibetur, Lentigines &
alia Cutis vitia emaculat cum
Melle aut Ari farina.

Stercus ejus Moschum non
nihil redolet. Morsus venena-
tos Mustelæ curat Allium. Ce-

P 3

pa, The-

pæ, Theriaca, Pellis propria imposita.

Mustela candida.

Mustela hermela.

Ein weis Wiesel.

Hermelin.

A sylvestri saltem colore discernitur.

Tota enim alba est præter Caudam quæ nigricat.

Agricolæ nostrates ex observatione affirmant, sylvestrem Mustelam post decennium albescere.

Porcellus frumentarius.

Αἰντοῦρος

Κῆρος

Mus arvensis

Cricetus

Hamster

Ein Kornfärse/

Hamster/

Grünsche/

Grünsche/

Meuse Hamster/

Erd Wolff.

Generis est Murini & Ur-
fini minor paulo Cuniculo.
Longitudo dodrantalis &

palmi unius. Pilus in Dor-
so ferè Leporis est colore. Gu-
la, Venter, & Pedes interio-
res nigra sunt. Rubet in la-
teribus & circa Caudam, quæ
coloris Murini tres digitos
longa. Maculæ albæ sub au-
ribus, juxta rostrum, supra ar-
mos & coxam. Pedes admo-
dum breves, digitis & ungvi-
culis albidis quinque utrinque.
In pedum planta seu parte di-
gitorum inferiore tubercula
veluti calli ubique eminent.
Oculi splendidi nigri elegan-
tes. Dentes habet ut Lepus
anteriores binos incisores &
laterales. Lingua mollis
spongiosa. E bucculis Vesti-
culæ utrinque amplæ mem-
braneæ sub Cute porriguntur
quæ sensim gracilescentes
Dorso tenui ligamento alli-
gantur. Has instar sacci mes-
sis tempore granis Tritici, Si-
liginis & aliis ceu folles quos-
piam infarcit, atque in suos cu-
niculos comeatum in futu-
ram hyemem congerit ac re-
ponit.

Pulmonibus candidis qua-
tuor sunt lobi.

Cor Renibus paulo majus
mucrone obtusiore. Hepar
triplicatum apparet unum su-
per alterum

per alterum impositum. Inferior pars Dorso adjacens duos obtinet lobulos. Media, quæ maxima integra absque in cisure integrum Abdomen secundum latitudinem occupans ventriculū ex parte amplexatur. Superior portio divisa aliis incumbens Diaphragmati proximè subjacet. Fel nullum conspici licuit.

Ventriculusei duplex. Unus candidus rotundiusculus, cui alter per isthmum annectitur longiusculus, sinistrum hypochondrium occupans. Huic prope Isthmum Oesophagus inseritur, alteri sub dextro hypochondrio Intestina adherent. In utroque reperiebatur chylus candidus puliculæ farinacæ similis crassior tamen in sinistro.

Intestina gracilia flavent, ubi desinunt, incipit Cæcum anfractuosum amplum, hinc crassiora ad cæruleum vergunt colorem. Excernit pilulas longiusculas instar Muriæ. Lien coloris sanguinei solem ferè humanam representat.

Renes bini phaseoli magnitudine & figura. Vesicula candida Pisum Italicum

æquat, rotunda lagenulæ instar.

Parit quinque; sexve uno partu.

In terræ cavernis habitat, Agri vastator & Cereris hostis. Autumno multa frumenti grana in specum congerit, & utrinque dentibus mandit.

Admodum pingvescit; ob id Porcellis Indicis non inepte comparatur.

In Cibum non recipitur; sed pelles consuuntur ad vestimenta.

De caverna sua aqua fervente seu frigida copiose infusa expellitur.

Animalculum est valde mordax, iracundum & in vindictam præceps si quis urgeat. Sicut Eques incautè prosequatur, solet profilire & os Equo appetere, & si præhenderit, mordicus tenere. Aliquando in homines insilit, & dentes cum inflixit, vix remittit.

Porcellus Indicus.

Cuniculus Indicus
Cuniculus Americanus
Porchelli de India.

Em

*Ein Meer Schweinlin
Indianisch Kamele.*

Animalculum Cuniculi ferè magnitudine, sed brevior Corpore & plenior.

Aurículas habet humiles, subrotundas & glabras ferè. Crura brevia, Digni feni antèrius, qvini posteriores. Dentes ut in Muribus. Cauda nulla.

Colore variant. Aliis candidus, aliis rufus, aliis niger, qvibusdam varius.

Vescitur omne genus herbis & fructibus, Avena, Pane &c.

In Hispaniola Indiæ occidentalis insula maxima á Columbo detecta horum mira fecunditas. Apud nos in hypocaustis alitur.

Æstate & hyeme parit ternos pro vice aliquando quaternos. Mas est libidinofissimus, ut ad fecuram pluribus satisfaciât.

Caro ejus in cibo humida, Asa á nonnullis editur & pro delitiis habetur.

Putorius.
á putore.

Injig Aristot.

Mustela rustica vel sylvestris Peucer.

Mustela. 2. Agricol.

Viverra Gaz.

Furunculus Fabric.

Ein Istis

Isther sil.

Ex sylvestrium Mustelorum genere aliquanto major est domestica Mustela, brevior sed crassior Marte, Pilos habet inæquales & non unus coloris. Etenim breves subfulvi sunt, longi unius coloris, qvi sic ex multis Corporis partibus eminent, ut distinctæ nigris maculis esse videantur; attamen circa os est candidus.

Habitat in riparum cavernis, ubi pisces captos comedit; & versatur in sylvis, ubiprehendit Aviculas: Domos ingreditur & necat gallinas earumq; sanguinem exugit & ova exorbet. Sæpe versatur circa fœnilia, stabula & alia ædificia.

Cum graviter exarserit, male olet.

Acerrimi est morsus: Caput gallinis primum aufert ne clamare possint.

Muribus

Muribus infestus est.

Genitale ex vino offertur pulv. Stillicidio urinæ affectis.

Pelles ad pileos & alia vestimenta à Pellionibus apparentur.

Sciurus.

Σκίουρος ἢ καυτίουρος ἢ
Cauda quæ supra dorsum reflexa se tegit & inumbrat.

ὑμνίου

Mustela Quercuum seu Arborum.

Ein Eich Horn

Eich Hörnlein.

Mustela est paulo altior & corpulentior, pilo rutilo seu nigricante, griseo interdum seu ferrugineo, ventre albilio. Caudam oblongam villosam & densam habet, quæ cum residet, inflexa, Dorsum Caputque tegit. Genitale Maris osseum. Lien ruboris sanguinei, Hepar pallidiusculum in cuius sima parte hæret vesicula minutissima fel subflavum continens. Priores pedes ei sunt pro manibus.

Cursu & saltu plurimum valet. Facile enim transilit

de ramo ad ramum, de arbore ad arborem, Cauda fere tanquam ala utens.

Vescitur faginis glandibus avellanis, juglandibus, pomis, strobilis Piceæ & Abietis. Fungos hoc anno in eorum ventriculis dissectis reperi quos ob penuriam fructuum & strobilorum ingesserant depellendæ famis, explendæque gulæ gratia.

Nidum in arboribus extruit. Majo pullos parit ut plurimum ternos.

Æstate cibum congerit, quo per hyemem alitur.

Caro ejus dulcis, saporis, origrata. Competit imbecilibus & qui fluxionibus molestantur.

Adeps ad Aurium dolores utilis.

Pelles præparatæ consarcinantur ad pallia nocturna. Multum enim calefaciunt Corpus. Ex Caudis Pictores penicillos fingunt.

Simia.

πρῖμος

Q

Simia

Simia, quod sima sit & Naribus depressis, vel quasi minima & imitatrix,

Ein Affe.

Animal est quadrupes, per-versissimum, condense villo, multa habens communia cum Homine Membra, tam exteriora quam interiora; verum omnia rudiora efferatiora; Facies namque illi rotunda est, & Aures, Nares, Dentesque; tam primores quam maxillares, Hominis more habet. Natura tamen in iis

Naresque a fronte remissas. *Con-*
tudit ex rugis peraravit anilibus
ora. Brachia Hominis

modo, sed hirtiuscula, quæ & ipsa, & Pedes ut Homo inflectit. Pectus ei omnium Animalium latissimum, in quo Mammillæ hærent binæ Feminæ. Cauda exigua. Genitale Feminæ Mulieris, Mari verò virga potius Canis quam Hominis.

Gestu inquieta est & ferox morfu, quo præ cæteris Animalibus viget.

Simias mittit Affrica, Lybia, India. Habitat in arboribus & rupibus. Nucibus & Pomis delectatur.

Simiæ facillimè mansvescunt & raro in patria nostra visuntur, nec nisi in ædibus divitum ludicri ac ridiculi spectaculi causa aluntur.

Frigidæ & siccæ sunt naturæ. Caro austera & humoris pessimi, Cibo inutilis.

Simia caudata.

χοιροπίδικον Nonn.

Κυνόκεφαλος Gesn.

Simia porcaria, Simia Præfiana

Tartaretus

Tartarinus

Ein Schwanz Affe
Pavian.

Magnitudo ei Canis Leporarii, cui barba ab Auribus usque sub Mentum. Rostrum longius, ferè caninum. Bipēs ferè obambulat, & vocem penè articulatam habet. Cauda donatur proluxa. Feminas amat.

Talem ex Tartaria adductam ante annos tredecim Magnificus ac nobiliss. Dom. Johan. Ulricus Schaffgotsche in arce Greiffenstein, catena alligatam

alligatam aliquot annis alebat.

Sus.

ὁ μὲν ἐκ τῆς ἰνδίας ὁ δὲ ἰταλίας.

Sus á subigendo, quod terram rostro subigat propter Cibum.

Porcus quasi spurcus.

Ein Same
Schwein.

Animal est obscænum & immundum maximè pituitosum & humidum, omnium ferè terrestrium Animalium, quæ in Cibum veniunt, humidissima carne.

Luto delectatur, quòd rostro suffodit horrendo grunitu.

Omnem situm Ruris usurpat. Nam & montibus & campis commodè pascitur, melius tamen palustribus quàm sitientibus. Nemo-
ra sunt convenientissima glandium pomorumq; sylvestrium feracia.

Vivit ad annos 20. & variis Morborum generibus la-

borat, Raucedine, Angina, Struma, febribus, grandine in patria nostra frequentissimè.

Cognoscitur autem parte lingvæ inferiore, ubi plerunq; multa infestatur. Scatæ in Dorso evulsæ sangvinolentæ in radice: Pedibus posterioribus non constant: Caput obliquum in incessu. Curantur vulgò sem. Sina-
peos, Cicere, Lentibus, Scrofularia & Ledo Silesiaco.

Sus diutius in cæno immorans imminentem tempestatem præsentit.

Sus, Homo vocatur fordius, immodestus & qui imprudentiæ intemperantiæq; modum excedit.

Verres.

ὁ μὲν ἐκ τῆς ἰνδίας ὁ δὲ ἰταλίας
Ein Eber/
ungeschnittener Eber.

Porcus mansuetus non castratus

Eligitur Corporis amplitudine eximii quadrati potius quàm longi aut rotundi, ventre
Q₂ promisso.

promisso, Clunibus vastis :
Cruribus veró & ungulis
haud perinde progeris, Rostro
breui & resupino, amplæ &
glandulosæ Cervicis, salacissi-
mus, qvadrimum agens.

Unus sufficit pluribus im-
plendis.

Caro cibo inutilis, a paupe-
ribus & bajulis in cibum reci-
pitur.

Jecur Verrinum contra
Serpentes auxiliatur.

Testiculi inveterati in la-
cte contra Comitialem dan-
tur.

Dentium exertorum cinis
sanguinem & procidentem
sedem retinet.

Scrofa.

Δέλφας, Sus femina, qvæ
uterum habet.

σκρίφα, id est, Porca, qvæ
sæpe peperit.

Ein Fähr Mutter.

Mör/

Nange/

Loosf.

Sus femina, animal multi-
parum per totum ventrem
Mammillas habens; generosa
12. vulgaris binas. Hinc Su-
men propriè dicitur, qvafi Su-
is abdomen, Venter Suillus

infra umbilicum cum ipsis
uberibus. Vulva anfractu-
osa sinuosaq; est, in sinibus
fœtum gerit.

Coire incipit octavo æta-
tis mense. Bis anno parit,
prægnans est qvatuor mensi-
bus, binis nutrit. Superfæ-
tat. Hoc enim anno 1602.
in vicinia Scrofa peperit pri-
mo die qvaternos, paucis post
diebus octonos porculos.

Ultra decimum qvintum
annum non generat.

Lac Suillum omnium cras-
simum.

Nocet ventriculo, nauseam
excitat, pravum gignit suc-
cum & Elephantiasin.

Tenasmo, Dysenteria,
Phthificis utilissimum. Caro
difficilis est concoctionis, pra-
vi succi & malum gignit san-
guinem, utpote macilenta,
dura & insipida. Melancho-
liam & Qvartanam facile
procreat.

Porcus.

χοῖς

γυναικας

Verres castratus

Porcus nefrendis

Ein Vorek

Ein geschnitten Eber.

Porcus

Porcus ferarius, qui sero
pastus est.

Ein Schwein mit schrot ge-
mästet.

Porcus faginat,us,

ῥέλαξ σίτουτος

διαλος ζῆς

Ein Mast Schwein

Mühl Schwein.

Porcus colluviaris, collu-
vione alitus,

Ein Schwein mit allerley
vnstat gemästet.

Qua ætate castrentur, non
refert. Commodissimè ta-
men anniculi, iique majales,

Facilime ad quodvis pabu-
lum assvescit & celerrimè
quoq; in pinguedinem profi-
cit pro sui Corporis magnitu-
dine, sexaginta scil. diebus.

Pingvescit Hordeo, Glan-
de qvercina, Nuce fagina
&c.

Præstat hyeme circa bru-
mam seu solstitium hyemale:
æstate damnatur.

Caro porcina cum humana
magnam similitudinem ha-
bet, omnium præstantissima
& saluberrima, præsertim
mediocris ætatis, optimè nu-

trit, multum alit, facilè dige-
ritur, Stomacho idonea, dul-
cis & Ori grata: at glutinosi
in se non nihil habet, quo fit
ut jecur obstruat & Renes, in
quibus meatus angustiores:
inde Senibus & humidior
ventriculo minus salubris.

*In Regimine Scholæ
Salernitanæ.*

Est caro porcina sine vino pe-
• jor Ovina.

Si tribuis vina, tunc est cibus
& medicina.

Prava est cum fuerit crudi-
or aut ambusta. Bilem enim
aut cholera procreat, & tur-
bationem facit.

Nostrates sale macerant ad
dies decem, deinde in carna-
rio, quo fumus penetrat, sus-
pendunt, ne fracescat & viti-
um sapiat, neve à tineâ & ver-
mibus lædatur, tandem ad in-
tegrum annum reponunt.

Perna à pede ῥέγα Petafo
Mart. Eine Schincke / dicitur
tam prior quàm posterior
Coxa, salita cum pede & in-
fumata. Æstate elixatur &
cum lacte seu Cepis tenellis,
mensis primis offertur, non
ingratum edulium.

Q 3

Rostrum

Rostrum, *Pedes*, *Aures*, *Cartilagines* succum gignunt crassum, viscosum & frigidum, probe nutriunt. Ex his aceto elixis cum Croco, Zingib. Pipere, Passulis Coqui nostrates gelu ut vocant, in patina parare solent, quod congelatum frigide editur. *Cine Schweins galret.*

Cutis præpingvium Porcorum, ubi elixa sit, glutinosum quidem pingvemq; succum gignit, sed non admodum crassum nec tam facile concoctionem admittit, quam extremæ partes, neq; succum præstat tam bonum, sed qui excrementis magis abundet. Ob id raro editur.

Viscera suilla omnia cæterorum Quadrupedum visceribus suâ naturâ sunt multo suaviora: secundum illud:

Ilia Porcorum bona sunt, mala sunt reliquorum.

Sanguis der Schweis / Laniationibus, propter similitudinem cum temperamento humano Intestinis immitti solet ad cibum.

Apexabo, Intestinum sanguine factum, *Cine Blut-*

wurst / *Schweiswurst*. Admiserunt Ditiore simillam lacte præmaceratam, Cerebrum Porci, & Lardum seu pingvedinem concisam, cum Majorana, Rosmarino, Pipere, Carvi & aliis aromatibus. Ex qua mixtura Venterculus factus Faliscus vocatur, die grosse Wurst / Intestinum crassius cum apice die Zippelwurst.

Tomaculum, *Cine Leberwurst* / ex Hepate, Corde, Renibus & Lardo concisis absq; sanguine paratur adjectis aromatibus.

Lucanica, Botulus, *Cine Brattwurst* / fit ex frustulis carnis macræ & Lardo concisis cum sale, Pipere integro, sem. Carvi & aliis aromatibus suffumigatur & reponitur.

Pulmo suillus impositus, attritus a calceamentis contractos ab inflammatione tuetur.

Jecur assum alvum sistit. Cum vino venenatorum moribus medetur.

Adeps seu Axungia porcina, *Noretschmaltz* / humanæ ferè affinis. Calefacit humectat mediocriter, digerit, abstergit

git nonnihil, multi in medicina usus.

Sincera confricatis membris prodest, itinerumq; lassitudines & fatigationes levat: contra Vulvæ & Sedis vitia idonea. Ambustis igne medetur. Cum terræ lumbricis nervis vulneratis prodest.

Axungia vetus acrior & calidior est.

Liqvamen Schmer/Schmalz ex adipe Abdominis Suilli adhuc recentis colligitur, quo butyri loco ad cibos feminæ utuntur.

Lardum, Laridum quasi larem aridum large aridum, Pingve quod inter Cutem & carnem aridum est. Salitur & suspenditur é trabibus, ut incorruptum maneat, optimum Ciborum condimentum

Vesica Suilla distenta & recto appensa optimè conservatur ad clysteres & fatus anodynos,

Tosta pulv. lectum permingentibus Pueris utilis.

Fel contra Aurium ulcera reliquaque omnia magno usus assumitur.

Lapis aliquando reperitur in Collo Vesicæ subobscuri aqve coloris, qvalis ante annos quatuordecim Hirschbergæ à Lanione inventus fuit.

Succerda seu finus recens calidus Naribus admotus odoratus sanguinem profluentem cohibet: Impositus &, post tertium diem sublatus, efficaciter Verrucas & clavos auferit. Ex aceto coctus ad venenatorum morsus Aëtius laudat, Vulgus ad stercorandos agros & hortos oleraceos Suillum finum cæteris præfert.

Astragalus Ασράγαλος ὄρε, Talus Suis ustus Cephalalgiam dissolvit. Coli inflammationibus & torminibus ventris tritus medetur & potus.

Pellis Suilla φογίον Schweinleder/A Bibliopegis ad librorum operimenta expetitur, ut pote quam firmitior & multo diuturnior quam ovilla aut vitulina. Non enim tam facile deteritur.

Setæ suillæ *Sembursten* ex his parantur Muscaria se tacea ad vestes extergendas,

Porculus.

Porculus.

ὅς γαλαθιδός,
 Δελφάκιον,
 Porcellus subrumus,
 Porcellus lactens,
 Ein Spanfärle/
 Spanferchel.

Porcellus nuper genitus
 Scrofae uberibus adhuc hæ-
 rens, ob nimiam humoris a-
 bundantiam insalubris est,
 lentum, viscosum & crassum
 procreat succum.

Eliguntur qui intra ædes
 detinentur, qui verò passim
 obambulant & omnes gene-
 ris sordibus vescuntur, inuti-
 les ad cibum sunt.

Purgantur á Coqvís inte-
 raneis exemptis, iterum sub
 cute & ventres farciuntur, &
 ad ignem assantur. Delitiæ
 sunt Divitum, & saporis non
 ingrati, fortibus Ventriculis
 utiles, cum bene concoqvun-
 tur. Secus enim phlegma
 viscosum gignunt, & nascent-
 es inde Morbos, Podagram,
 Ileum dolorem, Calculos Re-
 num, Paralyfin & similes.
 Ad venenatos morsus optimè
 auxiliatur si statim post cu-
 curbitas imponatur discer-
 ptus, & adhuc intus calens.

Talpa.

Ασάλαξ, quod perpetuâ
 cæcitate infestetur.
 ασάλαξ.

Mus terrenus vel cæcus,
 Albert.

Ein Mauswerff/ quod ter-
 ram rostro fodiat & rejiciat.

Moliturff/
 Mollmaus/
 Schermaus.

Animal est mutilum ni-
 grum, non multum muri dis-
 simile, pilis multis, brevibus
 & densis nigrore splendido
 (præcipuè in Dorso, Venter
 enim obscurior) insigne. Ro-
 strum habet Muris aranei si-
 ve Suillum potius. Collum
 inter crura anteriora brevissi-
 mum, & propè nullum. Cru-
 ra brevissima, & ungues acu-
 ti robusti, quinque; ante & po-
 sterius. Vola anteriorum pe-
 dum benè lata est & manum
 refert. Caput longiusculum.
 Oculi nulli, nec in Cranio
 ulla vestigia seu meatus, nisi
 quis velit Oculos dicere pun-
 ctula illa nigra semini PAPA-
 veris similia, sub cute utrinque
 prope rictum rostri hæren-
 tia. Dentes anteriores laci-
 usculos obtinet, & utrinque
 duos

duos acutissimos ad latera prominentes.

Talpa candidissimus hoc ipso anno effossus & captus est in agro Reichenoviano, sub Abbatia Grissenfi.

Testiculi bini Pisi minoris magnitudine coloris candidi, Genitale sub Intestino recto prominet.

Hepar quinque lobis absque felle distinguitur, cui subjacet ventriculus.

Renes Phaseoli magnitudinem æquant. Cor paulo majus Pulmones ambiunt, quæ multæ sunt fibræ separatæ, quæ nullo inter se principio coherent.

Lien longiusculus sanguinei coloris.

Audit liquidissimè. Defectum enim in visu Natura in Auditu restituit.

Sub terra sibi domicilia parat; extra eam enim diutius non durat, nisi forte ad horam unam aut alteram.

Terram rostro suffodit ac subruit egestis veluti colliculis. Pestis agrorum, hortorum & pratorum.

Vescitur Lumbricis, Ranis, radicibus, frugibus maximè, etiam terra in fame. Julio

menſe latibulo ſuo egreditur & facilius capitur, cum cæcus ſit natura, unde Virg. I. Georg.

Aur oculis capti fodere cubilia Talpa. Parit ſub terra.

Talpa manibus donec moriatur in paroxyſmo retentus, febrium inſultus reſſumit.

Vivus combuſtus in ollula ad cineres ex Cereviſia ſeu vino diebus aliquot Luna creſcente & deficiente, contra Dracuntias commendatur.

Cinis cum Melle illitus Lepram, ſtrumas & fiſtulas curat.

Sanguis capillos creſcere facit.

Ex pellibus fiunt pileoli, Cubicularia, ſtragula & crumenæ.

Taxus.

Μελίς

Meles à Melle quod avidè expetit.

Taffus vel Taxus Offic.

Blerellus.

Ein Dachs.

Medium inter Snem & Urum magnitudine Vulpis aut Canis mediocris animal pingve, dorſo latiore, mordax admodum, Cute ſpiſſa, pilis duris, rigidis, grifeis, ſupernè ad nigredinem vergentibus, infernè candicantibus.

R

Cruribus

Cruribus breviusculis, Capite in summo nigro, laterotenus albo, Dentes acuti, quibus, si à Canibus aut aliis animalibus impetatur, se defendit: sæpius corpore & pedibus etiam repugnat. Cauda ei varia villosa non longa.

Duo huius genera ab Autoribus numerantur. Unum Caninum *πολυκίς*, Canis instar digitatum, *Ein Hund Dachs*. Alterum, Suillum *διωκίς*, Ungulas ut Sus habet, bisulcum, *Ein Schwein Dachs*.

Passim occurrit. In cavernis vivit sub terra, è quibus exit & vagatur in sylvis, non aliter atq; Lupus, etiam hyberno tempore.

Apibus, & Melli infidiatur. Crabronibus aliisque vermibus victitat. Autumno Pomis & aliis fructibus arboreis præcipue pingvescit.

Capiuntur Caniculis, qui cavernas seu latibula ingressi eos extrahunt, deinde figuntur.

Tenues comedunt carnes, divites non item. Axungia loco Lardi utuntur in cibo,

Calefacit magis quam Suilla, emollit, digerit egregie, lenit. Utilis febricitantibus. Prodest in affectibus Renum, calculosis, Articulorum doloribus, fracturis, illita.

Contractos seu rigentes nervos & Articulorum durities emollit & discutit.

Tigris.

Τίγρις.

Ein Tiegerthier.

Fera est savissima, & miræ perniciousitatis, Silesiæ nostræ peregrina, colore subfulvo, maculis nigris orbicularibus, & eleganti nitore fulgidis asperso.

Tigrides indomitæ rancant, rugiuntque Leones.

Pellem exiccatam aliquando circumforanei, miraculi ergo ostendunt.

Trigides fert India & Hircania.

In aula Imperatoris Romani Præagæ alitur cum ceteris bestiis.

Cibi

Cibi caussa omne animalium genus, Quadrupedes præsertim majusculas invadit.

Velocitatis tremendæ sunt Tygrides.

Nihil enim tam longum, quod non brevi penetrent : nihil adeo antecedit, quod non ilico assequantur.

Tympanorum strepitum non ferunt.

Ursus.

Αρκτο,

Βερε.

Ursus quasi orsus, scilicet in ventre & extra completus.

Ein Bär/

Beer.

Ursa Beerin.

Animal est sævum & deformis in membris, aspectu horridum, Corpore crassiore, & vix mobili, hirsuto villo, Capite invalido, Ore seu Rostro oblongo, instar Suilli feré.

Ora illi lato de formia rictu.

Vox iracunda minaxque

Plenaq; terroris rauco de gutture fertur.

Dentes ferrati. Naris nigra. Pedes lati Hominis manibus similes (quibus, ut & Lumbis, vis maxima, & ad varia utitur) armat unguibus. Anteriores manus vocant Dagen/ Daapen. Cauda parva.

Femina Mammæ habet quaternas. Non coeunt sicuti cætera Quadrupedia, sed amplexibus mutuis ambobus cubantibus, veluti humanis conjugationibus, copulantur. Dum coeunt, utpotè hyemis initio, maxime sæviant Brummen.

Fert Uterum dies 30 secundum Nonnullos.

Parit Unum, etiam duos, tres, sed complurimum quinque, eo tempore quo later.

Fœtum minimum pro magnitudine Corporis sui edit, Catto minorem, nudum, cæcum, & Cruribus propemodum, membrisq; aliis plurimis indiscretum & rudem; postea lambendo calefacit & figurat, sinu gremioq; fovet, donec vocem edere incipiunt, quod & Ovidius confirmavit, ultimo metamorphoseos.

R. 2

Nec

Nec catulus partu quem reddidit Urſa recenti,
Sed malè viva caro eſt, lambendo mater in artus
Fingit, & in formam, quam tam capit ipſa, reducit.

Hæc fuit veterum opinio: At Experientia aliud teſtatur. Reperta enim eſt Urſa hyberno tempore in caverna, cum tribus catulis quos jam enixa fuerat, cæcos quidem at non informes, ut vulgo creditum fuit, ſed omnibus artibus ſuis formatos. Lambit quidem, ut Canes, parvulos, cum in labiſulis per hyemem pituita mucoſa impleantur.

Omnivorum eſt animal, utpote quod & fructus arborum edat, & fruges, Myrtillos, Rubi idæi baccas, herbas & legumina; nec non Apes, confringens alveos, & Cancros ac formicas. Carne etiam veſcitur, Sues enim ferros, Vaccas & Capras adoritur.

Duplex genus apud nos in alpinis tractibus, ubi plerumque vitam agunt, obſervare licet. Unum majus.

Urſus major.
Ein groſſer Beer/
Heubr Beer.

Aliquando enim in montibus circa Gigantum ingentis magnitudinis Urſi capti fuerunt.

Alterum minus.
Urſus parvus, ſaxatilis, formicarius.

Ein Steinbär
Zeidelbeer
Dmesbeer.

Lingvâ quam habet peracutam & longiſſimâ mittit in formicarum habitacula ad cujus humorem illæ accurrentes adhærent; ipſe autem ad ſe attracta lingua formicis onuſta epulatur.

Saxa incolit.

Natura Urſorum ante omnia ſe condere veterno appetente, priuſquam planè torpeant, & ſtupidi jaceant, ſe condunt in luſtrum. Mares quadraginta diebus latent, femina quaternis menſibus. Primis diebus bis ſeptem tam gravi ſomno premuntur, ut ne vulneribus excitari queant, tunc mirum in modum veterno pingveſcunt. Quodam murmure fugunt Pedes, tanquam alimenta quædam ex iis ſumant. Urſi aſtuti, feri, improbi, ſavi, maximè libidinis tempore. Juvenes capti

capti aliquando mansvescunt, & variis ludis ac gestulationib^{us} se exercent. Quod apparet in iis, qui aliquando è Lithuania spectaculi causa circumferuntur. Miranda levitate choreas ducunt, tibi-
arum modulatione deliniti, erectoq; corpore.

Capiuntur laqueis, retibus, armis, foveis.

Ursus naturæ est frigida & pituitosa. Caro ejus ἀρκυρ κρέας, frigida est, mucosa, concoctu difficilis, illaudata, pessimi nutrimenti, Medicinæ magis quàm nutritioni apta. Spleni ac Hepati obest, appetitum tollit. A pauperibus solummodo in cibum recipitur.

Pedes anteriores præcipuè apud Magnates in delitiis habentur, utpote prædulces & insigni suavitate præditi.

Axungia Ursi, Beerschmalz. Calefacit, humectat, digerit.

Livores & maculas eximit ambusta sanat cum Cera, du-
ros tumores emollit, & ad suppurationem perducit. Lum-
borum dolores mulcet & Cer-
vicis. Articularibus & Podag-
ricis morbis, Aurium item
doloribus prodest. Cum La-
dano & Adiantho Capillos

defluentes continet & Alo-
pecias emendat, Ulcera Cru-
rum, Tibiarumq; sanat.

In Hernia seu Enteroccele
Puerorum utriq; prolapsu
vulgatum Muliercularum re-
medium, Dorso seu Offi sa-
cro illita.

Eam capillos dealbare qui-
dam tradunt.

Fel cum folliculo ab Ursi
hepate separatum suspendi-
tur & exiccatur. Caducos sa-
nat Eclegmate, & morsis à ca-
ne rabido efficacissimè suc-
currit.

Oculus dexter siccus Pueris
appensus, ab eis timores, qui-
bus in somnis vexantur, a-
moliri dicitur, adstipulante
Rhazi.

Pellis Urina, σκύλος, Eine
Bährhaut / à Canes rabido de-
morsis, utiliter substernitur.
Hyberno tempore peregrin-
antibus straguli vicem sup-
plet.

Vulpes.

Αλώπηξ παρά τὸ ἀλῶ.

Vulpes quasi volupes, à
pedum volubilitate,

Ein Fuchs.

Bestia est vafra, callida,
astuta & dolis omnibus in-
structa, Canis mediocri ma-
gnitudine

R 3

gnitudine & gravis odoris. Color sæpè rutilus, priore tamen parte canescens, raro niger, rariùs candidus. Caudam ei Natura donavit magnam, & villis densam, in cuius superiori parte enascuntur pili flavi tenuissimi, Violam Martiam odore emittentes, qui à Venatoribus patriæ nostræ vocantur *die Blume*.

Mari genitale osseum est. Coeunt in latera projectæ, Maremq; femina amplexa. Parturiens ita recedit, ut raro grvida capiatur. Parit ut plurimum quatuor & cæcos, quos lingua lambendo refovet & concoquit.

Fallax Vulpecula gannit.

Vulpibus abundant montani tractus Silesiæ nostræ. Cavernarum suarum, quas altas incolit, *Suchsgruben* plura facit foramina, & multifores aditus procul inter se distantes, ne uno in loco insidiis à Venatoribus locatis facile comprehendatur. Dolo sæpè occupat Taxi foveas.

Venatur Lepores, Anseres, Gallinas, Anates, Aves, Mures, Pisciculos, Vespas, frumenta &c.

Satis justam ætatem conficitur.

Rabiens eadem incommoda infert, quæ Canis rabidus.

Capiuntur laqueis, canibus, foveis, decipulis ferreis, quæ *Tajolæ ferreæ* dicuntur, *Suchs Eisen*.

Vulpem insequuntur Venatores non ob carnem, sed propter pellem, quæ togæ & pilei suffulciuntur, & quidem hyberno tempore. Æstate enim si capiuntur, pili sunt tenuiores *Durchhârig* / & inutiles.

Calefaciunt Pelles, & utiles existimantur Arthritidi, Podagræ & frigidis fluxionibus, utpotè vi digerendi & resolvendi prædita. Quamobrem aliqui tibialia sive caligas inde parari curant.

Caro calida & sicca, terrena, melancholica, & pravi succi, ob id tanquam inutilis à culinis abdicatur, concoctu difficilis & gravis odoris.

Vulpes cocta, donec ossa tantum restent, fotu Podagras mulcet.

Integra oleo elixata digerendi facultatem addit oleo, facitq;

facitq; ut ad extremam superficiem evocet, quæ in alto dolore excitant, Arcicularis affectibus non incommodum.

Adeps Vulpinus calefacit, emollit, humectat, attrahit, resolvit, Nervos emollit rigentes. Prodest tremulis & ipsa spasmus divexatis. Sanat Alopecias, & finit Aurium dolores.

Pulmo, *Hepar*, si vino abluta siccantur, Lienis profunt, sistunt Alvi fluxus, & Phthisicis ac Lienosis usui sunt.

Pulmo, *Vulpis Fuchslunge* exiccatus, artis lege cum saccharo vel vino seu jusculo aut linctu sumtus, tussim inveteratam sanat, & Pulmonibus robur afflat. Alii pollinem linteolo includunt, & Asthmaticorum poculis injiciunt.

Fel cum Melle caliginem discutit.

Testiculi sicc pulv. ex vino proritant ad venerem, & conceptionem in Muliere excitant.

Genitale ossum Calculo humano remedium præcipuum.

Stercus Vulpinum Lepras cum aceto abstergit, & ulcera putrida sanat.

Vulpes crucigera.

Ein Ereus Fuchs /
Brand Fuchs.

Hæc priori respondet, præter lineam nigri coloris, quæ secundum longitudinem à rostro per verticem, tergum ad caudam usq; extenditur:


Insuper guttur Cruce alba insignitur.

In Kauffunga territorii Hirsbergensis à nobilissimo Dom. Balthazaro à Reder capta fuit.

Candidæ Vulpes rarius visuntur.

Nuper in montanis non procul ab Hirsberga, *Vulpes* visa fuit nigra, macula candida prope caudam adornata.







LIBER TERTIUS.

Reptilia Silesiæ.

Ερπετῶν, Ερπισκῶν, ἀπὸ τῶ
ἐρπειν, qvōd propriè de
Serpentibus & Vermibus dici-
tur, qvibus pedes defunt.

Οφίς,

Serpens,

Angvis,

Eine Schlange.

Serpens nomen est genera-
le, non minus ut Angvis, &
significat nonnunquam ter-
restre omne animalculum,
qvod se non attollit ingressu,
sed humi repit, etiam si qua-
drupes est, ut Seps, Salaman-
dra, Lacertus; etiam multipes,
ut Scorpio, Scolopendra.

Specialiter verò Serpens
animal est terrestre sangvi-
neum ἐρπισκῶν, minus perfe-
ctum, pedibus ex naturā ca-
rens, corticeq; intectum.

Omnia ferè Corporis mem-
bra habet Lacertis proxima,
si pedes iis demas, longitudi-
nem addas.

Partis Externæ

Pars prona, supina,

Cutis, Pellis Corium,
Schlangen balcf.

Collum proportionale
potius Collo videri potest.

Caput Dorso affixum,
qvod præter alia animalia
in aversum vertere, reliquo
Corpore qviescente, valet,

Sensoria non eminent,
sed foramina habent, ut Na-
res olfaciendi, Aures audien-
di.

Oculi duriores.

Palpebra superior im-
mobilis, sed inferiore conni-
vent.

Meatus seu ostium ex-
crementi.

Cauda, ut Lacertis, am-
putata renascitur.

Partes interiores.

Omnia interna etiam ferè
eadem sunt qvæ Lacertis: at
per longitudinem & angusti-
am Corporis, longa arctaq;
habentur, ut inter se dignosci
præ sua

S

præ sua figuræ dissimilitudine
vix qveant.

Lingva bifulca (trifulca
Plin.) tenuis, quippe quæ tenu-
issimis quasi capillamentis dis-
creta vibretur.

Dentes ferè serrati κα-
χαρόδοντες. Duo in superna
parte dextra lævaq; longissi-
mi, tenui fistula perforati.

Epiglottida non habent.
Arteriæ superpositam, sed
meatum ipsum modò contra-
hunt, modò laxant pro sui
desiderio.

Gula angusta & longa.

Arteriæ origo proxima
est, adeo ut sub ea Lingva esse
videatur.

Pulmo adnectitur fibro-
sis fistulis divisus, prælongus,
exiguus, fungosus multumq;
à Corde sepositus.

Jecur longum simplex.

Lien exiguus rotundus.

Cor in gutture hæret.

Ventriculus veluti In-
testinum amplius, Canino si-
milis.

Fel ac in Piscibus in omni-

bus præter Natricem Intesti-
no adnexum hæret.

Intestinum longum, te-
nue & ad exitum usq; uni-
forme.

Renibus & vesica caret.

Testes nulli, nec Penis,
sed meatus horum loco bini
dati, qui de Septo exorti latera
spinæ utrinq; perreptant, coe-
untq;ve juxta spinam in u-
num, atq; ita ad ostium excre-
menti finiunt.

Vulva bifida omnibus
ferè tendit prolixior modò
Corporis exorsa inferius ab
uno continuo meatu, didu-
cta q; utrinq; in latera spinæ
quasi duplex meatus usq; ad
septum; in qua Ova ordina-
tim gignuntur & edi inde so-
lent.

Viperæ uni, quandoq;vi-
dem animal edit, postquam
Ova inter se pepererit, Vul-
va similis ut Cartilagineis.

Dorsi spina Piscium mo-
re. Spinam enim in ossium
loco continet,

Costæ

Costæ singulis vicinæ, ut se facilius convolvere possint, ac in orbem complicare.

Actiones.

Incessus. Pectori innitentes totum Corpus uno nisu trahunt, quanquam & spiris se convolvant.

Vox. Vocem emittunt, sed exilem & veluti longum sibilum.

Sensus. Visu & Auditu pollent inter cetera Animalia, quibus sibi assidue cavent. Sunt enim timidissimi & astutissimi.

Hinc jubemur imitari Serpentum prospicientiam & prudentiam Matth. 10.

Coitus mutuo complexu supinarum parium agitur.

Adeo sibi circumvolvuntur, ut unus existimari serpens possit, isq; biceps.

Partus. Ova pariunt oblonga, foris, excepta Vipera. Omnes, non singulatim; sed ad monilis muliebris, quod collum ambit, similitudinem.

Incubant quæ pepererint in terra & statim sequenti anno excludunt.

Corium deponunt vere & Autumno.

Victus. Omnivori sunt. Nam & Carnem edunt, herbam & terræ pulverem. Diu sine cibo vivere possunt, quoniam a calore deferuntur.

Conduntur hyeme sub terra aut saxi, aut in arborum saxorumve cavis, & omnes, secessus tempore, veneno orbi dormiunt.

Loci in quibus versantur, ut plurimum sunt caulae, caesæ rusticæ & scopuli, aut exiguae valles, colles, prata quæ prope lucos & sylvas cæduas sunt.

Sunt enim in quærendis sibi latibulis tutis admodum perspicaces.

Natura.

Serpentes omnes tactu sunt quam frigidissimi.

In Capite & Dentibus Venenum gerunt, quod totum ē felle eorum proficisci volunt. Consistit autem in quodam subtiliore humore, sive ichore, sive excremento.

Isidorus lib. 12. c. 3. Serpentum tot sunt venena, quot genera, tot pernicies quot species, tot dolores quot colores.

Omnium Serpentium mortus, paucis exceptis, homini lethales sunt, nisi medicatio adhibeatur.

Quidam citissime interficiunt, alii tardius. Aspis Chersæ intra tres horas, Chelidonia presentissimam necem affert, Ptyas tardius necat. Dipsas siti enecat, sibilo seu halitu Basiliscus, Hæmorrhous ab effusione sanguinis, per omnia Corporis orificia fluente. Iaculus quod exiliens quasi telum mortem infert. Cenchrena hydropem & ulcera putria inducit.

Eusebius præparat. Evangel. lib. 8. cap. 5. Serpentes & venenata Animalia, multos ad morbos, & maxime perniciosissimos, remedia conferre saluberrima, Medici perhibent;

videbisq; si diligenter attendere volueris. Deinde a Deo ista esse parata in peccatores, sicut aculeos & alia tormenta in iudiciis præparata videmus.

Differentia.

1. **Sexus.** Mas minor est femina. Femina major, sævior & vivacior quam Mas.

2. **Loco.** Alii sunt terrestres. ut vipera, Aspis.

Alii aquatici, & hi vel humida & palustria incolunt loca, ut, Coluber, Boa &c. vel Maris indigenæ.

3. **Magnitudine.** Alii sunt breves ut Cecilia.

Longissimi, ut Boa, Chelydrus,

Crassi, Boa,
Graciles, Acontias, Cecilia,

4. **Colore.** Alii Cinerei, ut Ptyas
Albidi, ut Cerastes, Dipsas.
Subflavi, ut Vipera.

Virides, Acontia s. Jaculum.

Fusci ut Amphisbæna.

Rufi, Aspidæ nonnulli.

Purpurei, Porphyus

Nigri,

Nigri, Aspis, Berus, Dryinus, Hydrus, Tyrus.

Cærulei, Angvis, Cenchrines.

Flammei, Hæmorrhous.

Varii, Chamæleon.

Boa.

ὄφις Nonn.

χέλυς

χέλυς

Natrix domestica & vernacula Agric.

Serpens palustris, aquatilis.

Angvis boa, Draco serpens.

Bova à boum populatione.

Ein Spieß sil. id est Hasta, Lancea Pucke.

Immensæ molis serpens, qui prona parte flavet, supina per dorsum ex cæruleo nigricat.

In Baronatu Trachebergensi locis udis & desertis, veluti auff der Cothal/ frequens.

Veneri expers creditur. Greges Armentorum persequitur & bubulos: & si quæ plurimo lacte rigua est, ejus se uberibus innectit, suctuq; continuo interimit. Avium pullos insequitur & devorat

Arbores subeundo, è quibus maxima vi, instar teli seu hastæ, sese dejicit obvios feriens.

Accepi à viro fide digno istius loci incola, ante paucos annos Boam in arbore hærentem, octo Cubitorum longitudine, crassitie brachii, bombardæ globo occisum fuisse.

Non facile lædit quemquam, nisi fuerit laceffit.

Hinc forsan oppido Trachebergæ nomen cessit Draehenberg / à Draconibus, ob frequentiam horum Serpentum, qui olim Dracones dicebantur.

Cecilia.

Τὸ φλω Nicand.

Τὸ φλω

Serpens cæcus Plin.

Cæcula quod cæca sit.

Cophia quod hebetes illi aures.

Eine Blindschleiche.

Parvus est admodum Serpens, Agricolis notus, Corpore gracili, pelle duriuscula splendente, Coloris varii, partim subcærulei, partim subflavi, inter quos diluta purpura elucescit.

cescit. Oculos habet sed re-
nues & tenui pellicula quasi
obductos. Dentes minutissi-
mos utrinque; κακαρόδοντες
plures in inferiore Mandibu-
la magisque conspicuos quam
in superiore. Lingua biful-
ca. Rimam quandam sub
imo ventre obtinet, quâ de-
hiscence aut disrupta ova pa-
rit. A partu autem vivit &
vulnus coalescit.

Frequens in montosis æ-
state.

Hyeme condit se in terram
& saxorum rimas.

Ciconiæ his mirè delectan-
tur.

Venenatissimus apud nos.
Morsus ejus obscurus vix ap-
paret veluti Muscarum ictus,
inflammationem excitat &
Corpus inflamat.

Antidota sunt Theriaca,
Mithridatium, Sigillata.

Oleum Viperinum, Scor-
pionum, Erucæ.

Cœculæ carnem quidam
Theriacæ, loco trochiscorum
de Tyro addunt, veluti Of-

valdus Bru, quam Pestis tem-
pore multum profuisse, vir
multæ eruditionis & experi-
entiæ D. D. Felix Platerus
Medicus & professor Basili-
ensis testatur.

*Cochlea terre-
stris.*

Κοχλίας
Κύχλος

Limax à limo, in quo per
hyemem delitescit.

Eine Schnecke/
grund Schnecke.

Cochlearum aliæ reperiun-
tur magnæ, aliæ parvæ, aliæ
mediocres: quædam albæ,
quædam nigræ, quædam va-
riæ.

*Cochlea opercu-
laris.*

Κοχλίας πωυαλίας
Cochlea edulis.

Ein Ruben Schneck/
Weingart Schnecke.

Hæc contra frigoris in-
juriam

juriam quodam albo operimento duro, gypsi speciem referente concluditur, sicq; contacta terræ se condit.

Passim in vineis, frutetis & sepibus vitam agit.

Eruuntur è terra Martio & Aprili unceis quibusdam ferreis terra circum fossa: reliquo tempore cibo inutilis.

Quia demortuam Venerem excitare valent, apud lautos & libidinosos in pretio sunt: at Vulguseas negligit.

Sapidiores esuiq; gratiores existunt quæ in montibus degunt; item quæ in apricis admodum locis victitant herbis odoratis.

Cum ut cibo esculento uti volueris, ubi prius in aqua elixaris, in aliam aquam transferas, in qua rursus elixabis, tum demum condies ac tertio elixabis usq; dum tota caro intabescat. Hoc enim modo mucorem deponet suum, alvum etiam sistet, & alimentum dabit

Corpori non contemnendum.

Carne prædita sunt dura adeoq; concoctu difficili, sed quæ potentissimè nutriat.

Caro decocta cum Hordeo bibitur seu datur tussientibus ad sputum facilitandum. Commendatur Phthificis, Hæmoptoicis & prominenti umbilico.

In cibo sumta mirabiliter Coli & Vesicæ tormina sanat.

Una cum testis trita & imposita Abdomini, Hydropicorum aquas exhauriunt & exsiccant. In Arthriticis Articulorum tumores & dolores leniunt; Corpori impactos aculeos illita evocant, & menses nimium fluentes sistunt.

Mucus, *μύξα κοχλίου*, Mucus salivofus, qui computris Cochleis redditur, emplasticu est. Cum thure & myrrha purulenta, Aures glutinat desiccataque

Fronti

Fronti affixus Oculorum fluxiones resiccat.

Cochlea domus, Schnecken.
Heuslin / Calyx, καλυφος
Diosc. Οσγκαρον Gal.

Cochlea testa usta calefacit, siccatur, exurit. Pulvis inspersus sanguinem sistit, hæmorrhoides sanat, ulceraq; Capitis; cum thure Hernias.

Cochlea minor hortensis.

Eine kleine Schnecke /
Garten Schnecke.

Multo minor est edibili, testa seu domo ut plurimum flavente, lineolis subrubentibus seu purpureis.

In hortis oleraceis æstate passim obvia.

Cibo inutilis.

Cochlea etsi omnium Animalium ignavissima & stolidissima sint, nihilominus Concordiæ insigne exemplum præbent, Invicem enim eas hære compertum est uvarum modò. Plin. lib. 8, cap. 39.

Cochlea terrestris nuda.

Cochlea nuda
Eingraße Schnecke /
garten Schnecke /
Wald Schnecke /
ledige Schnecke /
rotte Schnecke.

Sunt in Cochlearum genere, quæ tegumento seu testa carent, colore nigrae aut rufæ, noctu potius quam interdiu ad pascua exeuntes.

Degunt in campis, hortis, sylvis gramineis, Cellis item vinariis, & aliis subterraneis uliginosisq; ædium locis.

Majo colliguntur, potissimum rubrae Mulieribus ad faciem expoliendam. Aquam aliis additis eliciunt, quæ facies illarum elota lavorem mentitur.

Cum Thure & ovi albumine in Cataplasmatibus formam redactæ & impostæ, curant Puerorum hydrocelen.

Pulvis exiccatarum inspersus, Melicerias Chirurgorum exiccat. Cinis cum Melle mixtus & faucibus illitus, Inflammationi & tumori faucium medetur.

Oleum ex his paratur, nervis vulneratis magno usui.
Oleo

Oleo macerantur á quibusdam adjecto sale contra Articulorum dolores.

Coluber.

Νερόφις;

Enhydriſ, Cherſydrus.

Natrix.

Coluber quód colat umbras, vel quód lubricos tractus flexibus ſinuofis labatur.

Ein Waſſer Schlange.

Wald Schlange.

Serpens eſt longus gracilis, ut Angvilla, coloris ſubviridis, Tortuoſe & ſibilans incedit, tranſeuntibus mordens inſidiatur, & lingua venenum infundit.

Virgilius :

Hirtus & ut Coluber, nodoſo gramine rectus,

Ventre cubat flexo, ſemper collectus in orbem.

Nemorum umbras incolit, & in aquis vivit. Aestate ſæpè occurrit. Natura ejus valde calida eſt & venenofa.

Coluber olla nova incluſus, & opercularuſ uſtus in cinerem, & ex oleo illituſ ſcrophulas liqvefacit. *Sylvius :*

Auribus exuvium confert ſinuofuſ Colubri,

Ex oleo laſis, quod ponit arte ſua.

Crocodilus.

Κροκόδαλος,

Χάμψης,

Crocodilus fluviatilis,

Crocodilus Niloticus. *Ceſa.*

Ein Crocodil.

Ægypti Lacertorum genus. Homini inſenſiſſimū, ſquamis præduris Oſtreorum modo totum obductum, cute corticoſa, contra omnes icſtuſ invicta. Oculi ſuilli.

Dentes exerti longi, pectinatim utriq; maxillæ infixi, & ungveſ in pedibus ſingulis quini acutiſſimi. Lingvæ parva, tota inferiori neſtitur Maxillæ. Crura alatere adjuncta, & in ſummo humo expanſa.

Pedes admodum parvi, atq; ad capiendum retinendumq; inutiles. In ventre mollior eſt cutis tenuiſq;, in tergo corticoſa. Mover Mandibulam ſuperiorem, non inferiorem, contra morem aliorum Qvadrupedum.

Cauda longiſſima eſt. Viſuſ in aqua hebes extra acerrimuſ.

Procreatur ex ovo magnitudine Anſerini.

T

Excedit

Excedit longitudine duodeviginti cubitus.

Parit Ova, qvalia Anser, circiter 60 candida, quæ terræ gremio committit, & sexaginta diebus incubat.

Parvum in meis Musarum thesauris exenteratum habeo, quatuor spithamarum longitudine & trium digitorum.

Ægypto familiaris est, India etiam & America notum hoc Animal, in terra & aqua vivens. Interdiu plerumque terram incolit, noctu vero aquis se mergit, innatatque flumine.

Piscibus nec non aliis animalculis in cibo fruitur, humani Corporis avidissimum.

Quatuor mensibus hybernis sine ullo cibo in latibulo quiescit.

Crocodylis hiantibus Trochylæ aves involantes depurgant dentes, & os ipsum totum: quo munere & ipsi aluntur, & Crocodilus sentiens secum commodè agi, eis nihil nocet, sed cum egredi

avem vult, Cervices aliquantulum movere ne comprimat. *Arist. lib. 9, cap. 6. hist. anim.*

Ichneumon mus Ægypti Crocodilo apricanti insidiatur, Cum enim Crocodilus humi jacet stratus, & rictu immenso os gerit patulum, tum Ichneumon dolosa consilia de illius pernicie obiens, limis oculis tam diu eum observat, quoad arcto oppressum somno intuetur: tum confestim in arena & luto volutatus agilis procurrit, & singulari animi fiducia mortis portum ingressus, per latum guttur in alvum delabitur. Crocodilus vero inexpectatum malum in ventre sentiens somno solvitur: & incitato cursu furibundus & confusus inops, longè lateque vagatur, modo in imam fluvii sedem se demergens, modo magnum acerbatis virus anhelans sese ad terram abjicit: sed nihil hæc curans Ichneumon, & viscerum (Jecori præcipue incumbens) suavi cibo expletur: ac tandem satur, jam exinanito Crocodili ventre profilit foras. *Gellius ex oppiano.*

Lacertus

Lacertus.

Σαῦρα, os Dioſc.

Κυλισσαῦρα,

Lacerta

Cin. Heider

Egochs.

Animalculum est omnivorum; Cute constans duriuscula, squamosa, Cauda longiuscula, lingua fissa bifida, pedibus quaternis, qui in digitos tanquam a volis aut palmis finduntur, & in obliquum flectuntur.

Omnia habent membra Serpentibus similia, si pedes iis demas, longitudinem addas.

Ova pariunt subtilissima velut Serpentes, quæ sponte in terra aperiuntur, & catuli per se erumpunt.

Sibilant ut Serpentes, & senectutem exuunt Vere & Autumno.

Morantur plerumque aridis locis & inter saxa, inter vetera ædificia, Muros & mœnia.

Vitam eorum annum non complere, sed semestrem finire ajunt. Mensibus certe quatuor frigidissimis latent.

Lacertæ quoque nulla est memoria, ideo non incubat, oblita quidem in quo loco sit enixa: per se enim erumpunt Catuli, *Plin. lib. 10. c. 65.*

Facit ea labilis memoria Lacertarum, ut res fixius admirantes spectent: pulchritudinem igitur Hominis, cuius amantissima sunt, fixo intuitu contemplantur; neque facile intuitum declinant, dum licet prospectare *Vincent. natur. lib. 20. c. 55.*

Venenum habere negant, Hominibus benevoli sunt, sed Apibus insidiantur, inde *Virgil. in Georg.*

Absint & picti squalentia terga Lacerti: videlicet a stabulis & alvearibus Apum.

Lacertæ caput tritum & appositum, aculeos & omnia Corpori infixæ extrahit: Varos, formicantes verrucas & peniles, quas *sterochordonas* vocant, clavosque tollit.

Variant Lacerti figura, colore & magnitudine pro variis regionibus.

T 2

Lacertus

Lacertus stellatus.

Lacertus ferrugineas maculas habens, *Gesn.*

An Lacerta Chalcidica, seu Stellio?

Calcis á Virgulis quas in dorso habet ærei coloris.

Ein Gestirnter Edochs/

Gescheckter Edox/

DisperNater. siles. á motu celeri & vago.

Forma & magnitudine Stincum, qvalem hodie Officinæ habent, feré refert. Color ei fuscus, nonnihil ad dilute cæruleum tendens, præsertim ad latera prope Ventrem, qui totus albet. Linea utrinq; per latus Dorfi á Capite ad Caudam porrigitur ex obscuro flavens, & media supina similis ad extremam caudam protrahitur. Quæ omnes per intervalla maculis ferrugineis coloratæ, punctis ceu asteriscis minutis luteolis resplendent, seu radicant.

Nomen habet variis stellatus Corpore guttis,

Inq; brevem formam, ne sit vis magna nocendi,

Contrahitur: parvaq; minor mensura Lacerta est.

Pedes ei sunt qvatuor: Digniti perexiles, antè & retró qvini cum ungviculis fuscis. Lingva bifida est ut Serpenti- bus, Denticuli similes. Petro- sis locis oberrat, cursus celer- rimi.

Rore tantúm vivit, & præ- terea Araneis & Melle.

Hybernus mensibus latet in cavernis.

Senectutem exerit ut Ser- pentes. Morsus eius noxius creditur, & putredinem parti inflictæ adfert.

In vino coctus morsus suos sanat.

Si divulsus admoveatur, ictis á Scorpione levamen- tum præstat,

Caro ejus illita Capillos profluentes renasci facit.

Insessus ex Lacertis in a- qva coctis Infantibus ruptis singulari remedio prodesse fertur.

Lacertus Viridis.

Χλαροσαύρα.

Σαύρα χλαρά,

Lacertus viridis,

Lacertus major,

Ein grüner Edochs/

Grüne Edox/ Jungfreulin/

Pueris.

Pulcerrimus

Pulcerrimus omnium, ejusdem ferè cum priori magnitudinis, aliquando major, colore viridis cum quodam pallore, in ventre candicat. Pedes ei sunt humiles. Plerumque in Rubetis & spinetis solet versari: nec admodum frequens. Vivus captus in facculum inclusus, & super Ictericum ligatus, quousque moriatur Lacertus, contrahit ad se IctERICI colorem, singulari experimento.

Ossa profunt Comitibus nova observatione.

In Vino decoctus (abscisso Capite & pedibus) & potus, prodest emaciatis, phthificis & hecticis.

Oleum ex vivo paratum, Oculos rubentes & lippientes clarificat, & puros reddit.

Lacertus cinereus.

Lacertus vulgaris,

Lacertus minor,

Ein Graue Edox/

Gemeiner Edochs.

Forma prædictis similis, sed minor, & coloris cinerei, Notus est & passim occurrit.

Lacertus palustris minor.

Kleine Wasser Egochs/ Wasser Heyder.

Minor est reliquis omnibus. Coloris super Dorsum fusci seu nigricantis. Venter rubet, Os latiusculum dentibus expers, Cauda angvillæ ad natandum apta.

In paludibus & humidis opacisque locis vitam agit, Venenatus creditur.

Lacertus aquaticus major.

Lacertus palustris.

Salamandra aquatica, Matt. an Scincus Vincentinus?

Ein grosse Wasser Heyder/ Wasser Moleh.

Salamandræ ferè similis est, ejusdem magnitudinis, Capite breviori rotundiore, Cauda latiuscula, nigro undique Dorso, Ventre autem rufescente, maculis resperso luteis, horrido aspectu, æquè ac terrestres.

Apud nos frequenter in fonticulis limpidis Montium visitur, in quibus & hyeme vitam agit.

Inter venenata recensetur, Liqorem enim instar Salamandræ effundit candidum, quamvis sit imbecillius.

T 3

Rana.

Rana.

Βάτραχος ἅ vocis asperiate
παρὰ τὸ βολῶ τραπεζίαν ἔχειεν :
Vel ut Theocritus quasi τῇ βολῇ
τραπεζίᾳ, τὸ γὰρ μέλος ἔκαλον
ἄδ' αἶ.

Ein Frosch.

Animal est quadrupes am-
phibium reptile, Oviparum
coaxans brexansq; cuivis no-
tum. Autor Philomele.

Garrula limosis Rana co-
axat aquis.

Lingva Ranis sui generis.
Pars enim prior, quæ cæteris
absoluta est, iis cohæret eo
modo quo Piscium : intima
verò absoluta ad Guttur ap-
plicatur, quæ suam vocem so-
lent emitte.

Hepar geminum seu bipar-
titum, cuius pars altera ad
dextram, altera quæ minor
est ad sinistram situm tenere
expetit.

Lien exiguus.

Pedes posteriores saltus
gratia longiores sunt priori-
bus. Anteriores manum te-
tradactylon repræsentant.
Posteriorum digiti nectuntur
membranis, ut commodiores

sint ad natandum, licet eis
non utantur terrestres, quam-
diu vivunt in terra.

Cibus Ranarum sunt Apes,
Tipulæ, Muscæ, Ranunculus
Herba, Morsus Ranae, Lenti-
cula palustris, Ros, Limosita-
tes, &c.

Ranarum alie ex semine,
mutuo congressu generantur;
alie sponte ex pulvere nas-
cuntur.

Perennes hyeme in loca
tepidiora se abscondunt : ter-
restres in terræ latibula se oc-
cultant, & subterranea occu-
pant : Aquaticæ ad fontium
scaturigines, lacus, paludes,
piscinas, & alia tepidiora loca
se recondunt, ubi quasi mor-
tue sæviente hyemis frigore
immorantur; tandem acce-
dente vere reviviscunt, & é
latebris suis egrediuntur. Vi-
di aliquando asperrima hye-
me é fontibus limpidissimis
extractas, quæ tepidariis ex-
positæ revixerunt.

Coitum exercent, ut pluri-
mum verno tempore, & no-
cturno magis quam diurno,
(Conspicæ enim sunt in-
terdiu quoque cohærere.) su-
perveniente prioribus pedi-
bus

bus, alas feminæ Mare apprehendente, posterioribus clunes, *Pisanellum* attritum vocat,

Fœtum emittunt feminæ continuo filo sibi cohærentem. Id sperma est, Ovorum conglobatorum specie. Sunt autem globuli quantitate avellanæ albi, sed cum aquositate perspicua. In eorum medio est granum nigrum, tanquam vitellus aut crystallus oculi, ea forma, quæ cernitur semen Cataputiæ minoris. In illo contentum principium animale Raninum provehitur, vegescit, distingvitur membris, & emissis meatibus nutrimentum augescendiq; materiam petit ex circumfluente humore, qui instar pituitæ in sanguinem Ranalem, succumq; alimentosum transit. Sed non statim emergunt omnia membra perfectè. Cum formatum in externis Caput est atq; Oculi in globoso Corpusculo, prorumpit ex membrana sua fœtus, & in aqua ludit, qui fœtus appellatur γύγιος, γέγιος, vel Moluris argumento Caudæ agibilis: aliquando & Βάτταχιε, ob parvitatem, quasi Ranu-

lam dixeris, licet nondum sit Rana actu perfectò. Tunc sub cauda pedes enascuntur posteriores, prodeunt & priores, fitq; Rana secundum speciem suam absoluta.

γύγιος παρὰ τοῦ γύγιου, ab orbe & rotunditate.

Βάτταχιε,

μικρὸς Βάτταχος, Steph.

Raul/

Raulars/

RoßKopff.

Ovidius.

Semina limus habet virides
generantia Ranas,
Et generat truncas pedibus,
mox apta natando

Crura dat.

Gyrinorum cinis sanguinem reprimat enaribus fluentem, si injiciatur

Ova ranina,

Ranarum sperma,

Genitura ranarum,

Seminium Raninum,

FroschEugen/

Froschleich/

Froschgerede.

Quod

Quod sit quasi gelatina plena nigris Oculis intus dentis.

Refrigerat, solidat, Emplastica vim habet, meatus obstruit, infarcit & adducit rupta.

Cum Rosacca permista februm æstibus opponitur. Eodem modo imponitur utiliter Phlegmonis, Igni sacro, adustæ carni, cutiq;. Instar puliculæ cum rad. Urticæ minoris contusæ, ad cruciatus brachiorum & pedum internos imponitur, & resiccatum mutatur. Vulneribus conducit, non sistendo sangvinem duntaxat, sed & integrando connectendoq; divulsa.

*Aqua Spermatis
Ranarum.*

Froschleisch Wasser
Froschgerede Wasser.

Martio seu Aprili mense ex spermate Ranarum per distillationem elicatur: at sal addas necesse est. Refrigerantis est facultatis. Omnes præter naturam tumores calidos, vel absq; tumore super calefactos locos ex eo madentes linteoli impositi miti-

gant, & refrigerant. Articuliis cruciatibus, Inflammationibus & phlegmonibus nobile præsidium. Repellit & sistit omnem sanguinis fluxum, facieiq; ruborem emendat. Sanat etiam manus, quæ rimis & Cutis duritie nimia humorum acrimonia & calore afficiuntur, si subinde laventur, & linteolis ex ipso madefactis humectentur.

Vesicæ ab humorum acrimonia exulceratæ & inflammata egregia medela. Ambustis igni & ferro apprimè conducit, & Vesiculas reprimat.

Rana temporaria.

Βάτραχοι διονεΐδης ὕδατος
novi γεγενηδ' eg.

Ranæ pluviae, pulverigenæ.

Ranæ Rubetiformes minores temporariae, And. Libanii.

Regen-Froschlin/
Regen-Krötslin/
Wetter-Froschlin.

Ranunculæ sunt parvæ, seu Ranæ omnium minimæ, in dorso rava admisto furvo, & quodammodo cæruleo seu ferrugineo, sub ventre luteæ (aliquando pallidæ) mutæ, saltitantes

salitantes repentēsq; spontē
ex putri pulvere & imbre,
conspersis tantū imbre æ-
stivo lictoribus, & itinerum
pulverulentis arenis, proge-
nitæ.

Latent in cæno, & reptant
in viis ac ripis. Post pluvias
apparent aliquando cute as-
pæra, quasi adhuc terræ ad-
hærente.

Vitæ sunt brevis, venena-
tæ & usus nullius. Hyeme pe-
reunt

Sunt & aliæ *Διοπτήες* quæ
ex aëre per tempestatem deji-
ciuntur. Aestate calidissima
ac pulverulenta, si diutius im-
bres cohibeantur, maxima
ejusmodi Ranunculorum vis,
vaporis & exhalationis ope,
ac pulvere sursum sublato,
gignitur, & unā cum imbri-
bus decedit.

Hæc interdum Aërem vi-
tium esse denunciant.

Rana arborea.

*Βάτραχος δένδρεος Ἰησ, An.
Liban.*

*Βάτραχος μικρὸς χλωρὸς,
Galenus.*

Δρυοφοίται, Plin.

μάντις, id est, Vates, Nonn.

*Βυξῆς, quod sono sui ge-
neris pluvias denunciaret.*

Rana parva viridis,
Ranunculus arboreus,

*Ein LaubFrosch / à foliis &
frondibus Arborum,*

Grüne BaumFroschlitz.

Ranula est clamosa be-
xans, in tergo viridis, ventre
alba, arbores saltu petens, in
quibus noctu maximè cla-
mat, & suum *Βυξῆς* vociferat,

Rore vescitur, Muscis, Cu-
licibus, & foliis arborum te-
nellis.

Hyeme in terra conditur.
Verno tempore sæpenum-
ro videtur ex terra eminere
media, media adhuc in ea
latere.

Venenata creditur. Vi
poller calefaciendi, attrahen-
di: nec destituitur narco-
tica & septica facultate, in-
primis adeps.

Si manu viva teneatur, fe-
bres fugare dicitur.

V

Femine

Feminæ ad ardorem febri-
lem restingendum infantu-
lis apponunt.

Affigitur panno quadru-
pes, seu quatuor pedibus assu-
tis, & illigatur jaculo, quod
est species doloris vulgò Ge-
schos, donec moriatur. Si ru-
bescit, signum est subesse ossa
soluta, quæ extrahi oportet.

Pinguedo illita, dentes si-
ne dolore evellit, secreto non
fallente. Ius ejusdem in aqua
& aceto coctæ Vermes Den-
tium tollit.

Cruor harum, pilos avulsos
renasci perhibetur, si in vesti-
gia avulforum instilletur, sec.

Quintum serenum :

Corporibus vulsi saniem per-
fundito Ranæ,

Sed quæ parvasitu est, & rau-
co garrula questu.

Ex his Quidam oleum con-
fici volunt, Podagricis inflam-
mationibus, & Erysipelatibus
commodum.

Rana calamites.

Βάτταχος καλαμίτης,

καλαμίνδιος. Hom.

κέ, εἰς, Nicot.

Calamitis, *Plin.*

Rubeta viridis parva, *Gesn.*

Bufo exilis, *Paral.*

Dephthites, *Perotti.*

Noth-Froschlin/

Similis est arboreæ, viridis,
parva, muta ac sine voce, ve-
nenata, in arundinibus seu
calamis potissimum habitans.

Pascitur rore, aqua, limo,
culicibus, &c.

Si ab improvidis comesta
fuerit, colorem buxum, bi-
lem, singultum, Cardialgi-
am & gonorrhæam affert,
Neander.

A bobus devorata, ventres
distendit, adeo ut interdum
crepent, quasi Buprestis sum-
ta.

Hujus saniem seu ligvo-
rem penicillis derosum, cla-
ritatem Oculis inunctis nar-
rant afferre, ipsa quæ carnes
doloribus Oculorum super-
ponunt.

Humor idem efficacissimum
psilothrum est, si recens illi-
natur, & ipsa arefacta ac tu-

sa mor

sa mox decocta in oleo æreis
vafis.

Sanguinem fiftit appensu
solo, nedum cinere instrato.

Hujus adipem esse septi-
cum & putrefactorium, Iacob.
Holler. 3. Chirurg. cap. 5. atte-
statur.

Rana aquatica.

Βάτραχοι ἔλαια,

Τελματιάοι,

Λιμναίοι,

Πελαγίοι.

Ranæ fluviatiles,
Innoxia,
Edules.

Wasser-Frösche/

Reger. Vulgo.

Ranæ sunt innoxia, blan-
dæ in fluviis, piscinis, seu pa-
ludibus vitam agentes, coa-
xantes, cibo utiles, vulgaræ
notitiæ.

Editur ab eis vox, coax,
qvax, exerto capite, paulo al-
tius ex aqua, qvâm in Ololy-
gine, vel etiam in ripis & la-
cunis absq; aqua ore susce-

pta, sed mero Aere & Pul-
monibus inflatis repetito, &
lingva peculiari guttureq; &
oris hiatu formato: potissi-
mum autem coaxant sub So-
lis occasum, & noctu (qvod
aër tunc tepidior, cessentq;
tumoris causæ, qvarum ab-
sentia audaciam parit) eti-
am interdum aliquando ca-
nunt, quando aer blandius
aspirat. *Philomela autor.*

Garrula limosis Rana co-
axat aquis.

Cum supra modum ac con-
suetudinem clamant, tem-
pestatem ac pluvias prædici-
re, Agricolæ turba fre-
quenter observavit, non
tamen semper sequitur effe-
ctus.

Alia vox est Marium pro-
pria, Ololygo, ὀλολυγὼ, U-
lulatus dicta, qvem Mares in-
tra aquam reddunt, ut allici-
ant ad coitum feminas, &
flagrant tantisper oculi lucer-
næ modo dum vociferantur
Qvar, Qvar, vnde & á non-
nullis Berren. Harum aliæ
interdum narrant mar, mar,
aliæ qvin tantum acutum &
cum tremore karrant.

Hybernis mensibus in fontium scaturiginibus latent, & Piscinis.

Temperamentum Ranarum aquaticarum frigidum in 2do. humidum in 3tio. gradu. Duræ sunt coctionis, Ventriculum gravant, pituitam augment & parvum supeditant alimentum.

Calidis conveniunt Anni temporibus, juvenibus choleris, multo exercitio deditis Phthisicis, Hecticis, tabidis, macilentis & extenuatis, Elephantiacis.

In omni virulenti animalis morfu auxiliantur comestæ.

Dolores Capitis mulcent, Tonsillis & similibus morbis medentur.

Tussim sanare dicuntur, Piscium modo è jure decoctæ in patinis. Præstaret addere Veronicam, Beronicam, Pulmonariam, Capillos Veneris, Tussilaginem &c. & addito Melle redigere in formam Eclegmatis.

Fugiendæ Senibus & pituitosis.

Raró apud nos in cibum recipiuntur, & præstaret prorsus abstinuisse. Cum enim carnes obtineant laxas & humidas, putrefactioni obnoxie sunt.

Eliguntur, quæ in fluviis puris, vel vivariis piscium habitant, non socordes, sed saltando & natando se exercentes, strenueque suum *εργον* præstantes. Æstate duntaxat & ultimo vere in Cibos suppetunt, quamvis Itali quibusdam locis per totum annum edere soleant, ob id vivaria instituuntur, ut bene saginata tum quadragesimæ jejunio in cibum veniant, tum aliàs voluptati inserviant.

Capiuntur reticulis ut Pisces. Ab Aliis, hamis esca instructis, ut vermiculis, Muscis, Apibus, papilionibus; frequentius rubri panis particulis hamo innexis.

Primò detracta Cute exterantur, servatis duntaxat armis, tergo, coxis, ubi musculosa caro est candida, limosus succus dein excoquitur

tur aqua vel vino, Coctæ lavantur, repurganturq; aqua falsa : inde variè apparantur.

Alii farinæ involvunt, & oleo vel butyro in sartagine frigunt. Quidam elixas seu coctas ex jure gallinaceo, admixtis aviculis, aspergunt aromatibus, Piperi, Caryophyllis, Macis, Zingib. Croco, & mensis inferunt.

Rana viva integra alligatur ad Caulonum æstus & pestem : si ventri torminoso imponatur, in eam vitium transire confestim, fertur. Ventres impositi dolores podagricos levant, & ignes sacros restingunt : jubent verò pedibus posterioribus pronas adalligare, ut crebriore anhelitu profint.

Carnes sugillatu delent.

Oleum Ranarum vel simpliciter cum oleo communi, Rosato, vel Sesaminino paratur, vel chymicè additis aliis elicitur.

Vim obtinet refrigeratorem, Morbum articulare levat, duritias emollit, & contracturas seu diuturnos chor-

darum dolores sedat. Destinatur & frigoribus seu rigoribus febrium.

Aqua Ranarum Epilepticis cum suis additamentis præbetur : foris illinitur tumoribus, articulis tumen-
tibus, tabidis membris.

Cinis combustarum Ranarum vel arefactarum, sanguinem in vulneribus cum potum inspersus sistit : cum aceto fluxus Narium & genitalium restringit. Cum pice liquida ad Alopeciam prædicatur. Drach. i. ex vino rubro austero gonorrhæam sistit.

Nostri homines clunium Ranarum beneficio venantur gammaros, sive Cancros fluviatiles, non sine industria & singulari oblectamento. Qua ratione brevi spacio multos & quidem maximos nanciscuntur.

*Rana aquatica
citrina.*

Rana aquatica edulis subcitrina *ῥά ταντος ῥά* Homer. *Ein gelblicher Wassersfrosch.*

Rana est notissima vocalis, aquatica, subcitrina seu sub-
V 3 lutea

lutea in fluviis, lacunis, Piscinis degens esui apta. Tergo flavet, licet non sit plané purus color, nec sine maculis. Emicat obscura flavities, in ventre candicat.

Præ aliis magis ad cibum eligitur.

Rana aquatica viridis.

Βάτραχος χλωρός
πικνιτικός

Rana viridis aquatica edulis.

Rana lacunalis viridis Avic.

Ein grüner WasserFrosch
grasFrosch.

A priori colore differt. Viridis in tergo duntaxat est, ventre alba, innoxia.

Hanc vino suffocatam efficere abstemios bibentes, *Miraldus* autor est.

Feminae hujus patriæ ad febrium æstus mitigandos Pericardio imponunt.

Rana lutaria.

Βάτραχος πλυατιαίος. Arist.
Ein PsalFrosch.

Lutaria, quod in lutosiis pigrisq; & cœnosis plerunq; paludibus vivat, & fœditate luti gaudeat, nomen sortita est.

Formam habet similem fluviatilibus, sed color lividus est, & os mutum.

Quædam hujus generis sunt furvæ, tanquam terreum Corium gestarent, quales veri simile est esse eas, quæ ex luto vel cum luto ex suo fiunt semineo.

A culinis abdicantur.

Rana hortensis.

Rana lucida, Varreni.

Ein Garten Frosch/
GrasFrosch.

Color ei lividus declinans ad flavedinem, vel subcroceum, seu subfuscum. Voce caret, a mensis exulat, & veneni est particeps, quamquam minore gradu.

In hortis & pratis vivit locis umbrosis, & vere cum Bufonibus rem habere scribitur.

Bufo

Bubo terrestris
major.

φρύνος,
φρύνος κωφός
βάτραχος χεισαίος
μύθος ινοπία.

φύσαλος, παρὰ τὸ φύσσει,
vel τῆς φύσεως, quod ex cauda
factus Bubo sese inflat, tu-
mescatq; in morem follis.

Rubeta terrestris major,
Borax, Botrax

Ein Krötte/
Weische/ sil.
Easche/
Botte/
Jerdische Krötte/
Ergkrötte.

Rana est terrestris, omni-
um grandissima, Dorso ven-
triculo seu tuberculis axaspe-
rato, pellis densissima, aspe-
ctu tristi & fædo, muta, ve-
neni plena.

Color ei fuscus, luridus,
fulvus aut rarus, mistus ex
nigro & bilioso flavo.

Vivit repitq; in sicco potius,
& caveas facit in tellure, fi-
mo, stabulis, inq;ve hortorum

pulvinis & inter lapidum
strues.

Vescitur Rore, terræ limo-
sitatibus, lumbricis: herbarum
venena legit, & Apibus infidi-
atur, in quibus captandis uti-
tur solerter virulento halitu.
Salvia inprimis delectatur.

Tardè procedit, non salit
ut cæteræ Ranæ, propter cor-
pusignavum, turgidum atq;
iners, & pedum quoque bre-
vitatē.

Non tantum coit cum sui
generis Rubeta, sed & cum
Rana hortensi, ut inde oria-
tur φρυνόβατραχος.

Hæc non modò veneni
mictu omnia quæ perreptat
loca inficit, sed etiam saliva
sæpius conspuat herbas na-
scentes & Animalia. Unde
non mirum, si nonnunquam
repentè intereant Homines,
qui fraga, fungos, aliasq;
plantas harum veneno in-
fectas inscii devorave-
runt.

Inflat se cum stimuletur,
cunctabundus & Oculis rube-
factis truculentum prospicit,
dein

dein non lotium duntaxat ejaculatur virulentum, sed etiam maleolentem halitum, succumq; album: Nonnunquam etiam affilit, Oris labiis regidioribus morsum impressurus. Nec facile occiditur, Nam & confixus per medium aliquot dies in palo vivit, venenumq; cruentum aqua citrina dilutum stillat.

Nostrates dicunt Venenum mingere bestichen improprie, cum vesica & urina careant.

Bufonis inimicus est Vipera, Felis, Putorius, Araneus.

Bufo aëre suspensus & arefactus pestilentibus imponitur Bubonibus, papulis & apostematis, omne virus exuens.

Pulvis singulari Naturæ dote, saltem Collo appensus, dicitur sangvinem sistere.

Integer Umbilico alligatus fluxus hystericos, qui nullis remediis inhiberi possunt, retrahit & inhibet.

Pulvis cum Arsenico, Smaragda, hyacintho, bolo armeno, Succino, Tragacantho, in tabellas reducitur, & serico obducto Collo suspendi-

tur, laudatum pestilenti constitutione prophylacticum.

Arefactus plantis Pedum appositus, Capitis, Cordis morbis, Phrenitidi & febribus succurrere dicitur.

Oleum Bufonum ad Anasarcam facit, si eo perungatur venter deorsum trahendo manus: deponit enim ventositatem ad Crura, ubi dissipatur.

Rubeta oleo incocta ad tertias, donec extabescat & in oleum convertatur, corium & ossa nudentur, & percolata in unguentum redigatur, frequenti inunctione Colli strumas certo delet auxilio,

Venenum Bufonis.

Inter primi ordinis venena numeratur. *Signa sunt.*

Tumor, Pallor ad buxum inclinans, $\alpha\chi\rho\acute{o}\tau\eta\varsigma$ seu luridus color totius Corporis.

Anhelatio seu respiratio densa confertaq;.

Oris halitus gravis, Aëstus Membrorum.

Vertigo repentina, Syncope.

Convulsiones interruptæ.
Labra,

Labra, Lingvaq; nigricans
& balbutiens : obtutus tor-
vus : Vomitus effrenis : su-
dor frigidus, tandem Mors.
Aliquando inventa genituræ
profusco, Singultus, Caligo
Oculorum, Dysenteria, Fa-
stidium, Delirium, Dentium
casus, Stupor totius cum alto
& profundo somnolenta
Tabes.

Auxilia.

Vomitus ex Hydrolæo.
Theriaca, Bolus Armena,
Cornu Cervinum, Uni-
cornu.

Mithridatium, Terra sigil-
lata Strig.

Coagulum Leporis, Lac hu-
manum.

Damafonium, Arthemisia,
Betonica, Scorzonera, Cype-
rus.

Rhabarbarum, Bezoar
Persicus.

DiaCurcuma, DiaLacca.

Pulv. Bezoarticus aureus.

Aq. Theriacalis, Balsamus
Indicus,

Spiritus Chaleanthi.

Oleum Hyperici, Citrii,
Arantiarum.

Turbith minerale, Stibii
infusum.

Cutis abluatur lixivio, mu-

ria, vino salso, urina propria,
lacte muliebri.

Bufo arefactus carpis, axil-
lis, præcordiis admoveatur,

Xenochdon *Theoph.*

Bufonites, Ophites.

Hydrargyrum.

Maris de Arthemisia.

Radix illius collo suspensa,
Rubetis

Dicitur & cunctis nocuis
obstistere Ranis.

Bufonites.

Bufonia gemma, Bufo-
nius lapis,

Myoxus, *Cardani.*

Chelonites.

Crapaudina, *Gallk.*

Borax,

Ein Krötenstein.

Gemma est lapideæ duri-
tiæ & consistentiæ, bullæ in-
star, in aversa parte cava, in
dextra protuberante conve-
xitate, instar speculi convexi,
Coloris ex fusco pallentis,
quæ expolita splendet, contra
venena magnæ æstimationis.
Hæc colore aliquando fusca
est: interdum in medio ha-
bet Oculum cæruleum: non-
nunquam nigra, aliquando
alba, & liventibus maculis in

X

vertice

vertice insignitur: interdum viridis; nonnunquam versicolor, rarius in ea forma Rubetæ apparet sparsis pedibus.

Sitne os an lapis, magno studio inter doctos controvertitur.

Gemmarii & Plebei Bufonis Capiti innasci arbitrantur,

Gestatus, antiquos Renum dolores tollit, & lapidis prohibet generationem, ventriculo, febribus, venenatis ictibus confert.

Omne virus elicit consumitq;. Crebro attritu contactuq; tumores & inflationes a venenatis bestiis illatas discutit.

In annulis passim a magnatibus portatur & appenditur, quod veneno praesente colorem suum mutet, & quasi sudoris guttas emittat, & a veneno pestifero tutos reddat.

Rubeta minor.

ωυίφλω

Rubeta minor flammea
Andr. Liban.

Rana fossilis Agric.

Ein Jeverströte ex ignis

colore qui illi affidet.

Minor est Bufone, furva tergo, ventre pallido seu citrino, maculis punctisq; rubris variato, muta & venenata in vepribus frequens.

Nascitur in terra, aliquando in solidis lapidibus.

Vis ei maligna & discussoria.

Ad Cynanchen & alia apostemata sangvinolenta fori Emplastico praedicatur.

Ad strumas Libavius hanc praefert. Pulvis praeclarus in sanguine sistendo, Papulis & Bubonibus pestilentibus, Cancro, Lepra & similibus, modo perite adhibeatur.

In aqua decocta & potu data, suum morbis medetur.

Rubetarum hostis est Buteo triorchis. Rapit namque eas & excedit.

Bufo palustris major.

φρύνες ἑλαιο.

φρύνες ἑλαιο.

ἑλαιοῦ ἑλαιο.

Rubeta Lacunarum

Rubeta palustris venenata.

Bufo aquatilis venenata.

Ein

Ein Psulkrötte/
Wasserkrötte/
Psulfrösch/
Pumpfrösch.

Rubetæ terrestri similis.
Coloris in Dorso fusci, ven-
tre pallido, impuris canosisq;
lacunis paludibusq; vitam a-
gens.

Vox hujus qverula quasi
uncans, acuta, profunda.

Buso palustris miniatus.

Rubeta palustris minor.
Ein Feuerkrötte/
Guldinkrötte.

Similis est ferè Rubetæ mi-
nori. Dorsum ei fuscum,
venter albicat, maculis undi-
qua; Minii colore varius,

Passim in paludibus & a-
quosis scrobibus extra oppi-
da vitam agit.

Salamandra.

Σαλαμάνδρα Diosc.
μολχῆ quia tardè greditur
ob Crura brevía.

Lacertus melanoxanthus
Ein Molch/
Moll/
Bunder Molch/
Moldwurm
Dlm.

Animal quadrupes, ex La-
certorum genere, aspectu fœ-
dum & horrendum, Capite
magno, ventre crassiusculo,
Cauda brevior. Color illi
niger, luteis non minimis in-
fectus maculis, quadam læ-
vitate pellucidus.

Habitat in montium Con-
vallibus, locis valde frigidis
& humidis. Delectatur fon-
ticulis limpidissimis. Æstate,
Vere & Autumno apparet,
maximè pluvioso tempore.
Hyeme in cavernis & saxo-
rum commissuris latet.

Irritata saniem evomit la-
cteam.

Nihil gignere, neq; esse in
iis masculinum femineumq;
sicuti in Angvillis, Multi opi-
nantur.

Huic tantus rigor, ut ignem
illæsus, pertransire possit,
ignemq; tactum, ut ajunt, re-
stingere, non aliter ac glaci-
es. Certum quidem, observa-
tione constat, Salamandram
summa frigiditate, Carbo-
nes ardentissimos & flam-
mam, ad certum usq; termi-
num reprimere, at uri tan-
dem si longiori spacio sit ad-
mota: Cum nihil sit, quod
ignibus non uratur & pereat.

X 2

Salamandra

Salamandra in olla cuprea usta, & in cinerem redacta, cum micis panis iis datur, qui Dracontis vexantur.

Vis ei tribuitur calefaciendi, erodendi, exulcerandi. Additur medicamenti exedentibus & Lepras abolentibus. Liqvescenda in oleo pilos avellit.

Non modò Hominis demorfos immisso veneno interficit; sed etiam fructus herbasq; quas perreptarit, & fontes sanie seu saliva lactea, humoreq; mucoso, quem ore evomit, inficit, magno sæpè eorum, qui imprudentes herbas illas esitarint, aut aquam biberint, sanitatis & vitæ incommodo.

Antidota eius sunt.

Cupressi folia, Urticæ semen, Terebinthina.

Theriaca, Mithridatis antidotum ex vino pota. Theriaca Diatesaron.

Rosina pinea in elegmate.

Galbanum ex Melle deglutitum.

Nuclei piri ex Ajugæ decocto poti.

Testudo terrestris cocta & devorata.

Ranarum jus in quo Eryn-

gi radices decoctæ, potum.

Testudo.

χελώνη λιμναία

Testudo

lutaria palustris

lacustris.

Rubeta, testa scuti aut orbis effigie testæ.

Ein Schild Kröte /

Teller Kröte.

Animal est ἀμφίβοτον quadrupes Oviparum & sanguine præditum, tardo gradum, à testa qua tegitur nomen habens.

Scutum duplex nigrum osseum, superius convexum ex tredecim tabulis cum ora exteriori; inferius latum ex decem constructum videtur, quod ex utroq; latere tunica duriuscula veluti coagmentatur.

Inter scutum utrumq; exeunt pedes quatuor, bini anteriores, totidem posteriores, hi quatuor, illi quinque unguibus aduncis nigris armati, quos cum Capite & Cauda pro libitu modò exercere modò subducere potest.

Corium seu Cutis scabra, rugosa, nigra, quæ Collo intra scutum retracto Caput ad modum galeæ contegit.

In

In Cruribus, squamulis ex nigro splendentibus, veluti lorica apparet, punctis luteolis repleta. Caput exiguum rostro acuminato. Dentes nulli sed Rostri margines acuti, superiore parte inferiorem claudente pixidum modo, ad cibos dividendos. Mandibulam inferiorem ornant virgulæ oblongæ quævinæ, fenæ luteæ: in superiori foramina duo Nares repræsentant.

Oculorum pupillas splendentes nigras ambit Circulus ex fusco purpurascens, binis, aliquando ternis punctulis flavescentibus maculatus.

Lingva imperfecta, non libera, sed palato inferiori adnata Paululum protuberat.

Pulmones maximi bini, levissimi, fungosi, translucidi, fibrosis fistulis distincti, veluti vitra Venetiana, quæ apparent ac si essent gelu congelata gefrorne glâser.

Venter simplex longiusculus.

Cor latiusculum obtusum.

Jecur flavet binis lobis, in cujus dextro fel hæret cœruleum.

Lien perexiguus sanguinei coloris.

Renibus & Vesica caret.

Cauda sesquipedalium longa, teres, sensim in acutum definit.

Abruptum & perexiguum sibilum edit.

Pamphaga est, Carnem edit & herbam.

Coëunt ut ζωτόκα, Mare superveniente sine ullo negotio. Ova pariunt durioris testæ, & veluti Avium bicolora, quæ effossa scobe in terram reponunt, eaquæ obruunt.

ἡ μὲν χελώνη τικτεῖ ἀσκλη-
ροδέρμα καὶ δ' ἰχθύων, ὥσπερ
τὰ τῶν θηρίων.

Testudines habet Bartha patriæ nostræ fluvius, ex quo sæpè retibus à Piscatoribus extrahuntur.

Oblectantur lutosis, Pariunt educantquæ in sicco, prorsus tamen ab aquæ natura disclusæ vivere nequeunt: in humore etiam intereunt, nisi quandoquæ respirent.

Duram obtinent carnem. Tabescentibus remedio esse traduntur & Hydropicis. A cibis abdicantur hodie.

Sanguis exiccatus cum vino, veneno Viperarum & Rubetæ adversatur: Contra Epi-

X 3

lepsiæ,

Iepham convenienter bibitur.
Reddit abstemios.

Et visus obscuritatem au-
fert, oculos claros & puros
reddit. Anginis, & in ore In-
fantium nomis prodest. Na-
ribus inditum Comitiales eri-
git. Axungia flavet instar
Piscium fluida.

Per biennium sæpè durat,
in cadis culmariis, in quibus
jurulenta pro porcis asservan-
tur, ea perſuſione, Porcos
inde melius proficere & pin-
gvescere.

Vipera.

Εχίς, mas
Εχίς, femina
Δήσιον.

Vipera quòd vi pereat au-
pariat. Hinc Nicander ἡνίκα
δορυμένου ἔχιοις δολεῶν κινώ-
δοντι δουρίε δόδ' ἔμψα,
κάτω ἀπὲρ ἐμῶν: id est
Turgida dum secum coeunti
mordicus hæret,

Et dente impuro rescindit
colla mariti:

Aut pœnas repetunt nati pro
cæde paterna.

Vel potius quòd sola ex o-
mni Serpentium genere vi-
vos pariat, Ovis intus con-
ceptis & exclusis,

Εἰς Matter/

Hec Matter/ id est, vipera
dumetarum

Matter/

Εχίς Catuli Vipera.

Serpens est squamosus, co-
lore subflavo, pluribus orna-
ta maculis rotundis, longitu-
dine cubitali, aut trium do-
drantum.

Valdè differens est Mas à
femina. Nam femina habet
Caput latius quàm mas, Ocu-
los subruſos, Collum angu-
ſtius, Cervicem minus ela-
tam, dentes quatuor, Corpus
crassius sed brevius, Cau-
dam magis extensam excar-
nemq; & squamis duriusculis
asperam universim acerva-
tim. Incessus quietus & tardior.

Mari verò caput est angu-
ſtius, Collum crassius, Cervix
magis elevata, Dentes soli
duo canini, & vulnera ex pla-
ga bina. Corpus & longius
& tenuius, & velociter ince-
dit.

Oculi, cùm irritatur, rubi-
cundi, Cauda paulatim graci-
lescit, aliorum more Serpen-
tium. Color idem qui fe-
minæ,

Vescitur herbis & animal-
culis.

Hyeme sub saxis latet.

Sola

Sola vivum fœtum edit,
Ova primùm intra se & in
ventre ex ovis vivum fœtum
parit, quem deinde excludit,
Veteres sibi persvaserunt, Ca-
tulos matrem exeundo lace-
rare, & trucidare, alvum ejus
erodentes.

Qvòd vanum esse, Experi-
entia rerum magistra aliud
docuit. Visæ enim sunt u-
triusq; sexus Viperæ lagenis
vitreis inclusæ parvus eniti,
utroq; parente superstite.

Carnes viperinæ calidæ &
siccæ temperaturæ evidentè
existunt, qvæ totum Corpus
per Cutem expurgant.

Adeps caliginem Oculo-
rum tollit, suffusione ambu-
stis medetur.

Vipera Lepræ antidotum
præfens & amuletum: qvòd
casu compertum fuisse tradit
Athenæus, cùm Vipera, dor-
mientibus non procul ab ejus
antro Leprosis, in vini lase-
nam odore illecta irreplis-
set, atq; illic mortua Lepro-
sis ex eadem lagena bibentib-
us, salutem insperatam re-
stituisse.

Vipera domestica.

Ein HausNater/
Ex cæruleo splendet.

Domos habitatas subit, &
pluribus annis in iisdem com-
moratur, nulli noxia.

Vipera nigra.

Ein schwaralichte Nater/
schwarze Schlange.

Sesqvi cubitum longa, fuf-
ca, maculis albicantibus re-
spersa.

Admodum venenata, &
morsus ejus exitialis, nisi ma-
turè antidotis obtundatur,

Vipera purpurea.

Eine braune Nater/
In montibus & sylvis ali-
quando visitur.

Vipera cinerea.

Eine graue Nater.

Vipera candida.

Eine weisse Nater/
HaselNater.

De Vipera argentei cando-
ris sub Corylo visciifera reper-
ta, multi plurima nugantur,
superstitionis plena. Thesau-
ros enim seu Metalla in terræ
visceribus latentia perspicere
eos posse, si eam secum tule-
rint, frustra sibi persvadent.

Vipera

Vipera senecta.

ῥῖπας ὄφης
 Spolium Serpentis.
 Exuvium Viperae
 Waterbalck/
 Schlangenhaut.

Vipera est exterior similis membranae Cutis, quam primo vere, lapidum vel fruticum angustis exuit. Veluti operculum inest Cuti. Cum exuere incipit, ab oculis primum detrahit, ita ut obocari videatur iis, qui rem non intelligunt; tum Caput exuitur. Glabrum enim hoc omnium ante, quam reliquum Corpus, apparet; atque una fere nocte ac die Senecta tota exuitur, a Capite orsa ad Caudam, ejusque quod exuitur, quod externum erat, fit internum.

Invenitur in campestribus inter saxa & stirpes.

In vino decocta utiliter infunditur Aurium doloribus, Impetigines extrahit. Aceto vero collutione Dentium dolori medetur. Cum aqua marina sugillata delet.

Cinis assidue inspersus Alopecias explet celerrime.

Ad Canis rabidi morsum cum Cancro masculo trita il-

linitur.

Ad alligata lumbis, faciliores partus facit, at protinus a Puerperio removenda.

Per se reposita in arcis armariisque tineas necat.

Venenum in nostra Vipera tam vehemens non est, ac in calidioribus regionibus, nec tam cito interficit: quamvis non careat pernicie, ut istos saepe in vitae periculum adigat.

Tumor in parte vulnerata subrubens: lividus, tuberosus, Corpus intumescit univsum,

Horror & refrigeratio, Mentis stupor, Capitis gravitas. Anhelitus difficultas, Syncope, tandem Mors.

Curatio in extractione veneni, partis percussae obligatione, & Cordis praemunitio-
ne consistit.

Pastilli viperini,
 Theriaca Andromachi,
 Ol. Viperinum,
 Allium, Ruta,
 Echium, Fraxinus.

Vini meraci larga copia pota.
 Saliva hominis jejuni.
 Pulv. bezoart. aureus
 Sigillata Strigenfis.



LIBER



LIBER QVARTUS Aviarius Silesiæ.

DE AVIBUS IN GENERE

Avis.

Ὀρνίς, ὄρνις, ὄρνις,

Avis, quod avia, hoc est, incerta itinera in aëre sectetur, vel ab adventu, quod inde veniat, unde quis minimè suspicetur.

Ales, ab alarum magnitudine.

Volucris, à volando,

Ἐἷν Βογελ/

Ὀρνίθιον, ὄρνιθιον,

Avicula,

Ἐἷν Βογελίν/

Ὀρνιθοπαίς,

Pullus aut **Pipio** avis.

Pullus est generale nomen omnium Alitum: & **Quadrupedum** etiam quorundam fœtus **Pulli** dicuntur, ut **Equi**, **Asini**, sed præcipuè **Avium**.

Avis animal est volatile,

pennis decoratum, binis incedens pedibus, ὠτόκοπος, agile & leve, substantiæ calidæ & siccæ, gradatim aut saltatim ambulans.

Cibum **Aves** petunt, *quædam* ab **Aere**, ut **Avis Paradysi**, **Hirundines**.

Quædam ab **Aqua**, *eaquæ*, *vel* fluviatili, *vel* lacustri, *vel* marina, ut **Ardeolæ**, **Anates**, **Fulicæ**, **Mergi**, **Alcedines**.

Quædam à **Terra** dum fruntur, *vel* arena, *vel* lapillis, ut gallinarum genus, olores: *vel* seminibus, frugibus aut fructibus, ut **Passeres**, **Carducles**, **Phasiani**, *vel* herbis, seu gramine, ut **Anseres**, **Anates**.

aut **Vermiculis**, ut **Rubeculæ**, **Motacillæ**; **Pici**.

Aut **Ranis** & **Serpentibus**, ut **Ciconiæ**, *aut* carnibus Animalium, ut **Aquilæ**, **Noctuæ**, **Milvi**, **Accipitres**, **Corvi**.

Y

Avibus

Avibus profunt squalores, tum ad ceteram sanitatem, tum etiam ad partum: incommodi autem anni pluvii.

Caro Avium minus nutrit quam Quadrupedum, sed facilius concoquitur.

Avium partes communes cum aliis Animalibus.

Caput magnum, parvum, longum, rotundum.

Vertex cristatus, sine crista.

Collum longum, breve, crassum, gracile, pronum, supinum.

Mentum barbatum, sine barba.

Cervix der Hals.

Pectus integrum & sibi continuum, carinatumq; & acutum atq; carnosum die Brust.

Venter Pectori subjacet, ad ostium usq; excrementi & suffraginem Crurum.

Dorsum.

Clunis femori similis, longior ventre medio tenuis porrectus.

Umbilicus Avibus adultis jam delitescit, incertusq; est. Intestini enim coalitu consistit, nec Venarum pars

ulla est, ut in Viviparo genere.

Pedes bini, Crura, ut in Homine bina, sed intro flexentia, Jusse / Schenckel / Gestelle.

Digiti terni pluribus: quaterni aliis: Terni in priori parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro Calce. Bini utrinq; paucis, ut Iynghi, Cuculo, Certhio, Hirundini muraria.

Lingva: brevis Ciconia; Alyconi.

brevissima Corvo lacustri, Pelicano.

longissima Picis.

angusta Numenio.

tenuis Passeri Troglodytidi, Perdici rustica.

acuta Iynghi, Picorum generi.

lata Psittaco, Sturno.

bifida Oriolo.

Ossea seu stota Certhio

Cornea lapice anteriore, ut Picis, Iynghi.

Oculi omnibus sicuti ceteris Animalibus bini, sine superciliis, graviores. Palpebra inferiore connivent.

Pupilla nigra ut plurimum.

Iris colore variat: Crocea Accipitri, Noctua: intense flava Niso: rubea Coturnici: Cinnabarii colore, Bombycilla.

bycillæ : nigra Caprimulgo:
plumbea Pavoni femina. &c.

Auriculis & Naribus
carent, meatusq; odorandi
in Rostro continent. (For-
amina enim bina ante os ha-
bent, sed non ita explanata, ut
Nares appellari possint) au-
diendi in Capite.

Pulmo exiguus, parum
habens sanguinis, fungosus,
Membranaq; similis, & aptus
ampliari & extumescere cum
inflatur. Deest Epiglottis.
Arteriam enim contrahunt,
atq; ita claudunt, sicut Qua-
drupeda Ovipara.

Gula angusta Spernologis.
amplissima Corvo lacu-
stri & rapacibus.

Ventriculus :

tenuior Rapacibus, Car-

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| Fel | { | jungitur | nullum habent Glareola & Pluvialis. |
| | | | Ventri ut in Curvo |
| | | | Intestino ut { Columbo |
| | | | Passeri, Calamodyti. |
| | | | Coturnici. |
| | | | Iecori, ut Oriolo, Numenio. |
| | | | Iecori & ventri, ut Capricipiti, Corvo lacustri. |
| | | | Iecori & intestino, ut Accipitri, Milvo. |

Renes neq; Vesicam
obtinent, quia raro potu utun-
tur, siccioribus vescuntur ali-
mentis: unde si quid ferofi est
humoris, facile per cutem di-

nivoris, ut Aquila, Accipitri.

carnosus plurima parte,
callosus Gallinis, Anseribus,
Olori, Turdis.

amplior, Ulula, Ardea
stellari.

longior Ingluviei simi-
lis, Tinnunculo.

Hepar, Jecur simile Vi-
viparorum. Puro enim &
sanguineo colore exhilara-
tur. In nonnullis flavet, ut
Alcedini.

Cor magnum, parvum,
acutum, obtusum,
trifidum τριεὶς ὅλων in tres
velut cuspidis divisum Co-
turnici.

Lien exiguus adeo, ut
propemodum sensum effugi-
at, ut in Columbibus, Milvo, Ac-
cipitre, Noctua.

geritur, vel per plumas abir.
Renum vice carunculas quas-
dam latiusculas habent, Re-
num speciem ostendentes.

Y 2

Intestinum

Intestinum *vel simplex* renue, ut parti plurimæ Avium: *vel* appendicibus paucis infra quâ definit Intestinum, donatum, ut Olori, Anseri, Gallinis, Corvo lacustri.

Testes omnibus intus lumbis adhærent.

Semen album, ut cæterorum Animalium.

Vulva juxta septum annexa est. Cervicem habet carnosam callosamq; parte inferiore: at supernè quâ septo jungitur, membrana constat, & prætenus adeo est, ut Ova extra Vulvam esse existimes. *der Eierdarm vulgò.*

Partes propriæ Avium.

Rostrum ῥάμφος, ῥύγχος, os Avium proprium, *Der Schnabel.* Osseum est, ut commodè & cibum capiant, & ad pugnam armentur. Non enim labra nec dentes habent.

Aduncum hamatum in Aquila, Accipitre, Milvo, Psittaco, Lanio & aliis rapacibus.

Rectum Corvo, Ciconia, Ardea Stellari.

Acutum Pico, Cardueli, Linaria.

Latum Pelicano, Anseri, Anati,

Longum Ciconia, Perdici rustica, Ardea.

Arcuatum Numenio.

Serratum Anati longirostræ,

Curvum Crucifera.

Cornei coloris,
cæruleum,
fuscum,
rubrum,
flavum,
album,
nigrum.

Peculiare Corvo lacustri.

Oris rictus, frenum *der Kache.*

amplissimus Corvo lacustri, Cuculo, Caprimulgo.
angustus spermologis.

Crista in capite ῥόφος *der Kamb.*

plumacea, Quam quædam pennarum eminentia exstructam gerunt, ut Upupa, Vanellus, Ardea cærulea, nigra,

gra, Columbæ & gallinæ
nonnullæ, Ein straus / koppe.

peculiaris, ut pote quæ
nec caro, nec a natura Carnis
aliena omnino, ut Gallina-
ceo. Nanctamb. vertex, cri-
sta Galli.

Palea καλατορ Palearia
πώγων Arist. quod de Mento
Gallorum rubens velut barba
dependet, das rotte Lâpflin am
Nanenhalse.

Pennæ, πτερά, πτεῖλα, vo-
gel federn. Non enim squa-
ma, non cortice, sed pennis
Aves integuntur, Proprie di-
cuntur majores & duriores,
quales sunt ex quibus alæ &
cauda constant: generaliter
hic accipitur, ut omnes plu-
mas comprehendat.

Differunt forma, ma-
gnitudine, situ, colore, nu-
mero.

Pennula πτερίς ein Fe-
derlin.

Caulis, Calamus, fistu-
la, scapus calami, Federkengel
oder fchle.

Medulla, die Seele.

Dorsum, est Linea seu
Nervus Pennæ / der grad an
der Feder.

Pluma, Latera Pennæ,
das wolleschte an der Feder,

Oræ seu margines Pen-
næ.

Apex Pennæ, die euser-
ste spize an der Feder.

Pennæ fissæ, infissæ, cau-
lem habent, excaules sunt.

Pennæ vestitricæ, κα-
λυπτήρες sunt minores, quæ
prætexunt Aves die deck Fe-
dern.

Remiges, Rectrices
ἀκύνητες, majores pennæ
quas expandunt dum volant.
ἐλατύνες τῶν πτεγῶν, Schwing-
Federn / in quibus ad pernici-
tatem volandi præcipua vis.
Hæ differunt magnitudine,
longitudine, latitudine, for-
ma, colore.

Plumulæ, πτεῖλα, Plumæ
molliores, Lanugo plumosa,
χνόος, pennæ minores, molli-
ores Corpori proximæ, Die
gauchfedern / die Wulffedern /
Pflaumsfedern.

Ala πτέρυξ πτερόν Flügel
Fâtrich quæ Aves volant.
interior

exterior: superior
media
inferior.

Y 3

ὀξυπύγιον,

ὄρροπύγιον, ὄρροπύγιον,
κόκκυξ ἢ σπονδυλίον, Poll. ὄρ-
ρογ, Gal. id est, τοῦ ἱεροῦ ὄρροῦ το
πέρας, propriè Volucrum, ul-
tima pars spinæ, ubi sphondy-
li desinunt, seu Cauda pennis
condita, Der Dursel. Avi-
bus ad dirigendos volatus af-
figitur.

Hordeolum, Κεῖδῃ, Α-
λαπταρία Hordeum, Der
Steuß/pars extrema Uropy-
gii, pustulæ instar eminens, &
acuminata; sic dicta quod hu-
morem album & pingvem
contineat. Hac parte inflam-
mata vel tumefcente, morbo
acuto pereunt Aves, nisi ma-
ture exprimat, & sale con-
fricetur, die Darre/ vulgò.

Cauda: ἢ ὄρρα der Schwanz.
breves Longipedum, ut Ci-
conia, Ardea, item Halcio-
nis fluviatilis.

Planipedum, ut Anserum,
Olorum.

major iis quæ ē contrario
constant, vel contractis ad
ventrem pedibus volant.
ut

recta,
longissima Pavonibus, Pha-
sianis recurva, Gallo Betula-
rum, Anati masculo,

nulla Mergis.
rigida Picis, Corvo la-
custris.

Pennæ inferiores firmantes
Caudam veram, Schwem
federn unterm Schwanz, dar-
auff der Schwanz ruhet/ ve-
luti in pavone masculo.

Calcar πάλκτρον, Der
Sporn/ in Gallis.

Ungvis ὄνυξ, Klatve/
Nagel.

Ungves hamati Haliaeto
adunci Aquila, Accipitri,
Noctua.

rectiores Anati sylv. Mergo.
acuti Hirundini muraria.

lati Mergo s. Urinatrici.

Ungvium mucrones,
ὄρελοι ἐνύχωρ.

Ovum ὄον, Ein Ey, qua-
si ὄον, id est solitarium, quia
singula pariant.

Ovi luteum, τὸ χλωρόν
τοῦ ωοῦ. Hipp. Vitellus Ovi,
Plin. λέκυθος, χυμὸς τοῦ ωοῦ.

Cherdoster. Interior Ovi
liqvor, qui lutei coloris est.
ὦδ τοῦ πυρρῶν, Suid. ὠκρόν.
Aristot.

Ovi

Ovi vitellum á vita, qvód ex eo vivat pullus. Alitur enim pullus intra Ovum vitello, succo ejus attracto, ut infans in lucem editus lacte Mamillæ.

Ovi albumen λευκόν του ὄβου Arist. λευκωμα, Ovi albor, Ovi candidum Celsi. Candidus Ovi succus, Qvód rupto jam Ovo apparet.

Eyerklar/das weisse im Ey/Cyweis.

Ovi testa Sereno. ὀστράκον Arist. κέλυφος, λέπτος, τὸ λεπύρον του ὄβου, λεπύριον Hippoc.

Putamen Plin. Cortex Ovi Eyschale.

Ovi umbilicus, ὀμφαλός Arist. qvasi umbilicaris appendix,

Ovum geminum ὀδύμῳ Aristot. qvód binis constat vitellis. Ey mit zweyen Dottern.

Ova : candida Gallinarum, Perdicum, Hirundinum.

pallida palustrum punctis distincta Phasianorum, Coturnicum, Gallinarum Indicarum.

rubra Tinnunculi Mi-

nii modo.

viridia Graculorum, Picarum.

Ova urina, ὠὰ ὑρίνα, κυνόσουρα, Canicularia Ova, Ova generationi inepta, Ova incubatione derelicta. faule/ stinckende/brüttige Eyer.

Ova subventanea, ὑποβλαῖμα Arist. Αυτόματα, Αὐμαῖα, ὑεφύγια qvasi vento concepta, ē qvibus nihil gigni potest, Ear/Lauter/Wind Eyer. Sterilia sunt & minora, ac minus jucundi saporis, & magis humida, qvám ea qvæ fecunda gignuntur.

Pariunt id genus plures Aves, & maximē qvæ non volaces sunt & adunca, sed multiparæ, ut gallinæ, perdices, columbæ, pavones, anseres.

Ingluvies πτερόλογος, πτερογορεῶν, Vesicula Gutturis der Kropff. Cutis est in amplum sinuata, Ventriculo præposita, qvâ Cibus ingestus primum continetur incoctus. Qvâ parte gulæ jungitur, angustior est, mox amplior, tum qvâ definit in ventriculum, arctior est, ut Gallinis, Columbibus, Perdicibus, Aquilæ.

Aliis

Aliis Ingluvies deest, sed
ejus vice gula latior & paten-
tior, ut Corvo lacustri & ter-
restri.

Vel tota, Passerculis, quo-
rum Ventriculus longior est.

Vel quâ propius Ventricu-
lum aditus est, ut Milvo.

Hinc Aves quædam sinum
unum habent, quo mergun-
tur recentia ut guttur: alte-
rum in quem ex eo demittunt
coctione maturata, ut Galli-
næ, Columbæ.

Coitus Avium.

Coëunt Aves: vel femina
confidente humi, Mare super-
veniente, ut Gallinarû genus.

Vel femina stante, ut Grues.

Osculo præmisso, ut Co-
lumbæ, Corvi.

Tempus, plurimis Vernum
ac ineunte æstate: circa bru-
mam Alcyonibus: circa Na-
tivitatis festum, Crucifera.

Semel, magna ex parte,
Anseres, Pavones, Cygni,
Ciconiæ.

Bis, Hirundines, Sturni,
Merulæ, Turtures.

Ter, Passeres, Alaudæ.

Sæpius, Columbæ, Gallinæ.

Partus, *Parcus* Vncun-
gibus, quibus vngves adun-
ci, Aquilæ, Accipitri.

fœcundior, crebrior, Colûbis.
numerosior, Gallinis, Pari-
cibus.

Sine nidis pariunt, quæ
graviores sunt & minus vo-
lant, ut Perdices, Coturnices,
sed condenso frutice prolem
muniunt.

In nidis, juxta paludes, &
locis herbidis, Anates sylve-
stres, Olores, Lari fluviatiles.

Arboribus cavis, Stur-
ni, Upupæ, Columbæ sylve-
stres.

Super ramis Arborû,
Ardeæ, Cornices, Picæ, Tur-
tures.

In terræ cavernis,
Hirundines ripariæ.

In tectis ædium,
Passeres, Hirundines.

Concipit femina, cum
coiverit, Ovum superius ad
Septum transversum, quod
primò minutum & candidum;
mox rubrum cruentumq; de-
inde increfcescens luteum & fla-
vum efficitur totum; jam am-
plius auctum discernitur, ut
intus pars lutea sit, foris can-
dida ambiat: ubi perfectû est,
absolvitur à Corpore, & exit
putamine dum paritur molli,
sed protinus durefcente, nisi
vitio vulvæ defecerit.

Generatio

Generatio omnibus ex ovo evenit. Fit enim ut incubante & concoquente Ave, animal ex parte Ovi secernatur ex albumine scilicet, au-geatur verò ex reliqua parte & perficiatur, nempe vitello. Origo namq; in albumine est, Cibus per umbilicum ex luteo petitur: At non pari temporis spacio evenit omnibus, sed pro magnitudine generantium interest.

Feminae ut plurimum incubant solæ, & quidem pertinacissime magna tædia tolerantes. Quædam partita tempora cum Maribus habent, & fovendi & nutriendi fœtus, ut Columbæ. Sturni.

Avium differentia:

I. Aves: vel sunt Domesticæ seu Cicures, Hævel

Cohortales colū. Cortales Οἰκίαι καὶ τοῖς οἰκίαις, quibus intra cortem seu aulam, seu ædes inclusis minus libera evagandi potestas, *Einheimische Vogel/im Hause erzogene Vogel* ut Gallinæ, Anseres, Anates, Columbæ.

Altiles *πλιν σικυτὰ, σικυτὰ*. Fartiles Aves, quæ caveis in-

clusæ saginantur, & turundis fariuntur, ut pingvescant. *Mast Vogel. Vogel so in der Maste sitzen.*

2. Feræ, Αἴγιοι, Aves sylvestres, quæ sponte & liberè in aëre & sylvis vagantur. *Wilde Vogel oder gestügel.* Harum aliæ incolunt

Alpes seu altissimos montes, ut Urogallus, Gallinæ Corylorum, Merulæ torquæ.

Montes & sylvas, Turdi, Turdelæ, Merulæ, Regulus, Rubiculæ.

Fruteta, Linaria, Luscinia,

Fragosa & Saxa, Aquilæ, Petronella.

Deserta Montium loca Bubones, Noctuæ.

Campos & Agros, Alaudæ, Coturnices.

Prata, Curruca.

Flumina, Alcedo, Merula palustris, Ardeolæ, Motacilla.

Lacus, Mergi, Anates sylvestres, Fulicæ.

Z

Maria

Maria Alcedo marina,
Anseres marini in Brasilia.

Aërem Avis Paradysi,
qvæ ex solo Aëre vivere dici-
tur. Hirundo, præsertim mu-
raria.

Item Avium Sylvestrium
Alie.

Semper apparent,
Passeres, Cornices variæ, Picæ.

Non semper conspici-
untur: sed vel

Hyeme tantum,
Emberiza varia ξανθόπυγος
Bombycilla.

Aestate tantum, Hye-
me verò discedunt in

Vepidiora loca,
ut Monedula, Sturni, Cor-
nices nigrae, Anates sylve-
stres, Alaudæ.

Longinqva, id est, pere-
græ avolant, ut Ciconia, Gru-
es.

Vel latent in Arboribus, Cu-
culus, Upupa.

Convallium angustiiis,
Hirundines.

Avium alie sunt:

Fidipedes, αἰζόποδες,
Fissipedes Aves digitatae, qvæ
fissos habent pedes, Vogel so
gespaltene und zertheilte Füsse

haben. Hæ rursus vel

Altivolæ, volaces, qvæ
alis grandibus sunt atq, vali-
dis, ut Aquilæ, Falcones, Ac-
cipitres, Lanii.

Pulveratrices in terra
versantur, ut Gallinaceum,
genus, Trochilus terrestris,
Coturnices, Alaudæ, Perdi-
ces.

Alie Palmipedes περι-
πόδες Planipedes, Solidi-
pedes, qvibusu ngves mem-
brana junguntur, Breite/ flä-
che und ganssfüßige Vogel.

Harum digiti aliis utrinq;
membrana cohærent, ut A-
nati, Anseri, Olori:

Aliis utraq; ex parte non
totaliter membrana conne-
ctuntur, ut Ardeæ.

Aliis una ex parte aliqua-
tenus membrana junguntur,
ut Novali media.

Latiusculi, ungvibus latis,
ut Mergo, ungvibus aduncis,
ut Fulicæ.

Rursus. Οἰσῆα alia sunt.

μονοφάγα, qvæ vel vermi-
culis & formicis aluntur.

ἐκωληκοφάγα, qvæ ver-
mes ad Cibum inquirunt, ut
Vanellus, Motacilla.

Κυινοφάγα

Κνιποφάγα ἢ σνιποφάγα, qvæ vermiculis in ligno degentibus, formicisve gaudent, ut Picorum genera, Parices, Cnipologus.

Σαρκοφάγα, Carnivora, qvæ carnes vorant, & ex rapta vivunt, unguesq; aduncos habent, ut Bubones, Aquilæ, Milvi, Accipitres,

Ιχθυοφάγα, Piscivora, qvæ piscibus vescuntur, ut Larii, Mergi, Alciones, Corvi lacustres.

Ακανθοφάγα, qvæ spinam appetunt, Carduelis, Salus, Spinus, Ligometris.

Σπερμολόγα, Seminilega qvæ seminibus & frugibus vivunt, Gallinæ.

Καρποφάγα, Καρποφαγούνα, qvæ frugibus victitāt, ut Columbæ, Turtures, Passeres.

Παμφάγα, Παντοφάγα Omnivora, qvæ nullo discrimine quibuslibet vescuntur, ut Pica, Cornix cinerea, Corvus.

Ex colore. Aliæ sunt unius tantum coloris, ut Corvus niger, Cygnus albus. Aliæ varii coloris, ut Psittacus, Cornix picta &c.

Avium utilitas.

Aves Corpori inserviunt, ut Cibus; dum palata nostra in cibis instruunt.

Harum Caro licet minus præstetimenti, qvām Qvadrupedum, facilius tamen concoquitur, & probum gignit succum,

1. Agrestes saturans, Agricolis, villicis & plebeis familiaris, veluti sunt Anseres, Anates, Gallinæ, Columbæ. &c.

2. Elegantium mensis jucundus, Magnatibus & Principibus notus, ut Phasiani, Vrogalli, Attagenes, Gallopavi & similes.

3. Infirmis & iis, qvi adversa valetudine fruuntur commodus, seu medicamentosus. Dum Aliarum Caro

1. bona, svaavis, facilis digestionis, ut Pulli gallinarum, Perdices.

2. dura, Turtures, Palumbi, Anates.

3. fibrosa, dura, concoctu difficilis, Pavones.

4. probi succi, Phasiani, Gallinaceum genus, Turdi, Avicularum montanarum & sylvaticarum genera.

Z 2

§. excre-

§. excrementosa & improbi succi, ut quæ lacustribus palustribusq; locis ac fluminibus immundis & turbidis degunt, ut Mergi, Fulicæ, Corvi lacustres.

Hic habendus est delectus earum, quæ vel sint fugienda vel eligenda.

ut Pharmacum. Hac ratione Medico usui destinantur Aves

Integræ. Sic Ciconia in Apoplexia, Paralyfi, Arthritide efficax.

Alauda in Colica.

Galbulus in Ictero.

Passerculus in Impotentia venerea.

Passer Troglodytes in Nephritide,

Cuculus in febribus, Epilepsia.

Pica } in Spasmo &
Hirundines } Convulsionibus.

Partes Earum:

Internæ.

Ventriculi tunica interior Ciconiæ, Gallinarum.

Cor Alcedinis fluviatilis.

Cerebrum Cornicis cineræ, Passerculorum.

Fel Accipitris.

Testiculi Gallorum.

Externæ. *Pinguedo* Gallinarum, Anserum, Anatum, Ardeæ, Aquilæ, Coturnicis.

Pelles Aquilæ, Vulturis, Oloris, Mergi, quæ præparatæ ventriculo admoventur, ad concoctionem promovendam.

Ungues Ardeæ stellaris.

Plumæ Anserum, Olorum aliarumq; Avium. Ex his enim parantur lecti & culcitæ, quibus non solum lassitudinem ex longo & difficili itinere, vel alio quovis diutino labore leniunt ac sublevant; verum etiam Corpus hyberno tempore fovēt, & à frigore defendunt.

II. Animum informant. Insignia enim exempla virtutum præbent:

Invocationis divinæ.

Pulli Corvorum. Non enim prius eos parentes pascere solent, quam plumis vestiri incipiant. Hiob. 39. v. 3.

Laudationum Dei.

Nam & in Avibus laus Dei resonat, sicut David *Psalm 8. v. 9.* exclamat: Benedicite omnes volucres cæli Domino.

Quæ

Quæ mané inter densos Arborum ramos & de medio petrarum dantes vocem suam, atq; in Aère circumvolitantes suavissimis modulationibus æternum Deum Dominum & Creatorem omnium rerum concelebrant. *Psalm 104. v. 12.*

Alauda, quia ter quotidiè canit, mané pauló ante ortum, meridiè & vesperi docet ac monet nos illa tempora tribuere precationi & gratiarum actioni.

Pudicitiae & Castitatis. Palumbes ab omni stupro castissimi. Adeó enim mutua consensione stabile & certum connubium per summam castimoniam tuentur, ut neuter alienum cubile attingat. Eadem lex ad Turtures pertinet, sanctaq; & fincera permanet.

Iustitiæ. Mater enim Hirundo adversus filios suos iusticiam servat in distributione Cibariorum, suam cuiq; tribuens dignitatem.

Simplicitatis, Columba.

Nam internuntii munere defungi eas compertum est.

Amicitiae domesticæ.

Compertus est Anser ad annos 60. in eadem domo vixisse.

Concordiæ. Cornices inter se fidissimæ, & cum semel inter se societatem coierunt, maximo se opere diligere, ac non temerè violare *Politianus* testatur.

Ciconiarum concordia magno miraculo comperta. Nam si interceptæ repentino frigore ex Europa, nequeant sedes suas repetere, conveniunt, ac conjunctæ velut uno globo sese omnes in unum lacum demergunt, atq; ita Hyemem totam demersæ ac velut mortuæ transigunt; at vere, repente cælo quasi reviviscentes rursus evolant. *Fulgos. lib. 1. c. 6.*

Anno salutis 1467. In Lotharingia juxta Metensem urbem in lacu quodam permultæ Ciconiæ inventæ fuerunt, quæ in thermis calefactæ revixerunt.

Benignitatis seu Liberalitatis Parentum erga liberos. Ciconiæ amanter suos fœtus curare dicuntur. Cum enim ad pullos, qui per

ætatem è nido nondum evolare qvèunt, cibum aliunde comparare nequeunt, esculentia, qvæ prius ederant, evomunt, atq; in educandos fœtus convertunt, & ad volandum pullis imperitis duces sunt.

Pelicanus pullos suos á serpente caesos, fuso ex proprio pectore sanguine rursùm vivificat.

Idem de Hirundinibus, Alaudis, Falconibus scribitur, qvòd peculiari qvadam industria & amore pullos suos curent & alant.

Pietatis & gratitudinis Liberorum erga Parentes. Magna cura Ciconiæ exacta ætate parentes alunt, etsi humanis hoc facere legibus nullis jubentur, sed sola bonitate naturæ ad id impellantur.

Merops justitia & pietate omnibus Avibus præstat. Non enim in senectutem Parentes alere differt, ut Ciconia: sed statim, ut per ætatem volare potest, hoc ipsum exequitur.

Gratitudinis erga benefactores. De Ciconia, qvæ Memor beneficii, Mulieri Tarentinæ, ob præstitam in sanando crure diligentiam, in sinum gemmam preciosissimam evomuerat, lege *Ælianum lib. 8. c. 21.*

Beneficientiæ. Ossifraga prolem Aquilæ abjectam per benignè suscipit atq; alit, donec adolescat, *Arist. hist. anim. lib. 9. cap. 34.*

Politix sive gerendæ benè Reipublicæ. Ciconiæ, Grues, qvi cùm hinc in Ægyptum redeunt, duces & exploratores adhibent.

Vigillantix. Anseres acrius qvàm canes ad custodiam advigilare Romani planè explorare perceperunt. *Ælian. lib. 12. c. 30.*

Animum voluptatibus recreant. Dum Pulchritudine exbilitant, seu colore placent, eoq; vel simplici.

niveo, ut Olores candidi, Pavones nivei, Columbæ, Falcones, Corvi, Passeres.

viridi, ut Psittaci, Alcedo, Cornix sylvatica, Picus viridis.

flavo,

flavo, Oriolus, Gulgulus, Luteola.

vel vario :

Phasiani, Pavones

Aures recreant : *Cantu* ut Oscines *Plin.* ὠδῖναι ὄσγειαι, quæ voce seu cantu sunt sva-
ves & mirabiles, Luscinia, Sturni, Luteola Canariensis, Merula, Turdela, Ligurini.

Loqveta, ut Psittacus, Pica glandaria, Pica varia, Corvus, Monedula, Sturnus.

Quoniam Avium aliquan-
to sublimior natura videtur,
cùm suprema semper petant,
cælumq; videantur inhabitare,
terrenis rebus se longius
removentes, rationis symbo-
lum aliquod videntur habere
supra reliqua quæcunq; Ani-
mantia: propterea sola Avis
ad loqvendum docilis, reli-
qua Animantia muta dicun-
tur.

*Medicam artem
edocent.*

Hirundines Chelidoniam
herbam adinvenere, cæcitatis
pellendæ caussa.

Ibis, avis Ægyptia, rostri
aduncitate partem eam, quæ
excrementa emittuntur, quæ-

si Clysterio consuevit purga-
re. Est enim avis prudens, no-
vitq; Lunam crescere ac de-
crescere, ac ut Medicorum
clysteriis magistra, rationem
vivendi augmento Lunæ vel
decremento perdidicit & do-
cuit. *Ælian. lib. 2. c. 35.*

**Anni tempora disci-
minant & distinguunt.** Ci-
conia adventus sui testimo-
nio Veris initium denotat; re-
cessus verò Autumnum &
Hyemem.

Hirundinum adventus Æ-
quinoctium vernale, recessus
autumnale significat.

Coturnix ejiciens tristiti-
am hyemis, lætitiæ veris
introducitur; recedens frigus in-
stare denunciat.

Luscinia cum Solstitio æ-
stivo colorem & vocem mu-
tat.

Imbres aliarumq; Tem-
pestatum injurias præ-
nunciant. Mergi Anatesq;
pennas rostro purgantes ven-
tum portendunt.

Corvi & graculi cùm gre-
gatim apparent, & similem
Accipitribus vocem edunt,
pluviam indicant.

Galli

Galli norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdiu cantus; nec non pluvias imminentes, si præter solitum canant, præsentunt.

Monedulae volantes modò in sublime, modò deorsum versus, frigus & pluviam monstrant.

Aëris pestes & vitia famemque præsentunt.

Anno 1087. accidit, ubi Anates cum Anseribus, Gallinis, Pavonibus & aliis Avibus, Hominis usibus subjectis, domesticæ consuetudinis oblita, & subito efferata sylvas petierunt. Sequuta sunt: infelix promiscuæ multitudinis in Syria navigatio, demum fames & pestis. In Annalibus Vindelicis, Bombycilla, Corvirostra, Salus si turmatim ad Montes nostros advolarint, brevi famem aut pestilentiam fore vulgus observavit.

Scripturæ inserviunt Anseres, Olores, Pavones, Ciconiæ, Corvi. Harum enim Avium calami seu fistulae præ cæteris eliguntur.

DE AVIBUS IN
SPECIE.

Accipiter.

Ἰεῖδαξ & πὸ τοῦ ἰεῖδαξ ἕξωρ, ἅ
celeritate motus.

Ἰεῖδαξ Ὀρνίθ.

γῆραι.

Ein Hapch/

Habich/ vom haben/ behalten.

Accipiter, ab accipiendis & rapiendis. Avibus nomen tulit, quasi minor Aquila. Est enim nomen commune, & multa Avium prædæ in hiantium genera, ut Buteonem, Falcones, Nisum, Smerillum, Muscerum, &c. complectitur.

Aristoteles libro 9. histor Anim. cap. 36. decem genera recenset.

Accipiter stellaris.

Ἰεῖδαξ & σῆλας Arist. Bellon.

ὑποτέλειος Eber. & Feuc.

Accipiter simpliciter

Astur.

Ein Habicht/

großer Habicht.

Avis elegans valde, Corpore magno, rostro adunco, Oculis pellucidis, aspectu hilari, pedibus crassis, ungibus aduncis, colore varia, albis & nigris maculis distincta, nullam

lam avem formidans, ipsa-
met prædatoria.

Fel Jecori simul ac Intesti-
no jungitur. Lien valde exi-
guus, ut sensum ferè effugiat.
Ventriculus ferventior.

Ex raptu vivit, & carnibus
ut Aquila vescitur, nec non
Muribus urgente fame: quod
hoc anno, dum hæc scriberem
in Horotino deprehendi.
Crura Avium cum ungvibus
integra devorat: at ventricu-
los excoriare solet.

Nidulatur ac degit Monti-
um nostrorum densissimis
sylvis, aliisque aditu diffi-
cilibus ac solitariis locis.

Parit quatuor aut quinque
Ova, nidum extruendo in ca-
cuminibus Abietum aut
Picearum, Incubat vicenis
diebus.

Eximuntur pulli è nidis,
& veteres reticulis supra ni-
dos capiuntur: hyeme etiam
decipulis, gallinà & columbà
alligatà.

Accipiter venatur Perdi-
ces, gallinas, coturnices, A-
nates, Anseres, Columbas,
Corniculas, Monedulas, Le-
pusculos.

Caro ejus cibo interdicitur,
utpote dura & concoctu dif-
ficilis.

Affa in cibo sumpta, ani-
mum corroborat, Melancho-
liæ & perturbationi Mentis
resistit, & Morbum sacrum
curat. Rabi Moyses.

Fel valde acre est. Glauco-
mata & suffusiones corrigere
creditur.

Adeps Oculorum caligines
discutit, & juncturis utilis.

Accipitres variè ab Ac-
cipitrariis distingvuntur, quod
alius sit

Nidarius, Nidularius em
Nestling/ ein Nesthabeicht/ qui
de nido extractus & educatus
fuit, Præ cæteris laudatur
& Dominum raro deserit.

Ramarius, Ramalis em
Nestling/ qui nuper de nido
egressus parvo tempore ma-
trem suam volando de ramo
in ramum sequitur. Et hic o-
ptimus esse solet, Nidulario
celeritate prævalet.

Sorus à colore infumato
em Wildfang / Qui aliquan-
diu liberè volavit, & post-
quam nidum reliquit, captus
fuit, Hic duplex est, vel

Hornotinus em Rénig
Habeicht ist rot mälieht / pri-
mo anno captus antequam
pennas mutaret. Color ei
varius. Dorsum & Alæ su-
periores

A a

periores

periores paucas habent maculas albas. Coloris sunt fusci, nonnihil ex obscuro rubentes. Pectus & venter maculis albis & nigris varia. Caput fusci est coloris at dilutioris. Præstantissimus putatur ad disciplinam.

Mutatus, qui jam penas in feritate mutavit. Ein Mäuser / ist weis mählich. Maculis albis & nigris distinguitur, quæ albiore & nigriores sunt, cum sæpius mutatus fuerit, anniculus, bimus, trimus aut profectior. Item alius.

Accipiter est major nobilior.

Accipiter femina.

Köselcher Habicht/

voll Habicht/Accipitrariis.

Oculi Iris, & suprema, ubi Capiti contigua est, rostri pars, item Crura tibiæve & pedes colore croceo tinguntur. Dorsum fuscum vel subnigrum. Cauda tæniis seu maculis latis & obliquis, partim nigris partim canis, admodum frequentibus distincta. Penæ Colli superioris, nec non Capitis magis ex obscuro rufescunt, & punctulis nigris

plurimis itidem interstinguntur.

Plumæ veró femorum ac ventris diversa ratione maculantur.

Accipiter minor femina.

Semiastur, Accip. medius nobilis mutatus.

Mittel-Habicht/

Halb-Habicht/

Longitudo ei dodrantum trium & semis. Latitudo septem. Tectum seu Dorsum totum cum alis fuscum, ad Indicum inclinans. Vertex cum collo nigricat cum obscura rubedine. Alæ maculis latiusculis obliquis nigris distinguntur. Cauda Zonis partim fuscis partim canis transversim ductis intersecatur. Infima pars tota albet lineis nigricantibus respersa. Rostrum aduncum obscure caruleum. Pedes crocei, ungibus aduncis, maximo posteriore, qui tetradactylos ferè circum ab solvit. Iris crocea, pupillâ nigrâ.

Accipiter

*Accipiter minimus.**Klein Habicht.*

Priori colore similis; at multo minor, Sparverii magnitudine. minusque audax, & robustus.

*Accipiter Tercellinus.**Accipiter mas**Habicht/ Tercellin/*

Minor est femina, & ad venationem inutilis.

Accipiter instructus & edoctus ad venationem.
Ein abgerichter Habicht.

Accipiter nobilis major
nivei coloris.

*Ἰεῖαξ λευκός.**Ein Schneeweisser Habicht.*

Anno 1600. Auceps nobilis viri Georgii Eeken in pago Polwitz Ducatus Lignicensis, Accipitrem maximum cepit coloris prorsus candidi, præter pauculas obscuriores Alarum Caudæ maculas, & clypeum Dorsum subrubentem. Hunc per triennium unâ cum aliis Avi-

bus rarioribus domi suæ enutrivit, qui jam, dum hæc scriberem, paulatim obscurari incepit.

Avis elegantissima & jucunda aspectu, nec unquam in his terris visa. Magno æstimatur precio.

*Accipiter Buteo.**Ἰεῖαξ Ἰεῖαξ Arist.**Accipiter Butorius**Accipiter triteftiger**Accipiter Buteo Gesn. & Ulyß. Ald.**Milvus palustris Ul. Ald.**Aquila percnopteros Arist. Bell.**Lanarius niger Recent.**Ein Bus Ahr/ Bushard/**Rohr Ahr/ Weuß Ahr/**Fischknecht/ Fisch Ahr/ Stl.*

Magnitudo ei Milvi majoris, longus cubitum unum, ferè, latus alis extensis cubitos ij. & digitos iij. Rostrum brevi, adunco, subæruleo, nigricante. In fronte color ex viridi & flavo mixtus, penulis ceu pilis utrinque inter oculos & rostrum rigentibus.

A a 2

Crura

Crura flava Milvi altiora imbecillia, ad medium usq, plumosa, ungvibus uncis nigris, Tergum obscurum seu subnigrum, pennæ extremæ non-nihil rufi coloris præferunt: interior pennarum pars, quæ mutuo obrectu latet, albescit, multis densis, crispis, mollissimisq; plumulis obsepta. In ventre & pectore albicat, nigris passim maculis distinctus. Capitis pennæ fuscae per medium albicantes. Alarum remiges pennæ cæteris nigriores. Cauda minimè bifurcata, lata, obscurè rubra, maculis nigris trasversim aspersa.

Testes ad spinam Dorfi hærent bini, tertium in nostrate videre nondum licuit.

Carnivorus est, Mures majores & minores, Ranas, Scabæros, Locustas, Erucas, Aviculas, Ruri & in agris perquirat & devorat.

Pisces etiam appetit: ob id circa aquas plurimum degit. Semper cernitur.

In volatu frequenter alas concutit, Accipitrum omnium penè ignavissimus. Tardus enim, & pigri volatus. Hinc

proverbium Germanis natum Buteonis instar sedes, Du sihest wie ein Busshard.

Admodum pingvescit. Caro ejus à cibis abdicatur, licet dulcissima & boni saporis.

Testiculi ejus recentes sumti, frigida Membra egregiè excalefaciunt, & ad Venerem apta reddunt.

Accipiter Palumbarius.

quod Columbas potissimum persequatur & capiat.

Ἰεῖα ἑρσσοφόνος
φαρότυπος Arist.
ἑρσσοκτόνος
φαροκτόνος.

Accipiter ferox.

Falco Columbarius.

Falco tertiolus, id est mas in genere Falconis. Nonn.

Aquila truncalis.

Ein Taubenjäger / Eber. & Pucc.

Stoek Ubr/sil.

Longitudo & à rostro usq; ad extremos digitos dodrantum iij. & digit ij. Color Dorfi, Colli, verticis fuliginæus ut &

ut & Caudæ ac Alarum, quarum majores pennæ maculis nigris transversim insigniuntur. Pectus, Venter maculis ex fusco rubentibus, flavis & candicantibus, versus uropygium dilutioribus distinguuntur: Crura flaventia obtegunt plumulæ villosæ subobscuræ rufæ, ex femoribus dependentes. Ungues insigniter hamati nigerrimi. Rostrum coloris cornei, breve, digitos duos longum, unicum.

Audax est & celerrimè volat. Palumbos, Columbas, Perdices & grandiusculas aves insequitur. Hunc, cujus descriptionem dedi, Pueri rustici in montanis fuste interfecerant, cum jam gallinam rapuisset.

Accipiter fringillarius
mas.

Accipiter minor mas Gesn.

Accipiter fringillarius femina *vl. Aldrov.*

Nisus à conatu, nisu, quod aves se multo majores rapere nitatur.

Nisus femina Gesn.

Sparverius, Spervarius
Albert.

Accipiter Sparverius.

Accipiter Palumbarius
Turner.

πέρκος Aristot. Eber. &
Fenc.

Ein Sperber/
Sperwer vulgò.

Longitudo ei spithami cum sesquipalmo & digit. j. ab extremo rostro ad ultimam caudam. Rostrum obtinet breve, subcæruleum, crassum, modicè unicum. Iris Oculi intensè flava. Vertex, Collum, Dorsum, Alæ colore castaneo, nigricante obscurève fusco. In syncipite tantum & circa alarum medium, quæ dorso ipsæ incumbunt, alba macula conspicitur. Pars prona totius Corporis, nempe Gula, Pectus, Venter, latera alis tecta, femora & uropygium sunt candida, & transversis lineis luteis interfecantur. Tibiæ & pedes lutei, ungues nigri incurvi. Cauda supina tota fusca, lineis latiusculis quatuor transversim ductis per intervalla ornatur.

Citò mansvescit, & delicatè nutriri

A a 3

te nutriri postulat, leviter aucupatur, & velox ad volatum. Perdices, Coturnices, Alaudas, Fringillas venatur.

Si Mulieris partus differatur, & parturigines absint; item ad secundas pellendas, simus Sperverii tritus prodest.

Accipiter fringillarius femina.

Σωβ'ας Arist.
ωρίτις

Accipiter fringillarius mas.
Muscetis Ulyss. Aldrov.

Muscetis mas Gesn.
Nisus femella Mihi.

Frogellus.

Ein Spring.

Springel/

Springling / á maculis, quibus toto Corpore resper-
sus est.

Minor aliquanto est Niso, longitudinis spithamalis, & digitorum trii. Rostro unco exiguo acutissimo. Oculi Iris lutea, reliquum intense flavet. Dorsum cum collo & Capitis vertice obscure cæ-

ruleum seu diluté fuscum, Caput, Collum pronum, Pectus, venter, Alæ interiores, Crura albicant, & variis maculis seu lineis transversis distinguntur. Cauda reliqui Corporis longitudinem feré æquat, & nigris & diluté fuscis maculis transversalibus alternatim dispositis ornatur. Pedes tibiæq; longiusculæ crocei coloris. Ungues nigri incurvi.

Passerculos, Fringillas & Galeritas plerunq; capit.

In altissimis arboribus Suditorum nidulatur. Quaternaria ut plurimum parit Ova, Julio & Augusto, in cuius fine pulli capiuntur.

Hyeme nusquam cernitur.

Vulgo creditum fuit, Nisum esse feminam, Muscetum veró Matrem: sed anno 1601. contrarium edoctus fui. Dum enim in thermis Hirschbergenfibus Aprili mense Muscetis Passerculos insequere, bombardæ globulo occisus fuit, in cuius ventre dissecto Ova continebantur, cum admiratione Nobilium quorundam.

Alauda

Alauda.

κορυδιό Gall.

κορυδιό αλόο Diofc.

κορυδιό αλόο τῆς κορυδιό α
galea.

Cassita á casside

Galerita á galero.

Alauda á laude, qvód nimirum Deum laudare videatur cantu suo. Hanc enim septies qvotidié in altum evolare, suoq, Creatori hymnum canere veteres observarunt: vel qvód ipsa digna sit laude, mira alacritate pen- nis in aërem exertis, musicam & canoram se declarans.

Cine lérche.

Avis est pusilla, cinerea, canora, nulli non cognita.

Hujus aliquot differentiae in Silesia nostra observantur.

1. *Alauda vertice
plano.*

κορυδιό αλόο ωδικοό,

αγγελόο

επιτρεος.

Alauda sine crista Eb, &
Penc.

Alauda non cristata Ul.

Aldror.

Alauda Cælipeta

Alauda terrena.

Ein sang lérche/

qvód cantu cristatae præferatur.

Feld lérche/

Grosse lérche/

Himmel lérche/

qvód in sublime extra Oculi captum sese abdat, longioremqve moram in eo trahendo cantillet.

Avis Passere pauló major, palmos ij f. longa. cinerea, maculis fuscis undiq; respersa, præter ventrem qvi albidus est, ad flavedinem tantillum inclinans. Rostrum gracile rectum. Pedes obscure flavent unguiculis cornei coloris, qvorum posterior longissimus existit. Cauda fusca ex pennis duodecim condita, quarum binæ exteriores mediotenus candidæ sunt.

In campis & agris degit. Granis, seminibus cerealibus & vermiculis vescitur; nunquam in arboribus consistit.

Nidificat

Nidificat in terra inter segetes, ubi artificio magno ex radiculis herbarum aridis stipulisq; nidum construit.

Alciat emblem. 26.

Occulit inflexo nidum sibi
gramine Alauda,
Vulgó ajunt; pullos sic fovet illa suos.

Parit semel in anno; quamvis alii ter parere asserant; forsitan in calidioribus regionibus. Ova ut plurimum quinque excludit, Pullos ferè implumes adhuc in agros ad pastum educit.

Mas suaviter cantillat, primaq; Avis quæ cantu vernum tempus prænunciet, Hyeme à nobis ad loca tepidiora recedit aliquandiu.

Caveis inclusa nutritur Milio & Papaveris semine. Valdè Musicus est, & cantu suo antelucano diem annunciat.

Gregalis est, autumnò maxime, ubi admodum pingvescit, & demessa segete retibus nocturnis, cæteris temporibus etiam Falconella capitur.

Caro ejus cibo peridonea, suavissima ac laudabilis succi. Calidi & siccioris tempe-

ramenti; ventrem stringit.

Assa vel elixa, & aromatibus condita mensis affertur.

2. *Alauda cristata.*

Κορυδαλλὸς ἐπίγειος ἢ λόφος
ἔχωρ.

Alauda capellata.

Cassita Lat.

Alauda cristata major, Gesn.

Alauda viarum,

Heubelerche/

Kobelerche/

Wegelerche/ Kottelerche/

Jürke/ Nonn.

Magnitudine & colore canora ferè similis. Dorsum cinereum albo maculatur, venter & pars alarum interior albicant. Cauda nigricat, exceptis geminis utrinque quæ alarum colori respondent. Rostrum ei longiusculum acutum, aliquantulum cavum & recurvum, lingua exigua ferè furcata. Ungues longiusculi, æqualis magnitudinis. Verticem Capitis exornat crista, quâ à Canora distinguitur.

Et hæc Musica est, sed prior præfertur. In terrâ, non in arboribus diversatur nidificatq;ve, Rarò evolat, & evecta alijs

sta alis statim rursus procum-
bit, neq; altis nec longis spa-
ciis confectis. In viis sæpe ob-
via, hyemis præsertim tem-
pore, nec gregatim volat.

Baptista Mantuanus.

Prole nova exultans, galea q;
insignis Alauda,
Cantat & ascendit, ducto q;
in aëra gyro,
Se levat in nubes, & carmine
sydera mulcet,

Eligantur in cibum pingvi-
ores & juvenes. Calidæ & sic-
cæ in secundo excessu viden-
tur.

Assa & in jure elixa acu-
tissimos Coli cruciatus mul-
cet: Verum assidue eam ede-
re simul cum jure necesse est.

Alauda cū sua pluma in va-
se fictili usta, in pulvere sub-
tilis, ex aquæ calidæ cochle-
aribus ternis, per biduum aut
quatrimum pota, Colo &
omnibus Intestinorum dolo-
ribus incredibile remedium.

Sanguis recens ex aceto
acerrimo, aut vino generoso
calido haustus, Calculosis
efficacissime subvenit.

Alauda arborea.

Κορυθώρ ἀγέλατος. ἀνώvu-

μ. Alauda: fera,
sylvatica,
cristata minor, *VI. Aldr.*
Calandra, *Nonn.*
Ein Heide Lerche/ *Sil.*
Mittell Lerche/
Baum Lerche/
Wald Lerche/
Stein Lerche.

Minor est reliquis, colore
totius Corporis subfusco.
Cristam habet, at cantuncu-
lam nullam peculiarem edit,
parte prona albicat, & pedes
subrubent.

In sylvis degit planis &
Erucā confitis, ubi & nidifi-
cat, Hyeme aliquando secus
itinera conspicitur, Gregalis
est, & pingvis, ac boni saporis,
Ob id in cibum recipitur.

Alcedo fluviatilis.

Αλκυών παρά τὸ ἐν ᾧ
κύμα, quod in mari pariat.

Halcyon fluviatilis,
Halcyon riparia, *Agricola.*
Ispida. Alcedo quasi Algedo.
Eysvogel/ *Sil.* quod glaci-
osa hyeme nidificet: vel po-
tius, quod hyeme juxta glaci-
em rivulorum degat & con-
spiciatur.

B b

Eysengartel

Eysengart/
Wasser Hünslin/
Seeschwalme.

Avis est speciosa, Passere paulo amplior, longitudine dichadis. Rostrum ei longum rectum, acuminatum obscure rubens, tres fere digitos longitudine æquans. Pedes humiles miniati, digitis binis anterioribus æqualiter divisis, posterioribus paulatim a se invicem distantibus, internodiis seu articulationibus, quasi lineis transversis, distinctis, qui ungviculis muniuntur aduncis, acutis, nigricantibus. Colore tum cæruleo, tum viridi, tum etiam purpureo & flavo insignis. Supina pars viret. Vertex lineis seu striis transversis notatur. Alæ superiores guttulis ex cæruleo albicantibus maculantur. Per dorsum usque ad caudæ finem excurrit linea latiuscula in viridi cærulea, quæ ad Solem conversa Serici instar lucet, Sapphirum aut potius Turchesiam referens. Ad latera Alarum juxta dorsum passim refulget Purpura. Pennæ majores seu remiges partim cæruleæ, partim nigricant. Pectus totum cum

ventre, & alarum interiore parte, ferruginei coloris tunicam medianam Castaneæ eminentientis. Rictus crocei coloris cum Lingva brevissima, latiuscula, palato adnata.

Cor rubet fabæ magnitudine, cujus mucronem Hepar Pallidiusculum bilobon amplectatur. Sequitur ventriculus amplus, tenuis, gula longa ampla, ad podicem fere desinens. Cui adjacent Intestina albicantia, tenuia, ad dextrum latus in gyrum seu spiram quasi convoluta.

Vivit ex piscibus & vermiculis: ob id ad fluvios & torrentes passim visitur.

Nidum ad ripas fluminum, rostro excavata terra figit. Ova parit quinque, vel sex, quæ Majo excludit.

Hyeme non discedit, sed apud nos manet, & circa fluminum ripas glacie concretas degit. *virgil.*

Littoraque Alcyonem resonant, & Acanthida Dum. Grati

Grati & jucundi coloris, Iridis colores quodammodo imitans est Alcedo, & visum mirè afficit. Nostrati odor inest non Moschi, sed potius ferinus.

Pellem detractam ad panos repositam putredini resistere, & tineas pellere fama est.

Integra in domo si reponatur, seditiones & litem avertere, anilis persuasio.

Cor ejus siccatum & collo Infantium suspensum, Comitalem arcere, à Nobilibus quibusdam Silesiæ habeo, ut experimentum non contemnendum.

Ferunt, Arborea & Gramina arescere si supersederit Alcedo, juxta proverbium: Du verdörrest Laub und Gras/ wie ein Eysvogel.

Anas domestica.

ἄνα ἡ ἀναΐδα, quod est natare.

ἄνα, ἄνα ἡ ἀναΐδα.

ἄνα ἡ ἀναΐδα.

Anas cicur.

Ein Dätsche/ } sil. à voce
Dätsche/ } rauca.

Endre femina.

Endrach/mas.

Dam Endre/

Haus Endre.

Avis notissima ex genere *σαυονόδω* & amphibiorum, ab assiduitate natandi dicta. Mas major est femina, & colore magis vario. Ima summaq; Corporis parte cæsa est. Pennas Alarum aliis asperfas coloribus, præcipuè tamen purpureo nitentes habet. Collo Capitiq; viridis inest ad nigredinem tendens. Medium Collum ambit candidus circulus. Rostrum latius. Pedes rufi & lati ad natandum apti.

Femella varia, sed cinereis & nigris albisq; maculis distincta.

Gula ei tota ampla est & lata. Appendices quoq; paucas habet infra quâ desinit Intestinum.

Bb 2

Differunt

Differunt Anates domesticæ colore. Vel enim totæ candidæ, nigræ, cineræ; vel compositi coloris ex omnibus dictis, inveniuntur.

Passim in pagis, villis & urbibus aluntur, ubi aquæ, paludes ac flumina quibus gaudent. Nam sine his difficile vivere possunt.

Vititant avena, vermicibus, pisciculis, gramine, herba, radicibus, Lenticula palustri, limo, sordibusq; aquarum.

Ova pariunt plurima, quæ plerumq; Gallinis supponuntur, è quibus pulli orti primum aluntur ab iis, à quibus exclusi fortiq; sunt, deinde eas (pulli matres) relinquunt & effugiunt, sequentes quàm primum aquam quasi naturalem domum.

Anas omnibus volucris domesticis calidior. Caro ejus humida & calida 2do recessu, excrementitia, crassarum partium & difficilis concoctionis. Melancholicum generat succum, & febres facile procreat: at multi alimenti; augeat sperma, & coeundi libidinem excitat. Insuper vocem acutiorē & clariorem

reddit, flatus tollit, & torminosis in cibo prodest.

Sanguis recens aut siccus epotus, medetur omnium animalium venenatorum moribus; unde commodè antidotis miscetur. Sanat morsum viperarum.

Adeps calescit, humectat, emollit, digerit, resolvit. Mordicationes interiores Corporis, & dolores maximè (Laterum etiam) sedat.

Mulcet adeps nervos, & sanguis viscera sistit.

Fimus morsui Animalium venenatorum imponitur.

Anas peregrina.

Anas Indica Gesn.

Anas Turcica

an Anas procerior Hispanæ insulæ Columb.

Grembe Endre/

Türkisch Endre/

Indianischer Endrach.

Colore & magnitudine à Nostratibus differt. Dimidio ferè major & gravior. Caput ei rubescit ut sanguis, & bona pars conjuncti Colli à postero-

â posteriore parte. Id totum callosa caro est, & incisuris distincta. Crista in vertice per longitudinem plumea candida.

Oculis flavescit circulo nigro. Rostrum totum cæruleum. Pluma illi per totum Colli processum reliquum alba. Quâ Corpori Collum jungitur, circulus plumeus niger, rara pluma alba maculosus & inæqualis, per ima angustior, per summa latior. Per totum inum ventrem alba est pluma, per summum Corpus fusca. Extremæ Alæ atq; Cauda cum splendore virescunt, ut Cantharides. Tibiarum Cutis, incisuris levibus per circuitus, ducta.

Minor est femina, non ita variegato Corporis colore.

Vivit ex cænosis locis. Vox illi rauca. Moschum redolet.

In aulis Nobilium aliquando aluntur.

Nonnunquam in sylvestribus visa est, ut mihi retulit Nobilis quidam virrei aucupariæ studiosus.

Anas fera.

Νῆσσα ἀγρία, ἀνήμερος
Anas sylvestris
Ein Wild Endte/
Wild Harsche.

Plurimis Anatum ferarum generibus Silesia nostra abundat, ob piscinarum, lacuum & fluviorum frequentiam.

Anas fera 1. seu torquata minor.

Anas sylvestris vera Albert.
Anas sylv. major Eber. & Puc.

Ein Wilde blaw Endte/
Mierz Endte/
Gros Endte/
Härsch Endte/
Blas Endte/
Spiegel Endte/

Magnitudine, forma & voce inter cæteras proximè ad Cicures accedit: Longitudo ei duarum dodrantum & sesquipedalium. Caput viride, Rostrum subflavum, Collum superius viride, infera parte Castanei coloris, in medio

Bb 3 dio

dio circulus albus. In alis mediis transverso fitu color cæruleus est, paucis infra supraq; pennis candidis.

Pars Dorsi, caudam versus & in Caudæ principio, ex cæruleo ferè ad viridem ac nigrum inclinat. Inferior autem Caudæ pars pennis atrii vel Indici coloris conspicua est, ambientibus per medium fuscis, quarum aliqua in acutum extenuantur. Venter ex albo cinereus & variè maculosus. Crura rubent.

Femella varia, sed cinerea, & nigris albisq; maculis distincta.

Nidum extruit juxta paludes, piscinas & flumina. Ova parit. 10. 12. 15. 16. quæ aliquando à gallinis incubantibus excluduntur, & tunc facile manscunt.

Hyberno tempore migrant ad loca tepidiora, flumina & lacus, qui frigore non congelantur.

Laqueis & retibus capiuntur: at prius Hordeo aut avena inescantur.

Estur assa vel elixa frustum incisa, cum liqamine

nigro vel flavo ex aceto, additis Melle, Pipere, Zyng. Caryophyllis, Cepis &c.

Duriorem habet carnem, nec mali saporis.

Anatem vivam ventre depumato, in Colica malum ad se trahere, Abdomini appositam, experientia constat.

Anas fera 2. seu torquata major.

Cin Stor Endre/
Sters Endre/
grosse Wild Endre/

Priori paulo major existit, Longitudo dodrantum iij. & digitorum iij. latitudo ferè quinq;. Rostrum flavescit, apice extremo nigro. Pedes intensè crocei seu miniati. Caput cum medio Collo vi-
ret, quod circulus ambit candidus, reliqua parte infera Castanei coloris. Dorsum fuligineum. Latera utrinq; cum ventre mustelini coloris. Alæ superiores cum pennis majoribus fuscae seu cinereæ sunt; mediæ cæruleæ, utrinq; linea nigra & alba transversim ducta insigniuntur. Inferiores candidæ sunt. Circa uropygium

trotygium utrinq; ex nigro viridantes, ad cæruleum tendunt. Cauda brevis alba, ex sedecim pennis. versus nervum utrinq; nigricantibus, quarum mediæ quaternæ superiores nigræ recurvæ dorsū versus assurgunt in mascula.

Rostro fundum fodit, dum arenam & herbas ad cibum perscrutatur, unde ei nomen Stor Endre.

Avena, Hordeo & glandibus etiam in cibo fruitur.

Passim occurrit in Piscinis & lacustribus montosis.

Anas fera 3. seu major.

Anas magna. Fabric.

Anas fera maxima,

Ein Rost Endre/

Mers Endre/

Grosse Wilde Endre.

Rostrum ejus in medio nigrum, à lateribus lutescens; tergum in nigro flavicante maculosum. Venter reliquo Corpore dilutior. Alæ cineræ, in quibus pennæ quædam lineis duabus transversis albæ, quædam insigni fulgore sic radiantes, ut aliter

in opaco, aliter in Sole gemmare videantur. Caput columq; gemmantis viriditatis: Medium Collum circulus ambit albus, pars altera spadicæ coloris est. Cauda in nigro viridans, quæ in femella tergo æqualis est. Pedes crocei.

Iisdem ut superiores degit locis.

Anas fera 4. seu juncea.

Anas graminea Fabric.

Ein Schmit Endre/

Schmit Endre/

Schmelichen.

A certo Graminis juncive genere angustis perpetuo foliis virente, & aquis stagnantibus innatante, in quo frequenter versatur, nomen accepit.

Cinerei est coloris, Rostro & pedibus nigris. Reliqua cum Anate majore jam descripta illi sunt similia.

Anas fera 5. seu media.

Bornas

Boonæ, Arist. Gesner.

Anas mediocris.

Ein Mittel Endte.

Longitudo dodrantum *ij.*
& sesquipalmi: latitudo ve-
rò dodrantum *iiij.*

Rostrum obscurè flavens,
superius nigricat, ut & pedes,
quorum digiti membrana ni-
gra junguntur. Vertex ejus
niger totus, media Alarum
pars & circa uropygium sub
cauda. Pectus albis, nigris,
cinereis pennis variè macula-
tur. Venter & Alæ interio-
res albæ sunt. Dorsum fus-
cum seu cinereum. Alarum
superiores & majores pennæ
cinereæ sunt, Mediæ partim
rubent lateritio, partim ni-
gro, partim albo colore trans-
versim distinguuntur.

Passim occurrit in palustri-
bus, & in cibum recipitur, sa-
poris non ingrati.

*Anas fera 6. seu
cristata.*

Anas media cristata.

Anas cyrrhata.

Ein Straus Endte/

Robel Endte.

Paulò major est media, fe-
rè ejusdem cum majoris fe-
mellæ magnitudinis. Colore

ornatur vario. Venter to-
tus à Gula ad uropygium usq;
candidus est. Dorsum cum
splendore nigricat, cum ala-
rum superiore parte quæ Dor-
so vicina est. Remiges
pennæ, cum Cauda quinque;
digitos longa, fuscae sunt.
Mediæ candore nitent, in-
terius cinereæ totæ. Linea
alba longiuscula Dorsum ab
Alis separat. Caput totum,
cum vertice cristato retror-
sum reflexo, splendenti viri-
ditate gemmat, macula u-
trinque sub Oculis juxta ri-
ctum lata candida. Rostrum
digitos *iiij.* longum, latiuscu-
lum, serratum, nigrum. Ocu-
lorum circuli crocei. Pedes
flavent, digitis tunica fusca
conjunctis, quæ ungviculis
donantur nigris.

Rarior hæc apud nos. An-
no 1601. ad me missa est à
nobili viro D. Daniele Gots-
chio, quam in piscinis prope
arcem Boberstein bombardæ
globulo interfecerat.

Pingvis & in cibo grata.

*Anas fera 7. seu macula
in fronte candida in.*

signis.

Ein Blas Endte/

Blas Endte.

Magnitudo

Magnitudo ei mediocris Anatis, Roſtro obſcuré cæruleo, Capite rubro, præter maculam in fronte niveam. Pectus Caſtanei coloris. Dorſum fufcum. Venter albet pedibus ſubrudentibus.

Rariùs viſitur.

Anas fera 8. ſeu Erythrocephalos 1.

Anas fera fuſca vel media, id eſt, mediæ magnitudinis, Geſn.

Ein Braun Endte/ ſil.
Braun Köpfſichte Endte/
Rote Endte/
Mittel Endte/
Wilde graw Endte.

Magnitudine & figura ferè ad urbanam accedit. Roſtrum ei latum, tres digitos longum, inferius omninò nigrum: ſuperior verò Roſtri pars antè & retrò tantum nigricat, per medium ex fuſco, vel ſubcæruleo albicans. Caput totum & maxima Colli pars colore rufo vel Caſtaneo ſplendent nitentqve: inferior verò Colli pars juxta Dorſum & Pectus undiq; nigricat, ut Dorſi etiam finis & Cauda. Reliqua Dorſi pars cum alis Muſteli- num colorem refert, ut Mu-

res Pontici, ſeu varii dicti. Inſunt autem vario colore diſtinctæ, ex albis nigrisq; lineis cymatili ductu perquam elegantes. Idem in ventre color, ſed obſcurior. Interior Alarum pars albis pennis conſtat. Crurum color glaucus, digiti quoq; Pedum glauci vel ſubalbi, ſed nigris membranis juncti. Oculorum circulus ruber, pupilla nigra.

Feminae Caput non ruber, ſed maculas aliquas ſubflavas habet.

Ante biennium plures accepi ex pago Gierſchdorff, propè thermas Hirsbergenses ſito.

Anas fera 9. ſeu Erythrocephalos 2.

An Penelops, Ariſt.
Ein Brandt Endte/
Rott-Hals/
Rott Köpf.

A priori non multum differt. Longitudo ei ſpithamorum ij. Caput, Collum & pectus rubent Hepatis colore. Roſtrum fuſcum latum. Linea fuſca à Collo ad Dorſum porrigitur. Dorſum, Cauda & Alæ nigricant, quæ per tranſverſum linea alba duorum

C c

rum

rum digitorum latitudine interfecantur, Venter ad uropygium albicat maculis subflavis respersus. Alæ interiores albæ, latera ad Crura usq; ex fusco lutescunt.

Anas fera 10. seu strepera.

Anas strepitum edens,
Ein Leiner/ Gese.
Schnarr Endte/
Schnatter Endte/
Schnerr Endtsin/ sil.

A vocis strepitu graviore, quem obvariam folliculi ossei in pectore harentis conformationem, cui arteria aspera & pulmones junguntur, edit.

Rostrum ei nigrum, Collum leucophæum maculosum. Dorsum in cinereo flavet, sub aliis quasi Perdicum pennæ. Alæ rubras, nigras, albas pennas permixtas habent. Venter supernè candidus. Cauda nigra, & in extremo cinerea. Pedes lutei, Digitos conjungunt membranæ nigrae.

Anas fera 11. seu canora.

Anas fistularis, Fabric.

Ein Pfeiff Endtsin/ sil.

A sono acutiore, quem fistulæ modo emittit. Aeris meatus in Rostro habet latiores. Magnitudo ei ferè Anatis mediocris. Rostrum colore Isatidis, circa ungve ducto nigros quasi fila habet. Collum rubro nigroq; varium. Tergum partim plumbeum, partim rubris nigrisque pennis distinguitur, cum quo Alarum superior pars convenit, media maximaq; alba est, ima cinerea.

In femella verò nec Rostrum nec Tergum, nec Alæ eodem sunt ornatu, solus venter in utrisq; candidus.

Gregatim volat.

Anas fera 12. seu Caudacuta.

Anas caudacuta, Fabric.
Ein Spies Endte/ sil.
Spieschwang.

Sic denominatur à cauda acuta. Utrinq; enim pennæ longiusculæ, sicuti in Hirundine domestica porriguntur. Capite Anati mediæ, Dorsò

Dorso streperæ similis. Rostrum superius nigrum, ad latera dilutè caruleum: in femella cinereum maculis nigris respersum. Remiges pennæ extremæ transversim sunt candidæ: in medio obscurè virides & caruleæ splendent, in imo quædam lutescunt. Pedes cum membranulis fusco colore visuntur.

Circa Beutenam in palustribus capta fuit.

Anas fera 13. seu minor 1.

φασκας Eber. & Peuc.

Боскас minor,

Anas sylvestris minor.

Qverquedula sylvest. Gess. quoniam qverquero, id est frigido & hyemali tempore maximè apparent. Per hyemem enim in lacubus & fluviis, qui glacie non adstringuntur, degunt & commorantur.

Ein Rriech Endstin } sil.
Rriech Endste/
Rriech Endstin/
Rriech Endstin/

graw Endstin.

Minor est mediocri Anatis sesquidrantalis longitudinis, Rostro nigro, latiusculo, inferius flavo. Caput rubrum seu Castaneæ potius colore, cum viridante ex caruleo utrinque longiuscula macula. Gula alba atris notatur punctis. Venter item albus lineis transversis cinereis variegatur. Alæ in caesio viridantes nigris, candidis rubentibusq; transversim admixtis pennis. Dorsum fuscum. Latera sub alis ad caudam alba, lineis variis mira arte picta. Cauda varia ex caruleo, viridante, fusco & cinereo coloribus permixta. Digiros Pedum fuscis membranæ connectunt nigra.

In femella minus insigne Caput, minus gula, Venter Anati magnæ feminæ similis.

Vescitur Limacibus palustribus, vermiculis, herbis aquaticis earumq; seminibus, dum rostro fundum & herbas enascentes perscrutatur.

Cc 2

Passim

Passim nota, & æstate in palustribus obvia, ubi & nidum parat, ac pullos excludit.

In cibum recipitur assa, nec improbi saporis.

Anas fera 14. seu minor 2.

Anas Circia Fabric.

Querquedula fusca Gesn.

Ein Graue Endtsin/

Bircsilgen.

Magna ei cum priore similitudo. Alæ pennis gemmanibus carent, & venter magis maculosus.

Anas fera 15. seu minor 3.

Querquedula varia Gesn.

Anas sylvestris minor,

Ein scheeficht Endtsin/

sprenghicht Endre/

Kernel / Argentoratenst.

Longa est dodrantes ij. Coloris varii. Rostrum latiusculum Indici seu cornei coloris. Circa Caput rufa, sed punctis albis aspergitur. Vertex niger, Gula alba (nigram

ego deprehendi) ut pars etiam ventris superior. Duæ lineæ albæ longiusculæ ab Oculis retró ex latis in angustas tendunt. Dorsum fuscum ut & Cauda. Colli latera ad rufum colorem albis insigniuntur punctis. Alæ dilutæ cœruleæ superiores, transversis duabus lineis albis distinctæ, superiore latiuscula, angusta inferiore, quarum intervallum nigricat, ut & ima Alarum pars. Pectus subrufum, nigris maculis magnitudine figuræq; diversis, tanquam cymatili ductu (quibus & venter albicans variat) distinguitur

Crura fusca vel cinerea ferè, Digiti tunicis nigris conjuncti.

Gregatim volat.

Mirificè pingvescit, & Cibo utilis.

Anas fera 16. seu minor 4.

Ναῦα λωπεξ

Anas parva mustelaris, Vulpanas.

Ein Fuchs Endre/sil.

brauntöpficht Endre.

Magnam

Magnam cum Querquedula obtinet similitudinem. Capitis rubore Mustelam seu vulpem refert,

Anas fera 17. seu minor 5.

Anas Muscaria Gesn. quod Muscas super aquas volitantes capiat.

Anas limosa.

Ein Müel Endle/

Stegen Endle/

Mos Endle/

Mur Endle.

Color per totum Corpus varius est, ex nigricante, charopo, albo & mustelino alicubi mixtis. Pedes flavent membranulis nigris, quibus digiti cohærent. Rostrum latiusculum serratum coloris flavescens.

Cæno vescitur, & Muscas captat.

Anas latirostra.

Anas latirostra major, Gesn.

Anas platyryncha,

Anas Schellaria,

Clangula Fabric.

Ein Köffel Endle/ sil.

Breitschnabel/

Breitschnäbltichte Wild Endle/

Schall Endle/

Schild Endle/ id est, clypeata.

Magnitudo ei mediocris Anatis. Rostrum duplo ferè latius, ungve corneo anteriore & latiore parte donatum, undiq; aculeis setarum instar serratum; nigrum. Caput ad medium Collum ex rubicundo fuscum, pennulis ex cæruleo viridantibus. Collum dilutè cinereum maculosum. Gulæ pars inferior alba. Venter spadicei coloris. Oculi luteoli pupillam cingunt cæruleam. Alæ in superiore parte laticoloris, sic ut blaw: in media albæ; postrema in nigro viridantes visuntur. Remiges pennæ seu majores, ut & Dorsum & Cauda, (quæ minor acuta) cinerea. Pedes coloris Minii, lati, ungviculis fuscis. Femina cinerea est.

Inter volandum alis crepitaculorum sonum repræsentat.

Minus frequens ut ceteræ Anates.

Anas longirostra

I.

Cc 3

Anas

Anas longirostra, Fabric.

Mergus mustelaris

Mergus Anatiformis

Anas cristata.

Ein Langschnabel á rostro

Schlicht Endre á gemitu.

Teucher/Nonn.

Wieselschen/

Weisse Tuch Endre.

Magnitudo ei mediocris Anatis, Corpore longiore. Rostrum obtinet ferratum, longitudine digitorum *iiij.* s. ungve corneo acuminatum, ruboris miniati. Collum & Pectoris initium notis fuscis & candidis maculatur. Color Dorsi fuscus, præter Alas, quarum majores pennæ nigrae, in secundo ordine paucae candidæ. Candore Ventris magnæ Anati femellæ similis. Cauda brevis fusca. Pedes miniati, membranulæ luteæ digitos connectunt. In vertice crista, quæ obscure rubet,

Rarior apud nos. Aliquando tamen hyemis initio in palustribus montosis capitur.

Fruitur in cibo pisciculis, perculis, quos sæpè integros

cum plurimis percarum lapillis in ventriculo aperto reperi.

Pingvissima evadit. Assa in cibum recipitur boni saporis.

Anas longirostra

I I.

Anas longirostra melanocephalos cirrhata,

Mergus major cristatus
μελανόλευκος.

Eine grosse Langschnäblische / geschheckte Straus Endre.

Major est Anate ferà torquatà, longa tres dodrantes & digitos quatuor: lata, ferè dodrantes quinque. Rostrum ei digiti medii longitudine rectum, ferratum, ungve corneo in extremitate donatum; Cujus Maxilla inferior saturè coccineo rubore tingitur, superior verò superficietenus obscure rubet. Rictus cum Lingva tenuiori, gracili, asperiuscula, flavicat. Dentes ferrati retrorsum flectuntur,

Crura

Crura retrorsum ut Mer-
gus porrigit, quæ cum digitis,
qui interjectis membranis
obscurè rubris junguntur,
Arantii colorem ementiun-
tur. Ungviciuli obscuri re-
ctiores.

Vario pingitur colore. Ca-
put enim totum cum cirrho
Indicis longitudine, nigrum,
præter Mentum & Tempo-
ra, quæ obscurè albescent, pun-
ctis nigris infinitis respersa,
& maculam sub utroque oculo
albam. Iris Minium co-
lore repræsentat. Collum
præter pronum & latera ejus notis
partim albidis, partim subru-
bentibus, partim nigris ma-
culantur, superius fuscescit.
Dorsum nigrum est. Alæ
prope Dorsum nigre sunt,
mox albæ, deinde iterum ni-
gricant, jam rursus albæ line-
is duabus latiusculis nigris
transversim distinctæ, ad re-
miges usque apparent, quæ
cum Cauda breviuscula, re-
missius nigra cernuntur.
Venter argenteo nitet can-
dore. Alarum superior pars
cinerea est, & maculæ supra
eas ad latera ex nigro micant
candidæ latiusculæ. Juxta
latera sub alis & circa uropy-

gium ad finem Dorsi lineo-
lis albidis & nigricantibus
per intervalla cymatili spe-
cie pingitur.

Hepar bipartitum flavet,
inter quod & Intestina, quæ
circa finem, appendiculis dua-
bus donantur.

Fel prassini coloris majus
hæret, Ventriculo crassiori
præponitur sinus amplius lon-
giusculus. Testes pineis
nucleis similes, paulo crassio-
res.

Piscivora est. Inprimis
perculis delectatur, quas in-
tegras deglutire & conco-
quere solet.

Abundat pinguedine mul-
ta eaque flava.

Caro in cibum venit, at
saporis minus grati.

Anas longirostra

III.

Anas longirostra major.

Mergus niger major,

Mergus magnus.

Ein grosser Teucher/

Rache/Nonn.

Teuch Ende/

Schwarzer Teucher.

Major est Anas domestica
& longior, Rostro quam prior
longiore

longiore sed crassiore, & dentato ac fusco, cui unguis simplex corneus acuminatus. Tota pars supina, Caput, dorsum, & alæ nigrae. Ventre candido.

Pedes lati breves, colore Minii.

Hæc in fluviis, soluta jam glacie Martio mense aliquando visitur, veluti in Bobero & alibi.

Anas longirostra

I I I I.

Ein Fisch Treiber.

Brantam ferè æquat magnitudine, Vertice splendet atro, Collum album. Per Dorsum fusca est. Venter miniato instar Arantiarum nitet colore. Rostrum longū ferratum cum unco, ut priores, habet, Pedes plani rubent.

Iisdem ut prior locis primo vere occurrit.

Piscium est voracissima,

Anas longirostra

V.

Anas glacialis major.

Mergus Rhenanus, *Gefn.*

Nonna seu monialis alba,

Eys Endre

Nonn Endre.

Ex genere Anatis longirostræ maxima. Colore partim albo, partim fusco aut cinereo. Rostrum nigrum cum parte juxta oculos. Collum pronum cum pectore & ventre candidi coloris, sed qui passim cinereis punctis aut maculis distingvatur, quæ quidem inferiore Ventris & laterū parte, cymatili ductu delectant intuentem. Crura circa ventrem prominent, digitis tunica junctis fuscis. Cauda nigra. Alæ Dorsumq; totum nigrum, & candidis spaciis vicissim distingvuntur.

Hyberno tempore in fluviis frigore non concretis degunt.

Anas longirostra

V I.

Anas varia, seu monialis maxima,

Eine grosse Geschecke Endre.

Anatum omnium quas videre licuit maxima, Spithamas tj. s. longa. Tota nivei coloris, exceptis Capite, Collo, Dorsō medio, & Alarum remigibus pennis, quæ nigra erant,

erant. Cauda brevis fusca. Rostrum rubrum, digitos .iiij. longum, ferratum, ungue corneo donatum. Pedes rubebant.

Rarissimè occurrit. In Piscinis Ducatus Legnicensis capta fuit.

Anas longirostra

VII.

Anas monialis, glacialis minor.

Mergulus varius.

Geschecktes Endtsin/

Elster Endtsin/

Wonn Endtsin/

Eys Endtsin/

Niederlendisch Endtsin.

Paulo major est Querequedula, longitudine spithamorum duorum cum digitis totidem. Pedes digitiq; fusci, membrana nigra cohærent, Rostrum ei dentatum subcærulei coloris longiusculum, sensim acuminatum, apice obscure rubente. Oculi circulus coloris miniati. Corpus universum atro & niveo colore distinctum, & instar Pice varium. Pars juxta Rostrum & Oculos nigra est: in occipitio, maculæ longiusculæ utrinq; ex nigro virescunt, cirris retrò exiguiscan-

didis eminentibus. Dorsum totum nigrum, juxta uropygium, cum Cauda fuscescit. Alæ atris & albis aliquot spatiis distinguuntur. Remiges seu majores pennæ fusci sunt coloris. Venter totus cum Capite & collo nivis instar candicat. A Dorso initio excurrit linea atra, utrinq; ad latera ventris, quæ tamen integrum circulum non absolvunt. Latera sub aliscymatili ductu pinguntur.

Ventriculum habet crassiores, cui sinus oblongus amplior præponitur. Fel adhæret Intestinis, quibus non procul ab exitu appendicula adnata visitur. Testiculi bini sunt candidi longiusculi, pineæ nucis excorticatæ figura.

Martio jam glacie diffuente, Boberum, & alios fluvios advolat, & instar Mergi pisciculos insequitur. Limo etiam cum lapillis in Cibo fruitur.

Pingvissima est, & Cibo utilis.

Anser domesticus.

Χῆρ, a verbo χαίρειν & χαρὰν ἰσθῆναι, ab oris hiatu & voracitate.

D d

Χίνα

Xivæ

Ganza Veteribus.

Cine Gans/

Zame Gans.

Xlviii. Pullus Anseris,

Ein Junge Gans/ Gân-
selin.

Mas privatin,

Ein Ganser/ Ganserich.

Avis domestica Rusticis
& Villicis nota, Anate ma-
jor, Rostro & Pedibus ru-
bentibus, Coloris albi, cine-
rei, nigricantis, varii.

Gula ei tota ampla & lata
est. Appendices quasdam
paucas habet, infra quâ desi-
nit Intestinum.

Non solum terra conten-
tus est, sed etiam aquam re-
quirit, natura vorax, & ven-
triculo calidissimo. Herbis
riguis, frigidis & humidis ci-
bariis delectatur.

Saginaturs radicibus, Rapo,
Carotta, Avena. Non ma-
gnam curam poscit, ob id Ru-
sticis gratus.

Coeunt Anseres in aqua. A
coitu sese aquis ingurgitant.
Tempus aptissimum est bru-

ma ad pariendum & incuban-
dum, à Calend. Martii usq;
ad Solstitium æstivum. Pa-
riunt Ova 8, 12 15. supponun-
tur novem, Gallinis iiii. aut
quinque. Incubant triginta
diebus.

Utiles existunt multis no-
minibus, pluma nimirum, car-
ne, adipe & stercore.

Caro excrementitia est, &
concoctu difficilis, nec adeo
probi succi. Calidæ & hu-
midæ naturæ, minus calidæ
quàm Anaturn, facile febres
procreans.

Variis modis à nostratibus
Coquis apparantur; vel enim
in vernassantur: vel in olla
additis Cepis fringuntur: vel
superfuso liqumine acido
nigro ex aceto pipere, cepis,
Zingib, caryophyll. elixan-
tur.

Præstant Juniores, & quî-
dem hyeme, avenâ nutriti.
Veteres Hamorrhoidibus af-
fectis nocent.

Agricolæ deplumatos &
purgatos, per medium disse-
ctos saliant, & fumo exiccant,
unde

unde pulchrè rubescunt: at validum requirunt Ventrículum.

Χηρείον ἄνρας, Anserinum Hepar sartilibus in immensum augeri potest, omnium Avium delicatissimum, humidum & grati saporis, facilis concoctionis, & optimi succi.

Sanguis Cibo utilis, Antidotis miscetur.

Testes in cibo ad sobolem procreandam juvare feruntur.

Lingva singulari proprietate Stranguriæ prodest.

Pedum tunica exterior siccata in pulvere, loca frigore uisa & exulcerata sanat, Agriolarum usu.

Adeps seu axungia *Γάνση* / *schmalz* / calidior est Suilla; humectat, emollit, digerit.

Plebecula eo, butyri loco, Cibus condire solet. Puera quædam in Bojemia maximè, butyro in cibis præferunt. Num rectè & commodè, penes Medicos judicium esto.

Maximè tenuium est partium, ob id morlus in alto Corporum magis obtundit.

Recens ad Vulvæ vitia valet. Instillatus Auricularum infantium dolores levat, omnes durities solvit. Rigor Cervicis perunctione velocissimè curatur.

Si aqua Aurem intraverit, præcipuum remedium Anserinus adeps.

Phlegmoni medetur, Ignibus sacris, Labiis fissis prodest.

Acopis, quæ lassitudines & fatigationes tollunt, & Malagmaris, additur.

Cum Iridè nostrate pulv. permixtus, testæ nucis Juglandis inditus & umbilico appositus, Alvum solvit Infantibus.

Ova Anserina,

Χηρεία ἄνρας,
Γάνση Ἐγερ.

Crassioris sunt essentia, & ægrè digeruntur, gravem habent odorem, & fastidium pariunt. Mali succi. A pauperibus in cibum solummodò fixa recipiuntur.

D d 2

Villicæ

Villicæ feminæ Anseres, Vere & Autumno secundum femora deplumant, mollioresq; plumas avellunt, ex quibus Culcitræ, Cervicalia, & totos Lectos, ut mollius cubemus, parant. Pennæ majores & duræ Alarum, Scholasticis ad scripturam inserviunt, Schreibfedern/ Calami scriptorii.

Plebs superstitionis plena in festo Martini, cum pro more Gentis Anserem assum apponit, ex osse Dorsi, quod vocant das Rückbein / hyemem futuram prælagit. Si enim candidius sit, asperiores & graviores: sin verò fuscum subcæruleum, aut nigredine maculisqve infectum fuerit; mitiorem ac molliorem Hyemem fore annunciat: idqve vel prima vel ultima sui parte.

Lætamen, s. stercus Anserinum omnibus satis inimicum; potu tussis mitigat.

Anser nocturnas excubias celebrat. Horas enim noctis fures clangore prodit. Proprium ejus gingrire Schnattern.

Anser quadrupes.

Anser monstrosus.

Eine vierfüßige Gans.

Memini, dum puer essem, natum Anserem pedibus quatuor, binis anterioribus, & totidem posticis, in pago Mülsseiffen, non procul ab arce Greiffenstein: sed brevis fuit vitæ.

Ex omnibus Avibus frequentiora sunt in Anseribus monstra, ob stoliditatem & nimium humorem: ideoqve garrulum præ omnibus animal est.

Anser ferus.

Χλὴ δ' αἰγῶς δ' ἀγελᾷ.

Anser sylvestris, immanisvetus,

Anser cinereus major, Albert.

Eine Wilde Gans.

Grawe Gans.

Minor est domestico, cui ferè similis. Longus dodrantes circiter *iiii*. latus octo. Rostrum nigrum, utrinq; per medium croceum, apice atro splendente. Crura pedesq; toti

toti cum membranis ex totis
rubent. Color Capitis Col-
liq; fuscus, suprà magis ni-
gricans, & nonnihil rufi ha-
bens, inferiùs plus cinerei.
Venter totus, præter inferio-
rem partem, uropygium & a-
las versus, quæ pennis constat
albissimis, cinereus. Dor-
sum & Alæ nigrificant, admi-
xto obscuro rubore, præser-
tim in minoribus & superio-
ribus pennis. Margines in
nonnullis mediis maximè al-
bican, in aliis cinerei. Ma-
jores pennæ obscurè cæruleæ.
Cauda brevis ex rufo fusca,
apicibus rubentibus.

Coëunt post hyemale sol-
stitium, dein initio veris pari-
unt Ova ad summum quinq;
decim.

Ad lacus & piscinas majores
frequens. Hyemis ini-
tio segetes virides depopu-
lantur, ubi & retibus capiun-
tur.

Caro ejus dura est, nigri-
cans & difficilis concoctio-
nis. Juniores meliores, si,
priusquam coquantur, aqua
calida immersi fuerint, nec
ingrati saporis.

Lingva assata Calculosis
commendatur.

Fimus Lethargicos, & ute-
ro suffocatas reficit.

Anseres indomiti maximè
volaces sunt, Aëris alta pe-
tunt, volantque extento Col-
lo, ut Grues, ordine literato.
Vix à volatu cessant, nisi ne-
cessitate cibi. Silentes mi-
grant, nisi turbatus sit ordo:
tunc enim clamant.

Anser Grandinis.

Anser nivis.

Anser hybernus.

Cin Schneegans/

HagelGans.

Totus albus est, præter
Alarum extremas quatuor
vel quinq; remiges pennas,
quæ nigrae sunt.

Aestate nuspiam in conspe-
ctum veniunt. Hyeme in-
gruente sublimi volatu gre-
garim migrant.

Anser Arboreus.

Gesü.

Anser Arborum.

Anas arborea.

D d 3

Cin

*Ein BaumGans/
BaumEndse.*

Fero Anserem multo minor, est Anatis magnitudine. Rostrum ei nigrum, qui Color etiam Capitis est, sed cum splendore item Colli proni, Dorsi, Caudæ, Alarum.

Circa Oculos, & Gulâ totâ sive Collo supino albicat, ubi & maculis quibusdâ cinereis aut fuscis notatur, quæ in Pectore fusco magis nigricant, In ventre tum albæ tum nigræ apparent.

Pedes lati, coloris fusci.

Nidificat in arboribus cavis, in nidis Cornicum & Ciconiarum. Ova parit 13. 14. flaventia.

Anserum ferorum more volat.

Caro infravior est.

Aquila regalis.

Αἰτὴς γυναικὸς Arist. τὰς ἀτὸς ἰσσω, id est raptor impetu, & concitus feror: sive, ut aliis placet, imperium fa-

cio, quod in cæteras Aves imperium habere videatur.

Χρυσαιτός,

Vlyff Aldrovand.

Aquila quasi acuta, ab acutè videndo, vel ab aqvilò colore, id est, fusco & nigro.

Aquila aurea seu fulva.

Aquila germana, nobilis, vera.

*Ein Adeler/
Adeler/ quasi
Adel Ubr.*

Ὁρνέων βασιλεύς, Omnium Avium vivacissima ac solertissima, Regis imaginem representat, nec formosa nec canora, nec esculenta, sed carnivora, rapax, prædatrix, populatrix, solitaria, invisa omnibus, omnium pestis.

Aquilam veram & genuinam, plumbeo globulo trajectam, mihi communicavit nobilis Dominus Abrahamus à Lest in Langenau, cujus sceleton & pellem cum aliis adhuc refervo. Anno 1600. 28. Decembris.

Pondus

Pondus erat ℥. ℞ij. Longitudo ab extremo Rostro ad Caudam ultimam spithamarum ℥ij. Latitudo expansis alis spithamarum novem.

Rostrum ei hamatum seu aduncum, coloris cornei ad Indicem inclinantis. Membrana, quæ à fronte ultra Nares protensa est, nec freni, seu rictus luteæ sunt.

Color totius Corporis, Dorso, Colli, Alarum, ex fusco ferrugineus seu castaneus, maculis sparsim intercurrentibus albidis, paucis dorso, pluribus ventre, radicibus ubiq; albis.

Venter & Cauda circa uropygium obscure albicant.

Rectrices Alarum pennæ, Caudaque extrema nigra. Circa Caput & Collum ex fusco flavescit. Crura ad digitos ferè usq; plumosa ferruginea, punctis albidis respersa.

Singulos digitos tabellæ quaternæ semicirculares extremos integunt, excepto maximo anteriore, quem tres tantum annuli investiant, colore & magnitudine Tritici

Indici. Cætera squamulæ cooperiunt, ad granorum Milii majorem & paulo minorem magnitudinem.

Ungues adunci, nigri, quorum posticus quinque digitos in circumferentia longus, anterior quatuor, laterales breviores sunt.

Oculi maximi, quasi immersi profunda cavitate latent, superciliorum regione eminente, ad modum instar tecti prominentis, quos tunica quædam crassa, ab infra sursum exprorecta, inter nitendum cooperit, *ωγιοφ-δελμ'ορ* dicta, charopi, quibus in diluto virore splendor igneus intermicat, pupillâ saturi nigroris.

Humor vitreus luteo Topazii colore refulget; Crystalinus verò Adamantem fulgore seu luciditate representat, satis magnus, scissilis & apprimè solidus.

Gula seu Oesophagus, cum ad sex digitorum spacium descenderit, in insignè quasi ventrem, (Ingluviem vocant) membranosum dilatatur, qui inflatus, Aquæ ℥. ij. ferè erat capax.

Ab hujus exitu ad orificium Ventriculi, ad palmum & medium Oesophagi, porrio producitur primò quidem angustior, dein paulatim dilatata, post ultimam ingluviem membranofior ac candidior, ut prope Ventriculum carnosam tota ac rubicundior. Ventriculus parvus duos digitos latus crassus, cujus interior tunica rugis plena (Pulpa continet candidam æquale pinguedinis instar) Hunc amplexatur lobis duobus Hepar rubicundum, cujus cavæ parti vesicula inhæret olivæ magnitudine, succo felleo porracei seu prassini coloris turgens. Testiculus utrinque unus lumbis adhæret oblongus, Phaseoli vulgaris magnitudine.

Proprium ejus clangere & plangere.

Lepusculos, Anseres & alias Aves capit, ut non verè Rex, sed tyrannus videatur, Vitæ est longissimæ.

Hæc quam secui pingvissima erat, nec ferinum, ut cæteræ aves rapaces, olebat.

Pingvedo candida, omnium Avium calidissima; hu-

medantis, resolventis & digerentis naturæ.

Articulis resolutis, stupentibus, rigidis, convulsis & luxatis commodissimè illinitur, durities & nodos à frigore concretos dissipat, à me factò sæpius experimento. Oculorum nebulas discutit, & incipienti suffusioni occurrit,

Fel amarissimum, cum acrimonia calidum. Melle inunctum, visum recreat, Oculosque reddit acutissimos. Illitum, veneno Serpentum & Viperarum medetur.

Pellis cum plumis Abdomini imposita, Colicos juvat, & concoctionem promovet.

Aquila biceps, Signum Imperii Romani, postquam in orientale & occidentale dividi cepit.

Aquila marina.

Αλκυονες Aristotel.

Aquila Piscium, Aquila s. genus Aristotel.

Corvus piscator,

Ein Fisch Adler /

Fisch Ahr / sil. Ein Rohr-
Fasche.

Meer Adler.

Hanc nuper accepi à nobili Dom,

li Dom. Nicolao Zedlitz in Schildau, quem servitor ejus bombardæ globulo, dum in Bobero pisces venaretur, interfecerat. Miræ pingvedinis Avis, quæ tota piscosum odorem spirabat.

Longa erat spithamas iiiij. lata alis extensis spitham. viij & palmi unius. Corpore major Milvo. Rostrum aquilinum paulo minus.

Crura pollice crassiora breviora, squamosa; pedes hamati & coloris cærulei, digitis quatuor per superna ad dimidiam longitudinem etiam squamosis, ad reliquam incis, per inferna asperis, tenacitatis causa, & his tam validis, ut flexos vix ulla vi distendas. Hi firmantur ungibus nigris, acutis maximis Aquilæ ferè. Vertex Capitis illi erat albus, fuscis lineis longiusculis distinctus. Colore per summa fuligineo, per ima albo, Gutture maculis notato rufis, ut & pectore, Venter purè candido. Oculi in medio nigri, in ambitu aurei, retro quos macula oblonga nigra: Alæ fuscae præter tres extremas majores pennas quæ nigricant, & Cauda, (quæ lata dodrantem

& sex digitos longa) sed dilutius, cujus pennæ ex latere interno maculis latiusculis candidis insigniuntur, veluti & majores Alarum pennæ, sed obscurioribus. Cervix ei crassa & magna.

Haliæti genus suum non habent, sed ex diverso Aquilarum coitu nascuntur *Plin. lib. 10. cap. 3.*

Non solum circa Mare moratur, verumetiam ad flumina & stagna Silesiæ nostræ degit, & Arboribus insidens Piscibus insidiatur, quas clarissima Oculorum acie in vitreis ac profundis undis conspectos, ex alto sese librans, & in profundum aquarum se præcipitans, aquis pectore ruptis rapit.

Caro ejus cinerea ad nigredinem vergens, fibrosa, & dura, Cibo interdicta.

Axungia flavet mirè calida, tenuium partium.

Adipem, (ut ferunt) in Cauda preciosum reconditum habet, quem dum pendens in aëre piscibus exitium machinatur, guttatim supra pisces in aquam demittit, cujus vi Pisces attoniti quasi & torpescerent vertuntur supini: super quos mox recta

E e sese

sese præcipitem dejicit instar jaculi, & eos pedibus arripit.

Felle, Melle Attico permixto, inunguntur nubeculæ & caligationes & suffusiones Oculorum.

Aquila nigra.

Μελαναιετός, *Aristot.*

Αἰτός λαγωφόνος, *Aristot.*

λαγοθήρας,

Melanaetus, *Ulyss. Aldr.*

Aquilæ. 3. genus, *Aristot.*

Aquila pulla, fulva, Valeria, Leporaria.

Ein schwarzer Adler/
Schwarzer Ahr/ sil.

Hasen Geyer. Hasen Ahr.

Minor est reliquis, magnitudine ferè Gallinæ decumanæ, longitudine trium spithamarum, latitudine spithamarum vi. Rostrum ei aquilinum admodum aduncum, extremo nigro, quantum ham recurvum est, cætera corneo colore subcæruleo. Supra Narium foramina, rostri initium membrana quædam flavâ transversim obvestit: freni seu rictus oræ ubiq; luteæ,

Oculi pupilla nigra, Iris charopa, & ex luteo nonnihil rufescit.

Caput ei magnum, crassum, sic & Collum.

Vertex ac Cervix colore obscurè ferrugineo tinguntur, relucens passim albicantibus notulis.

Dorsum superius totum ex obscuro nigrum, seu fumati coloris.

Alæ ad ultimam caudam ferè exporriguntur, quarum pennæ majusculæ transversim nigris maculis colorantur, Remiges purè nigrae, superiores minores flavicant.

Cauda spithamalis longitudinis, alba lineis ad extremum latis transversis alternatim exornatur.

Inter Oculos & Rostri initium utrinq; pili rigent nigri.

Sub mento plumula horrida nigra, instar barbulæ extant.

Palpebræ inferiores candidæ mollissimis plumulis, quasi lanugine intertæ.

Pectus latiusculum ex flavedine albicat, maculis nigris latiusculis distinctum.

Venter totus niger, sub alis item & supra femora.

Crura

Crura non admodum alta, lineis secundum latitudinem ex obscuro ferrugineis distincta, tota propemodum plumulis cinereis operiuntur; præter lineam posticam, à digitis ad femoris initium, quæ cum digitis quaternis exquiritè lutea, tabellis ternis quaternis, ad ungues latiusculis, reliquis Milij instar minutis. obtegatur. Ungues toti nigerrimi, adunci, acutissimi. Lingua crassior, latiuscula. Testes ad Lumbos bini, Pisi Italici magnitudine. Ventriculus crassior, parvus, cui gula ampla præponitur, inter Hepar bipartitum & Intestinum hæret, bilis viridis vesiculâ conclusus.

Colit sylvas & montes. Hyeme apud nos maximè apparet.

Audacissima est, omnis generis Aves, Columbas, Monedulas, Cornices & Lepusculos sectatur, secundum illud:

Major in exiguo regnabit corpore virtus,

Pingvedo, quâ ubundat, articulariis affectibus commodè illinitur,

Pellis, detractis pennis majusculis, apparata frigidiori Ventriculo utilis. Investunt enim eam per universum corpus plumulæ, velut albissima lanugo.

Capta est aliquando reticulis Columbæ alligata, quavis sit astutissima.

Aquila nœvia.

Μόσφις, Aristot.
Morphno congener.
ηλάγος,
Κλάγος,
Νητοφόνος.

Ein Rößlicher Meuse
Ahr.

Magnitudine æquat Gallinam domesticam, longitudo ei spithamarum duarum cum dimidia. Latitudo alis extensis spithamarum quinque & digitorum trium. Rostrum aduncum nigro cæruleum, digitos duos longum, deorsum rectâ propemodum tendens, membrantula Capiti conjunctâ lutea, tunica, quæ

E c 2

tota

tota lanugine candida integitur; oculos integentis ora exterior flavet. Color totius corporis obscuré ferrugineus est, præter maculam in prona parte albam, quæ pectus veluti Zona adornatur. Mentum obscuré albet. Alarum remiges pennæ extremæ fuscæ, omnes transversim obscuris maculis tinguntur. Interiores autem pennæ albicant. Pupillam cæruleam subnigricantem circulus ambit baticus. Cauda similis cum Corpore coloris, ex duodecim pennis spithamæ unius & digitorum trium maculis latiusculis obscuris seu fuscis transversim insignitur.

Sub Uropygio albicat, & collum primum maculis longiusculis ceu lineis respergitur. Crura spithamam ferè longa: femora plumosa, ultra mediam tibiā, quæ crocea, ut & digiti, tabellis seu annulis luteis intecti, unguibus nigris acutissimis.

Mures ut gratum cibum devorare solet. Aviculas etiam, Anates & Columbas venatur.

Hanc vivam anno 1602. Decembri mense captam nobilis. Dominus Daniel Gut-

schius ad me misit.

Rariùs in hisce montibus occurrit.

Aquila Ossifraga.

Φῆνις ὡς ἀπὸ τοῦ φέναν.

Φηνὴ Arist.

Ossifraga Ulyss. Aldrov.

Harpe Oppian.

Aquila barbata Plin.

Sanguinalis Massur.

Ein Weinbrecher/

Stast/sil.

großer HasenÄhr.

Aquila omnium maxima.

Cujus longitudo ab extremo rostro ad ultimam caudam quinq; ferè dodrantum: alis verò extensis spithamas undecim lata. Rostrum ei aduncum admodum, adeo ut unguis solus pollicem adæquet: totum palmum longum, subnigrum & ex corneo colore fuscum, nonnihil ad subcæruleum obscurum accedens. Initium membrana quædam lutea ultra Narium foramina protensa investit, quæ finibus suis seu marginibus S. literam exprimit. Rictus palmum & digitos duos longus est. Lingva longiuscula lato apice, utrinq; hamatis appendicibus, duriusculis &

lis & corneis, & membrana
quadam tenui ad in ferio rem
mandibulam cōn nexa. In
ferior mandibula instar cana
lis excavata, oris sublati pa
latum utrinque subit, ejusq;
marginibus includitur, quod
medio rimam quandam ex
hibet, per quam pituita ē Ca
pite destillat. In Mento ob
longæ & angustæ plumæ ad
arunci speciem prominent:
quin & inter Oculos & nares
utrinq; plumulæ tenues villo
rum instar rigent. Color
totius Corporis subalbus, fu
scus, ferrugineus, albis macu
lis respersus Venter albidus
maculis latiusculis ferrugine
is notatur. Remiges pennæ
ex toto fusæ. Cauda ex
nigro & albo maculatūr. Pen
næ ea parte, quæ intrō spe
ctat, albescent; quæ extrā
fusæ sunt, mediæ duæ pro
miscuē notis albis conspersæ
majore ex parte fusæ sunt,
in extremo omnes nigrae;
quæ his ab extremo Dorso
incumbunt ferē totæ albicant,
paucō tamen nigro respersæ,
& nisi quod extrema nigri
cent. Femora & Crura fu
scis plumulis oblongis, ali
quando fulvescentibus seu
potius ferrugineis, ad medium

usque obteguntur. Infima
tibi arum pars quæ plumis de
stituta est, unā cum pedibus
intenso luteo tinctā est, &
squamulis rotundis inæqua
libus majore ex parte prædita.
Digitos superiores tabellæ
semicirculares ut in Chrysa
eto, vestiunt. Ungues ni
gerrimi splendentes ad amu
sim semicirculum explent.

Non minorum Animalium
solummodō, ut Anserum,
Anatum, Lepusculorum; sed
etiam majorum, veluti Capre
olorum, Hinnulorum venā
tu vivit. Quinetiam Pisci
bus victitare deprehensus est,
cūm plerunq; circa palustria
degit, veluti in baronatu
Trachebergenfi.

Integram aridam habeo ā
nobili Heinrico Geelhorn,
quam in montanis circa Svid
nicium bombardā interfecē
rat.

Ossifragæ Aquilæ venter
arefactus & potus, iis qui cibos
non conficiunt, utilissimus
prædicatur, & calculos cum
lotio pellere creditur: unde
contra Calculos & alias diffi
cultates Vesicæ commenda
tur.

Intestini pars extrema sic
cata, reposita & ventri alliga

E c 3

ta Intesti

ta Intestinorum dolores miré sanat.

Pedibus Nobiles quidam utuntur, ut iis imponant candelabra.

Insignis in hoc relucet pietas, non modó erga suam proplem, sed & alienam (veruntamen Aquilarum tantum) quæ ab iis excludi nequit, quam ejectionem excipit, & cum suis educat, conscia cognationis, quæ ipsi cum illis intercedit. Quo ipso insigni paterni affectus officio, reliquas omnes, quotquot sunt, Aquilas longé superat.

Actites.

Αἰετίνος
Aquilinus lapis.
Lapis Aquilæ,
Ein Adlerstein/
Klapperstein/

Lapis est prægnans, cortice duro rotundus, ut galla concavus, alium in se lapidem continens.

Plinius quatuor ejus recenset genera; hodie plura observantur magnitudine, forma

colore differentia; quorum aliquot genera inter mineralia refervo.

Quidam in Aquilarum nidis reperiri arbitrantur: hodie passim in Montium & saxorum commissuris gignitur.

Actites vi pollet exiccandi, adstringendi: sedat inflammationes Mammarum & Testium. Caduco Morbo correptis medela egregia.

Phylasterium est prægnantibus. Partus continet sinistro brachio adalligatus. Femori si suspendatur, adjuvare feminas parturientes, ut sine doloribus pariant, feminarum persuasio. Sed de his inter Fossilia.

Ardea.

Εἰς τὸν αἵμα ab ἑαῖς id est, sanguis & ἰδὴν quod est sudare. ὅτι ἑαῖς ἰδὸς quod sanguinem sudet.

Ardea quasi ardua, quod alté volet.

Ἀρδὶόλη
Ardeola

Tantalus

Tantalus.

Ein Reiger/Reither/
Reger/sil.
Reigel/Herrgans.

Vox ejus est κληῖς clangere.

Ardea subcærulea.

πείλας Arist.
Ardea pella, pulla,
cinerea.

Ein Aschensarbener Reger/
blauer Reger/sil.
grauer Reigel.

Longitudo à pedibus ad Rostrum extremum cubitorum duorum. Latitudo expansis alis Cubitorum trium, Colore dilutè cæruleo. Vertex Capitis & Alæ superiores obscurius cæruleæ. In Collo & Ventre juxta uropygium albicat, Collum ei longum. Rostrum acutum septem digitorum, fuscum superius, inferne flavet. Pedes spithamæ longitudine ex fusco cærulei, digitis fissis, quorum exteriores duo utrinq; tunica modicè junguntur, unguibus

nigris splendentibus, medio utroq; falcis instar serrato, quò Pisciculos facilius apprehendere possit. Mas in vertice Capitis pennas ferè do-drantales subcæruleas, ternas ut plurimum, rariùs plures retrò extensas conditas habet, quas partus tempore abjicit, magni valoris. Reger Se-deru.

Victum quærit ad fluvios & piscinas, ubi pisciculos non sine desiderio adnatantes devorat. Quidam enim pro certo asserunt, Ardeas hac vi pollere, ut ad pedem, si in aquam imposuerit, tanquam ad illicium quoddam seu ad escam frequentes Pisces adnatent; quibus ultrò accurrentibus & devoratis famem solentur.

In densis sylvis, non procul à ripis fluminum aut piscinis, super arbores altas, gregatim nidificat, veluti ad Viadrum, Bartham; olim satis frequenter in Abietibus altissimis, in sylva densa pagi Meiwaldæ extra Hirsbergam nidificabant; quæ etiamnum hodie ab Ardeis nomen retinet, der Reger Wald.

Coëunt

Coëunt cruribus super dorsum ~~feminæ~~ flexis, ita ut pedes Maris ad caput feminæ sint, & genua versus excrementi sedem super Dorsum: & tunc motu alarum se sustinens, locum conceptionis, feminæ contingit, ac semen infundit. *Albertus.*

Nonnulli Ardeam in cibum recipiunt. Caro piscosum sapit, fœtida & insalubris. Pulli præferuntur. Nocet iis, quibus hæmorrhoides fluunt.

Axungia semper prostat venalis in officinis nostris Pharmaceuticis. Illita podagricos lenit dolores, cum axungia Coturnicis, Oculorum nebulas discutit, & visum clarificat.

Instillatur Auribus malè audientibus.

Piscatores hinc frequenter utuntur ad inescandos pisces.

Illicium Piscium.

℞. farinæ Hordei.

Carn. Cancrorum ex chelis & caudis.

Placentæ Lini expresso oleo an. P. j.

Vitell. Ovi nu. iij.

Pingved. Ardeæ.

Ol. Laurini an vnc. iij.

Petrolei.

Camphoræ an. drach. z.

Croci Scrup. j. fiat mixtura, quâ inunguntur hami piscatorum. Mirè alliciuntur Pisces.

Ardea nigra.

Ardea *μελανοκίανος.*

Ardea pulla.

Ein schwarzer Reger.

Æqualis est Cæruleæ magnitudine. Tota nigra, præter Alas superiores, quæ cæruleæ visuntur.

In pago Gûsmansdorff territorii Hirsbergensis capta fuit.

Ardea candida.

Εἰς δὲ λευκὸς

λευκεῶδες Arist.

Ardea,

Albardeola.

Ein Weißer Reger/

Weißer Reigel.

Minor est subcærulea, rostro latiusculo, recto, coloris pulchri. Tota candida est. Alæ superiores paululùm ad cæruleum inclinant.

Cumulum pennarum, ut cæteræ, in capite gerit.

Rariùs

Rariùs occurrit. Pascitur
paludibus lacu, campis & pra-
tis.

Ardea rubra.

Ardeola littoralis.

Ein rodter Reger / Sand-
Reger sil.

Magnitudine est Cornicis,
Rostrum fusco tris. digitos lon-
go. Pedes phaeopæi, digitis
fissis. Caput acutum par-
vum, Collum longum. Color
Dorsi rubicundus, Ventre ob-
scure castido. Alæ ad cæru-
leum vergunt, remigibus pen-
nis nigris. Per medium Col-
lum & pectus linea candida,
digitum fere lata, à Mento
Ventre versus excurrit. O-
culi flavent.

In arboribus altis nidificat,
pisciculis & omnis generis pa-
lustribus insectis vescitur.

Caro ejus ferina, ingrata &
cibo inutilis.

Ardea stellaris.

Ασπίς ἰσθμίου Arist.

Ορν.

Ardea palustris vel Arun-
dinum.

Ardea stellaris, Piger co-
gnominatus.

Botaurus

Asinus

Taurus quod Boum mugi-
tus imitetur.

Ein Moos Reigel /

Rohr Reigel /

Moos Dchse /

Moos Kuh /

Rohr Trumm /

Rohr Trummel / sil.

Ab arundinibus & tuba,
quod inter arundines degere,
& tuba sonum reddere sole-
at.

Corpus ei tenue, tanquam
pulli gallinacei fere. Alæ ut
gallarum.

Color, per totum Corpus,
varius, subflavus nigris macu-
lis splendentibus densissime
respersum. Vertex Capitis ni-
ger. Alæ colore lateritio &
nigro punctatim distingvun-
tur. Rostrum fuscum, acutum,
longum. Crura longissima
ex viridi lutea. Ungues ad-
unci, longi, maxime qui Cal-
cis vicem gerit longitudine
sesquiunciam superat. Cau-
da brevissima. Collum lon-
gum mire plumosum obitnet,
quod contrahere & exten-
dere solet. Irritata mire in-
flatur ac intumescit, rostroque
se munit,

F f

Agre

Aegré evolat, nisi prius
salierit.

In palustribus degit, & a-
rundinetis passim occurrit :
solitudines amat.

Vescitur Ranis, Pisciculis,
Serpentibus. Autumni fine
sylvas adit, & mures captat,
quos integros devorat.

Rostro longo in aquas im-
misso sonitum ciet Tauri vel
Asini, qui ad dimidium ferè
milliare exauditur : idque
pluviae prognosticum est.

Nidum intertextit Arundi-
nibus.

Ova parit quatuor vel
quinque, Majo, Junio & Julio.
Exclusos pullos mater sub a-
lis fovet.

Sanguis Articulorum affe-
ctibus singulare remedium.

Autumno valde pingvescit.

Pinguedo calefacit, lenit,
mollit, scabiem sanat.

Ardea varia.

Nun. *Ardea* Gess.

Corvus nocturnus, Agric.

Caprimulgus, Turneri.

Corvus sylvaticus.

Albardeola.

Ein Dunder Neger /

Schild Neger.

Joeker / Joeker. sil.

Nachtram /

Nacht Kabe.

Avis est Piscivora ex Arde-
arum genere, sed minor, ma-
gnitudine Gallinae, longitu-
dine trium dodrantum & se-
mis.

Color Gulæ, Colli, Pecto-
ris candidus, Ventris verò, u-
ropygium versus & Crura ex
albedine flavescunt.

Alæ superiores & Cauda
dilutè cærulea seu cinerea.

Dorsum cum vertice Ca-
pitis ex virenti nigredine
nitet.

Rostrum obscurè rubet,
quatuor digitos longum.

Oris hiatus maximus.

Crura oblonga nigricant
cum rubedine, digitis fissis
modicè pellicula annexis, un-
gyibus aduncis, acutissimis,
nigris; inter quos medius ex
altera parte denticulatus est.

In vertice retrorsum Pen-
nae oblongae nivei coloris do-
drantales tres ut plurimum,
aliquando

aliquando plures Mari nascuntur, quas dum verno tempore pariunt, abjicere solet.

Magno veneunt precio. Iuvenes nobiles his pileos suos exornant.

Joctfedern.

Nidificat gregatim udis locis ad Viadrum, prope Steinam & Dubinum, nec non ad Plessoviam arcem Generosi Dn. Baronis ABRAHAMI à Promnitz. In Alnis alijsq; arboribus, & fruticibus densis, cum Cornicibus nigris similem nidum construit. Ova tria vel quatuor parit. Vox ei Ka, Ka, Ka.

Pisciculis pascitur, Ranunculis, Gryllis &c. Interdiu latet, vesperi & noctu absona voce molesta. Primæ omnium avolant, Verno tempore cum Ciconiis adventant.

In cibo à nonnullis Pulli laudantur, & in delitiis habentur; at succi minus probi.

Ob pennas, quæ Capiti innascuntur, gratae sunt, alias inutiles.

Inde proverbium apud Silesios natum credo: Du

bist ein loser Joctfe. in hominem levem, inutilem, vix ternis pennis dignum, Von dem nicht mehr als drey gutte Federlin kommen.

Atricapilla.

Μελανόκεφαλος, Aristot.

Μελανόκευφος

Συκαλὶς, Græc.

Καζογίτσα.

Ficedula, Bellon. Gesn. & Vlyß. Ald.

Passer fuscus gramineus.

Ein Mönchlin / sil. idest. Parvus Monachus.

Schwarzkopff / Grasespan.

Avis ex Currucarum genere; ei similima, Passere paulo minor, vertice nigerri-
mo. Supina pars tora cinerea seu fusca, Collo dilute caruleo & Ventre albicante, pedice subflavo. Rostrum mediocre, in extremitate nonnihil recurvum, supernè nigrum, inferiùs cornei coloris. Pedes glauci: ungviculis fuscis. Caret summæ Lingvæ acumine. Canora est.

F f 2

Nidificat

Nidificat in arboribus ca-
vis, & plurima parit Ova.
Pullos mira sedulitate alit.
Vermiculis vivit, etiam Sor-
bi alpinæ bacculis, quibus
Autumno, ubi admodum pin-
gis existit, etiam capitur.

Boni alimenti existit, faci-
leq; concoquitur, saporis sva-
vis & grati.

Frequentem ejus usum vi-
sum exacuere Dioscorides
testis est.

Ficedula & Atricapilla vi-
cibus commutantur. Fit e-
nim ineunte autumno Fice-
dula; ab autumno protinus
Atricapilla. Nec inter eos
discrimen aliquod, nisi colo-
ris & vocis est. *Aristot lib. 9.
histor. Anim. c. 49.*

Ego Atricapillam Vere &
Autumno deprehendi.

Aureola.

Lx 75802

Emberiza flava. *Gesn.*

Anthus seu Florus Orni-
thologi.

Ulyss. Aldrov.

Lagopus Crocea, *Eber. &
Feuc.*

Chloreus. *Long.*

Galbula, Galgulus.

Icterus.

Ein Goldammer/Sil.

Gaulammer/

Gelbling/

Geelgerst/

Embrig/

Emmerling.

Avis notissima, Passere pau-
lò major, Corpore longiore.
Maris pectus & Venter lutea
sunt: Feminae verò pectus
luteum, & venter pallidus est.
In Capite, Dorso & Alis, pen-
nis fuscis luteæ intermiscen-
tur. Juxta Uropygium ad
dorsi finem ex flavo ruber.
Rostrum firmum, breve, acu-
tum. Crura obscure flavent,
Ungvuli fuscii. Cauda lon-
giuscula est fusca, exceptis
utrinq; extremis duabus,
quarum oræ extremæ candore
nitent.

Æstate ad sylvas recedit,
in frutetis nidum suspendit,
& terna vel quaterna ova
parit.

Hyeme tota conspicua, cir-
ca villas, horrea, & pabula
commoratur, & gregatim
cum passerculis volat.

Vescitur hordeo, tritico,
avena, præter vermiculos.

Caro ejus tota flavescit,
Cibis grata est, & Ictericis
salubris.

Aureola

Aureola si spectetur, Ictericam sanari tradunt, & a-
vem emori.

Aurivittis.

Χρυσόμαϊτις *Peuc.*

Fringillamontana femina
Eid.

Fringilla aurea.

Ein Queck/

Quecker/sil. á voce.

Goldfincke/Quetschfincke/
Laubfincke/

Magnitudo ei Fringillæ,
quam alis & Dorso repræsen-
tat. Rostrum acutum fla-
vum, anterius nigrum. Pe-
des subflavi. Caput & Dor-
sum supinum cum splendore
nigrum, punctis flaventibus
respersum. Pectus & Alæ su-
periores ex rubro flavent,
Ventre albicante. Alæ inte-
riores croceo tinguntur colo-
re. Cauda fusca. Oculi pu-
pillam Iris Castanei coloris
obscuri ambit.

Sui generis avis, non femi-
na Pyrrhulæ, ut quidam opi-
nantur. Vox ei *Qvec, Qvec.*
sine cantu.

Vescitur Lini, Carduorum,
Cannabis & aliis feminibus.

Æstâte rarissimè conspicit-
ur, nec apud nos nidificat,

Vere & Autumno cum cæte-
ris aviculis montanis grega-
tim volat, & retibus capitur.

In cibum venit, ut Fringil-
la, sapore nonnihil amari-
usculo. Ictericis & Cache-
cticis prodesse Quidam cre-
dunt.

Bombycilla.

γνώφαλος *Bas. Fabri.*

Αμπελις *Arist. Vlyß. Aldr.*

Fullo *Eber. & Peuc.*

Garrulus Bojemicus *Gesn.*

Galerita varia

Microphœnix *Fabr. Padu-
ani.*

Incendiaria *Nennull.*

Gallulus sylvestris ob Ca-
pitis cristam.

Incineraria

Zinzirella á voce quæ ei
Zi. zi. ri.

Ein Seideschwanz/ *Silesi*
Schneefesche/

Behemle/Schneevogel/
Wipstern.

Avis colorum varietate e-
legans, á plumis tomenti mol-
libus sic dicta, major Cocco-
thrausto, minor Turdela,
Rostro fusco Pâsseris dome-
stici Pedibus cum splendore
nigricantibus

Ff 3

nigricantibus: Oculis rotundis Cinnabarinis.

Capitis quodammodo compressi vertex anterior & lateralis rubore ferrugineo tingitur, quem linea nigra à Rostrum per Oculos & medium caput circumscribit, apice in summo retrò vergente more Upupæ, coloris ex cinereo rosei. Mentum atrum utrinque; Mandibulam inferiorem versus macula alba & rubra. Collum cum pectore, dorso & alis superioribus ex cinereo rubent, dilutius in collo, obscurius in Dorso, sed prope uropygium leucophæum. Majores alarum pennæ nigræ sunt, interiores subcinereæ ad nigredinem tamen declinantes, punctis triangularibus per transversum in medio lineam albam constituentibus, apicibus extremis partim flavis partim albicantibus, partim minutis donatur sanguineis. Cauda maris decem, feminae duodecim pennis constat, inferior tota lateritii coloris, in radice coloris murini; superius nigricat, tota extremitas lutea est.

Avis est gregalis, simplex

& stolidi, quæ facillimè capitur.

Baccis vescitur Sorbi aucupariæ, Juniperi Ribesii insipidi, pane, carne, inclusa.

Æstate nunquam apparet: hyberno tempore ad nostros montes, nec quovis anno, advolat.

Editur assa, at minus savoris ejus caro, nec adeo probum gignit succum.

Cum turmatim apparent, Vulgus habet pro malo omine, & pestem seu famem portentare credit.

Bubo.

Βυὸς Βοῦφος

Βούταλις

Bubo *Gefn.* à bovis mugitu, quem imitari videtur.

Bubo maximus, montanus, alpinus.

Ulula major à fletu, Chalcis *Goropii.*

Ἐν Πυθῳ/σίλ.

Βῆν/Βεργῆν/
Βῆν.

Avis

Avis est feralis, omnium nocturnarum maxima, inauspicata & solitaria, plumis ornata, specie noctuæ similis. Caput habet magnum, Corpus Anseris magnitudine, breve tamen & quasi decurtatum, ac colore varium, Rostrum curvum, ungues nigros, aduncos, acutissimos, Oculos grandes lucentes, igneos, Cruera quàm Aquila breviora. Corporis tegmen plumeum, ferrugineo seu fulvo ac obscuro quodam æris est colore, maculis fuscis adornato.

Bubulat horrendum ferali carmine Bubo.

Deserta colit dira & inaccessible, noctis monstrum. Latet in tenebrosis Montium & rupium cavernis. Vivit ex carnibus, Aviculis, Muribus, Ranis, Vespertilionibus. Lepusculos etiam persequitur.

Nidis eligit rupes altissimas & invias, ne fetus suos injuriis exponat. Tria ut plurimum, raro quatuor parit Ova.

Bubones à mensis arcent

longissimè Silesii, utpotè impuras Aves, & in Sacris vetitas,

Caro & sanguis Asthmaticis & difficulter spirantibus conferre creditur.

Cerebrum, cum adipe Anserino mirè vulnera glutinat, scabiem verò cum Aphroniæro.

Adeps ad claritatem Oculorum facit.

Fel Albugines, Suffusiones & Caligines discutit,

Oculorum cinis collirio visus claritatem efficit.

Crus ad paralyfin, ulcera & Cancros prædicatur.

Pluvias denotare, si præter solitum ululet, Monticolæ observarunt.

Ejus apparitionem mali ominis esse, aut bellum, aut famem, aut mortem prætere, vetus persuasio fuit, ad seculum nostrum derivata.

Referam

Referam, quid egomet
observārim. Accidit, quód
dum in vicinia ante annos
duodecim, item ante bienni-
um, Nobiles duos magni no-
minis, ægrotantes in viferem,
Bubo insolito more fenestras
Arcium, & quidem ejus hypo-
causti, in quo decumbebant,
advolans, tristi ululatu eorum
mortem quasi præfagierit,
qui paucis post hebdomadis
huic Mundo valedixerunt.

*Ursinus in sua proso-
popaia.*

Adferat an Bubo dirum mor-
talibus omen.

(Ut referunt) Bubo quem
tibi mitto docet.

Quærito Mæcenas laudes &
commoda rerum:

Deme sed auguriis omini-
busq; fidem.

Bubo inquit.

Si nulli noceo, volucres si in
retia duco,

Cur me dirum omen vul-
gus habere putat?

An quia culminibus carmen
lachrymabile fingam,

Sic me fortunam fingere,
Stulte putat?

Sortis quisq; suæ faber est, cur
improbe sortem

Accusas? fortis si faber ipse
tuæ es?

Adde, quód ipse Deus fato me-
liore gubernat

Res Hominum: FIDAS, (si
sapis) ERGO DEO.

Caprimulgus.

Αἰγὸδῆλκς Arist. παρὰ τὸ ἐξ

Αἰγὸς τε δὴ λακύναι.

Fur nocturnus Plin.

Νυκτικὸς ὄξ Nonn.

Connilus nocturnus

An Caprimulgus Bellon?

Ein Nachtschader sil: quód
noctu ad prædam volet.

Tageschläffer sil: quód in-
terdiu lateat.

Nacht Räbſin/

Nachtvogel/

Waff/Eber & Peuc.

Avis nocturna Cuculo pau-
ló minor; sed præterea adeó
illi similis, ut Cuculum jures
nisi inusitata Pedum Cru-
rumq; exilitas & brevitás, &
diversa constructio obstaret.
Ab extremo rostro ad ulti-
mam caudam dodrantem &
pollicem longus est, Rostro
perquam exiguo, nigro, mo-
dicum adunco, plumulis gra-
cilimis, tanquam pilis quibus-
dam, superné ad Nares, & in-
ferné seu Mento ceu barbula.

Caput

Caput vertice longo ac compresso: Oculi grandes admodum. Iris, Pupilla prorsum nigra. Quæ totum corpus investiant plumæ medio iuxta Calami ductum utrinque nigrae, extremo apice albæ; cætera leucophea sunt: quare Accipitrinam speciem præ se ferre videtur. Remiges alarum tantum nigrae, maculis subluteis interstinctæ. Tegetes in primo aut altero ordine per transversas alas maculam ducunt. Gula, Pectus Venterq; tota ferrugineo colore diluto, & notulis seu lineolis fuscis haud continuis transversis, uti in Accipitribus quibusdā resperguntur. Cauda perinde pari ex intervallo nunc nigris nunc ferrugineis maculis vicissim exornata, quam remiges longissimæ binum aut ternorum ferè digitorum spacio superant. Femora crassiuscula, & Pedunculi exigui, tenues, breves, coloris ferruginei. Digiti terni antè, retrò unicus, contrà atq; in Cuculo. Os in maximam amplitudinem deducit, cujus interior pars flavet. Molliter volat.

In vicinorum Montium sylvis aliquando occurrit.

Latet in densis frutetis. Parum clarè interdiu videt, sed noctu perspicax est.

Nidificat in terra, & Ova Columbinis similia parit duo aut tria cum plurima,

Nonnunquam à Venatoribus & canibus venaticis excutatur, qui paulatim quasi cæcutiens cum strepitu erumpens, mox iterum decedit & occultatur.

Pingvis est, & cibo utilis.

Quamvis greges Caprarum in Sudetis frequentes sint, nullibi tamen à pastoribus observatum fuit, diligentiori inquisitione facta, Caprimulgum aut aliam Avem advolasse, earumq; ubera suxisse.

Carduelis.

Ακανθίς ἀπὸ τῶν ἀκάνθων.

Χρυσομυτίς Ulyss. Aldr.

γὰρ δ' ἐλὶ vulgò

ποικιλίς Veturib.

ῥεῖν πῖς Arist. Gaz. Hermol.

Aurivittis vlyss. Aldrov.

Zena id est Avis Jovis,

Kyran.

Ein Stieglitz/sil.

Distelvogel/

Distel Finck/

Nottfogel.

G g

Avis

Avis est parva, etiam pueris nota, cui Dorsum cinereum & fuscum.

Alæ croceo colore nigroq; mixtim & alternatim variatæ, albisq; maculis notatæ. Vertex nigricans, Rostrum acutum subrubens apice fusco. Oculi ambitus exterior niger, hunc miniatus, minutum cæsius circumdat. Pedunculi subrubent, digitifusci, unguiculis nigris. Femina minus cantu & pulchritudine valet, Alas habet cinereas, guttur album, Caput rotundius.

Carduorum semine victitat; inclusa caveis, etiam Cannabis, Rutæ, Lini, Rapi sylvest, Myagri, Papaveris, &c. In 20. annum vitam producit.

Nidum in truncis Arborum construit, ubi quinque ut plurimum excludit, Bis parit, Aliquando in hypocaustis pulli-
tiem educit.

Visco & retibus capitur.

Boni est succi & facilis digestionis in cibo sumta.

Assam, scabie, Iliacâ & Co-

licâ affectis prodesse, Kyrandes scripto, prodidit.

Svavissimè cantillat, non solum cum libera arborum ramis insidet: sed etiam caveis inclusa.

Epilepsia sæpè corripitur.

Imperata facit, nec vocetantum, sed & ore & pedibus, quibus pro manibus utitur. Ergastulo enim clausa suppositam aquam filo appensam, in vasculo pedibus & rostro attrahit ab imo.

Ciconia.

Κικονέον, Varino.

πελαγός, quod Alarum pennæ partim sint nigrae, partim albæ.

Ciconia, quasi Cicania, a sono quo crepitat, quem rostro quatiente facit.

Ein Storch / ἡ παρὰ πῶ

Storch / ἡ σαργῶν, ἡ

Elbiger. ἡ mirabili il-

lo affectu & amore, quo parentes prolem prosequuntur, & proles illos vicissim.

Avis cuius nota, mediæ magnitudinis inter Gruem & Ardeam, pennis albis & nigris

gris distincta. Crura obtinet longa, rubentia. Rostrum gruinum, longum sed rubrum & crassum. Lingvam habet subrubram brevissimam. Unde á Quibusdám creditum fuit, carere illam lingvâ.

Glottorat immenso de turre
Ciconia nido.

Serpentum hostis. Ranis, Lacertis, Cæculis, Piscibus, & Angvillis vescitur. Bis in ejus ventriculo dissecto, Avicularum ossa reperi.

Nidos in summis tectis, aliquid in summis fumariis & turribus extruit.

A pauperibus in cibum venit. Carnem habet flavam, duram, difficilem concoctu, & pravi succi.

Asa si semel anno edatur, præservat á podagra, chiragra, Tremore, & aliis Nervorum passionibus. *Kyranides.*

Fel ad Oculorum vitia commendatur.

Axungia podagris & tremulis articulis utiliter illinitur.

Acstatis est nuncia. Hyeme exacta nidum veterem repetit, quem á sordibus hy-

berno tempore collectis repurgat & instaurat.

Ova parit Anserinorum magnitudine & colore. Unum fœtum ejicit Domino loci illius, vel ut Deo decimas solvat.

Ciconiæ fœtus suos supra omnium Avium genera studiosius fovet, & magnis periculis adjuyant, etiam cum propriæ vitæ periculo. Nam conflagrante ferè toto Delfio Batavorum oppido, Parentes filios adhuc ad volandum impotentes, ab incendio protegentes, alis illos contexisse, rostro detulisse ac pedibus, ut eriperent, & ne officium intermitterent paternum, nunquam deseruisse, quin potius Mortem cum illis sustinuisse, propalam visæ sunt Anno 1086.

Sic etiam proles jure parentibus beneficium rependit. Eos enim senio confectos, & ad volatum invalidos, suis alis huc illuc gestant ut nutriantur, & si cæci fuerint, cibum eis ingerunt, singulare nobis pietatis & virtutis imitandæ exemplum præbentes.

G g 2

Hyeme

Hyeme loca calidiora quæ
runt Africa & India, inju-
rias frigoris fugientes. Quod
& Hollandi testantur, qui
cum ante quinquennium No-
vas terras inquirerent, Men-
se Januario in Insula quadam
Maris Indici, Ciconias pluri-
mas conspexerunt.

Abituræ, quod fit sub æsta-
tis exitum, circa Idus Augusti,
in certo loco congregantur,
comitataque, sic, ut nulla sui
generis relinqvatur, nisi ca-
ptiva & serva. Remigrant
ad patriam sedem circa x.
Calendas Martii.

In Thessalia capitale fuit
Ciconiam occidisse. *Plin. libr.*
10. c. 23.

Ciconia nigra.

Ciconia fusca.

Ein schwarzer Storch/

Color Dorsi subniger, cum
viridi vel subcæruleo & pau-
co purpureo mixtus. In Ven-
tre & lateribus sub alis albus.
Rostrum magnum, validum,
punicem, ut Crura etiam &
pedes. Alarum majores seu
remiges pennæ atræ.

In palustribus & humidis
locis aliquando conspicitur.

Nidum parat in Abietibus:

& Piscibus, Ranis &c. in ci-
bo fruitur.

Ferini admodum odoris est
& ferè piscosi.

Axungia Podagricis com-
mendatur.

Coccothraustes.

Κοκκοθράυστες *Hesych. & Va-*
rin. Gesnero.

Coccothraustes *Crnithol.*

Vlyß. Aldr.

Ligurinus major *Eber. &*
Peuc.

Cinclus *Nonn.*

Ossifragus

Gemmivora.

Ein Leske/Kirsch Leske/sil.

Steinbeisser/Kirschschne-
ler/

Eyssticker/Kirsch Fincker

Eber. & Peuc.

Klepper/Helvet.

Wollenbeisser/

Pauló major est Alauda seu
Fringilla sanguinea, sic dicta,
quod rostro suo coccos & in-
teriora grana sive ossicula
Ceraforum confringere sole-
at, ut nucleis vescatur. Ro-
strum ei insigniter magnum,
pro Corporis magnitudine
durum, validum, breve, cras-
sum, fuscum, tantillū, subru-
bens. Color Capitis charo-
pus vel

pus, velex flavo rufus, in pectore & ventre ex cinereo rubicundus, cum macula sub gutture nigra. Pennæ alarum superius nigricant, in medio albescent, in imo Indici sunt. Collum pronum utrinque ad latera plumis vestitur cinereis. Dorsum ex rufo nigricat. Propius Caudam nigrae sunt pennæ, extremæ albicant, præter medias duas quæ totæ cinereæ.

Vescitur gemmis Arborum, fructu Juniperi, Sorbi alpinæ, nucleis Ceraforum &c.

Æstate raró, Autumno & hyemis initio frequentius in sylvis montium conspicitur, & laqueis ut Turdus capitur: nec quotannis gregatim volat.

Cantus ei peculiaris, Cymbalorum ferè æmulus, non insuavis.

In cibo cedit. Caro ejus non improbat, quævis sit amaricantis saporis. In Cibo Calculosis proficius.

Vt Caput magnum, sic etiam ingenium crassum & stolidum obtinet.

Columba.

περὶ τῆς οἰκίδ' αὐτῆς, καὶ τοῦ περιστερῆος

ἐστὶν, ἃ nimio amoris affectu.

Ein Taube/Teubin.

Columbus mas

Ein Teuber.

Columba domestica.

Columbarum duo sunt genera. Unum καὶ τοῖς οἰκίδ' αὐτῶν, domesticum, quod cibo domestico intra limina pascitur, & nobiscum ferè degit.

περὶ τῆς οἰκίδ' αὐτῆς, Gale

Columba domestica,

Columba Cicur,

Columba Cellaris,

Zahme Taube/

Heimische Taube/

Schlag Taube/Blug

Taube.

Avis est domestica, simplex, pulveratrix, notissima, cujus in colore, magnitudine & figura, magna varietas observatur.

Aliæ enim sunt magnæ, aliæ parvæ.

Quædam candidæ, aliæ cæruleæ, aliæ atræ, aliæ purpureæ, aliæ variis coloribus exornantur.

Nem quædam planum verticem habent, quædam cristatis sunt capitibus. Nonnullæ Cruribus donantur totis hirsutis

G g 3

cutis ad extremos usq; pedum digitos, plurimæ his carent.

Columbarum Ventriculo ingluvies præposita est. Lien exiguus.

Fel aliis Ventri, aliis Intestino jungitur.

Vulgus eas felle carere credit: inde proverbium apud Germanos vulgatum. die Tauben haben keine Galle/ sind der Leute aller.

Vivunt feminibus Cereali- bus. Agris sationis tempore in- commodant.

Coëunt Columbæ Mare feminam ascendente: Sed ut plurimum antea sese mutuò exosculantur: sæpè femina Marem sine osculo admittit. Ovid.

Oscula mox junges cupidas imitata Columbas.

Pariunt obscuris ædium locis, omnibus Anni temporibus, pullosq; educant, si locum apricum habeant & cibum: sin minus, æstate tantum fœtant. Ova pariunt candida magna ex parte bina, propter caliditatem quatuordecim diebus foventur & excluduntur. Inter omnes vo-

lucres Columbarum collegi- um fœcundissimum.

Ad annum octavum vi- vunt.

Et castus Turtur atq; Co- lumba gemunt.

Columbæ carnem habent admodum biliosam, sangvi- nem moderato crassiorē & calidiorem gignunt, atq; ob id febres nonnunquam accen- dunt.

Renes frigiditate dolentes juvant, semini genitali & san- gvinis adjiciunt.

Veteres propter caliditatem nimiam & siccitatem, conco- ctionisq; difficultatem à cibis abdicantur, durioris alimenti & improbi.

Fimus Columbinus Tau- benmist/vehementius excale- facit, attrahit, rubificat. Cum hordeacea farina mistus, stru- mas ex aceto dissolvit. Car- bunculos emarginat cum Mel- le, Lini semine & oleo. Are- factus tritusq; cum Nasturtii semine, inveteratos Coxendi- cis, Cervicis & Lumborum do- lores, podagras & Arthritides omnes exstirpat.

Adversus inveteratos Capi- tis dolores, nimirum Hemi- craneam

craneam & Cephaleam á Galeno commendatur.

Columbarum Pulli.

παραγεῖται
παραγεῖται
Columbuli
Pulli Columbini
Pipiones
Junge Tauben/
Teublin.

Hæ á Nostratibus saltem in cibum recipiuntur. Vere salubriores, uti & pingviores censentur quàm Autumno, & omnino calidiore tempore deteriores, Convalescentibus utiles.

Assæduntur, & infarctæ, mixturâ ex ovis, pane candido, lacte ping. add. Passulis, Cepis, Croco, Macis, Petroselinio, Majorana &c. paratâ. Elixantur etiam á Villicis, & in sartagine coqvuntur.

Humidæ sunt & calidæ 2do. gradu, crassi succi & excrementitii.

Sanguis sub alis venâ incisa, Oculorum suffusionibus, lusciosis, recentibusq; vulneribus prodest: peculiariter cruorem Cerebri membranis erumpentem inhibet.

Columbino sanguine Moschus adulteratur.

Ex proprietate chronicum Capitis dolorem gignere, & Oculis obesse esum Columbarum, Rhazes testatur. Hinc forsitan inolevit consuetudo, ut eorum Capita tanquam innocentissima pars in occisione truncentur & tollantur. Quod hodie etiamnum á plebeis observatur.

Columba cristata.

Columbæ Cypriæ,
Köppichte Tauben/
Cæteris ceu nobiliores præferuntur.

Columba cristæ.

Vollechte Tauben/

Columba dasypodes.

Columbæ hirtipedes.
Columbæ Russicæ,
Rauchfüßige Tauben/
gehörsere oder Neussische Tauben.

Columba Norvegica.

Columbæ niveæ maximæ,
Norvegische Tauben.

Hodie

Hodie ad nos affertur ex Svecia seu Norvegia. Columbarum genus maximum, magnitudine Gallinæ ferè, candoris niveo, cristato vertice & pedibus hirsutis.

Apud nobiles & divites captivæ aluntur.

Columba fera.

Alterum Columbarum genus est agreste, *νομαδινός. πτελίας Aristot.*

Livia à livore quasi Livida

Columba agrestis sive saxatilis *Varr.*

Columba Cavernarum.

Ein Wilde Taube/

Loch Taube/

Holz Taube/

Duplices sunt: Aliæ.

Saxatiles.

Turricolæ *Scaliger.*

Columba Livia *Vlyß. Aldrov.*

πτελίας Arist. Eidem.

Columba cavernalis *Alb.*

Palumbella *Ital.*

Stein Tauben/

Turn Tauben.

Quæ maximè sequuntur turres, in quas ex agro evolant suapte sponte, ac remeant

Pauló minor est domestica. Plumis penè liver & nigricat, pedibus rubris scabro-
tisq;. Alarum majores pennæ, & caudæ extremitas nigra. Collum pronum, & ad latera ex subviridi purpurascit.

Aliæ.

Arborea.

Ορνίς Arist.

Oenas seu Vinago *Vlyß.*

Aldrov.

à colore quo Uvis maturnis nigris similis.

Columba montana.

Holz Tauben/

Kol Tauben/

Blawe Tauben/

Wilde Tauben / simpliciter sil.

Magnitudo ei cum domestica. Rostrum Cinnabarium longum, in extremo acuminatum. Caput totum, Venter & Alarum pennæ sunt cinereæ, ad cæruleū vergentes, exceptis remigibus quæ nigricant. Cervix viridis est, intercurrentibus nigris plumis. Pectus circa initium quodammodó ex ferrugineo ad fumatum accedit, Cauda versus uropygium cinerea: cætera nigra.

nigra. Pedes rubri, ungues nigri.

In arboribus sylvarum excavatis, montosis locis nidificant.

Autumno gregatim volant, & retibus, appositis alleatricibus excacatis, vulgò *Stelle Tauben* / *Stahl* / capiuntur.

Præferuntur in cibo domesticis, utpotè minús excrementitiæ.

Assæ vel nigro liqumine elixæ mensis afferuntur.

Columbi Mares in Cibo, membris trementibus ac resolutis, & lingvæ ad loquendum profunt.

Fimus peculiariter contra Argenti vivi potum valet.

Columba fera tripes.

Columba monstrosa.

Wilde dreyßigige Taube.

Hanc Civis quidam Gryphibergæ ad Qvadum fluvium inter alias ceperat, ante annos viginti.

Cornix cinerea.

Κορών quasi κρών á κρύω á vocis asperitate.

Κέραιες Hefych.

Κορών, Κουρών

Κορών σποδοειδής.

Cornix varia Gesn.

Cornix hyberna

Eine Schilt Krahe/sil.

Nabelkrane/

Winter Krahe/

Avis est voracissima, Corvini generis, sed Corvo paulò minor. Caput, Collum inferius, Mentum, Rostrum, Alæ, Cauda, Crura admodum nigra, qui tamen color in Mento, Rostro atq; illa parte, quæ supra Stomachum est, tanquam setis quibusdam tecta, multò intensior est. Dorsum totum, Collum superius, Alarum latera, Nates & totus venter cinerea.

Lingva bifida, crassa, subcærulea.

Pamphaga est Qvadrupedum, Hominum infelicitèr mortuorum, & in crucem sublato, deniq; & Piscium carnes affectat. In fruges pariter vermesq; & omne Insectorum genus sævit.

Toto anno obvia est. Vere & Æstate in sylvas avolat, supra Abietes & Pinastros nidulatur. Ova parit quatuor quinq;. Circa Autumni initium ad plana descendit, ibiq; totam post hyemem prope op-

H h

pida

pida & pagos, velut inter homines degit.

Cornicis vita est longissima, utpoté cui multas (id est novem) ætates dederit *Hesiodus* :

Ter tria secla Hominis transmittit garrula Cornix :
Quattuor & peragit Cornicis tempora Cervus.

Caro tetrum spirat odorem, succi pravi, biliosi & putridi; ob id á Culinis prorsus abdicatur.

Cerebrum illitum, pedes frigore ustos sanat. Ad eadem á plebecula Pingvedo usurpatur.

Scribit *Plinius lib. 10. cap. 43.* sese vidisse Cornicem in urbe Roma é Betica, exprimentem plura verba ordine contexta, & alia atq; alia crebró addiscentem. Forsan de Corvo intelligendum.

Cornices clamorem nimium, seu crocitationem frequentem pluvias præfagire, etiam Pueri norunt.

Crocituq; gravi pluviam increpat usq; morantem.
Politianus.

Cornix nigra frugilega.

Κερώνη σπερμόλογος,
σπερματολόγος.

Cornix granivora, *Longol.*
Cocis, *Albert.*

Cornix frugivora, *Vlyß.*
Aldrovius.

Ein Kooche/ sil. Kooche.
Kouch/ forté á rostri scabrioris asperitate.

Schwarze Krane.

Tota nigra est, Rostro, Cruribus & toto Corpore undiq; nigerrimis, ita, ut præ nigredine splendeat. Rostrium prope Caput albicans asperiusculum, durissimum, firmissimum ad instar Cornu, oblongum, haud aduncum, sed acutissimum. Reliqua habitudo Corporis Corvo similis; at multó minor.

Frugibus maximé inhiat in agris, neq; terræ interim lumbricos aspernatur. Carnes non gustat.

Vere gregatim ad pagos & oppida in cæmiteriis maximé supra arborum cacumina, Tiliæ maximas, *Quercus* & *Alnos*, nidos parat.

Molestæ

Molestæ sunt, dum pari-
unt, obstrepero sonitu, & no-
xiâ Agricolis, dum semina
recentia in agrum recondita
devastant ac depascunt.

Hyeme abeunt, post æqui-
noctium vernum revertun-
tur, Aestatis nunciæ

Pulli pingves in pauperum
mensas veniunt.

Carnes in longissimis Mor-
bis utiles prædicantur.

Cerebrum coctum come-
stum, Capitis doloribus auxi-
liatur.

Fimus alpos discutit,

Cornix candida.

Eine weiße Krähe.

Hæc aliquando albo visi-
tur colore.

Cornix caerulea.

Cornix fera, sylvatica,

Cornix picta,

Pica sylvestris, Eber. &
Peucer.

Psittacus germanica.

Ein Mandelkrähe/ von
Mandeln.

Krähe/ á voce, siles.

Heiden Elster/ Eb. & Pe.
Kugel Elster/

Holskräe/

Galgel Kegel/

Gals Kegel/

Deutscher Papagen.

Avis est pulcherrima, & pen-
narum venustate nobilissima,
sylvestris planè & imman-
sveta, Magnitudo ei Mone-
dulæ, minor Cornice. (Lon-
gitudò dodrantalis & vij. di-
gitorum: Latitudo trium spi-
thamarum) Rostrum acu-
tum, nigrum, crassum. Crura
obscurè flavent, proportionè
Corporis parva, unguiculis
nigris. Cæruleo colore passim
nitet, in Capite, Alis, Cauda,
circa uropygium, & tota parte
supina, alibi sinceriore, alibi
admixto viridi. Dorsi & Col-
li proni color subflavus est,
tantillum Cupri colorem e-
mentiens. Venter dilutè vi-
ret, Pectus varium ex flavo,
rubro, viridi & albedo per-
mixtum. Majores alarum
pennæ nigræ, intrinsecus cæ-
ruleæ, minores ex utrisq;
mixtæ. Fauces intrinsecus
flavent. Lingva bifida.

Aestate in sylvis densis
non frequentatis solitaria
vitam agit. Nidum ut U-
pupa ex oleris construit.
Messis tempore cùm jam fru-
menta colliguntur, & ma-
nipuli in acervos, vulgò

H h 2

Mandelu

Mandeln á numero qvino & denario comportantur, in campis, pascuis & secus vias conspicitur.

Vivit ex seminibus, vermibus, scarabeis, nec non projecta Cadavera arrodit.

Autumno admodum pingvis efficitur. A nostratibus in cibum recipitur, saporis boni & grati.

Corvus.

Ο κόραξ á colore nigro. Κόρος enim nigrum est : vel παρὰ τὸ κέρας μεγάλην ἔχειν á Capitis magnitudine.

Κόρακας

Ein KolRabe/

Rabe/

Rappe.

Avis est notissima omnium nigerrima, Corpore & Rostro crasso, fera & crudelis in natos. Huic est atrox adeo intensus, ut præ nimia nigredine cæruleus quodammodo appareat. Vice Ingluviei gulam habet amplam & patentem. Fel aliis ventri, aliis Intestino adhæret.

Non in uno loco degit, cum sit polyphagos, & penè pampagos sive omnivorus. Modò humidis locis, modò agris

cultis, modò locis desolatis, sæpè in mediis urbibus & in cellis ædificiis, turribus & altissimis Arborum cacuminibus nidum construit.

Martio Aprili Ova parit tria, quatuor, quinqueve subflaventia, punctis nigris maculata.

A cibis abdicatur ob pabula immunda, quæ sunt magna ex parte ex cadaveribus Hominum, Piscium vel aliorum animalium.

Corvi duo, Vere è nido sublati, combusti, & in levissimum pulverè redacti, drach. j. pondere. ex aqua decoctionis Castorei, Epilepticis utiliter propinantur.

Cerebrum Corvi cum verbenæ stillatio liqore Comitialibus prodest.

Cinis ad Podagram, alphas, Lepras & similia utilis.

Pennæ seu Calami Pictoribus ad icones subtilius delineandas, & Organistis ad Musica instrumenta eliguntur.

Facile mansvescit. Ingenio benè valet, & ad loquendum edoctus. Brutorum sæpè quamplurimum & hominum vocem solertissimè imitatur. Vitæ est longissima.

Ante annos circiter 24. Magnificus

Magnificus & nobilissimus Dom. Johannes Schaffgot-sche Corvum jam cicurem factum multis aluit annis, qui liber extra arcem Greiffenstein in vicinas sylvas evolvit, ac sponte rediit. Accidit ut Corvus, relicto suo domicilio, cum aliis Corvis adventantibus peregrè avolaret: Coqvus ejusdem loci post annos paucos per Silesiam iter faciens, in libero aëre Corvum crocitantem animadvertit. Corvus hunc agnoscens, utpotè à quo sæpè cibatus fuerat, ex alto sese demittit, eiq; adeo familiarem reddidit, ut eum manibus caperet, & domum reportaret.

De quadam Corvorum specie scribitur, quòd pullos suos exclusos negligant, donec plumulis nigrescant, quos Deus miraculo implumes, & omni creaturæ ope destitutos nutrit, Quidam arbitrantur rore, ut alii enatis in nidovermiculis. Sunt qui credant, prorsus absq; cibo eos sustentari, secundum illud *Hiobi cap. 38. vers. 3.*

Qvis Corvis de cibo prospicit, cum pulli ejus famelici ad Deum fortem vociferantur, (eum suo modo incla-

mantes) aberrantibus penuria Cibi? & *Psalm 147. v. 5. 10.* Magnus est Dominus noster, & multus viribus &c. qui dat jumentis Cibum suum, pullis Corvorum qui crocitant.

Lucretius.

Mutant cum tempestatibus unâ
Raucifonos Cantus Cornicum
secla vetusta,
Corvorumq; greges, ubi aqua
dicuntur & imbres
Poscere, & interdum ventos
aurasq; vocare.

Corvus albus.

Ein Weißer Rabe/

Corvos candore nitentes
gignit Norvegia, Islandia,
& alia loca frigidiora polum
arcticum respectantia. Ex
Dania aliquando ad has terras
feruntur.

Corvus alpinus.

πυρρόκοραξ
Corvus sylvaticus
nocturnus
*Ein Alsprappe/
Wald rappe/
Nacht rabe/
Steinrabe.*

Hh 3

Torus

Totus niger est, Cornice minor. In montibus altiss. vivit, noctu clamore molestus: Diurno tempore raro conspicitur.

Corvus lacustris.

Κόραξ Aristot.

Corvus aquaticus Gessn.

Scharbus Albert, quasi Corvus.

Mergus magnus niger, Nonn.

Gulo.

Ein SeeRabe/sil.

WasserRabe/

Seucht Ars/

Schalsuchorn/

quasi ein Schlucker.

Corvus aquaticus, quem mihi anno 1602. 30. Augusti nobilissim. Dom. Daniel Gotsch misit, ponderabat lb. j. Magnitudo ei ferè Anseris Brantæ. Longitudo dodrantum iiij, & digitorum trium. Latitudo sex dodr. & palmarum ij. Coloris est nigri in Capite, Collo & Dorso. Venter albet. Rostrum acutum & peculiare, sex digitos longum, superiori parte nonnihil inflexum, unco descendente acutissimo, piscibus attrahen-

dis apto, superius nigricans, utrinque ut Cornu lucidum. Cutis inferiori Rostro & utrinque sub Oculis obtenditur crocea. Crura palmarum ij. longitudine. digiti pedum quaterni; nigri, lineis transversis s. circulis quasi continuis donati, amplis nigrisque membranis junguntur. Cauda palmos & digitos duos longa ex 14. pennis constans, tota nigra & rigida, ut in Pico majore. Dorsum superius maximè circa uropygium ex nigro viridiq; splendet. Alas habet longissimas, at pennas in eis breviores, (unde tardè volat) quæ per medium maculis ex cinereo lucidis ac rufis asperguntur. Collum primum cum pectore obscura sunt, fuscis notis varia.

E cranio Occipitis nascitur ossiculum trium digitorum longitudine, quod tenue latiusculum ab ortu sensim in acutum mucronem gracilescit, & Musculis colli implantatur, quæ in nulla Ave hæcenus videre contigit. Lingua minutissima in profundo latitans trigona subflava.

Gulam obtinet amplissimam ad fauces, quæ sensim prope

prope Stomachum, qv̄i ad n-
ropygium extenditur albissi-
mus, augustior redditur. In-
testina appendicibus donan-
tur.

Hepar bilobium, parte de-
xtrâ qvinq; digitos, sinistrâ
vix ij. s. longa,

Huic jungitur fel vesicula
digiti minimi ferè longitudi-
ne contenta, qv̄æ graciliore
parte Intestinis annectitur, &
ventriculum tangit.

Circa lacus, amnes & flu-
vios vivit. Arboribus insi-
det, & in iis nidificat, veluti
in baronatu Trachebergenfi,
udis ad Bartham locis.

Piscivorus est, voracissimus
& multi cibi. Per autumnum
& veris initio aliquando ad
fluvios & piscinas Montium
Suditorum advolat. Longo
spacio urinaripotest, Nec diu
admodum in aquis natat, sed
frequentius arboribus aut pa-
lis insidens pisces speculatur.

Pingvedo ejus flavet. Ca-
ro nigra, piscosi & ingrati sa-
poris, ac pravi succi. Prius-
quam elixatur, aqua calidis-
sima præmacerari oportet,

Pellis densa & crassa pro
tegumento ventriculi frigi-
dioris præparatur, ad promo-
vendam concoctionem.

Coturnix.

Ορνις υγος ab Ortygia in-
sula isld.

Ορνις hodie vulgò

Coturnix à sono vocis.

Qviscula, Qvisqvila Arnd.
Vill.

Qvalea Blond.

Qvaqvila

Currelinus à currendo.

Etne Wachtel/

Quackel.

Pulveratrix est avis. Per-
dici similis, sed multis partib⁹
minor. Rostrum ei breve
nigrum crassiusculum. Ocu-
li lateritii coloris, pupilla ni-
gra minutissima. Crura sub-
rubra, digiti quatuor, ungui-
culis fuscis. A rostro supra
Oculos & Aures linea insi-
gnis longitudinis ad cervicem
usq; excurrit, sub qv̄a circu-
lares aliquot maculæ, seu li-
neæ potius, albæ nimirum bi-
næ, tres nigre alternatim po-
sitæ sunt. Collum rufum pla-
né albis intercurrentibus line-
olis. Pectus & venter albida,
Supina

Supina ejuspars ferme nigricat, albis oblongis deorsum tendentibus lineis.

Femina ferme testacei est coloris superius ad Cervicem, dorsum, caudam & alas. Ad Mentum & pectus sublutei, ad ventrem ferè albi. Rostrum fuscum, & pedes lutescunt: Tota minor Mare, & pennulis ceu capillis supra rostrum, ac macula nigra Mento subiecta Maris caret.

Ingluviem & gulam infra prope ventriculum amplam & latam habet.

Cor ei trifidum Muricis modo. Jecur, & fellis conceptaculum Intestinis agglutinantur, quibus exiguum canalem communicat, per quem bilis delabitur.

Testes sub Jecinore continentur, ut in Gallinaceo.

Campestribus delectatur locis, in segetibus virentibus & earum stipulis latitans. Pascitur vermiculis & seminibus. Milio, Tritico & aqua pingvescunt. Agrè admodum propter sui Corporis pondus volant. Sunt enim Corpore grandiore, quàm suis pennis deferri possint.

Salacissimæ sunt, & in plana area inter segetes ex cala-

mis, festucis & vepribus nidos construunt. Et sufficit unus mas multis feminis.

Ova pariunt dena, duodena, quindena ferè, Columbinorum magnitudine, cinerea, maculis purpurascensibus respersa. Pullos exclusos ut gallinæ incubando fovent, prodeuntes ducunt & subinde transferunt, secundum illud *Baptist. Mantuani*.

Sedula per stipulas tenera cum prole Coturnix Pascitur, & magno natorum examine Perdix.

Capiuntur à Nostratibus aucupibus primo accessus tempore, reticulis viridibus, illectæ fistulis ex osse & corio confectis.

Pingves sunt & grati saporis, & apud nos in delitiis habentur, cum Veteres eas à mensis prorsus amoverint. *Plin.* causam assignat, quod veneno alantur: Helleboro nimirum & Comitiali morbo laborent. *Avicenna* earum esum dissuadet, quod Tetanum & Spasmodum inducant, utpotè nimia pingvedine palato gratiores, ita ventriculo & concoctioni ineptissimæ, exiguæ nutrimenti, Hinc

Baptist.

Baptist. Fiera.

Sint autumnales croceo tibi
pabula lumbo,
Sive coturnices, sive voces
Qvaleas.

Sensibus hæc mala sunt, tene-
brisq; replentia fuscis,
Vetri in visa, malis febrim
bus exitium.

Si tamen ulla tuos circumvo-
litaverit orbes,
Cæna tibi non sit, sed leve
prandiolum.

Caro secundum *Averrhoem*
temperata est, & ad calidita-
tem paulo propensior, ac te-
nuis substantiæ, optimiq; suc-
ci. Qvare sanis, & iis qvi
convalescunt, alimentum est
ad bonam valetudinem acco-
modatissimum. *Grapald.*

In pretio sum nunc, olim
damnata Coturnix,
Vox, nomen, pretium, dat
sapor ipse mihi.

Eduntur plerunq; assæ.

Ova genitalibus inuncta,
voluptatem inducunt, & po-
ta libidinem augent.

Adeps in Sole destillatur ad
Oculorum maculas: cum pau-
co Helleboro, ad vim amoris
excitandam, pudendis Mem-
bris à Joh. Kufnero inungitur.

Ad Comitiales, Cotur-
nicum Cerebrum ex unguen-
to Myrteo tritum, stanneo
vase reposito, eoq; faciem
illinito, miraberis effectum
Gal.

Coturnices ad nos Majo ve-
niunt, & Augusti fine disce-
dunt.

Cuculus.

Κόκκυξ, á κοκκύζειν, id est
cucurire.

Cuculus á sono vocis, qva
semper seipsum nominat.

Cuculus major, prior *Vlyß.*
Aldrov.

Ein Kuckuck / sil.

Cuckauch/

Cucker/

Avis est pigerrima, timi-
dissima, é genere Accipitrum.
Longitudo á rostro ad cau-
dam extremam, spithama-
rum duarum & palmorum to-
tidem. Latitudo alis expan-
sis spithamarum trium. Ro-
strum acutum, leviter adun-
cum, anterius nigrum, caput
versus fusci coloris. Tibiæ
breviores croceæ, ut & digiti
qvaterni antrorsum, & retror-
sum bini, ungvibus aduncis
armati. Prona pars tota tam
cinerea (sub gula & collo)

Ii

qvám

quàm alba (in ventre) lineis seu maculis transversim ductis oblongiusculis fuscis distinguitur; at non continuis, sed interruptis. Supina tota, nempe Collum, dorsum, alæ, nigris ac ferrugineis pennis variat, extremæ plerunq; oræ albicant. Alarum remiges fusæ totæ in mediis extremis undiq; albentes, ultra mediam caudam quàm longissimè protenduntur. Cauda palmos duos, & dig. j. longa, ex pennis decem condita nigricat, punctis albidis juxta spinam referta, & lineis utrinq; secundum longitudinem ferrugineis. Rictus oris cum interiori capacitate & lingua intensè crocea.

Nares in superiore Mandibula tubercula quasi rotunda.

Et Cuculi cuculant, fritillat rauca Cicada.

Vermibus & aliis insectis quibusdam, ut Muscis & Erucis vivit.

Hyeme in cavernis arborum latet muta, quasi mortua.

Procedit vere. Auditur à festo Jacobi usq; ad festum.

D. Johannis, aliquando ad Jacobi usq;.

Parit in nidis alienis, præcipuè in Palumbium, Curruca, Alauda, Rubecula, Motacilla, majori ex parte Ova singula, raro bina.

Pullus Cuculus, dum in nido ab aliena matre educatur, pingvis est & boni saporis: ob id ab Italis in cibum recipitur. A culinis Silesiæ prorsus abdicatur, utpotè avis impura & excrementitia.

Cuculus exustus datur utiliter febricitantibus paroxysmi tempore, Nobilium vulgato usu. Medetur Epilepticis.

Cineres ad dolorem & Ventriculi humectationem valent.

Fimus in vino coctus, & potus, morsum Canis rabidi curat.

Mirandum refert *Plinius, lib. 30. cap. 10. nat. h.* (at superstitiosum) de Cuculo. Quo quis loco primùm audiat alitem illam, si dexter pes circumscribatur, ac vestigium defodiatur, non gigni Pulices ubiq; spargatur.

Apud

Apud Plebejos & Pueros Silesiæ nostræ consuetudo inolevit, ut qui primò Cuculum ruri canentē audiant, petant ab eo per ludum, aut ex veteri antiqua superstitione, ut numerum annorum, quos adhuc superstites victuri sint, ipsis præfagiat. Numerant verò totidem annos, quoties ille suum κόκκυ per interval-la, post quæstionem factam, repetiverit.

Proverbium Germanis notum : Du sohnest mir wie der Grasmücken der Guckuck. id est, Mercedem reddis, quam Cuculus Currucæ: de homine beneficiis ingrato.

Ingratus Cuculus, in eos qui accepti beneficii immemores, malefactum pro beneficio rependunt. Fertur enim Cuculum patrem non solum deglutire Nutricis ova, & propria relinquere, verum etiam ipsam nutricem tandem excluso pullo devorare.

Saliva Cuculi, Guckuck speichel.

Salivam spuere vulgus credit. Verum materia illa aerea, quæ sæpè æstivis temporibus

herbas inficit, spuma non est, sed exhalatio seu Manna aërea, quæ facillimè putrescit, & omnis generis Vermiculos & araneas gignit, ac sæpè herbas & integras arbusculas, nisi abstergatur, adurit ac corrumpit. Aliquando ternum ramusculum ambiens, instar Piperis longi, granulis veluti multis induratur, qui exemptus tubulum refert, per quæ si potus Epilepsia correptis offeratur, eos erigere vulgi persuasio : Guckuck spey.

Cuculus mutat colorem. Nam vere supina parte totus ferè ex nigro subcæruleus existit, parum ferruginei coloris obtinens. Cauda nigricans longissima, quarum pennæ ad spinam maculis albis insigniuntur.

Autumno per totum Dorsum, Alas, Caudam, fusco, ferrugineo seu lateritio, & albo variat colore; supra uropygium pennulæ, veluti Pavonis spiculum relucet.

Cuculus junior.

Cuculus major alter, Vlyß. Aldr.

Cuculus pullus.

I i 2

Ch

Cin Junger Ruckuck.

Hic anno 1601. Furis nocturni nomine ad me missus fuit mense Augusto. Cujus longitudo erat dodrantalis & duorum digitorum. Rostrum breve, acutum, sensim arcuatum, fusci coloris; interius croceum. Pupillam nigram ambiebat circulus luteus. Caput, Cervix, Dorsum, Lumbi, Alæ superiores leucophea erant, lineis albis transversim intercurrentibus. Remiges Alarum pennæ striis ferrugineis transversim insigniebantur. Omnium verò apex exterior linea candidissima adornatus erat. Cauda quinque digitos longa ob pennarum inæqualem longitudinem sensim acuminata, fusca erat emicans tantillum ferruginei, ex pennis decem, quæ utrinque ad nervum albis notis, figuram quodammodo Cordis æmulantibus, interjecto inter singulas medii digiti spacio, pulcherrima serie & jucundo spectaculo respersæ erant. Venter, Pectus, uropygium ex cinereo albicabant, intervenientibus transversim lineis nigris. Crura brevissima ad pedes usque pro-

pemodum plumulis testæ, crocæa erant tabellis cincta, uti & pedum digiti ad ungues usque, qui & ipsi nonnihil flavescunt latiusculi. Digitos obtinebat utrinque; nempe ante & retrò pares, ut in Pico.

Curvirostra.

Λοξία Fabric. Gesn. Vlyß. Aldr.
à rostri obliquitate.

Χλωρίη Arist. Nonnull.
an Tragon Plin.

Avis crucifera.
Cruciata.

Cin Krinisch / sil.
Krinisch /

Krumbfchnabel /
Creuzvogel.

Avis olim rarissima apud nos erat, hodie etiam Pueris nota, paulo major & longior Fringilla sanguinea. Color ei per totum Corpus varius, quem tempore & ætate mutat. Nunc enim ad flavum, nunc ad rubicundum, nunc ad viridem, nunc ad cinereum seu griseum magis declinat, Rostrum cornei coloris, cujus summæ partes ac mucrones in Crucismorem invicem transpositæ ac decussatæ sunt. Caput magnum, Crura subrubent.

Sudetes

Sudetes montes incolit, frequens circa giganteum, & alia frigidiora loca. Nidificat in cavis Arboribus, & pullos excludit, Januario circa natalitia Christi, Aprili etiam & Majo. Voracissima est, & nucleis Pinastris & Abietis in cibo fruitur. Semine Cannabis mirè delectatur ac pingvescit.

Caveis inclusa ferreis (ligneas enim confringit) rostro ac pedibus sursum deorsumque, instar Psittaci, reptitat. A potu pocillum rostro, si potest, abjicit. Ingenii est simplicis & stolidi: at suavissime modulatur hyeme & æstate.

Non quotannis visitur. Aliquando turmatim montana advolat. Vulgus earum copiam, annonæ caritatem seu pestem præfagire credit. Quod ante septennium & sex annos à me diligenter observatum fuit. Ingens enim harum Avium erat captura adeo frequens, ut etiam pagos & oppida appropinquaret. Sequuta sunt brevi post tempore famines ingens & pestis vehemens.

Visco facillime capitur, supposita alleatrice, maxime Majo & Junio, cum cæteræ aves

nidificant.

Cibo non est insuavis, saporis grati & succi boni. Calculosis & Arthriticis commendatur. Probum enim, siccum & minus excrementitium nutrimentum generat.

Aquam in corniculis seu vasculis potioris, cui rostrum sæpius immergit, Caduco morbo repugnare, ejusque insultus coercere, experimentum notum.

Erat femina nobilis in vicinia, quæ alitem hanc eam ob causam cavea inclusam alebat, ut aquam Pauperculis Monticulis prædicto Morbo correptis propinaret, nec infelici successu.

Quidam ob id detinent, persuasi, Eas domos, in quibus sunt, non conflagrare incendio, nec à fulmine tangi: at hoc vanum & superstitione plenum.

De hac egregium extat Elegiacum carmen D. D. *Johannis Majoris poetæ celeberrimi.*

Obvia Naturæ rerum vestigia mentis

Certa suæ impressit conditor ipse Deus.

Inq; feris quæ mente carent, & moribus harum,

II 3

Quæ

Quæ fugienda homini,
 quæq; sequenda monet.
 Est Avibus pietas inter se, est
 gratia quædam,
 Et suus in Dominos est a-
 mor atq; fides.
 Id docet exemplo volucris pia
 & advena quædam,
 Christifera gestans æmula
 rostra Crucis.
 Tempore natalis Christi pa-
 rit; inde triumphum
 Tempore per sylvas agmi-
 na vesca volant.
 Cum reliquæ indulgent ovis,
 hæc usibus apta est.
 Nec nulla in cantu gratia
 inesse solet.
 Fert etiam imperia, atq; agno-
 scit herilia iussa,
 Et cavet infantes ne mala
 Luna premat.
 Orta sagax noctu increpitat
 vulcania damna,
 Matribus & fetus non finit
 esse graves.
 Fama est, has rostro tentasse
 revellere clavos,
 In cruce pendentem qui te-
 nuere Deum.
 Si quæ crucis Christi stat ima-
 go lignea rectis,
 Inlidunt, clavos & ruere o-
 re parant.
 Fama pium affectum notat,
 & quæ novimus illas

Præ reliquis Avibus laude
 vigere, fidem.
 Vix uno servata die duo no-
 minis hujus
 Forre mihi ex cavea plu-
 mea turba volat.
 Itq; reditq; viam in sylvas,
 rursumq; frequentat
 Tecta, suum plenus dum
 facit annus iter.
 Ergo me cantus monet, & pie-
 tatis imago
 In cruce, quo Christi sim-
 memor ipse Crucis.
 Ac quo animo perferre Crucem,
 & dare præmia laudum,
 Par est, quos salvos Crux
 tua Christe facit.

Aucupes Silesiæ Cruciatæ
 avis aliquot differentias ag-
 noscunt, ex colore, magnitu-
 dine, anni tempore, & Rostri
 flexura desumtas,

Quantitate.

Minores, kleine Krinisse/
 gemeine Krinisse.
 Majores, Corvirostræ, c-
 quina.
 Rost. Krinisse.
 grosse Krinisse.

Colore.

Rubræ, sanguinei coloris
 Rost. Krinisse.
 Flavescences,

Flavescentes, aurei coloris.

geelbe Krinisse.

Incanæ, grisei coloris, veluti Juniores.

graue Krinisse.

ποικίλοι id est varii coloris.

bundte Krinisse.

Rostri flexura.

Aliæ Rostrum obtinent dextrosum, aliæ sinistram versus decurtatum.

Recht / geschrenckte Krinisse / sinck / sinisse.

Tempore Partus.

Quædam pariunt hyeme, quæ vocantur hybernæ, Hyemiparæ.

Winter Krinisse / Christ Krinisse.

Quædam pullos excludunt vere, & nominantur Verna-les seu Æstivæ.

Sommer Krinisse.

Aliud genus ante sexennium in hisce montanis hyemis initio apparuit, quod huic forma & colore omnino respondebat, solo rostro differens, Cui erat longiusculum re-

ctum. Pauló minor Bombycilla, minor Turdela, rostro fusco, Coloris rubicundi & flavescentis, non aliter ac Crucifera. Vulgus appellabat Schneevogel / Neuvogel.

Laqueis ex feris eqvinis Turdis positis facillimè capiebatur. Sorbi enim aucupariæ baccis vivebat. Adeo stolidi erant, ut se etiam manibus capi permitteret.

In cibum recipiebatur, non ingrati saporis.

Curruca.

ὑπολαίε Arist. quod vermibus pascatur.

ἡπιδαιε

Curruca

Andothia Albert.

Passer gramineus.

Eine Grasemücke / sil.

Grasemüsche.

Avicula colore & Corporis figura luscinia ferè similis. Supina parte tota cinerea, Prona albet, partim dilute cinereo colore respersa. Rostrum rectum, fuscum, Crustula nigricant, vertex punctulis nigris maculatur.

Passim

Passim in hortis & pratis prope oppida & pagos æstate cantu suo exhilarat, quo Lusciniam ferè refert.

Vermiculis alitur arbores perreptando.

Nidum suspendit inter gramina rotundū. Ova Majo plerumq; quinque parit, aliquando septem subviridia, punctis minutissimis varia, quæ si digiris tangantur, ea non amplius fovet, sed relinquit. Hyeme avolat.

Aliquando alienos pullos pro suis educat. Cuculus enim Ova, propriis ejectis, sua reponit, quæ fovet & excubat.

Cyanopus.

Ἀσπερίας Arist. Peuc.

Falco hyacinthinus Albert.

Accipiter stellaris Eber. &

Peuc.

Avis phœbea.

Ein Blawfuß.

Accipiter est ferox, Corpore grandi, punctis & notis quibusdam stellas referentibus respersus. Oculi varii pellicidi, circulo aureo, pupilla nigra. Corpus oblongius, femoribus præferim longioribus. Crura seu tibiæ respectu femorum brevia ac crassa. Pedes magni ac crassi, cæru-

lei seu azurini. Dorsum, Alæ superiores & cauda Indici coloris.

Arboribus excelsis Montium nidificat. Ova parit quinque, cum plurimum.

Venatur Coturnices, Perdices, Cornices, Columbas, in quas subito ac conspexit maxima velocitate & impetu irruit, neque persequi desistit, donec in potestatem suam redegerit.

E numero est Pugillarium dictorum, id est qui emissi prætento pugno revocantur.

Emberiza varia.

Ξανθογυγχες.

Passer hybernus, μελανόλευκος

Avis peregrina à D. Piperino missa. Ge/n.

Avis Merulæ congener. Vlyß. Ald.

Ein Winterling/

Schneevogel/ } vulgò.
Neuvogel/ }

geschechter Emmerling.

Figura tota Aureolam seu Emberizam flavam refert, excepto colore & magnitudine, quæ Alaudam ferè æquat longitudine palmarum duorum, & digitorum totidem.

Rostrum

Rostrum simile robustum, crassiusculum, intensè flavens, triticei grani colore, in extremitate nigrum. Oculos nigros exornat circulus obscurè purpurascens. Caput totum ex cinereo subrubet, macula juxta oculos ferruginea. Prona pars candida, præter pectus, quod colore ferrugineo respergitur. Cauda pennarum duodecim, quarum mediæ nigræ, ternæ extremæ utrinq; candidæ sunt. Alarum pennæ quatuor Corpori proximæ atræ sunt, oris extremis spadiceis: reliquæ omnes candidissimæ, præter majores septem remiges, quarum extrema ad medietatem atra sunt, & binas parvulas superiores, juxta remigum radices.

Dorsum cinereum, atris maculis varium, ad Uropygium rubore lateritio maculatur. Radices pennularum investientium omnes nigræ sunt. Crurculis incedit Aureolæ, sed cum splendore ut in Merula atris.

Ungvuli similes sensim incurvi, posteriore ut in Alauda cæteris longiore. Ventrículum obtinet crassum & latiusculum ut Gallinæ, cui

junguntur Intestina admodum gracilia, paucis revoluti-
onibus contexta. Fel Hepati & Intestino jungitur exiguum.

Remissior color est Femina. Dorsum enim cinereum, fuscis notis varium. Similiter Alarum remiges, & quæ dorso vicinæ fuscae sunt. Superiores cinereas, quæ in Mare totæ candidæ sunt, lineolæ albæ interfecant. Collum superius cinereum cum vertice, ex quo non nihil flavedinis emicat.

Spermologus est, & hyeme gregatim apparet apricis & secus itinera locis, ubi grana & semina ex plantis arefactis legitur.

Capitur visco & reticulis in Silesia inferiore ad Crosse-
nam, Grünebergam, Svibosium, & vicinis locis: & in cibum recipitur, saporis non ingrati, Monticulis signata.

Vere imminente recedit, nec æstate conspicitur. Ubi nidum struat quando pariat, & unde volet, nondum exploratum.

Vocem edit altam, num cantillet non habeo quod dicam. In hypocaustis ad mensas duos trësve, semine Milli

Kk Cuscutæ

Cuscutæ, figopyro &c. aliquando enutrita fuit, absque cantu.

Falco.

φάλακς
Falco à pede introrsum arcuato, seu à falcato unguum hamo.

Ein Falcke/

Falcke.

Accipitrini generis nobilissima species, & animo & audacia reliquis plurimum præstat.

In rupibus & montibus Bojemiam à Silesia determinantibus Falcones nascuntur, inde nomina à Falconibus quibusdam lociscescere, Falkenberg, Falkenhain, Falkenstein, &c.

Ciculantur, domantur, condocesunt, mansuescunt ad aucupia.

Differunt natalibus, magnitudine, colore, sexu, ætate.

Falco montanus.

Gefn.

Falco montanarius *Albert.*

Cybindus, Accipiter noturnus. *Plin. Eber. & Peuc.*

Ein Birel Falck/

Berg Falck.

Corpus ei breve & valde spissum, Pectus planè rotun-

dum & magnum. Crura fortia & brevia, Pedes nodosi, unguibus fortioribus. Dorsi Alarumq; exterior color cinereus, qui paulatim fuscus clarior efficitur & pallidior.

In Montium rupis nidulatur.

Ferum est hoc genus, malis moribus præditum & iracundum.

Falco peregrinus.

Gefn.

Falco communis

Falco migrator & commetator.

Ein wander Falck/

gemeiner Falck/

fremdbling Falck.

Qui semper peregrinatur, & migrat de una regione in aliam. Minor est montanario, Cauda brevi, alis longis, Capite crasso, Coxa longa, Cruribus, brevibus, iisdem & pedibus albicantibus.

Bonise est moribus si, benè nutriatur à Falconariis.

Falco niger.

Falco Carbonarius

Ein Kohlfalcke.

Figura

Figura peregrino per omnia
similis, at brevior. In dorso
& exteriore Alarum parte &
Cauda tota fuscā habet ni-
gredinem. Guttas in facie
Falconarias prorsus atras, quæ
circumfunduntur quodam
obscurō & fusco pallore.

Falco candidus.

Falco albus.

Falco Moscoviticus.

Ein weißer Falck/

Moschowitterische Falck/

Major est Falcone pere-
grino. Figura Pedum, un-
gvium, Rostri ac totius Cor-
poris, naturam Falconis præ se
fert. In Dorso & Alis subal-
bus est, alibi verò maculas seu
guttas habet valde albas, aliis
guttis subpallidis interposi-
tas.

Hunc mittit Septentrio &
Oceanus à Norvegia, Svecia,
Estovia, Moscovia. Ante
antios quinqve loco muneris
à Moschoviæ Duce ad Impe-
ratorem Romanum per Le-
gatos, quatuor albi Falcones
Pragam missi sunt.

Albus Falco perquam au-
dax & bonus, nec unquam à
natura Falconis aberrat.

Falco sacer.

Ἰεπεξ

περὺν Arist. Eber. & Peuc.

Falco Britannicus Symmach.

Falco Aëriphilus

Ein Sacker/ Socker Falck/

Stocker Falcke/

Röppel/ quasi copulatus

Stos Falcke.

Magnitudo ei ferè Aquilæ,
Cruribus crassis & ungribus
maximis. Oculi flammei ex
citrino ad rubeum declinant.
Caput magnum, rostrum for-
tissimum, Cauda longa, pen-
næ rufæ, vox barbara.

In altissimis montibus ni-
dificat.

Nulla est avis tanta, quam
non statim deiciat, nec unam
tantum, sed quotquot habue-
rit obvias.

Amat hominem & Canes
venaticos.

Falco medius.

Hierofalco quasi sacer
Falco.

Hierofalchus

Herodias quod Ardeas ve-
netur.

Ein Gier Falck/ sil.

Ger Falck/

Mittel Falcke/

Reger Falck.

K x 2

Probia

Probis pedibus præditus est, digitis longis, Corpore valido & pulcro, præsertim postquam pennas mutaverit.

Strenuus ac ferox est, ad omne aucupium utilis.

Falco mixtus.

Falco montanus cæruleus. Falconis montani secundum genus Vlyß. Aldrov.

an Falco cinereus seu leucophæus Eidem?

Ein Zwitter Falcke/

Stechtblauer Blausuß/

Ascherfarbener BergFalcke/

Syring Blausuß / Nonnulli.

Avis est elegans & audax, spithamas ij. & digitos iij. longa, lata spithamas iij. & palmos ij. Rostrum habet breve unicum, Indici ferè coloris. Crura alta, Tibiæ graciles longæ luteæ, ungviculis nigris acutissimis, digiti exteriores duo utrinq; tunica aliquatenus junguntur. Color cinereus ad cæruleum vergens dilutiùs obscuriùsve pro diversa partium ad lucem obversione. Capitis, Colli, Gulae, Alarum superiorum & Cauda dilutius, Dorsum ob-

scurius; Pectus cum ventre toto & femoribus plumosis nivei sunt candoris, Alarum remiges sex nigræ sunt, reliquarum extremitates tantum nigræ sunt, mediotenus secundum scapi longitudinem albæ. Nares membrana circumtegit lutea; juxta Rostrum & Oculos albet: Oculi pupilla ex nigro cærulea. Cilia seu ambientes circulum membranulæ luteæ sunt, ut & iris. Capite donatur crasso & Collo, Corpore admodum gracili. Alæ ad mediam ferè Caudam extenduntur, quæ dodrantem longa ex duodecim pennis, dilutè est cinerea, quarum mediæ dilutè cæruleæ sunt, exteriores quatuor, utroq; latere binæ candidæ, omnes ad nervum utrinq; maculis triangularibus fuscis insigniuntur. Supra Oculos juxta rostrum pennulæ ut piligent.

Hepar totum sanguinei coloris, notulis albicantibus continuis respersum erat, inter quod & Intestinum fel prasini coloris hærebat.

Venatur aviculas, & perdices insequitur, cujus partem penè consumtam in ventriculo dissecto reperi.

Rarissimus

Rarissimus est, circa Paschatis festum à quodam Cive mihi communicatus fuit, quem bombardæ globo interfecerat extra oppidum in montanis.

Falconellus.

Falco parvus
Falconellus feriens.
Ein Gros Falc / in /
kleiner Falc / e /
Lerch Falc / in.

Longitudo ei spithamalis cum Palmo, pallidi pedes, seu subflavi. Dorsum nigrum ad Indicum inclinat, Pennæ Alarum nigriores. Pectus albidæ & nigræ maculæ variant. Oculi toti nigri, quos circulus angustissimus pallidè luteus in periophthalmio ambit, Genæ albæ, Gula in masculo rubet, in femina pallet.

Cauda fusca maculis transversim nigris distinguitur. Sub uropygio spicei est coloris. Femora ad tibias fusca sunt. Alæ longissimæ ultra Alas extenduntur crucem efformantes, Rostrum cæruleum.

In montibus nidulatur.

Freqvens ejus usus in aucupio, maximè ad Alaudas &

Perdices capiendas.

Falco palustris.

δνα Tagan Ing
Falco littoralis.

Ein Rohr Falc / sil.

Milvi ferè est magnitudine, Corpore longiore. Rostro adunco nigricante. Cruribus crassioribus, squamosis, cæruleis, digitis similibus, qui ungribus armantur nigris acutissimis. Per Dorsum ex fusco purpurascit, in Capite dilutius. Alæ longissimæ & acutæ quarum majores pennæ lineis fuscis interfecantur. Venter subalbidus. Oculi lucidissimi sunt.

Omnium ignobilissimus est. Circa paludes, piscinas & flumina degit, & piscibus tantum victitat.

Præceps ex alto in aquas se dejicit, & discussis Pectore aquis pisces rapit.

Fringilla.

Σπικ Aristot.

Vinelia Avis Albert.

Fringilla.

Ein Finc / e /

Duch Finc / e /

rotte Finc / e.

Passerem magnitudine æ-

K k 3

quat,

quat variis coloribus, albo nempe, viridi & rufo distincta. Maris pectus rubescit, femina pallet. Cauda fusca exterioribus utrinque binis albicantibus. Nidularum in arboribus, earum ramis appenso nido. ex Musco & Lana Ova parit numero v.

Cantat mas primo Vere usque ad solstitium. Aucupes eas obscuro loco reservant aluntque, Autumno canoras ad aucupium extrahunt, pro reliquis Avibus ad retia alliciendis.

Vescitur sem. Papaveris, Lini, Cannabis &c.

Autumno & primo Vere, ubi gregatim volat, capitur. Hyeme avolat paucis superstitibus.

Editur assa & elixa. Amariuscula est, nec mali succi. Stomachicis non inutilis.

Fringilla candida.

Ein weisse Finckel/
weisse Buch Finckel.

Priori omni ex parte similis, præter colorem qui totus candidus.

Rarius occurrit.

Fringilla torquata.

Ein Ringel Finckel/

Similis est Fringillæ vulgaris præter torquem albam, quæ Collum cingit, & verticem plumulis candidis nitentem.

Capta fuit in sylvis ad Kotznam.

Fringilla hyberna.

Ορνιθία

Fringilla montana

Fringilla hyberna, nivalis.

Montifringilla.

Eine Wald Finckel/

Winter Finckel/

Schnee Finckel/

Dannen Finckel.

Fringillæ æqualis, & magnitudine proxima, sed collum habet cæruleum, rostrum luteum. Alæ variis coloribus, albo nigro & luteo distinguuntur. Vox illi insavis & stridula.

In montibus versatur.

Fringilla sanguinea.

πυρρούλας Aristot. Turneri.

Fringilla alpina

Pyrrhula

Ignaria

Rubicilla Gesn. Eber. & Peuc.

Ein Blut Finckel/

Leh/Loch Finckel/sil.

Nott vogel/

Dollen.

Dollenbeisser/ id est *νυμ-
Φονόπος*

Thumherr/

Thumpfasse/ á vertice nigro, qvì niger qvasi Cuculus.

Gumpel.

Magnitudine Alaudam æquat, Passere major, rostro brevi, crasso, nigro, fermé triangulo. Color Dorsi & alarum superiorum cinereus. Capitis, Alarum pars inferior, & Cauda nigricant. Post Oculos, Collo & Pectore igneo rubore nitet, qvì ventrem versus dilutior est, imo ventre ad uropygium pallet.

Femina tota prona parte pallida est, cætera Masculo similis, vertice tamen nigro.

Fruitur gemmis Arborum, acinis etiam fruticum qvorundam, Sambuci palustr Juniperi, Sorbi &c.

Æstate rarissimè & nunquam ferè apud nos apparet. Autumno & hyemis initio montosis frequens, nec tamen singulis annis.

Alitur in hypocaustis cantus gratiâ semine Cannabis & facillè cicuratur. Perqvám

docilis est, & fistulam voce sua imitatur.

Autumno tendiculis exsecris eqvinis capitur, & in cibum recipitur, non mali gustus.

Pyrrhula candida.

Fringilla montana alba.

Ein Weißer Thumpfasse/ Gumpel,

Anno 1601. capta est in pago Fischbach colore prorsus candido, paucis in Dorsò nigriusculis plumulis elucen-
tibus.

Fulica.

Κέπφος Arist.

φαλαγίς Nonn. á mucula alba, *φάλον* enim album & splendidum significat.

φαλαγονόσαξ

Λούφα, Τρυγὰς Turm.

Fulica Recentiorum Gesn.

Gallina aquatica Agric.

Gallina Arundinum

Follega, Follata

Fulsa, Fusca

Mergus niger.

Ein Wasserhunsil.

Nohr Henne/

Psaffe.

Mergi

Mergi genus. Avis aquatica nigra tota, Anati similis, at paulo minor, tres spithamas longa, & quatuor extensis alis lata. Rostrum ei acutum, crassum, longiusculum, candidum. Pedes obscure glauci, circa genu supra & infra ex viridi flavescent. Digniti cum calce tres, ut in Colymbis fissi, quibus per internodia tunicae semicirculares, ejusdem cum pedibus coloris, ora exteriore nigricante, junguntur, unguiculis fuscis rectiusculis acutis. Color per totum Corpus niger, in Collo & Capite nigerrimus. Venter dilutius ad cinereum inclinatur.

Synciput glabrum, figura fere ovali, alba pellicula rectum, Calvitii specie. Collum oblongum, Cauda brevissima. Ventriculus callosus crassior ut Anserum. Hepar majus sine felle, quod Intestinis implicatur, conspicitur. Alarum superior ambitus per angustam lineam albicat in Mare.

Frequens apud nos in lacubus, piscinis, & fluviis, nec facile, recedit, si escam habet & pacem.

Vescitur seminulis plantarum aquaticarum, Grami-

ne, Pisciculis, vermibus &c. Super stipites in aquis nidum extruit.

Admodum pingvescit Autumno. Caro ejus quid grave & palustre olet.

Quapropter prius aqua fervente elixatur, ut odoris virus exhalet: deinde assatur & conditur.

Succum gignit minus probum, & biliosum.

Cor crudum comestum Epilepticis prodesse creditur.

Cerebrum cum veteri oleo permixtum Ani passiones curat.

Fulicae matutino clangore tempestates praenunciant; quod carmine Aratus confirmat.

Cana Fulix itidem fugiens exurgite Ponti,
Nunciat horribiles clamans instare procellas,
Haud modicos tremulo fundens ex gutture cantus.

Gallus domesticus.

Ἀλέκτωρ, quia nos a lecto exuscitat.

Ἀλεκτρυών

Gallinaceus absoluté

Gallus gallinaceus,

Ein Han/

Haus Han.

Avis

Avis est altilis canora, fau-
cibus & capite cristata, plus-
quàm notissima.

Gallo colores sunt diversi,
& in singulis vel color unus
per omne Corpus, id est fla-
vus, niger, candidus, cinereus
&c. vel varii. In cruribus ad-
versis spiculis ornatur.

Cucurrere solet Gallus, Gal-
lina gracillat.

Fruitur omnis generis Ce-
realibus.

Piscibus item gaudet, Ra-
nis, Rubetis &c.

Hic præter familiarem u-
sum, quem in villam fert,
dum gallinas plenas facit, &
culinam dapibus opulentat,
magno adjumento Patrifa-
miliâs esse consuevit cantu
suo, quo ad opera familiam
revocat, monetq; ut absterfo
ab Oculis somno expergiscan-
tur & vivere discant.

Profunda nocte validiùs
cantat, mané leniùs. Novit
sydera, & ternas distingvit
horas interdiu cantu. Cum
Sole it cubitum, quartaq; ca-
strensi vigilia ad curas labo-
remq; convocat, neq; Solis
ortum incautis patitur obre-
pere, diemq; venientem nun-
ciat cantu. Cantaturus pri-
ùs alas excutit, & seipsum fe-

riens vigilantiozem reddit.

Virgil. in Moreto.

Excubitorq; diem cantu pate-
fecerat ales.

Ovid. 1. Amorum.

Jamq; pruinosos molitur lu-
cifer axes,

Inq; suum miseros excitat
ales opus.

Ambrosius. Galli cantus, sva-
vis nocte & utilis dormien-
tem excitat, & sollicitum ad-
monet, vigilantem solatur,
processum Mortis signans.

Jus Gallinacei ob nitro-
sam & salsam substantiam
calefacit, lavat, terget, tenu-
at, flatus dissipat cum carmi-
nativis. Dolorem ventricu-
li, Coli, Ileci, Renum á flatu-
bus ortum sedat, obstructa
aperit.

Dysentericis medetur, Ser-
pentium moribus : quippe
venenorum acrimoniam he-
betat, Calculos deturbat,
Asthmaticis & defectum Cor-
dis patientibus validam præ-
stat opem. Idem cum uvis
im maturis decoctum bilem
utramq; extingvit. Valet
in febribus longis Melancho-
licis, suspiriis, Articulariis

Ll

Morbis

Morbis & Stomachi inflatio-
nibus.

Gallorum cum Gallinis
nondum coeuntium testiculi,
deperditas in Morbis vires re-
stituunt, laudabilis & velocis
digestionis. Eapropter Hecti-
cis & Marasmo laboranti-
bus, Morborumq; diuturnitate
macrefactis, utiliter exhiben-
tur. Semen prolificum sup-
peditant, & venereas robo-
rant vires.

Fel aqua dilutum, Lumi-
num aciem confortat, & Leu-
comata tollit.

Finus ex aceto, vino aut o-
xymelite contra venena fun-
gorum bibitur: ex aceto mor-
fibus Canis rabidi salutaris.
Ad Felis morsum cum adipe
gallinaceo subactum imponi-
tur. Cinis ejus exulceratio-
nes pedum sanat.

*Gallus major
exoticus.*

Gallus Italicus Patavinus
an ἰταλικὸν ἰσχυρὸν Aristoph.
Ein grosser Besscher Han/
Paduanischer Han.

Grande genus Gallinaceo-

rum, altis Cruribus, nonnun-
quam hirsutis.

Ex proximis provinciis ad
nos delati sunt,

*Gallina villa-
tica.*

Αλεντορίε

Ορεντὸς Ἰαλῆς

Gallina villaris, domestica

Eine Henne/

Hun.

Femina est in gallinaceo
genere, sed domestico.

Gallinae ingluviem habent
ventriculo prepositam, & ap-
pendices quasdam parvas in-
fra quâ definit Intestinum.

Differunt magnitudine &
colore.

Quædam totæ crocæ, vel
subflavæ, quædam nigræ, quæ-
dam candidæ, quædam variis
maculis insignitæ.

Item aliæ sunt parvæ, aliæ
magnæ.

Vescuntur seminibus Cere-
alibus, & saginantur farina.

Pascitur & dulci facilis Gal-
lina farina,

Pascitur in tenebris; ingeni-
osa gula est.

Pulvere

Pulvere impendio delectantur, in quo sese volutando quodammodo scabunt.

Toto anno præterquam tribus mensibus brumalibus pariunt. Magna etiam generosarum nonnullarum, maximè lanigerarum fecunditas, ut ova 60. vel plura edant ante incubitum. Inhorrescunt à coitu, & se excutiant. Ovum consistit à coitu, & perficitur decem diebus magna ex parte.

Gallarum caro melior est quam Gallorum, nisi sint castrati: nigrarum verò, quæ non pepererunt, melior est & levior.

Probum gignit succum, neque calidum seu nimis tenue, ut facile in bilem abeat; neque frigidum seu crassum, ut pituitam augeat, sed mediocrem seu temperatum: facile concoquitur, coloris bonitatem facit.

Jus Gallinarum omnes succos Corporis temperat, utiliter bibitur in Stomachi rofionibus.

Ventriculus alimenti bonitate servavitque reliqua-

rum Avium omnium ventriculos superat.

Cerebella earum substantiam Cerebri adaugent, ac sensus acuant.

Contusum Gallinæ,
Eingeſtoſſen Hun. Gallinam percoqvito, donec carnes bene mollescant, & in pila pulpam unā cum ossibus contunde: tum cum jure omnia per æneum vas colatorium exprime, modicum vini generosi & Croci aromatūq; quantum satis adjice, & coqves aliquandiu. Cum inferre vis, panem tostum subjice. Cibis puerperis & qui venam secuerunt conveniens.

Pastilli è Gallinis hoc modo parantur. R. Carnis Gallinarum paulatim costæ quantum volueris: adde Ovorum q. s. Panis similaginei flore lactis macerati ad sufficientiam: deinde contusis omnibus cum butyro, aromatizetur Majorana, Petroselinum, Cepis, Macis, Cinnamomo, formentur globuli, albumine Ovi illinantur: bulliant iterum ad sufficientiam, & addito Croco offerantur.

Ll 2

Plurimum

Plurimum nutriunt & facili-
 me concoquuntur.

Tunica seu pellicula interior
 Ventriculi *ἐξίως* ab aspritu-
 dine dicta, seu cortex qui-
 dam, amara est, adstringit,
 roborat, vomitum compe-
 scit.

Vino lota & exiccata, po-
 ta concoctionem juvat: ex
 vino trita Stomachicis inser-
 vit.

Cerebrum, gingivis Puero-
 rum infricatur a feminis, ut
 Dentes absq; dolore enascan-
 tur. Prohibet fluxum san-
 guinis, Narium & Cerebri.

Sanguis Gallinarum ni-
 grarum ad maculas & lenti-
 gines valet. Leucomata O-
 culorum & cicatrices cum a-
 qua inunctus sanat.

Adeps calefacit, humectat,
 emollit, lenit, mediis inter An-
 ferinum & Suillum. Calidior
 tamen & siccior est quam Su-
 um, & tenuior ac minimum
 terrestris. Rimas Labiorum
 sanat. Valet contra pustulas
 Oculorum, Lingvæ asperita-
 tem & Aurium dolores.

Fel absterforia est faculta-
 tis, maculas in corpore illi-
 tum aufert. Miscetur Ocula-
 ribus liqvidis.

Si Bubo ortus sit in peste,

Gallus seu gallina deplume-
 tur circa anum, & apponatur
 loco per horam, & in alia ho-
 ra apponatur alter: & sic fi-
 at aliquot vicibus. Ea ratio-
 ne venenum retrahitur a Cor-
 de, & gallina subito moritur.

Gallinam nigram Vetulae
 per spinam dissectam, calen-
 tem confestim Capiti impo-
 nere, & fascia ligare Melan-
 cholicis vel desipientibus, ne-
 scio qua admurmuratione,
 superstitiose jubent, & tan-
 dem in flumen abjicere.

Gallarum pituita,
 seu grando *κρόφα*, der *Σπ/*
Ψιπφ. Id vitium maxime
 nascitur apud nos, cum Cibi
 aqua calidior commiscen-
 tur: vel cum frigore & pe-
 nuria Cibi laborant. Lingvam
 extremam reptat pellicula al-
 ba, quæ leviter ungvis vel-
 litur, & locus butyro illinitur,
 trajecta per Nares penna ali-
 quot vicibus, quo possint re-
 spirare.

Huic malo medentur, Ser-
 pillum, Origanum, Tormen-
 tilla in potu, Lac ebutyratum,
 Allium, Cepæ.

Gallinæ, si ultra solitum
 se concutiant, magnum est
 futuræ pluvie signum.

Gallina

*Gallina Italica
magna.*

Gallina Medica seu Decu-
mana.

Ein Welsche Henne/
grosse rauchfussige Henne.

*Gallina lanigera,
Indica.*

Gallina lanata,
Turcica.

Eine Wollechte Henne/
Türkische Henne.

Gallinae sunt peregrinae,
quæ pennis crispis instar lanæ
obteguntur.

Has mittit Fuch urbs Indiæ
orientalis maxima.

Ova pariunt optima &
plurima.

Gallina altilis.

Eine Masthenne.

Gallina quæ sagina alta &
enutrita est.

Gallinarum matrices.

Bruthennen.

Sunt gallinae, quæ incuban-
do pullos excludunt.

His supponuntur non so-
lùm gallinarum, verùm etiam
Perdicum, & Anatum ova,

Gallinae glocientes.

Gallinae veteranæ

Gluckhennen/

Glocientes suo strepitu mo-
lestæ sunt, & agmen pullorum
ducunt.

Gallina novellæ.

Merzhennen.

Graciles sunt, & plumis
contractioribus. Anniculæ
sunt neq; hæcenus pepere-
runt.

Gallinarum Ova.

œ

Hüner Eyer/

Plinius. Nullus alius cibus
est, qui in ægritudine alat,
neq; oneret, simulq; vim po-
tus & cibi habeat, ac Ova.

Præferuntur aliis omnibus
Gallinarum ova, maximè si
ea ex Gallo conceperint. E-
liguntur recentia è Gallinis
pingvibus non macilentis na-
ta, oblonga, parva, tenuia,
si sumas ovum molle sit atq; novum.
Gratioris sunt saporis, Ori-
jucundiora, plusq; afferunt a-
limenti quàm cætera. Ad
æqualitatem & mediocrem
temperiem tendunt. Servan-
tur Ova hyeme in paleis, æsta-
te in furfuribus aut cineribus.
In Ovo sunt albumen & vi-
tellus, Albumen ad frigidita-
tem,

Ll 3

tem, vitellus ad calorem tendit. Ambo autem humida sunt, potiss. albumen.

Ova recentia sunt alimentum sanguini proximum.

Unde in Regim. Schol. Salern. scribitur :

Ova recentia, Vina rubentia, pingvia jura,
Cum similia pura, Naturæ sunt valitura.

Ova in aceto cocta, Alvi fluxiones desiccant, efficaciora fiunt, si aliquid austeri addideris, & super prunas frixeris.

Nostrates feminæ Nucem myristicam, sem. Accipitrinæ & alia aspergunt, puerisq; dysentericis afferunt.

Ovum crudum totum, admixto Rosaceo, valet ad Palpebrarum, Aurium, Mammarumq; phlegmonas, & quæ in partibus nervosis contingunt, ut cubito & digitorum tendinibus.

Ambustionibus si statim imponatur prodest, sive solum candidum, sive cum vitello. Mediocriter namque refrigerat, & citra erosionem desiccet.

Ova zephyria.

Ova subventanea,
Spinnen Eyer/ vulgò
Drachen Eyer.

Parva sunt Columbarum ferè: at prorsus rotunda non oblonga, absq; vitellis. Vulgi opinio est, ea esu Araneorum terrestrium nasci.

Minus sapiunt, humida magis & inutilia.

Ovi albumen.

Τὸ λευκὸν τοῦ ὄβου.

Ovi candidum, Plin.

Albus liquor, Columell.

Weis Ey/ Eyerklar/
Das weisse im Ey.

Refrigerat modicè, mordacitatis expers, atq; emplasticum. Collinit, mitigat acres fluxiones, spiracula Cutis occludit, repellitq; inflammationes Oculorum lenit, ambustis medetur.

Fronti cum thure impositum, fluxiones arcet avertitq;.

Ophthalmiis, Sedisq; ac Pudendorum ulceribus commodum pharmacum.

Ambustionibus pustulas innasci non finit, si quàmprimum

mum eo perungantur: faciem à Solis ustione tuetur,

Alba Ovorum conjice in vas, quotquot suffecerint, & Vinum, quoad spumat concutiat, pellucidum fit.

Hoc etiam Apozemata & Syrupi clarificantur.

Ovi vitellus.

Τὸ ὠχρόν, Ariff.

Χλωρόν τοῦ ὠοῦ, Hipp.

Eyer Dotter.

Temperatus est, facile digeritur, & probum sanguinem generat.

Suggillata in Oculis discutit imposita, & Cataplasmatibus, quæ phlegmonas mitigant, miscetur. Additur Ceteris lenientibus & clysteribus.

Feminæ Vitellum recens cum momento salis linteolo exceptum, Infantibus ad Alvim proritandam intrudunt, Addunt quædam Mel & Crocum.

Pellicula interior,
(Hymen) detracta Ovo si-
ve crudo, siue decocto, La-
biorum fissuris medetur. Da-
tur pulvis Dysentericis ex vi-
no rubro.

Ad Cruris fracturam utilis,

Ovi testa, κελυφός,

τὸ λεπύριον τοῦ ὠοῦ.

λεπύριον τοῦ ὠοῦ, Hipp.

Eyersehale.

Tosta cum corticibus Pini Pedum attritiones ex calceamentis sanat, omnemque humorem & rheumatismum constringit, Hæmorrhagiam sistit, & ipsis dentifriciis additur.

Ovi testa, è qua pullus exit, purgata, Stranguriæ succurrit.

In pulverem subtilissimum redigitur ad Horologia.

Præparantur Ova ad cibum variis modis.

Ova effusa.

ὠὰ ἐξαφντὰ, hoc est, emissa
Ova elixa, dispersa,

In Wasser gefelte Eyer.
Wasser geschlagen Eyer.

Appellantur ea, quæ è testis suis effusa, abjecto folliculo coqvuntur integra, seu Ova in aqua bulliente fracta seu elixa. Hæc vel per se eduntur, vel cocti panis segmentis imponuntur. Salubria sunt.

Ova sorbilia.

ἐσοφντὰ. Diosc.

Ova mollia, liquida.

Gang

gans Weichgesottene Eyer.

Dicuntur, quæ dum co-
quuntur excalescunt tantum
liquida adhuc minimè con-
cocta densataq;.

Per se tantum ebibuntur
cum modico salis. Minus tre-
mulis nutriunt, humectant,
vires reficiunt acervatim,
ventrem meliorem reddunt,
facilius subducuntur. Pro-
sunt gutturi exasperato, tussi-
entibus, pleuritidi, raucedini,
Phthisi, dispnæ, sputo san-
guinis, Renum & Vesicæ ex-
ulcerationibus. Ventricu-
lum tamen languidum sub-
vertunt.

Ova tremula.

ὠὰ ἀπαλὰ Diof.

τρομικὰ

Ova mollia Cels.

Ova tremulenta

mollicula, tenera, tenella.

Weiche Eyer.

Cum paulo magis coquun-
tur ad mediocrem usq; confi-
scentiam, Sorbilibus plus nu-
triant. Multum alunt, & Sto-
macho apta sunt. Ad conco-
ctionem, digestionem, nu-
tritionem, boniq; succi gene-
rationem præstant, Cum sale
& pane eduntur.

Ova mediocriter dura.

ὠὰ ἱερὰ ἢ ὀπῖα

ἐν δέντρῳ Gal.

Dotterlose Eyer.

Dotterweiche Eyer.

Sunt ova ad duritiem ali-
quam cocta, vitello adhuc
molliusculo.

Plus mollibus nutriunt.

Ova dura.

ὠὰ σκληρὰ

Ova Paschalia

Hartgesottene Eyer.

Ova sunt, quæ omnino co-
ctione induruerunt. Duriora
sunt, ἑσθ' ὑποῖα tardius per-
meant, & crassiores succum
procreant, Album consti-
pant.

Æstate frequenter testis
exuuntur, & in partes aliquot
secantur, ut alternis vitelli ac
albuminis segmentis lances
Acetariorum coronent. Cum
Salatte mit Eiern.

Mediotenus divisus ali-
quando superfunditur liqva-
men ex melle aceto, additis
Croco Zingibere.

Ova assa.

ὠὰ ὀπῖα ἢ ὀπῖα δέντρῳ

Ova tosta.

In der Asche gebratene
Eyer.

Sunt

Sunt Ova; quæ in cineribus calidis coqvuntur vel asfantur.

Concoctu sunt difficilia, & tardi transitus, crassiusq; alimentu Corpori tribuunt. Magis siccant minusqve refrigerant, & ingratoris sunt saporis quàm elixa in aqua.

Ovum assum bezoarticum.

Ovum aureum bezoarticum.

Electuarium de Ovo.

Das Eufdene Ey.

R. Ova recentia num. ij. abjectis albuminibus, & quod vacuum Croco integro orientali repleto, foramina operculo suo claudantur, & in cineribus ad perfectionem assentur (non adurantur, uti plerunq; fieri solet) deinde auferatur Cortex addendo

Pulv. Erucae aceto præpar. unc. i.

Rad. Diptamni albi

Tormentill.

Angelica

Pimpinell. an. unc. f.

Zedoar.

Scordii, granor. Juniperi,

Boli Armeni.

Sigilli Strigensis an. drach. 2. scr. 2.

Nuc. Vomicae.

Myrrhae, Corn. Cervi.

Camphoræ an. drach. 2.

sem. Citrii, Acetosæ

Card. bened. an. scr. 4.

Theriaceæ Andromachi.

Mithridatii an. unc. 2.

Cum syr. acetos. Citrii f. massa, quæ Auro fino obducta pro usu reponatur.

Adversus pestem, febres pestilenciales & alia venena, Pharmacum magni usus.

Ova frixa.

ὄα τρυγανσά

τρυγανσά.

Ova fricta.

Ova in sartagine spissata, oleo vel butyro frixa. Spissantur autem variis modis.

1. cum butyro, integris manentibus vitellis, in patella seu lebetes frigentur, suppositis segmentis panis.

Eyer im schmalze/ gesazte Eyer/

Malum procreant succum, crassum, excrementosum, nidorosum, & reliquum quoq; cibum in ventriculo corrumpunt.

2. conqussata cum butyro in lebetes diligenter agitantur donec cocta fuerint, additis

M m

Mace,

Mace, Majorana vel Petroselino.

Ova agitata & confracta.
Γερνρε Eyr.

Minus pinguedinis obtinent quàm priora, ob id facilius concoctionis.

3. Utrinq; perforantur, & emissio liqore in peculiari ac convenienti lebetæ cum butyro frigentur.

Αυσγελαuffene Eyer.

4. In placenta formam coqvuntur, qui modis Agricollis & plebeis apud nos frequens. Addere solent farinam triticeam, Cepas, Petroselinum, aut Salviam, cum butyro aut axungia porcina.

Λεκοδίτης,

Placenta Ovorum frictata.

Ein Eyer Kuchen/
Pfanne Kuchen.

Hæc difficilissimæ sunt concoctionis, & facile corrumpuntur, viscerumq; obstructions pariunt: ob id stomachum requirunt probe constitutum.

Ova frixa mali sunt succi, fumosaq; in Stomacho coctura, facileq; corrumpuntur.

Pravum gignunt succum & excrementitium: mox enim in bilem ac putredinem vertuntur, ructusq; nidorosos generant.

5. Aliquando duriter coctis & divisis, abjecto putamine, eximuntur vitelli, qui additis Petroselino, Croco, Macis, crudo ovi albumine iterum induntur, & vel in butyro frigentur, vel in liqvamine ex aceto, saccharo aut Melle coqvuntur.

Ova,

Γεσθιlette Eyer.

Saner Eyer.

Hæc appetitum erigunt, & è morbo convalescentibus grata.

Ova suffocata.

Ωά πνεκτά,

Verdempffte Eyer.

Oleo garo ac vini modico imbuta in duplici vase supra ignem modicè crassescunt.

Elixis, duris & assis meliora sunt, & sapidiora, si ad mediocrem crassitiem pervenerint. Nam & probum generant succum, & facile coqvuntur. Magis leniunt & mitigant.

Gallinarum

Gallinarum Pulli.

Αλεκτορόπουλα,
Ορνιθόπυλα,
Νεοσσίδες.

Pullastri, Pullastra,
Junge Hühner/
Küchlin.
Jung Hühner/
Hemlin.

Gallus vel Gallina adolescentes. Horum caro sva-
vis est, facillimæ concoctio-
nis, & magis quàm Gallina-
rum humectat, ac sanguinem
probum procreat. Eumq; fri-
gidiorum, nec excrementi-
um, febricitantibus utilis.

Jus Gallinarum adolescentium æquat Corporis humo-
res & ardores, post febrium
discessum cum saccharo.

Pullus elixus é jure.

Pullum deplumatum, exen-
teratum & purgatum coque
in cacabulo, cum aqua suffic.
addito sale cum croco, zin-
gib. Galang. Macis &c. infe-
ratur.

Pullus farfiliis,

Ein gefüllter Huhn.

Pullum sic, ne aliquid in
eo remaneat, á Cervice ex-
pedies, & mixtura ex ovis,
lacte, passulis, majorana, seu

Petrofelino ac Croco infar-
cias, Integrum ollæ immittas,
ad ignem cum aqua elixato.
Cum bullierit sufficientur in-
feres.

Pullus in Agrestia.

Pullum cum salita carne de-
coquito: ubi semicoctus fue-
rit, grana uvæ, sublatis é me-
dio vinaceis in cacabum fer-
ventem indito, Petroselinum
& Mentham seu majoranam
minutim concidito, Piper &
Crocum in pulverem conte-
rito. Hæc omnia in cacabum,
ubi Pullastra cocta fuerit,
conjecto, & patinam statim
facito. Hoc obsonium ad-
modum alit, facile concoqui-
tur, Stomacho, Cordi, Hepa-
ti, Renibus convenit, ac bilem
reprimat. Simile modo para-
tur cum Crespini bacculis,

Pullus assus,

Ein gebraten Huhn.

Pullum benè depilatum,
exinanitum & lotum assabis.
Assato atq; in patinâ imposito,
antequam refrigeret, succum
Citrii aut Arantii, cum aqua
Rosarum & Cinnamomo be-
nè trito infunde & appone.
Eduium ventriculo gratum,
appetitum restaurat, & Hepar
calidius contemperat.

M m 2

Pullus

Pullus gallinaceus per medium sectus, cruentus & tepidus, Vertici Capitis in phrenitide utiliter imponitur.

Capus.

Αλεκτωρ εν τομία

Capo

Gallus semimas

Ein Raphan/

Rapun.

Gallus est, cui testes sunt avulsi. Apud nos femina quædam Gallos castrare solent, testiculis per posteriora revulsis. Vulnus tantum fit, quantum digito immittendo & testibus singulis extrahendis sufficit. Vulnus filo confuunt, & cinerem infricant, tum etiam cristam rescant, ut virilitas omnis absit, & abolita libidine pingvescant.

Vulgus cum saginare cupit Capos aut Gallinas, plumas cum cauda, quas *Massferden* vocant, evellere, cibo lapillos addere, & in locum renebricosum reponere solent. Alii pastam forma pilularum ex rebus nutrientibus intrudere solent, *Hünerstopffen*.

Laudes Avium omnium una Caro gallinacea in se comprehendit, nihilque reliquæ

Altiles popinis offerunt, quod unus Capus in se non habeat, sive elixum sive assum velis.

Caro temperata est, bonum & perfectum generat sanguinem.

Ex Caponibus fiunt varia fercula pro sanis & ægris.

Jus Caponis restaurans vires. Capum veterem paræ, exentera, purga, totum cum ossibus comminue, dein in vase stanneo probe obturato, adjectis nummis aureis Ungaricis senis, lixivio & aqua prius probe purgatis, momento Cinnamomi & Salis, in lebetem Cupreum aqua fervente plenum, ut bulliat imposito: tandem perfecta concoctione exprimatur, & ægro offeratur.

Axungia Caponis temperata est, dolores Laterum & Colic mulcet, pota & illita.

Pellicula interior ventriculi Capi, & cuticula Crurum flavæ addito Musco flavo saligneo, à Rustica gente adversus Icterus bibitur.

Alectorias gemma.

Alectoria Αλεκτορίας

Caponis lapis.

Ein Raphanen stein/

Gemma est crystallina specie in

cie in ventriculo Gallinaceo-
rum seu Caponum reperta,
fabæ magnitudine.

Anno 1591. Parens meus
in arce Greiffenstein, cum
à Coquis mactarentur Capi,
forte fortuna dissecto Capi
ventriculo, in eo reperit la-
pillus quinque, inæqualis for-
mæ & magnitudinis, rotun-
dos & longiusculos, translu-
cidos Crytalli instar, seu po-
tius aquæ limpidæ, subobscur-
is cæruleis fibris seu striis va-
riegatos; aureisq; micis Opuli
instar relucens. Majorem
Generos. Dom. Christopho-
rus Gotschius expositum au-
reo annulo inclusum gesta-
bat.

Politus non lædit oculum,
nisi pupillam attigerit.

Plura de iis superstitiosè
scribuntur.

Sylvaticus, Reges Alectori-
am gemmam gestantes, &
gladiatores invictos reddere,
ac sicim tollere, item Mulie-
ribus vires & gratiam conci-
liare scribit.

Obscurus.

Hic oratorem verbis facit ef-
se disertum,
Constantem reddens, cun-
ctisq; per omnia gratum.

Hic circa veneris facit incen-
tiva vigentes,

Commodus uxori, quæ vult
fore grata marito:

Ut bona tot præstet, clausus
portetur in orbe.

Gallina Corylorum.

Αἰγῶς Aristoph. Gesn.

Αἰγὼς Gal.

Αἰγὴ

Attagen

Francolinus

ἄγες & λαγῶσις. Longol. à
pedibus villosis & Leporinis
similibus.

Bonosa Alberti.

Gallina Corylorum, quod
inter Corylos versetur, ejusq;
gemmis & julis vescatur.

Gallinula sylvestris mon-
tana.

Perdix alpina

Tarda avis Eber. & Penc.

Gallina rustica Varro.

Ein Haselthum/

Haselhenne/

Notthum.

Avis est Perdix paulo ma-
jor, spithamas duas longa, to-
ta varia & elegans, cui Ro-
strum perbreve nigricans; Pe-
des hirsuti, plumis ad princi-
pium usq; digitorum percur-
rentibus: Digiti corticosi,
squamosi, glauci, multis li-
neis.

M m 3

neis articulati. Tota circa Dorsum κατὰ γὰρ φος id est versicoloribus picta maculis, Castaneæ seu figulinæ testæ colore, sed magis rufa. Vertex Capitis ex fusco rubet, nigris maculis respersus. Palpebra superior ferè Cocci colore splendet, cui adsunt utrinq; maculæ candidæ. Mentum nigrum, è quo ejusdem coloris tenues quædum pennæ cui villi dependent, tanquam barbulam efficientes. Cauda quàm Perdici longior, ut Dorsum varia ex pennis quindecim constans, coloris in extremitate glauci, Paulò interius linea nigra transversalis, digitum lata, exceptis mediis duabus, quæ ea carent. Ad latera sub alis & pectore maculis ferrugineis tingitur. Venter albet.

Frequens apud nos in Suditorum jugis, circa Gigantæum montem, & aliis alpinis tractibus. Ad plana rarò descendit.

Vivit ex julis seu nucamentis Coryli, Betulæ, gemmis primis Betularum, filiquis Saltarellæ, acinis Sambuci alpinæ, baccis Juniperi, Vitis Idææ &c. Hæc omnia in

ejus ingluviè per intervalla dissecta à me fuere reperta. Tritico etiam & Hordeo vescitur in hypocaustis; at difficile manescit.

Coit osculatione, ut Columbæ post æquinoctium verum. Nidum parat sub Corylis, aut Filice montana maxima, in terra. Ova parit 20. Columbinis paulò majora.

Gallinæ Corylorum his anno capiuntur, Vere & Autumno, ac quidem frequentius. Laquei seu retia in terram illis locis, ubi degere solent frequentius, figuntur, quibus huc illuc discurrentes implicantur.

Caro ejus candida, tenera, delicata, saporis gratissimi, quam Magnates Boemiæ & Silesiæ, ut cibum prorsus nobilem, & ferarum Avium omnium laudatissimam prædicant, adeò ut Principibus etiam commodè apponi possit. Man kan einen Fürsten darmit bewirten.

Calefacit, siccatur, probè ac multum nutrit, bonum ac laudabile

laudabile Corpori suggerit
alimentum, facilius digeritur,
& excrementorum expers.
In cibo Arthriticis, Paralyticis,
Epilepticis, Calculosis,
Stomachicis salutaris. Bonum
Corpori colorem conciliat.

Cerebrum roborat, & intellectum
ac genituram auget.

Assatur ut plurimum, transfixo
Lardo, Caryophyllis, Cinnamomo.
Elixatur etiam superfusio liquamine ex
vino, saccharo & aromatibus
ac passulis condito.

Bohemix Magnates & Barones,
ut lautissimum ferculum, feria
Paschatis solenniter, nescio quia
superstitione, mensis offerre solent.
Hinc alii aliis, iis carentibus, muneris
loco ad multa miliaria dono mittunt.

Femina suffitu plumarum
utero strangulatas erigunt,
non aliter ac Perdicum pen-
nis.

Quidam inter Attragenem
& Gallinam Corylorum distinguunt,
cum revera sexu saltem differant,
veluti in

Vrogallo & Grygallo idem
observare licet.

Gallo-pavus.

Pavo gallus.

Gallus Indicus.

Gallus peregrinus *Petr. Gyll.*

Meleagris *Turn. & Bell.*

Gallina Africana.

Numidica.

Sin Calcuttisch Hun/

Indiantisch Hun/

Welsch Hun.

Corpore est rotundo, Pavonis
majore, Cruribus procerissimis,
in quibus ungues aduncitate &
distinctione nostratibus similes.
Plumæ tum Accipitris speciem
similitudinemque gerunt, tum
extremæ albæ visuntur. Caput
autem plumis omnino nudum,
pelle tantum obducitur
carnosa rubescens, quæ nihil
aliud est quam appendix
quædam Cutis, quam nunc
extendit, & per Nares adeo
demittit irata, ut rostro
promineat, nunc contrahit,
seu in pastu ita retrahit, ut vix
videri

videri queat, cristam appelles : nunc cæruleo colore, mox pallido, dein purpureo, pro affectibus, ut apparet, suis pingit. Caudam instar Pavonis subito extendit, & in rotam agit. Acri atq; acutè videndi sensu viget. Vocem cum fragore per collum longè lateq; vagantem reddit, ut liqvorem in dolum infusum diceret strepere. In sua tamen voce gallinaceum quiddam recinit Gu, gu, gu.

Ex Novo Orbe primum alatus, hodie passim in Nobilium & divitum aulis alitur.

Avis est voracissima, & magnus sumtus in educandis alendisq; requiritur.

Fruitur in cibo Cerealibus omnis generis, ut Gallinæ.

Feminæ minores sunt. Ova pariunt albicantia, maculis rubentibus respersa. Incubant diebus tricenis: Adeo occupantur negotio incubandi, ut cibum sumere sæpè obliviscantur. Hodie frequenter iis supponuntur Ova gallinarum domesticarum, quæ feliciter excubant.

Gallopavi in cibo habentur lautissimi, & Principum mensis digni.

Caro alba, saporis, duriuscula, constans, præbens alimentum; maximè si probe concoquatur.

Glareola.

Gallinula palustris,
Ardeola littoralis,
Ardeola arenalis.

Sand Bogel/

Wasser Hühnlin/

Sand Regerlin/

Mott Hühnlin.

Plurima in Silesia æstate visuntur genera, magnitudinè præcipuè & coloribus discreta.

Rostrum omnibus rectum, modicè flexum, plerumq; nigrum, Cruscula oblonga, digitis fissis, quorum posterior, qui loco Calcis, vel perbrevis & nullus Corpus gracile adductum. Caput proportionè parvum. Cauda brevis.

Pars Capitis supina, quæ inter Rostrum & Collum multis albet, ut etiam Venter, sed aliis simpliciter, aliis maculis fuscis distinctus. Maxima alarum pennæ, omnibus ferè nigrae aut nigricantes, paucis exceptis.

Circa fluvios & torrentes locis

locis fabulosis & lapidibus
plenis æstate versari solent.
Vermiculis, Insectis aqvati-
cis, arena & limo victitare
solent. Plurimarum ventri-
culos dissecui, at nullos Pisci-
culos animadvertere licuit.

Glareola I.

Erythropus 1. *Gesn.*

Redshanka *Turn.*

Rottbein/Rotsüßel/

Wasserhühnlin mit roten
beinen.

Rostro est oblongo & ni-
gricante per summum modi-
cè inflexo, pennis fuscis albo
passim inspersis, ventre albo,
fuscis per transversum macu-
lis intercepto.

Glareola II.

Gallinula palustris 2. *Gesn.*

Erythropus minor *Gesn.*

Ein Kopkiegerse/

Kobel Kegerlin/

Sandvogel.

Magnitudo ei Coturnicis,
pauló major, Coloris fusci,
maculis cinereis undulati,
præsertim in Capite, Dorso
& alis superioribus, quas ni-
gricantes per medium linea
alba transversum distingvit.
Collum ambit circulus du-
plex, niger superior & candi-

dus dorsum versus. Alba
sunt, gula, Collum, venter,
Alæ interiores. Crura ex fu-
sco rubent, digitum longa,
tenuia digitis saltem ternis,
quorum bini interiores ali-
quantulum pellicula jungun-
tur, ungviculis minimis, tenu-
issimis, acutis, nigris. Ro-
strum fuscum, supra Nares &
rostrum tantillum rubet. Dor-
sum ut Coturnices varium.
Vertex ut in Alauda cristatus
apparet.

Ad littora fluviorum are-
nolis nidificat Pygalampidi-
bus & vermibus vescitur.

Glareola. III.

Gallinula aqvatica 1v.
Gesn.

Ochropus magnus Eidem
Ein Schmirring/ Geel-
füßel.

Varii est coloris. In toto
Corpore rufa apparet, in bre-
vissimis alarum pennis extre-
mis etiam rubens, ut in Rubri-
ca fabrili. Alba tum in capi-
te & circa Oculos, tum in
mediis alarum pennis & in
ventre. Longissimæ Alarum
pennæ nigræ sunt, & alibi
passim in Dorso, Cauda, Col-
lo & Alis maculæ nigricant.
Palpebrarum margines color

N n croceus

croceus tingit. Est & fusci vel cinerei nonnihil in alis. Crura subflava, ut & Rostrum, ad dimidium usq; Anterior enim pars nigra est.

Nidificat inter fruteta & Musco & gramine.

G. lareola

I V.

Gallinula aquatica, 8. Gesn.
Ochropus medius, Eid.
Grünfussel/
Mattnüllis.

Magnitudine est Merula.
Rostrum duos digitos longum, gracilius, fuscum. Dorsum fuscum, cui in collo nonnihil cinerei admixtum est.

Alarum longiores pennae nigrae. Cauda brevis, alba, sed circa finem lineis transversis nigricantibus distincta. Passim exigua puncta albicantia, per Dorsum praesertim, in minoribus Alarum pennis conspiciuntur. Venter candidissimus. Pars Capitis inferior candida. Crura longiuscula septem digitorum ad medium usq; plumosa, dein ex flavo obscure virentia, digitis quaternis, minimo posteriore. Antiores mem-

branula perbrevis conjungit, Ungviculis tenuiss. acutioribus fuscis. Lingua in oblongum bifidum mucronem definit.

Ventriculus apertus continebat limum & Vermiculos

G. lareola

V.

Gallinula palustris, 12. Gesn.
Ochropus minor, Eid.
Ardeola arenalis,

Ein Kiegersin/ quasi
motricula,
Sand Kiegersin/ sil.
Tullis.

Minima est inter Gallinulas, Rostro nigricante. Collum album, idq; altius quam in ceteris: idem linea fusca, ceu torqve cingitur inferius. Caput cinereum, in quo spacium supra Oculos nigrum, inter albas utrinq; maculas continetur. Dorsi alarumq; color ad cinereum vergit. Longissimae Alarum pennae nigricant. Crura sublutea. Pedes ternis digitis divisi, Venter subalbidus.

In arenis ad littora fluviorum nidificat. Ova parit ut plurimum

plurimum septem oblonga. Cursus est velocissimi, & noctes totas Aestate littrā, à quibus nunquam recedit, voce clangosa percurrit, Tul, Tul, Tul, Tul.

Insectis aquaticis fruitur.

Glaræola

V I.

Gallinago vel Gallinulæ genus nomine ignoto, *Gesn.*

Gallinula palustris holosericea.

Ein Samet-Hünle/

Mott-Hünlein/

Schwarz Wasser-Hünle.

Color ei ater & subrufus per totum ferè Corpus, instar Holoserici splendens, punctis albis maximè super alas sparsis. Crura alba & fusca sunt, digiti prælongi membranula coherent latiuscula, postremo breviusculo. Rostrum oblongum nigricat. Pars prona albet. Cauda alba nigris lineis transversim variat.

Rarior est cæteris, & similiter vermiculis ad aquas nutritur,

Glaræola

V I I.

Gallinago cinerea.

Ein Aesch-Hünlein.

Dorsum & Alarum pennæ minores obscuro fumi sunt colore, majores verò sunt nigriores. Crura fusci coloris, minimo roseo admixto. Colum, Pectus & Venter cinerea sunt. Cauda digitos tri, longa Rostrum longiusculum fuscum. Ad latera sub alis minutioribus lineis transversis ornatur.

Glaræola

V I I I.

Gallinula palustris, *λεονό-
πυγος*, seu *πύργαγος*, *Gesn.*

Bunde Wasser-Hünlein/

Gescheckt Mott-Hünle.

Magnitudine & colore ferè est Sturni, inferiori alarum parte maculis sparsa, albicante orrhopygio. Femora usq; ad medium plumosa. Pedes ex fusco virent, inter cujus digitos duos majores membrana interjacet.

In Ventriculo Vermiculi & Muscæ continebantur.

Odorem spirat gravem.

N n 2

Glaræola

G. lareola I X.

Cenchramus Nonn.

Gallinula novalis minor

fleir Brachvogel/

Mattfarn Argentinensibus.

Longitudo ei quadrantalís & digitorum duorum, magnitudo Ortygometræ. Crura leucophæa altiora, crassiuscula digitos vii. longa, digitis longiusculis, unguiculis latiusculis acutis. Rostrum rectum, acutum, ex obscuro flavum. Color Capitis, Cervicis, Dorsí, Alarum, Caudæ, ex fusco flavus seu fumo similis, maculis per Dorsum & Alas partim nigris, partim candidis, aspersus. Remiges Alarum nigræ, interiores subnigricant. Circa Rostrum & Oculos albet, ut & Collum superius cum Mento. Venter cum Cauda fuscus, media nigra, apicibus extremis candidis. Felle caret.

Admodum pingvescit.

In cibum venit Assa, esui grata, haud mali saporis.

Grus.

ῥέξανθ' ὅτι ὡς ἡ γῆ ἐξεννέει ἀπὸ τοῦ τῆς γῆς ἐξεννέει, ab eo quod terræ semina perscrutetur,

Κλαροῦς

Ein Kranich/

Kran.

Vipio. ein Junger Kranich.

Avis advena, Ciconiâ paulo major, Rostrò acuto, Cruribus altis, fuscis. Color maximè cinereus, præter Alarum majores pennas quæ nigricant. Digiti humanis non breviores. Vertex niger cum macula rubra. In alis retrò versus Caudam pulchræ & crispæ sunt pennæ, quas auro vel argento ornatas juvenes pilis affigere solent, Kranichs Siedern.

Grues κλάζον clangere dicuntur.

Frugibus & seminibus vescuntur.

Non nidulantur apud nos, sed pro delitiis in aulis Nobilium quondam aluntur. Mansuefactæ lasciviunt, gyrosque quosdam in decoro cursu vel singulæ peragunt.

Grues torminosas in cibo profunt. Jus earum vocem clarificat, spermaque auget.

Caput, Oculi, Ventriculus exusta pulv. fistulis & varicosis ulceribus insperguntur.

Axungia emollit, digerit, resolvit omnes durities.

Rigor Cervicis grui adipe mollicur

pe mollitur velocissimè, negantq; illos ullo labore lassificare, qui nervos ex alis & cruribus Cruris habeant.

Fel adversus Oris torturam & Oculis prodest.

Qui sibi nocturno metuunt dormientes à venenosissimis animalibus, nutriant secum Grues Avic.

Salutis ergo, medio Autumno, frigoris vim non sustinentes (tanquam terræ ambitum, Cæli mutationem, temporumq; varietatem scientia & cognitione comprehenderint) frequentes in Ægyptum, Lybiam, Æthiopiam, aliasq; Orientis regiones proficiscuntur, ubi cum hybernium tempus traduxerint, latissimiq; dies ac tranquillillucescere cæperint, ad patriam sedem remigrantes, nidos suos sine duce repetunt.

Septembri mense discedere incipiunt. Volant altè, ut procul prospicere possint, & inter volandum ordine ac serie λαμβδὰ græcum expriment, unde *Martialis*:

Turbabis versus, nec littera tota volabit,

Unam perdideris si Palamedis avem,

Si nubes tempestatemq; viderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt. Ducem etiam habent, & eos qui clamant dispositos in extremo agmine, ut vox percipi possit, cum consistunt ceteræ dormiunt, Capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes. Dux detecto capite prospicit, & quod senserit, voce significat.

Gryphus.

γρῦψ
γρῦνος à rostri & ungvium aduncitate qua Aquilam referre dicitur.

Ein Greiff

Gryphes ajunt quadrupedes volucres esse Indiæ ferocissimos, Corpore & ungvibus Leonis, Ore & alis Aquilinis, sed candidis, Oculis igneis & Capite, cujusmodi pictores fingunt, nidosq; in montibus extruere.

In Asiatica Scythia aurum effodere, & cum his assidue bellum esse Arimaſpis circa metalla, Autores scribunt.

Gryphes olim saxa arcis Greiffenstein inhabitasse vulgi opinio est. Inde etiam Oppido Gryphibergæ patriæ meæ ad Qvadum fluvium in

N n 3

um in

um in monticulo extructo
nomen cessit.

Hirundo.

Χελιδών

Χελιδών.

Hirundo ab hærendo.

Ein Schwalme/

Schwalbe.

Avis est parva, æstivalis,
non nisi in volatu flexuoso
Muscas captans. Venter
ei longior, neq; gulam habet
ampliorẽ, neq; ingluviem.
Fel aliàs ventri, aliàs Intesti-
no hæret. Nulla arte man-
svescit.

Nidum mira arte ex luto
fingit, & stramento seu paleis
roborat, plumis floccisq; con-
sternit, tepefaciendis ovis, si-
mul ne durus sit Infantibus
pullis. *Pontanus.*

Garrula limosas sedes moli-
tur Hirundo.

Ova parit candida, & Pul-
los magna solertia fovet &
alit. Notabili munditia ege-
runt Parentes excrementa
pullorum, adultioresq; cir-
cumagi docent, & foras fa-
turitatem emittere.

Ad Arcturi ortum in loca
vicina tepidiora secedunt, &

in angustis Montium recessi-
bus se condunt, circa 7. Ca-
lendas Martii deñuó conspi-
ciuntur. *Olaus Magnus lib. 9.
cap. 11.* Hirundines si frigore
præveniantur, mutuó conglø-
bantur per plurima os ad os,
pedem ad pedem, alam ad a-
lam mutuó conjunguntur,
atq; se in aquas præcipitant,
totaq; hyeme immersæ ita
conglobatæ persistunt ad usq;
ver proximum. Idem Pisca-
tores in Borussia observarunt,
extrahentes Hirundinum co-
piam.

Hirundinum qvatuor a-
pud nos apparent genera.

Hirundo I.

Hirundo domestica.

Ein Haus Schwalbe/

Gübel Schwalbe.

Avis est levissima, parva,
rostro parvo, dorso & alis de-
center nigra, caruleo ad late-
ra per caput & alas refulgen-
te. Venter totus albus cum
macula rubra, qvæ sub guttu-
re & pectore emicat. Cauda
longa bifurcata, pedibus ni-
gris, brevibus & debilibus.

Insidiatur

Insidiatur Muscis & Culicibus, quos in volatu capit, nec Apibus parcat.

Tecta nostra subit, & nidum ex luto & stramine facit figura semicirculari, & plumis floccisque consternit.

Ova parit quinque; magnitudine Olivæ, maculis conspersa ferrugineis, bis in anno.

Garrula est avis, diem prænunciat, & dormientes excitat. Proprium eius, τῆλεμα.

Cum primum redierit Vere, quod fit mense Aprili, cantu pristinis nidis inventis applaudere, & sibi gratulari videntur, mirifico, vario & quasi articulo, ut verbis etiam quibusdam suum gaudium testari videatur vulgo. Septembri recedit. Autumno quibusdam in locis, veluti circa Legnicium retibus capiuntur, pauperculisque in cibum cedunt.

Pulli in Cibo summi Comitialibus profunt, aciei visus medicamentum præbent, & Colicis opem ferunt. Crematarum cinis cum Melle oblitus, Oculis claritatem affert. Anginæ eo commodè perjunguntur, Uvæ, &

Tonsillarum inflammationibus commodè succurrit. Cum Melicrato potus Raucedines sanat.

Aqua Hirundinum.

Schwalben Wasser.

Hirundines juvenes tritas misce cum Castoreo, & cum bono aceto destilla.

vel,

℞. Pullorum juvenum nov. xxv. purgentur & laventur vino diligentissime. Adde

Sileris montani, Card. bened. an. drach. 2.

Amomi. Cyperi longi an. drach. 1.

Rad. Pyrethri, Zingib. alb. an. scrup. 2.

fem. Peoniæ unc. 1.

Cubebarum. Corn. Cervi usti,

Nuc. myristicæ an. drach. 2. f.

Sampfuchi, Rutæ an. P. ij. f.

Castorei el. unc. 2. f.

Rad. Peoniæ unc. 5.

Vini Malvarici ℥. iij. Destillentur in balneo Mariæ.

A jejuno pota, vera est medicina Morbi caduci, ex quacumque causa subortus fuerit.

Nidus

Nidus Hirundinum cum oleo violaceo & Anethino in Cataplasmate, Parotidibus, Anginæ aliisque faucium tum moribus utiliter imponitur.

Viperarum moribus commodum remedium.

Stercus acre est, digerit magis quam aliorum Animalium. Celsus causticis annumerat.

Vulgi opinio est, si quis Hirundines domesticas irritaverit, quod vaccarum ubera advolent, & iis punctis arefcere faciant.

Chelidonias.

ἡ χελιδονίας λίθος.

Chelidonia gemma

Chelidonium lapis

Ein Schwalbensteine.

In ventre pullorum Hirundinum reperiri lapillos, Plinius autor est. Plures secui, lapillos vidi, sed vulgares. Ab amico Chelidonium habeo Lente paulo maiorem, figura globuli dimidiati, ex subrufo flavicantem, levisimum.

De collo Puerorum suspensus, Comitialibus utile perhibetur remedium.

Alii amatoribus artibus aptos habent. Adduntur ad

Oculorum collyria.

Hirundo I I.

Hirundo domestica altera,

Ακάνδυλις Arist. Bellon.

Hirundo agrestis sive rustica Eber. Penn. & Vlyst. Aldr. Plinio.

Hirundo apes minor Turn.

Leimswalben/

Laubenschwalben/

Fenster schwalbe/

Dachswalben/

Kirschschwalben.

Minor est priori, Imo ventre ad collum usque; albicat, reliquo corpore nigro, nihil rubedinis habens. Pedes minores, pennis obvestiti.

Muscis infesta.

Nidum sphaerica figura confuit, quem parietinis domorum & fenestris appendit: hunc luto concludit usque; ad arctum foramen, per quod intrat & exit.

Passeres saepe earum nidos, expulsis Hirundinibus, occupant, & in iis nidificant.

Cinis hujus Hirundinis ex Aqua calida potus, Anginis succurrit.

Hirundo riparia s.

I I I.

Αρεπαις Arist.

χελιδών

Χελιδὼν θαλάττης

Hirundo riparia seu falcula, Gaz.

Ripariola Marcell. Empir.

Ein vser Schwalbe/

Rein Schwalbe/

Wasser Schwalbe

Minima est omnium, tota pronè, præter pectus, candicat, supinè fusca est. Mas magis nigricat, item collo toto, præterquam sub rostro ubi macula est, lutescens.

Ripas excavat, atq; ita in terra nido ex musco in pilæ formam constructo, plumulis substratis mollissimis fœtificat.

Hyberno tempore in ripis latet fluminum, lacuum, paludum, & in litoribus ac scopulis Maris. Unde accidit, ut piscatores interdum ita inter se junctas ex aquis extrahant.

Pulli ad cinerem ambusti omnium efficacissimè, mortifero fancium Morbo, multisq; aliis morbis humani Corporis medentur.

Hirundo I V.

Hirundo muraria

Απουξ Arist. non quod sit sine pedibus, sed quod careat eorum usu.

Κυψέλλος,

Apes, Depes,

Hirundo saxatilis seu speluncaria.

Mauer Schwalbe/

Geyer Schwalbe/

Spyr Schwalbe.

Maxima est omnium, toto Corpore unius coloris, nigricantis videl. ad cæruleum vergentis, præter Mentum quod macula alba decoratur. Caput obtinet supra admodum latum, Collum verò brevissimum, rictum amplissimum, Palpebras more terrestrium supra & infra Oculos. Rostrum ei exiguum nigrum, prope extremitatem acutum. Alas habet insuper longas, Caudam bifurcatam. Crura brevissima, ad digitos usq; pennis obvestita, digitos tandem utrinq; binos, ut in Pico Martio, ungibus armatos acutis.

Ventriculus crassus longior ad podicem situs est, Hepar rubet, inter quod & Intestinum, Vesicula longiuscula Fel continetur.

Perpetuò circumvolitant, nec confidunt unquam. Nulla enim his quies, nisi in nidis aut pendent aut jacent: ex-

O o tra

tra nidos semper *μετὰ τοῖς*
sunt. Insectis per aëra voli-
tantibus, Muscis, Apibus, nec
non Araneis victitant. Aedi-
ficiorum & templorum mu-
ros, cavernulas & Montium
scopulos expetit. Nidum spe-
cie cistellæ longius productæ
fingit ex luto, uno aditu dato
arctissimo.

Hirundines murariæ &
maturiùs mox post D. Jacobi
festivitatem recedunt, & tar-
diùs scilicet. Majo revertun-
tur, cum nullas ampliùs sen-
serint restare pruinas. Pueri
eas capere solent plumis, aut
cicadis hamo affixis, & per
baculum è fenestra suspensis:
quas Aves impetu petentes,
& deripere volentes, hamo
affixæ hærent.

Ex vino sumtas sanare tor-
mina Plinius testatur.

Hordeola.

Emberiza alba, *Gesn.* &
Viss. Ald.

Alauda alba, *Gesn.*
an Passer sylvestris ma-
gnus.

Passer magnus Solitarius.

Ein Gerstling / sil.
Gerst Vogel

Gersthammer /
Weisser Goldammer /
Weisse Emmeris.

Corpore est longiusculo,
Emberizæ flavæ seu Aureo-
læ non absimili, colore Alau-
dæ. Longa est dodrantem,
lata sesquidodrantem. Ro-
strum breve, crassum, acutum,
in superiori parte longius
quàm in inferiore, quæ albi-
cat. Tibiæ & digiti ex pu-
niceo fuscescunt. Vertex
cum Dorso cinereus, maculis
longiusculis fuscis respergi-
tur. Alæ & Cauda fusca,
apicibus extremè albicanti-
bus.

Gula & Pectus ex flavedi-
ne albent, punctis ut Turde-
læ varium, ventre inferiore
candicante. Cauda longius-
cula cinerea. In superiore
fusci Rostrum parte retrò mu-
cronem, tuberculum hordea-
cei grani ferè similitudine
conspicitur.

Nidum in terra collocat.

Hyeme circa horrea con-
spicitur. Autumno cum A-
laudis aliquando in agris se-
gere demessa capitur.

In cibum recipitur, ut &
Aureola.

Lanius

Lanius major.

Τύραννος, Aristot.

Εινεόντων,

Μαλακοκράνευς, Eber. & Peuc.

Collurio femina, Vhs. Ald.

Lanius cinereus, Gefu.

Pica cana seu ex cinereo, subalbida,

Falconellus,

Spinitorquus,

Sylvorum dominus.

Ein Wan Krenge/sil.

Wan Krenge/sil.

Wan Enges/sil.

NeumWörder/sil.

Waldt Herr/sil.

Waldt Hsher/sil.

Mediae magnitudinis avis, virione paulo minor, longitudinis dodrantalis. Rostrum habet crassum, durum, aduncum, nigrum. Tibiæ graciles, nigrae, vngvibus atris splendentibus, acutis. Color Capitis, Colli, Dorsii, ad uropygium usq; cinereus, ad cæruleum vergens. Maculae utrinq; longiusculæ atræ a Rostro per oculos Collum versus. Pili recti supra rostrum prominent. Venter, Alæ interiores, Caput imum

candida. Lingva bifida. Oculi ex fusco spadicei, pupilla nigra nitente. Alæ nigricant, præter lineam in medio transversim ductam albam, digitum latam. Cauda nigra, extremis duabus utrinq; albis.

Vocē donatur clamosa, canino latratui simili, quam hyemis, præsertim tempore frequenter & ad nauseam usq; repetit, Hovia, hovia.

Versatur plerunq; inter frutices spinosas. Fruticum & humilium arborum summis furculis insidet, in iisdem nidificat. Nidum ex musco, lana, & aliis tomentosis quibusq; construit. Senos pullos in nido ut plurimum reperire licet.

Vivit ex scarabæis, Papilionibus, grandioribus insectis, Avibus etiam minoribus, fringillis, regulis, rubeculis, & aliis, quibus collum quam citissime confringit & conterit.

Cantillat, & varias modulationes vocesq; Avium æmulator, Vere præsertim, æstate & autumnno, quo aves ad se capiendas alliciat.

O o 2

Data

Data enim opera exclamat,
aliorum sonos imitatus, eo
fine, ut illas, generis sui avem
qvampiam opprimi, ac egere
subsidio credentes advolan-
tesq; si qvæ proprior facta
est, arripiat, lanietq;.

Aplebeis nonnullis in ci-
bum recipitur.

Lanius minor varius.

Collurio mas vlyß. Aldrov.

Spinitorqvus minor.

kleiner bundter Wankren-
gel.

klein Wankren-
gel/
Dornträger.

Toto habitu est pauló mi-
nor. Vertex & Dorsum cine-
reo quidem tinguntur colore,
sed obscurius fuscescunt. Gu-
læ, Pectoris, Ventris, femo-
rum, Caudæque pronæ color
dilutiùs albicat, extrema ve-
rò nigris maculis variegatur.
Rostrum crassum, nigrum,
acutum, modicè incurvum.
Crura, pedes fusca sunt, un-
gviculis nigris, acutis.

*Lanius minor
rutilus.*

Lanius parvus, rubeus,

Ein kleiner roter Wankren-
gel/

roter Wankren-
gel.

Passeris sylvatici est ma-
gnitudine, seu Iyngis, cui non-
nihil similis.

Supina parte tota rufescit,
ut & Vertex Capitis, lineolis
seu striis obscuris transversis
varius. Venter albet cinereis
punctis notatus. Macula ut
aliis, sub Oculis nigra. Ro-
strum aduncum cornei colo-
ris: Pedes glauci ungviculis
fuscis.

Autumno visco capitur,
Aviculas minores jam visco
hærentes dum persequitur,
ipse met visco intricatur &
capitur.

Ad cibum aptior reliquis,
delicatus & salubris.

*Larus major ci-
nereus.*

Λαγος, á Laris pisciculis
qvos comedunt.

Larus cinereus,

Piscator,

Gavia.

Ein weißer Seeschwalbe/
grosser Seeschwalm/
grauer Meerschwalm/
FischÄhr.

Avis magnitudine Colum-
bam parùm superat, oblongi-
or, tota improbè clamosa.
Longa spithamar. ij. & dig. j.
lata spithamar. qvinq; &
digitor.

digitor. vi. Crura coccineo rubent, membranis digiti rubris sepiuntur. Rostrum digitos ij. s. longum, leniter incurvum quoque rubet, superna parte rima longiuscula perfossam. Alæ magnæ & oblongæ.

Color undiq; niveus, præter alas superiores & dorsum tantum, quæ cinerea sunt. Extremæ & longiores Alarum pennæ altero latere albæ sunt, altero partim albæ, partim nigrae, apicibus extremis omnibus acerrimis. Caput totum fuliginæum est, prona parte ad medium usq; Collum. Oculos nigros iris ambit cinerei coloris, Ora extrema Palpebrarum rubra, quæ instar circuli Oculos exornat.

Os interius totum & lingua, quæ bifida, rubent.

Gula amplissima præponitur ventriculo longiusculo crassiusculo, cujus interior tunica crassa rubra est.

Hepar maximum flavicans bilobium ventriculum infra amplexatur, supra Cor mucrone recipit. Lien longiusculus sanguinei coloris, Fel viride vesicula longiuscula in Hepate continetur, & Intestino ramulo jungitur. Ad In-

testinum rectum appendiculæ binæ graciles & tenues antrosum reflexæ.

Totus levis est ac plumis abundat, parum carnis habet.

Volat ferè perpetuo super lacus, paludes & fluvios etiam, raro quiescens, sed prædæ inhians. Ex alto ad prædam piscium se demittit.

Nidulatur in densis arundinetis piscinarum & lacuum, Majo & Junio Ova parit quinque, Colubinis paulo majora. Vescitur pisciculis, Insectis palustribus, Muscis & Conchulis.

Ferinum & piscosum quidam sapit, cibo inutilis.

Larus albus erythrocephalus.

Larus major capite rubeo

Ein Rottköpfichter Seeschwalbe/

Priori similis ferè, præter verticem qui insigniter rubet.

Larus minor cinereus.

Larus piscator Gesn.

Gavia minor

Ein klein Seeschwalbe.

Rohrschwalm/

Fischerlin/

O o 3

Longitudo

Longitudo sesquidodrantalis, Pica minor. Rostrum habet longum, rectum, pulcre rubens, extremo nigro. Pedes similiter rubent, digitis ternis membranula coherentibus, & posteriore minore, ungviculis nigris. Color in Dorso & Alis cinereus, vertex Capitis niger, Venter & cauda albicant. Sunt alæ longissimæ, & Cauda bifurcata.

Æstate in lacubus passim obviant.

Larus minor niger.

Larus niger *Gejn.*

Meva nigra,

Ein klein schwarzer See-
schwalbe/

Schwarzer Mewe/

Meyvogel/

KleinMübecklin/Nonn.

Magnitudo ei Turturis ferè, longitudo dodrantem & digitos ij. æquat. Niger est Roistro, Capite, Collo, Pectore, & Dorso supino ad Alas usqve, maculis utrinq; circa Oculos ad Rostrum albicantibus. Alæ dodrantem longæ, ultra Caudam, quæ non divisa, extensæ, cum reliquo cinereæ; sub Cauda alba est. Crura & pedes latiusculi rubent, nigricantibus

transversim anteriùs maculis. Ungves acuti nigri, leviter adunci.

Oculi ex fusco purpurescunt, pupilla nigra.

Nidum in arundinibus piscinarum suspendit, & Majo parit.

Linaria.

Agithus Arist. Bellonii,

Ligurinus,

Miliaria *Ruell.*

Miliaria rubetra *Longol.*

Linota *Gallus.*

Ein Henffling/ *Sil.*

Leinsincke/

Flachs Sincke.

Avicula est Passeris magnitudine, seu pauló minor, & specie, Coloris ex cinereo testacei, in pectore & ventre maculis sangvineis aspersa. Alarum rectrices pennæ fusæ, ad latera & in extremis, tibus suis candicant. Crura brevia, gracilia, ungviculis tenuibus, sva vissimi cantus.

Duplex est.

1. Linaria fera,

Linaria saxatilis,

Gejn.

Stein-Hensfling/

2. Linaria mitior,

Hensfling.

Kraut-Hensfling/

Alitur Papavere, sem. Li-
ni, Cannabis, Rapi, qvo diu-
tius & melius durat.

Nidum in vepribus & du-
metis suspendit rotundum,
ex paleis, musco, fæno, cul-
mis, & fetis eqvinis. Qua-
tuor & qvinq; parit ova.

Omnes voces edocta faci-
limè imitatur, potissimum si
mox á nido educato fuerit in
caveis. Comitali facilè
corripitur. Cibo utilis.

Linaria viridis.

Χλωρίς Aristot. Gesn.

Chloris,

Fringilla viridis,

Miliaria;

Viridia.

Ein Welscher Hensfling/
sil.

Grüner Hensfling/

grüne Fincel/

Hirsch Fincel/

Hirschvogel/

Grünling/

Grünvogel/

Alaudam ferè magnitudi-

ne refert, Rostro breviusculo
rotundo, extrémè acuto, co-
loris superius cornei, infrà
carnei. Pedes molliusculi,
digitulo maximo medio an-
tico. Tota superficietenus
ex cinereo luteo ad viridem
colorem vergit. Alarum
maiores pennæ, & Cauda bi-
furcata ex cinereo & castaneo
nigrescunt.

Inter spinas degit pluri-
mum, & ex herbarum semi-
nibus victitat. Non adeo fre-
quens ut prior.

Cantat amœné, Milio &
Cannabi in caveis nutritur.

Luscinia.

Αυδὴν ab αὐδῆν, vel ὄν
αὐτὴν αὐδῆν, qvòd sine intermis-
sione ferè cum cepit, canat.

φλουήλη.

ελουγὸν

Acredula Cicer. Nonn.

Eine Nachtigalle/

Avicula passere pauló mi-
nore est, Curruca magnitudi-
ne. Rostellum oblongiuscu-
lum ei, & teneriusculum atq;
molle. Caput Collum &
Dorsum ex phœniceo seu
spadiceo ad cinereum
qvodam-

quodammodo vergente colore decorantur, qui color spadiceus in alis & cauda dilutior est. Gula, Pectus, Venter, & uropygium subcinerea aliquantulum albicare videntur.

Cauda duodecim pennarum palmum longa, ut Rutilicillæ ferè spadicea.

Crura oblonga, ungues subtiles, aliquantulum incurvi. Lingula brevissima. Ocelli nigricant,

Duplex apud Silesios conspicitur.

1. *Luscinia minor.*

Luscinia montana

Ein Dörling / Aucupibus vulgò.

Kleine Nachtigal

Amœnis ut plurimum, & frutetosiss Montium locis degit & nidificat.

2. *Luscinia major.*

Eine grosse Nachtigalle

Nachtigalle / simpliciter.

Paulò major est superius descripta, tota ferè cinerea, parum rubedinis obtinet. Cantus svavitate & voce præcellit.

In planis versatur semper nec ad montes volat.

Victitat *Luscinia vermi-*

bus. Formicas & earum Ova avidissimè legit. In hypocautis aliquando oviss gallinarum ad duritiem coctis, nec non panis mica candida enutritur.

Nidificat inter frutices loco denso, non procul à terra. Eligit loca amœna. Nidum aliquando parat in terris, ex paleis & arborum foliis oblongum. Parit æstate quinos ut plurimum.

Avis est stolidi, curiosa, & minimè circumspècta, ob id captu facilis. Fossula in terram facta, decipulam Pueri collocant, superiore parte patentem, ut adeuntibus aviculis aditum præbeat, quæ tamen operculo cooperitur, cum opus est, & virgula quæ in altum erectum fulcitur, ne decidat prohibetur: Farinarios dein vermiculos. vulgò *Meeswürme* / intra & extra decipulam apponunt: Quos animadvertens ilicò occurrit, tracto loco dimovens virgulam, operculo delabente clauditur, miserculaq; capitur.

Tanta Cantus svavitate præcellit, ut nulla ferè Avium svaviore cantu dulcius aures demulceat & exhilarescat. Assiduè canit diebus ac noctibus quin-

bus quindecim, cum sylva fronde incipit opacari; deincant quidem, sed non assiduó: mox æstate adulta vocem mittit diversam, non insuper variam, aut celerem modularamq;

Hyeme á nobis discedit loca calidiora quærens.

Autumno pingvescit, Cachecticis in cibo commendatur.

Caveis inclusa diligentem requirit curam.

Luteola germanica.

Ακρίδις Arist. Gesu.

Ακρίδουλις

Χλωρίς Eber. & Peuc.

διὰ τὸ τὰ κατὰ ἑξαρ ὠχρεὰ id est á partis suæ inferioris colore luteo,

ωνίος Vlyß. Aldrov.

Ligurinus Gaz. διὰ τὸ λιγυρὸν τῆς φωνῆς á vocis argutie.

Serinus quasi Syren á vocis dulcedine.

Seris

Citrina,

Zifela,

Ein Zeisich/Zeisel/sil. á voce,

Zeisgen/Zenste/Zifse.

Avicula vulgaris notitiæ, colore viridi sed obscuro, non

splendido, Pectus luteum, Rostellum longiusculum, tenue & acutum. Maculas duas habet nigras, alteram in fronte, alteram sub Mento. Extremitates Alarum nigricant. Femina pallescit, cinerea nimirum, & ventre imo pulla.

Frequentissima, in montibus præcipue & nemoribus, in quibus per æstatem etiam nidificare solet. Fecundissima est. Nam duodenos & plures simul parit pullos.

In hypocauftis & caveis cantus gratia alitur papavere. Facile cicuratur, & imperata facere perdiscit pedibus & ore. Cum enim è fune hinc cibus, hinc potus propendat, Avicula hæc fune cibum & potum sibi è profundo trahit, alternatim laborans, quod sensisse aut vidisse conjicitur.

Mirum in modum pingvescit, boni ac laudabilis nutrimenti, saporisq; svis. Visco facile capitur.

Stercus alvum durum emollit, Infantibus ex lacte instillatum seu aqua decoctum, Paupercularum feminarum usu.

Luteola nigra.

Ein schwarzer Zeisig/

P p

Nigra

Nigra hæc tota visitur,
præter verticem qui flavescit:
In Aviario nobilis Georgii
Eeken.

Luteola Canaria.

Canaria Avicula, Gesn.
Passer canarius, Vlyß. Ald.
Canarius,
Citrina Canariensis,
Avicula saccharina.

Ein Canarien Vogel/
Zucker Vogel/
Canarien Zeisse.

Parum differt à Spino nostro. Magnitudo ei vulgaris
Pari, rostro albo parvo, in acutum tendente. Alarum &
Caudæ pennæ totæ virides. Femina masculo pallidior
est.

Afferuntur à Mercatoribus
ex insula Canaria, una ex iis
quæ Fortunatæ dicuntur, Oceani Atlantici.

Vescitur Lini & Papaveris
semine, Milio etiam, privatim
Phalaridis semine, saccharo eiusq;
arundine summo peré gaudet.

Væneunt singulæ numero
aureo, & à divitibus & nobilibus
solummodo aluntur:

Magnificus Dom. Sigis-

mündus á Czedlitz, præses
Camerae Casareæ masculum
cum femella Vratislaviæ in
hypocausto aluit, ita ut per
fenestram aliqui iis evolandipotestas
esset, pullos ex iis habuit & educavit.

Concentu valde amœno
est & acuto, quem spiritu diu
non interrupto, nunc in longum,
nunc in altum, varia vocis
inflexione, & Musica propé,
sané lepida & artificiosa
melodia extendit.

Mergus major.

Εἰς, Aristot.

Αἰδύια,

Αἰδύια,

Κόλυμπος

Κόλυμπος á κολυμῶν,
quod significat natare.

Colymbus major cristatus,
Urinatrix major,

Ein Teucher/

Grosser Kobel Teucher/

Straus Teucher/

Merch.

Magnitudo ei Anatis feré,
longitudinis cubitalis. Rost-
rum obtinet subrubens, canaliculatum,
in Acutum desinens, tres digitos longum,
Cristatæ

Cristatæ plumæ circa Verticem & Collum supremum eminent, superius nigræ, ad latera rufæ, instar pilorum vulpis.

Dorsum & Alarum majores pennæ fuscæ, minores albæ sunt. Parte prona Pectore & Ventre candicat, plumis ferè niveis. Crura juxta alvum ferè retrorsum porriguntur, glauci coloris, nationi potius quàm ingressui apta, femoribus in ventre conditis. Digiti pedum terni, lati, adherentibus membranis, sed aliquousq; divisi, non ut in cæteris aquaticis conjuncti, vngvibus omninò latiusculis, præsertim medio, fuscis. Cauda caret.

In fluminibus non admodum rapidis, stagnis & piscinis æstate frequens.

Alga, limo, gramine victitat, maximè Pisces persequitur.

Plures secui, & in omnium ventriculis reperi plumulas Avicularum copiosissimas compactas quasi cum pisciculis & arena.

Nidum arundinibus suspendit.

Pingvis est. Caro nigra in cibum venit: at piscosum sapit, & prævum succum generat.

Sanguis Mergi amphictoton est, & venenis resistit, præsertim Canis rabidi.

Ventriculus in cibo sumtus, Stomaccho medetur. Antidotis miscetur, veluti antidotis Esdræ Aëtii.

Mergi Hepar Calculos ejicere, Paulus, secundas non autem Calculos, Diosc. auctor est.

Pelles à Pellionibus elaborantur ad Uentriculum calefaciendum. Concoctionem promovent, non tantum calore suo, sed etiam proprietate.

Mergulus.

Mergus niger minor,
Mergulus niger major,
Merguli genus majus nigrius,

Colymbus minor.

Ein klein schwarz Teucherlin/

Schwarz Teucherlin.

Duch Endtsin/

Käfer Endtsle.

P p 2

Multò

Multo minor est priore, paulo major Columba. Per Caput, Collum, Dorsum niger est, Ventre albo. Circa clunes & femora, pennis quibusdam albis, aliis ruffis, Ad latera etiam Capitis post Oculos utrinque subrufis seu flavis donatur. Oculi nigri, Circulis croceis seu Cinnabarii colore. Genæ ejusdem coloris, quas linea rufa ambit. Rostrium acutum, nigrum. Pedes divisi, fusci, ungibus latiusculis. Alæ majorum pennæ fuscæ, inferiores candidæ.

Mergit sese, & conspectos pisciculos diu sub aquis prosequens huc illuc fertur, priusquam revertatur.

Merula nigra,

Κόττιφος, κόψινος

Κόσσυφος

δμῆλας, κόττιφος Arist.

Merulus

Merula quasi medula, quod moduletur.

Merula nigra

Merula vulgaris

Nigrettus Gesn. à colore nigro.

Ein schwarze Amstel/

Amstel/

Meerle/

Magnitudine est Turdi pi-

laris. Rostro longiusculo, recto, cereo, pedibus aterrimis, colore nigro & splendente. Colorem cum Rostri, tum plumarum, pro temporum diversitate mutat.

Femina paller.

Constitis nemoribus gaudet, in quibus nidum construit durum, & quasi glutino quodam firmatum. Bis parit anno quinque, ut plurimum: sed ejus primi partus facile pereunt frigore, cum omnium Anium prima hæc pariat.

Fruitur in Cibo Vermiculis, bacculis Sorbi alpinæ, Sambucique acinis. Clausæ ergastulo, carnibus & pane candido, sive farina hordeacea lacte permista, vescitur.

Capitur autumnis, laqueis inter duas arbusculas extensis, suspenduntur bacculæ Sorbi aucupariæ, quibus inescata illaqueatur.

Merula dulce canit, & vocis amœnitate seipsam oblectat, maxime cum vernum tempus imminere prospexerit: Post solstitium tacet, hyeme tantummodò balbutiens. Sæpe humanum sermonem imitatur, idque præstat facilius, si ferè implumis adhuc

adhuc é nido exempta educata fuerit.

Caro ejus calefacit & ficcat in fine primi gradus. Duriore est, concoctionis tardæ; parum alit, & succum procreat Melancholicum, Alvum sistit.

Prodest scabie vexatis, asfatus cum Myrtillis, & adversus dysenteriam estur.

Qui hæmorrhoidibus & cancris ulceribus vexantur, ab earum esu abstineant.

Alii Turdis præferunt, ut
Savandrola & Baptista
Fiera.

Si mihi pingvis erit Merulus,
tua gloria cedit

Turde, salutiferas vult mea
mensa cibos.

Igneus ardor inest major tibi,
sistitis ambo,

Tu gravior redolens, nî tibi
bacca faver.

Si tamen aucupius, laqueo vel
rete latenti

Falleris, inde mihi non mînus
ipse places.

Fimus ex aceto tritus Morpheæ
nigræ imponitur, & Lentigines
quoque extirpat.

Merula candida.

Εκλευκός Κόττιφος Arist.

Merula alba,

Ein weiße Amsel/

Magnitudine & voce prioripar est, sed rara. Aliquando in montibus nostris observatur. Capta fuit candida rostro flavo, in pago Liebthal à nobili Fr. Zedlitzio.

Merula varia.

Merula alba & nigra.

Ein Weisgescheckte Amsel/

Hæc tota nigra, præter Alarum pennas majores & caudam, quæ nîvei sunt candoris.

Apud nobiles quosdam caveis inclusas vidi; quæ cantu fuerunt mirabiles.

Merula alpina.

Merula montana Germanorum Vl. Aldrov.

ὁ φαίος κόττιφος

πελεκάνος

Merula fusca.

Ein Birg Amsel.

Stein Amsel/

Hag Amsel/

Paulo minor cæteris, Rostro & pedibus, Coloris ex nigro in fuscum vergentis, rufo quodam modicè admisto. Cauda atra. Venter ex cinereo & nigro mixtis. Saxa incolit Montium altissimorum.

P p 3

Merula

Merula torquata.

Merula montana

ἡ ἑαίος κορυφοῦς

Merula fusca Eber. & Peuc.

Ein RingAmsel/

SchneeAmsel/

WeerAmsel/

RohAmsel/

Turdi magnitudine similis. Inter Collum & Pectus parte prona plumas habet albas, duorum digitorum latitudine (non torquem in collo) Reliqua pars tota inferior maculosa est & varia, nigris in medio pennis ambitu albis. Rostrum inferius subflavum, tota pars superior fusca. Alarum pennæ margine extrinsecus albicant, præsertim quæ in medio sunt Crura ex nigredine obscure rubent.

Macula sub gutture femina candidior, Mari obscura, qui & nigrior & splendidior est.

Montium est incola, & hyemis initio capitur; nec singulis annis apparet.

Merula aquatica.

Merula rivalis

κορυφοῦς ἐν ὕδατι

Ein WasserAmsel/

WachAmsel/

SeeAmsel.

Paulo minor est merula vulgari, cui non dissimilis. Rostrum Merulae nigrum. Pedes fissi phæopi, Verticem Capitis obtinet fuscum, Dorsum & Cauda quæ brevis, nigra sunt. Collo supino ad Dorsi initium ex rubro nigricante. Alæ sunt partim nigræ, partim cineræ. Gula, Collum, Pectus alba sunt, Ventre rubente maculis seu punctis cinereis vario.

Secus fluentia vivit, limo vermiculis & arena in cibo fruitur, nec hyeme ab iis discedit.

Pingvescit, edibilis est, sed piscosum seu ferinum sapit.

Milvus regalis.

ἡ τῆς παρὰ τὸ ἰκνύμαι,

ἡ τῆνος

Αἴπην

λῆπν ἢ lupina rapacitate.

ἡ ἑαίος φελοκλόχος Eber. & Peuc.

Milvus quasi mollis Avis, scilicet viribus & volatu.

Accipiter

Accipiter ignavus seu Laniarius rubeus *Albert.*

Milvus rubeus

Milvus 2. *Vlyß. Aldrov.*

Accipiter rubetarius *Turn.*

Accipiter lævis,

Fur pullorum.

Ein Hünér Ahr / } á dilani-
Haw Ahr / } andis gal-
Hünér dieb / } linis Su.

Grimmer /

Weihe /

Schwemmer.

Avis notissima ex Accipitrũ genere, magnitudine & habitu Buteoni conformis est. Dorsum totum ferrugineum, cujus singularum plumarum oræ nonnihil albicant, intermixtis notis nigricantibus. Rostrum aduncum, nigrum, pennis minutissimis juxta Nares utrinq; rigentibus. Caput ex candido obscurè rubet. Alarum majores pennæ fuscae sunt. Collum plus candidi habet, Pectus, Venter & Alæ superiores lateritii coloris. Cauda inferior versus uropygium ex albo flaver.

Crura illi sunt crocea, humilia, Buteonis ultra po-

plites propendentibus plumis similiter ferrugineis dilutis obteguntur. Cauda nonnihil sinuata, cujus pennæ ferrugineæ quoq; fuscis notis frequentibus admodum & ordinatis, æquali ubiq; interstitio, transversantur. Ungues quaterni, nigri, adunci.

Cum vocem edit, lipire dicitur Er heulet.

Avis est rapacissima, carnivora & famelica. Infidiatur Avibus domesticis, maximeq; pullis gallinæci, & anserinis, quos incautos cum viderit, statim arripit. Autumno Mures & Columbas venatur, quibus ventriculum sæpè distentum reperire licuit.

Nidum parat in Abietibus & Piceis densissimarum sylvarum. Ternas plerunq; parit.

Verno tempore incipit apparere, certissimumq; est ejus nuncium. Hyeme latet in cavernis arborum, vel ad alia loca calidiora se confert.

Pingvescit

Pingvescit Autumno. Ejus pingvedo Articulorum doloribus illinitur.

Caro crassa est & dura, cibo in Sacris interdicta.

Fel Oculariis additur.

Milvus in fictili crematus potu Comitiales juvat.

Milvus albus.

Milvus major candicans
Milvi tertium genus albidius, rapacius *Turn.*

Lanarius albus *Vlyß. Aldr.*

Ein weißer Hünér Ahr/
grauer Meuse Ahr/

Magnitudine similis est regali. Color ei candidus, exceptis Alarum majoribus pen-
nis, quæ fuscae sunt. Rarius occurrit.

Milvus niger.

Ἰκτινός & ἰώνος *Aristot.*
Vlyß. Aldr.

Milvus i. seu niger *Eidem.*

Milvus fuscus

Ein Meuse Ahr/
Schwimmer.

Magnitudine Accipitri palumbario par. Caput, Collum, venter, & tota pars prona, uropygium, femora & Cauda inferna albicant. Rostrum unicum, nigrum, membrana lutea obtectum, quo Caput

contingit.

Dorsum, Alæ superiores, nec non Cauda superior fusca sunt. Majores Alarum pennæ nigrae. Femora ad media Crura plumis intacta. Tibiæ luteæ graciles valde, altiores Milvo regali. Digiti itidem lutei imbecilles, unguculis nigris uncis & parum validis.

Mures in agris inquirunt, Locustas, & pullos Avium, volandi adhuc impotentes, dum per terram vagantur, rapit.

Vulgatissimus est. Imbecillis volatus, ac si nataret.

*Milvus minor
rubeus.*

Key X^gle

Milvus rufus *Albert.*

Accipiter rubeus seu Buterius,

Lanarius ruber minor,

Tinnunculus accipiter *Gesn.*
à tinnitu per onomatopœian.

Ein Wannen Wäher/

quod alas extendat, ventiletq; instar ventilabri, quod vanum nominant.

Wandwäher/

Rötelweih/

Echweih/

Rötelweib/sil.

Parvum genus est Milvi,
Corpore

Corpore parvo, plumis Mustelinis aut Castaneis, ungribus aduncis nigris. Rostro Aquilino, pedibus flavis.

Reptilibus & insectis ut plurimum vivit. Papiliones, Locustas, Vespas & Mures capit & devorat.

Aviculas etiam insequitur.

In altis Urbium & pagorum turribus, quales sunt Templorum, in eorum etiam muris, nec non ædificiis eorumque tectis nidificat: item in cavis arboribus.

Ova parit rubentia Minii colore quatuor, quinque vel sex.

Fel Oculorum maculas delat.

Aliquando candido colore visus fuit.

Milvus minor candidus.

Ein weis Bannenväher/
weis Rötelweib.

Monedula.

à moneta.

Κολοιδε

Λύκος

Κωμολόχος

Lupus

Graculus q. garrulus

Ein Thale/

Tale/Tule/

Nelcke/

Avis Corvini generis, garula, quæ humanam vocem summa decacitate imitatur, Cornice minor, tota nigra, minimè canora.

Κλαζερ vox Graculorum
Rafen.

Vescitur in cibo vermibus, scarabæis, seminibus & carne.

Nidificat in altissimis turribus, nec non arboribus sylvarum cavis. Hinc à loco ab Agriculis nostris quædam nominantur. *Monedula muraria.* Mauser Tosen/quod in foraminibus Murorum seu turrium nidificent.

Aliæ *Arborea* Baum Tosen/quod intra arbores cavas pariunt.

Bis in anno pullificant. Ova parit ut plurimum quinque subviridia, maculis fuscis aspersa.

Pulli à Pauperibus eduntur.

Monedula Candida.

Eine weisse Tase/

Graculum ex toto album rostro subflavente vidi hoc anno in arce Glogoviensi cavea inclusum.

Q 9

Monedula

*Monedula roſtro
adunco.*

Krumbſchnabelſicht Tale.
Similis priori præter ro-
ſtrum, quod longius, adun-
cum, inſtar Accipitris, & Alas
remiges, quæ candidæ ſunt.

Monedula crucifera.

Eine Kreuz Tale.

Roſtrum obtinet inſtar
Crucis, veluti in Curviro-
ſtra decuſſatum. Cæteris vul-
gari ſimilis, at rariffima.

Motacilla alba.

Ξαροπυγίς, *Hefych.* id eſt,
Paſſer qui juxta rivulos a-
quarum, & torrentes inveni-
tur, cauda ſemper mobili.

Κίττιος,

Cnipologus, *Ariſt. Turn.*

Albicilla, *Gaz.*

Albicula,

Cauda tremula,

Paſſer aquaticus.

Eine Bachſtelze

Weißer Waſſerſtelze

Gravel

Queck ſterze

Kloſter Dreuſin.

Avicula eſt oblonga, Frin-
gilla pauló major, Vertice,
Collo ſuperiore & Pectore

nigris, dorſo cinereo, roſtro
longiuſculo, tenui, nigro, gu-
la candida, Ventre toto can-
dido. Alæ primúm cinereæ,
dein ex albo & nigro variæ,
quemadmodum etiam Cau-
da, quæ oblonga eſt. Tibiæ
& Pedes fuſceſcunt, & lon-
giuſculi ſunt.

Femella eſt cinereo verti-
ce, gula luteſcente, cætera
Mari ſimilis.

Caudam ſemper motitat.
Degit plurimúm ad ripas flu-
minum, ubi Muſcas captat, &
Vermiculos: quin & ara-
trum Vermium cauſſa ſequi-
tur, quos verſat & exhibet
cum gleba aratrum.

Nidos extruit ſub ſaxis &
colliculis, foſſula in terram
facta. Ova parit quinque,
ſex.

In hujus nido Cuculus ali-
quando educatur.

Ejus vis mira prædicatur in
atterendo Calculo, pulv. in
aqua Saxifragiæ, aut vino al-
bo generoſo, pota.

In hypocauſtis alitur, ubi
non ſolúm Muſcas captat, ve-
rúm etiam micas panis colli-
git, ac longo tempore perdu-
rat.

Motacilla

Motacilla flava.

Motacilla minor, Florus

Nonn.

Boarula. Culicilega 2.

Arist. Bellen.

Kuh Bachstelze/ qvód ad
pecora, qvæ pascuntur,
propius accedat.

Kleine Bachstelze/

Geele Bachstelze/

Kuhscheiffe/ Rusticks.

Vulgari minor est, rostro
longiusculo, recto, gracili,
nigricante. Corpus longi-
usculum, Capite & dorso fu-
scis, Ventre albicante, cum
paucissimo luteo. Gula lutea.
Pennæ in alis nigricant, in
medio per transversum albi-
cantes, extremis totis nigris.
Cauda longiuscula est, & bi-
furcata, partim alba, nigra &
lutea.

In arvis circa pecora fre-
quens.

Muscipeta I.

Κνίπολόγος, Peuc.

Μυοκέπος.

Culicilega cinerea,

Muscicapa.

Ein Sticherling/ sil.

Fliegenstecher/

Mückenstecher.

Avicula est longiuscula,
Spini magnitudine. Rostel-
lo gracili, oblongo, Muscis
capiendis idoneo, Colore per
totum Dorsum cinereo, Ca-
pite plumbeo, Ventre albi-
cante. Cauda longiuscula, &
Alæ fuscae. Tibiæ & Pedes ni-
gricant.

In sylvis vitam agit, &
semper irrequieta, Mulcas &
Culices venatur.

Visco capitur, & Autumno
in hypocaustis servatur,
Edibilis est.

Muscipeta II.

Culicilega flava,

Ein Gelber Sticherling/

Ein Jrsin.

Ejusdem cum priori ma-
gnitudinis, Coloris flavescen-
tis.

Muscipeta III.

Ein Mößelsincke/ sil.

Toden Vogel Gesu.

Avis pestilentialis, qvód
imminente Peste frequentio-
res, & propius civitates appa-
reant.

Pari feré est magnitudine.
Supina pars ex fusco cinerea.
Cauda, Alæ fuscae, qvæ per
transversum in medio, ut Frin-
gilla, linea alba colorantur.

Q q 2

Gula

Gula cum Pectusculo pallet,
ventre albido. Rostellum
crassiusculum. Pedes nigri-
cant cum splendore.

Solitaria semper est & Mu-
scis inhiat. Autumno ali-
quando capitur.

Noctua.

ἡ γλαυκὴ ἰσχυρὰ ὀφθαλμῶν
colore noctu perspicacissimè
videntium, interdum cæcuti-
entium.

Noctua saxatilis Vlyß. Aldr

Noctua sylvarum

Eine Nacht Eule/

Stein Eule/

Mittel Eule/

Kaug.

Gallinæ ferè est magnitu-
dine, duos dodrante s longa.
Crura & digitos habet Pedum
hirsutos, plumis albidis. Imi
seu interni digiti utrinq; bini
nudi sunt, ungvibus nigris,
aduncis, acutissimis. Color
ei tota parte beticus, id est ex
rufo fuscus, nigris maculis di-
stinctus. Caput ad reliquam
magnitudinem prægrande.
Oculi magni, glauci. Rostrum
aduncum brevissimum, dilutè
fuscum. Inter Oculos & Ro-
strum pennulæ quædam ri-
gent, ceu pili aut barbulæ. In
ventre plus albidi habet, quã

in cæteris. Alarum majores
pennæ & Cauda lineis trans-
versim fuscis latiusculis figu-
rantur.

Vox ei tou, tou, tou.

Versatur in sylvis, saxosis
& montosis locis. Capitavi-
culas, & nonnunquam Co-
lumbas, Muribus quoq; ve-
scitur.

Lucifuga obscuro latitat nam
Noctua luctu.

Hanc Aves cæteræ petunt
& circumvolitant. Ipsa ma-
jore multitudine circumdata,
resupina pedibus repugnat, &
in arctum collecta, rostro &
aduncis ungvibus tegitur.

Noctuæ carnes Paralyticos
curare Plinius; Melancholi-
cis & mente perturbatis pro-
desse, Rabi Moyse scriptit.

Fel Collyriis additur ad
maculas Oculorum. Eorum
aciem pingvedo acuit.

Ferunt Infantes, gestatis
Noctuarum ovis, in omnem
vitam reddi abstemios.

Noctua aurita.

ἡ ὅτι καλεῖται ὡς τὰ ὦτα
quasi Aurita. Plumæ enim utrinq; in Capite
Auricularum instar promi-
nent: tum quia harum ipsa-
rum foramina admodum pa-
tula

tula sunt & grandia.

Afio *Plin. Agric.*

Afio fulvus *Vlyß Aldrov.*

Ein Ohr Ruz/

Bhr Euse/

Ranz Euse.

Longitudo ejus spithamarum ij. latitudo qvinq;. Ex ferrugineo tota flavescit, sed magis ventre. Rostrum habet nigrum, aduncum, mucrone obtusiore. Ungves validi adunci, admodum nigri. Crura ad ungves usq; pilosa, flaventia, ut & venter inferior cum uropygio. Cauda ex ferrugineo flavet, lineis nigris transversim contortis, & incurvo flexu pictis, veluti undulatis. Vestitur copiosa pluma, quam macula nigricantes in ventre longæ, in collo & dorso latiusculæ, & puncta minutissima in margine albicante exornant. Faciem ambit circulus coronæ instar, ex plumulis diversi coloris. Juxta Oculos & Rostrum è flavedine & obscuritate candicat, minutissimis plumulis veluti pilis tota obsita. Oculi iris saturo, crocea, splendida, pupillima nigerrima. Plumæ in Aurium regione instar Cornuum utrinq; eriguntur, è qvaternis

qvinsve plumulis, qvibus margines candicant & flavent, medio nigro. Vertex varius ex punctulis nigricantibus, luteolis & fuscis. Alarum pennæ partim flavæ, præsertim interiores, partim fusca mediæ, partim albicant Corpori proximæ, omnes margine extremo candicante transverfis nigris lineis discusata, & notis minutissimis instar punctorum maculata.

Interiores alæ argenteo nitent candore. Lingva brevis, latiuscula. Ventriculus amplissimus. Oculi & Aurium structura mira. Oculus tunica cartilaginea, veluti capsula Cucurbitulæ, qva balneatores utuntur, forma inclusas, interna parte elatior & convexa, extrinsecus angustior. Sub Cornea latet uvea, nigrore, ac veluti atramento nigro perfusa. Hanc veluti circulus ambit pellicula aurea seu Arantii colore, sic connata Uveæ, ut nullo modo integrè divelli possit: Iris aurea, Pupilla nigra. Cerebrum unica sed crassior investit. Nervi duo magni ad Cerebellum latera ad Aures tendunt, & anteriore parte processus bini minutissimi conjuncti ferè papillarum

Q 9 3

papillarum

papillarum instar albert.

Ex raptu vivit Avicularum
& Murium. Habitat in mon-
tibus, ac in Arborum caver-
nis nidificat.

Hui hou. Hui hou vocem
edit.

Volatus ei levis & facilis.

Nucifraga.

Καρυων & Ιάκινθος Gesn.

Merula saxatilis,

Turdela saxatilis vlyß. Aldr.

Rubecula saxatilis,

Nucifrangibulus.

Graculi Alpini seu monta-
ni genus. Turn.

Ein Nußbäcker/

Nußbäcker/

Nußträhe/

Nußbrecher.

Avis montana, Graculo
paulo minor, Merula major,
per totum Corpus ex fusco
rubescens, albis maculis mo-
re Sturni distincta. Caput si-
ne maculis ex fusco rubet.
Rostrum Monedula longius,
crassum, nigricans. Alarum
pennae majores nigrae, in ex-
tremis candicant. Cauda
supine nigra, prone ferrugi-
nea, cujus extremitates albae
sunt. Pedes nigri splendent,
digitis ut in Pica glandaria
variis articulis flexibilibus.

Passim in montibus obvia.
Nidificat in cavis arbori-
bus.

Autumno Noces Avellanas
in terram seu arbores conca-
vas recondit, quas hyeme re-
quirit, & confractis in cibo u-
titur.

Solet nucleum cum corti-
cibus duris devorare.

Calculosis & Dysentericis
in cibo utilis,

Olor.

Κύκνος Arist. á κυκλῶν á tur-
bare, fodere, quod caenum
turbare soleat, dum cibum
quaerit.

Cygnus

Olor á colore, quod totus
sit albus.

Ein Schwan/

Delb/

Delbs/

Cygnus forma victuq; An-
seri similis, sed multo major,
totus candidus, Collo longis-
simo, pedibus latis nigerrimis.
Rostrum antérieur nigrum, po-
sterius flavet. Binos habet
appendices ad imum Intesti-
num, ut Anser.

Ovidius

Ovidius.

Corpus habet gravius: nec se
cæloq; Joviq;
Credir: sed -

Stagna petit patulosq; lacus,
ignemq; perosus,
Quæ colat eligit & contraria
flumina flammis.

Collumq; à pectore longè
Porrigitur, digitosq; ligat jun-
ctura rubentes:

Penna latus velat: tenet os
sine acumine rostrum.

Grusgruit, inq; glomis Cy-
gni prope flumina drenfant.

Ad lacus, amnes, fluviosq;
victum quærit. Vescitur li-
mo, arena gramine, alga, hor-
deo, Piscibus.

In lacustribus Ducatus Le-
gnicensis inter herbas nidifi-
cat. Cum domesticus est, in
domibus & lapidibus juxta
aqua substratis straminibus,
parit septena ut plurimum
Ova.

Vita est longissima, & vim
suam in alis habet.

Caro ejus dura, rubra, con-
coctu difficilis, non mali sa-
poris, at Melancholici succi.
Aculinis nostris plerunq; ab-
dicatur.

Adeps hæmorrhoides lenit,
si eo tangantur. Vulvarum
durities & collectiones emol-
lit: Oculos purgat, cum vino
Lentigines tollit.

Cygni pulli in oleo cocti ad-
dita medulla Cervina, Poda-
gricis profunt.

Pellis, plumis tenerimis
ac densissimis cum levissimo
vellere obsita. Colicos mirè
adjuvat, & Stomachi vitio
laborantes.

Plumula à feminis Nobili-
bus, ob calorem & levitatem,
ad culcitrâ implendas omni-
um Avium præferuntur. Ex
his enim pulvinaria concin-
nant mollissima.

Dicitur Cygnus mortem
præsentiens suavissimè canere:
inde proverbium: Cy-
gnæa cantio. Ein Schwane
gesang.

Onocrotalus.

Ονοκρόταλος
Pelecanus Petr. Bellon.
Truo,

Ein Kropffgans/
Sackgans/
Schneegans/

Bielstraß

*Dielfras/
Dhuvogel.*

q. d. Avium absurda

Avis peregrina alba, Cygno per similes, sed major, Rostrum prælongo & valido. A gutture usq; ad pectus receptaculum longum & amplum, instar socci magni (Ingluviem appelles) foras prominet, radici lingvæ ejus annexum. In hoc cibus receptus primum emollitur, & inde ad Stomachum digerendus transmittitur.

Horribilem vocem instar rugitus emittit. Piscibus alitur, & in paludibus nidulatur.

Raró has terras frequentat. Anno millesimo quingentesimo octuagesimo quinto Vratislaviæ Onocrotalus captus fuit.

Oriolus.

ab aureo colore.

Χλωροδύ Γαίη. *Budei.*

Chloreus Eber. & *Peuc.*

Merula aurea.

Vineo,

Virco,

Lutus, Lutea.

Ein Bierholtz/

Bierolff/

Beerhold/

Kirschholdt/

*GoldMeerte/
Witterwale.*

Pici genus Merulæ magnitudine. Rostrum crassum, oblongum antèrius flavet, posterius rutilat. Coloris aurei per totum Corpus, at dilutioris circa uropygium. Alæ ex cæruleo fuscæ, extremis apicibus albicantibus. Venter cum pectore & gula alba lineis longiusculis nigris distinctus. Crura breviuscula dilutè cærulea, digitis quaternis divisa unguibus totidem aduncis ex fusco rubentibus. Lingva bifida. Fel prassini coloris in vesiculâ Hepati adnascitur. Caro flavescit.

Vivit ax Arborum fructibus, Cerasis, Erucis, Scarabæis.

Nidum in ramis arborum minutissimis mira subtilitate suspendit, cyathi in modum, ita ut in aëre solo pendere videatur de terra cernentibus.

Variat vocem, & aliquando instar fistulæ canit, præsertim pluvia imminente.

Recentiores Icterus in cibo curare tradunt.

Procedit ante solstitium æstivum, & tunc pruinas non amplius futuras bona spes, exoriente Arcturo discedit, & tota

& tota hyeme non conspicitur.

In cibum recipitur.

Ortygometra.

Ορτυγόμετρα Arist. ab ὄρτυγ.
& μέτρα, id est, Coturnicum
mater seu matrix.

Coturnix prægrandis, seu
magna,

Matrix Gaz.

Serica Longol.

Cenchramus Plin. Eid.

Crex rurneri.

Rex Coturnicum.

Ein Schnereker / il.

Wachtel K nig /

Alte Knechte /

  voce Kreck, Kreck, Kreck,
ac si quis ferram duceret.

Avis Coturnici similis, sed
major aliquanto & nigrior,
Rostro crasso oblongo, ut
Coturnicis, Cruribus albis, ex
flavo virentibus. Tota fer 
Capitis, Colli, Dorsiq; nec
non major Alarum pars, qv 
dorsum spectant, testacea,
maculis nigricantibus, & al-
bicantibus punctulis passim,
(pr sertim in junioribus)
respersa. Vertex Capitis ad
c eruleum vergit. Venter al-
bicat. Al  qv  ventrem
contingunt, rufescunt.

Frugilega est, & advena.

Versatur in agris & pratis pa-
lustribus die nocteq; obstre-
pera. Rar  aut nunquam vo-
lat, cursus velocissimi. Inter
herbas & gramen sese abdit,
ut rar  appareat. Deprehen-
dunt eam aliqu do f eniseci.

Lumbricos etiam & vermi-
culos in cibum rapit. Nidum
struit in pratis, qvinq; sex pa-
rit Ova, Coturnicis paul 
majora.

Assa in cibum recipitur sa-
tis lauta, sapore Coturnicis.
Contra morbum regium pr -
dicatur.

Tempestatem futuram seu
pluvias frequenti clamore
pr nunciat.

Avolat Autumno, noctur-
no tempore & Vere cum Co-
turnicibus redit, qvib. se du-
cem pr bet.

Palumbus.

φ    mas

φ    , φ     femina Ari-
stot.

Π     

Palumbus major seu tor-
qvatus Vly . Aldrov.

Palumbus lun.

Torqvatus Martia'.

Columba torqvata

Columba sylvana

Hic, h c Palumbus.

R r

Virgil.

Virg. Nec tamen interea
rauca tua cura Palumbi.

Martial. Ingвина torqvati
tardant, hebetanq; Pa-
lumbi.

Cine Ringel Taube/ sil.
Hols Taube/
Wloch Taube.

Palumbus major est Co-
lumba vulgari, longitudine
duarum spithamarum, colo-
ris lividi. Alarum majores
seu remiges pennæ subnigræ,
qvas lineæ candida secundum
longitudinem ab aliis distin-
guit. Interior Alarum pars
ut plurimum fusca est, ut eti-
am Dorsum superior. Reli-
quum Dorsum & Cauda ci-
nerei seu lividi sunt coloris.
Caput ex rubro cæruleum.
Collum exornat circulus al-
bus (seu potius macula) im-
perfectus, supina Colli parte
desinens, duorum digitorum
intervallo, cujus reliquæ pen-
næ variæ sunt, & pro alio atq;
alio ad lucem situ positæ pur-
pureæ, virides, cæuleæ, cine-
reæ. Pectus cum aliqua Col-
li proni parte purpurascit,
cui cinerei etiam non nihil est
confusum. Venter albet. Pe-
des rubicundi. Rostrum sub-
flavum, cute utrinq; purpurea

inductum. Oculi rotundissi-
mi. Ingluvies Ventriculo
præponitur.

Plausitat arborea clamans de
fronde Palumbes.

Habitat sylvas plerunq; &
in arboribus degit. Vescitur
glandibus, frugibus, Visci se-
mine.

Nidificat in arborum ra-
mis, & bis in anno pullificat.
Ova parit ut plurimum terna,
incubat quatuordecim diebus
ut Columba, Hyeme demi-
grat in loca finitima aprica.

Profunt ei squalores.

Vita Palumbium longa,
Nam ad 25. triginta, vel ad 40.
annos durare existimatur.

Isidorus. Palumbus comes
est castitatis, cum amisso cor-
porali consortio solitaria in-
cedat, nec carnalem ultro co-
pulam requirat.

Porphyrius. Mira est Palum-
bium in conjugio castitas, quæ
etiam adulterio corruptæ in-
terimunt corruptorem, si asse-
qui possunt.

Caro Palumbis calida, sicca,
dura, concoctu difficilis & ex-
crementosa, alvum adstrin-
git,

git; Dysentericis auxiliatur; immodicos Menstruorum fluxus cohibet.

Veteres pro cibis delicatis & palato arridentibus habebant.

Si per hyemem diutiùs macerata ingerantur, Nervorum vitiis utiles sunt.

Veneris libidinis restinguunt, juxta illud *Martialis*:

Ingvina torqvati tardant hebetantq; Palumbi,

Non edat hanc volucrem, qui velit esse salax.

Sanguis ad Oculorum ictus, & Oculis cruore suffusis, ac Lusciosis illinitur.

Cinis plumarum Ictericos reficit; ex aceto contra Calculos & Urinæ difficultates sumitur.

Fimus urinam provocat, & Vesicæ affectibus, nec non Calculosis utilis prædicatur.

Pardalus I.

Arqvata seu Numenius, *Gesn.* quòd rostrum ejus inflectatur sicuti arcus.

Gallina novalis major,

Torqvatus,

Capella, *Nonnull.*

Tarlinus seu Terlicus,

Veneris an πορπάκιος, Veterin.

Ein Geißvogel / sil.

Brachum / Giloeh /

Himel Geiß /

Grosser Brachvogel.

Magnitudo ei Gallinæ vilaticæ. Longitudo ab extremo rostro, ad pedes ultimos circiter palmorum novem. Crura oblonga palmorum tñ. cinerea; Digiti fusci, sed aliquatenus membrana conjuncti, quæ etiam utrinq; juxta singulos digitos descendit, & inferiorem digitorum partem dilatat, ungribus nigerimis.

Rostrum circiter octo digitos longum, nonnihil arcuatum seu inflexum, deorsum nigricans.

Pennarum color fuscus ferè, sed varius & maculosus est.

Per alas, dorsum, ad uropygium fuscus, subflavis maculis undiqvq; variatur.

Ex eis maximè fulgent instar serici villosi, quæ inter alas & dorsum sunt in medio nigræ, in circuitu per intervalla subrufæ.

Cauda septem digitos longa, nigris & albis lineis transversim ductis distincta.

R. r. 2

Collum

Collum plus cinerei habet
quàm albi, pluma molissima.
In pectore præter nigricantes,
plumæ subrubent. In alis ex-
tremitas pennarum nigrescit,
venter & pars sub alis albicat.
Alæ ipsæ latiusculæ sunt, ex
egregiis pennis, partim nigris,
partim albis & fuscis disco-
lores.

Ventriculum habet ut Gal-
lina crassum, callosum, cum
ingluvie. Hepar rubrum, in
cujus medio fel prasinum ve-
sicula magna contentum.

In pratis circa palustria ver-
satur, ubi scarabæos, Vermi-
culos & alia insecta cum la-
pillis ad cibum inquirat. Cur-
sus velocissimi.

Ova parit qvalia Gallina,
pallida.

Caro ejus candida, svaavis,
grata, facilis concoctionis ac
probi succi: ob id in delitiis
procerum.

Autumno capitur.

Pardalus II.

Vanellus fuscus,
Kyvitta fusca,
Merula novalium.
Eine BrachAmfel/
grosser Brachvogel/
größer Gysis.

Avis Vanello congener,
sed pauló major, Rostro recto
acuto, rubente, palmum lon-
go, Cruribus altioribus, ut va-
nelli, similiter obscuré ruben-
tibus, sine calce. Caput, Col-
lum, Dorsum superius, Alæ,
Cauda, fusci sunt coloris ad
nigredinem tendentis. Col-
lum ambit macula candicans
prona & laterali parte, vel-
uti in Merula torqvata. Me-
dias Alas intersecat linea can-
dida digitum lata; veluti &
Caudæ pennæ exteriores, cæ-
teris longiores, transversim
lineis albis insigniuntur. Ven-
ter instar Turdelæ varius, ma-
culis longiusculis reperfus.
Versus caudam & femora al-
bet.

Vescitur Vermiculis & la-
pillis, qui in ejus ventriculo
fuere reperti.

Rarissimus in patria nostra.
Unicam habeo á nobili Dom.
Valentinò á Reder, quàm sub
acuto monte bombardi globu-
lo trajecerat in prato, ejusq;
iconem Avis ignotæ nomine
communicavit.

Totus odore Zibetum re-
fert.

Caro ejus palato admodum
grata, ob id preciosa, & in
magnis

magnis delitiis habetur.

Pardulus III.

Gallina novalis media,
πάρδαλις Aristot. Longol.

Turn.

Pluvialis Gesner.

Vivago Bodini.

Pluvialis viridis

Vanellus subviridis

an Rynthace Plutarch.

Ein Brachvogel / propriè &
simpliciter Silesis.

Eine See Taube.

grosser Brachvogel.

Pulvici Longol.

Pulros Eber. & Peuc.

Pluviers Gall.

Avis est pulveratrix, Vanello minor, longitudinis dodrantalis cum palmis ij. latitudinis verò dodrantum ij. & sex digitorum. Supinæ partis veluti Capitis, Dorsi, Alarum superiorum, Caudæ, color fuliginæus, ex obscura viredine, punctis luteis instar Pardi variè respersus. Majores seu remiges inferiores Alarum pennæ totæ fuscæ sunt, quarum medii ordinis apices extremi candore micant. Mentum cum ventre candida, ut & Alæ interiores, apparent, præter Collum pronum & Pectus

leucophæum obscura flavedine conspersum. Radices pennarum ventris nigræ sunt. Rostrum obtinet sesquidigitum longum, rectum, obscurè rubrum, canulatum.

Crura cinerea, iij. digitorum longitudine, ad medium plumis candidis tecta. Digniterni, quorum duo exteriores utrinque exigua pellicula cohærent, unguiculis nigerimis aduncis.

Hepar ei magnum bipartitum rubet, absque felle. Ventrículus parvus, crassior, rugosus: in quo sæpius dissecto lapilli, vermiculi & scarabæi minuti inventi fuerunt: Unde vanum credere eum solo aëre tantum pasci & vitam ducere.

Intestina per gyros circumvolvuntur, ad quorum exitum ferè, appendices bini digitorum ij. longitudine visuntur.

Pupillam nigram Iris adornat obscurè rubens.

In agris novalibus, campis desertis, planis, & juxta aquas degit.

Autumno gregatim volat, ac celerrimè, passim juxta lacus retibus, uti Columbæ feræ, capitur. Hyeme disce-

R r 3

dit.

dit. Cursus est velocissimi, ac vocem imitatur, qvalem pastores & aurigarum Pueri labiis porrectis ædunt.

Admodum pingves sunt autumnno.

Lutæ sunt in cibo, & in magnis delitiis.

Dum hæc scriberem, vivum in hypocausto ultra quatuordecim dies habui, qvī sola arena & aqua contentus tandem labe enecatus perijt.

Pardalus IV.

Pluvialis altera species *Gesr.*

Gallina novalis minor,

Pardalus minor.

Ein kleiner Brachvogel.

Hic reliqvis omnibus minor, Turturis ferè magnitudine. Supina pars tota fuliginea, maculis subflaventibus varia. Alæ longæ, fuscæ, quarum majores pennæ extremæ, mediotenús secundum longitudinem candidæ. Venter totus albus. Rostrum rectum, digitum longum. Crura ex obscuro lutescunt, tribus digitis anterioribus sine calce.

Iisdem locis ut prior degit, similiq; modo capitur, & in

cibum venit.

Parus.

Αιγιδάλης *Aristot.* ab impetu qvo volando utitur.

Parix Recent.

Parula,

Ein Weisse/

Weißlin.

Avicula est sæcunda & πολύπενη canora.

In arboribus degit, Vermiculos & Muscas ad cibum inqvirens.

Nidificat in cavis Arboribus.

Toto anno apparet, & decipulis ac Noctua capitur.

Aristoteles tres species describit: hodie plures cognoscimus.

Parus carbonarius.

Αιγιδάλης *αὐτῆς* *Aristot.*

Parus major,

Fringillago Gaz.

Ein Kol Weisse/

Spiegel Weisse/

Brand Weisse/

Grosse Weisse.

Maximus est omnium, & coloribus elegantissime variat. Rostrum

at. Rostrum ei rectum, rotundum, acutum. Pedes fusci. Caput Corvino nigrore splendet, quod per latera Colli descendens protenditur. Tempora & Oculorum ambitus alben. Dorsum subviridis est coloris, Pectus & venter flavi, quem tamen medium linea nigra in longum ducta secat. Alæ partim sunt cyanei coloris, partim subnigræ, partim albidæ. Cauda bifida, partim cinerea partim nigra, cujus extremæ utrinque pennæ duæ exteriori parte candicant. Lingua fissa est.

Delectatur semine Cannabino, Papavere, Nucibus juglandibus & Sevo.

In hypocauftis alitur, in quibus aliquando Ova parit.

Adeo mansvescit, ut etiam sponte, nuce porrecta, in manus involet.

Inspectus Icterus curare fertur.

Adversus Renum Calculum, & Colicos cruciatus efficax à Nonnullis prædicatur.

In cibo utilis.

Parus caudatus.

Αιγιδάλος ὄρνις Arist. VI.
Aldrov. ἀνώνυμος Nonn.

Parus Monticola Bell.

Schwanz Meise/

Zahl Meise/

Berg Meißlin/

Pfannenstiglis/Eber. & Peuc.

Minor est priori, at non omnium reliquorum minimus. Rostellum fuscum, crassiusculum, brevius: acutum tamen & rotundum. Pedunculi nigri.

Collum supinum ad Dorsum atrum est, prone à rostro ad ventrem usque candicat, intercurrentibus lineolis exiguis, deorsum descendentibus, nigricantibus. Vertex & genæ nivei coloris. Venter ad Castaneum vergit. Circa uropygium albet. Dorsum purpurascit, remigibus nigris in extremitate albicantibus. Cauda longissima nigra, utrinque extremis pennis media parte candidis.

Montana loca frequentat, vermibus, araneis, aliisque animalculis in cibo fruitur. Raro ad plana descendit.

Inquieta est, & certo loco residere nescit, modo hanc, modo illam arborem petens. Vox ejus guickeg, guickeg, guickeg.

Nidum

Nidum construit amplum
ex musco & plumis.

Autumno gregatim volat,
& noctuâ frequenter ab Au-
cupibus capitur.

Parus cæruleus.

Parus montanus Peuc.

Parus 2. *Turneri.* Parulus
cæruleus.

Ein BlawWeißlin/

MeelWeise/

BirnWeise/

PimpelWeise.

Exiguus est admodum, pau-
lô major Regulo, Vertice &
Cauda cæruleis seu azureis,
decoris. Rostellum breve,
crassiusculum, fuscum, Pe-
dunculi glauci seu subcærulei.
Dorsum totum cinereo advi-
rescente ornatus colore. Pe-
ctus supremum flavescit, ven-
ter infimus albicat, radicibus
plumularum nigris, Alæ dilu-
tè cæruleæ, in medio lineam
candidam transversim du-
ctam obtinent.

Cæruleum Capitis verti-
cem alba linea totum Caput
cingens claudit, ad Oculorum
canthum minorem ubiq; pro-
tensa. Collum medium alba
nota majuscula tingitur.

Apibus insidiatur, & quo-
vis Anni tempore in monta-

nis nostris apparet. Ova parie
plurima.

Parus fuscus.

Parus palustris *Gesn.*

Parus cinereus,

Parus atricapillus *Vlyß.*

Aldrov.

Parus quartus *Boll.*

Passer arundinarius An-
glor. *Tur.*

Junio *Arist. Turn.*

Ein GrauwWeißlin/sil.

MurWeise/

UtschWeise/

KottWeise/

RiedWeißlin.

Paulô minor est Cæruleo,
Corpore fusco ad cinereum
vergente. Caput prorsus ni-
grum, utrinq; candicans. Pe-
ctus & venter albicant. Ni-
gra sunt Cauda & Dorsum:
cui nonnihil rufi admixtum.
Cruscula fusca, subrubentia.

Circa cœnum & paludes de-
git, ad Saliceta.

Parus ater.

Parus Carbonarius minor,

Parus caninus,

Eine HundeWeise/sil.

Kleine KotWeise/

Subflavens macula ei infra
Oculos, & alia in Occipitio:
reliquum Caput atrum. Ven-

ter

ter pallidé flavescit. Dorsum fuscum, ut & Alæ, at maculis candicantibus respersæ. Rostrum pauló longius quàm Cærulei ex nigro splendet. Cruscula glauci coloris.

Passim occurrit insylvis & hortis.

Parus cristatus.

Ein StrausMeißlin/

KobelMeise/

HeubelMeise/

HeidenMeise.

Pauló major est atro. Vertex ei niger, punctis albis adornatus, crista retró extensa. Dorsum cum Cauda fuscum, Pectore albo, Crusculis cinereis.

Gregatim volat, & autumno in montibus frequenter capitur.

Paruli omnes in cibum veniunt, autumno & hyeme, saporis non ingrati, nec succi pravi.

Passer domesticus.

срѣдѣ.

↓ &.

Passer á patiendo, quód Caducum Morbum patiatur.

срѣдѣ Passerculus,

Ein Sperrling/

Spar/

Sperg.

Mas per Dorsum & Alas colore lateritio & cinereo distinguitur, nigris maculis tinctus. Vertex cinereus, gutture nigro & Ventre albicante. Rostrum fuscum, crassum, acutum.

Macula ante oculos nigra, retró rubra Dorsum versus.

Femina cinerea est, rostro candicante.

Vox ejus propria πικρίζει,

Pippilat & Passer, & dulce canit Philomela.

In cibo utitur omnis generis frugibus, maximé Hordeo delectatur. Cadavera etiam suspenforum arrodit, in quorum Craniis aliquando nidificare solet,

Passere abundat Silesia nostra, nec hyeme ab ea recedit.

Vere & æstate foetificat, & quidem bis, pullos quatuor quinque excludens.

Autumno gregatim ad agros volat, Hordeo & Tritico jam maturescentibus. Hyeme ad Horrea se confert, & granaria invisit, in quibus sæpé magno numero capitur.

Nidum sub altis tectis, ex festucis & straminibus mira arte congerit, & ut molliter

S f cubet,

cuber, quàm molliſſimis plu-
mulis ſternit.

Vita eis ob ſalicitatem bre-
viſſima, quàm ultra quartum
annum vix extendit.

Passeres non niſi á pauper-
culis, & hyeme quidem in ci-
bum ſumuntur. Calidi ſunt
& ſicci natura ad tertium
gradum, improbi ſucci, nec
grati ſaporis. Alvum ſiſtunt,
malè alunt, & difficulter con-
coquuntur. Aſſi in cibo ve-
nerem conciliant, maximè
Cerebella.

Baptiſta Piera.

Ardet, & in tenera Passer du-
rabitur alvo:

Si vis eſſe ſalax, det Cere-
bella tibi.

Heu miſerum: qui præcipiti
ſic labitur ævo,

I, Venus, hinc, ſolas ni mo-
dò perdis aves.

Epilepticis præſcribuntur,
quòd caliditate & ſiccitate
ſua humores conſumant, á
quibus Epilepſia dependet.

Trallianus tympanicis con-
cedit.

Galenus turricolas laudat
in Renum Calculo & Ar-
thritide.

Fimus á Lentiginibus pur-
gat faciem. Cum ſputo ho-
minis jejuni varices extirpat.
Ex adipe porcino Alopeciam
explet, & Carbunculos rum-
pit.

Passer niveus

Passer albus,

Ein Weiſſer Sperling.

A vulgari ſolo colore di-
ſtingvitur, qui totus candi-
dus eſt præter Roſtrum & pe-
des.

Hunc clariffimus Vir D.
Laurentius Scholtzius Med.
in viridario ſuo inſtructiſſi-
mo, Vratiſlaviæ, cavea inclu-
ſum alebat.

Prope oppida aliquando
cum aliis viſitur: Qvalis
hoc anno inter alios indies
conſpicitur Lignicii in plate-
a, quæ vocatur Media.

*Passer monta-
nus.*

σποδὸς ἄγριος.

Passer ſerus,

Ein Walde Sperling.

Weiden Sperling.

Magnitudo cum domesti-
co ferè eadem, paulò minor.
Roſtrum habet acutum, bre-
viusculum. Capitis vertex
caſtaneus

castaneus seu ruber. Dorsum atq; Alæ totæ partim flavæ, partim nigræ, Alæ vero, quæ Ventrem contingunt, modò ferrugineæ, modò atræ, modò albæ. Pectus albet. Cauda longiuscula ex luteo fuscescit. Tibiæ & Pedes subflavi sunt. Mentum atrum, inter quod & Verticem color albus est. Femina pallidior est, & Mentum nigra macula caret.

In montibus extra urbes & pagos degit, in cavis arboribus nidificans.

Passer torquatus.

Passer campestris,
Passer sylvaticus,
Passer Troglodytes, Eber.

Peuc.

Cin Ringel Sperling/
Ringel Spar/
Feld Sperling/
Wald Sperling.

Minor est domestico, superne fuscus, sed varius & lineolis albicantibus interiectus: inferne ad flavedinem vergit. Vertice purpureo. Collum ambit circulus albus.

In sylvestribus vitam agit, & arborum truncis longo situ foraminosis nidificat, Hyem-

me discedit, & nunquam ad oppida volat. Longioris vitæ quam domesticus.

Passer arundinarius

Gesn.

σπιδος χοϊνικλος,
an βάτις & Sceniclos Arist.
Junco Gaz.

Passer aquaticus Eber. &

Peuc.

Batis seu Rubetra Vlyß.

Aldrov.

Passer torquatus palustris,
Passer calamoditis,

Cin Rohr Sperling/Sil.

Rohrsparlin/

Rohrspar.

Magnitudo ei Fringillæ aureæ, Passere paulò minor. Rostrum ei breviusculum, crassum, nigricans. Cruscula fusca sunt, unguiculis nigris, uncis. Venter albidus est, pectus subflavum. Verticem exornat color totus ater, ut & Mentum, quod punctulis albidis aspergitur. Collum supinum ambit circulus albus, cui macula longiuscula similis coloris sub Oculis exorta retrò jungitur. Oculi nigri. Dorsum cinereum notis nigris & figulinis variū.

§ f 2

Fuscæ

Fuscæ sunt Alarum remiges cum cauda, cujus exteriores pennæ tres utrinq; in extremitatibus albedine maculantur. Alæ superiores figulinæ sunt ex flavedine. Lingva tenuis. Felle caret ventriculus crassiusculus.

Vescitur vermiculis, seminulis & arena. Post Æquinoctium vernum apparet, & tota æstate in arundinetis vivit, à quibus vix discedit, Cantu sylvæ. Autumno avolat.

Nidum inter arundines artificiosè suspendit, & ova quinque vel sex numero, Majore parit.

Passer Troglodytes.

Ἰσχυροδύτης.

Ἰσχυροδύτης Eber. & Penc.

Passer sepiarius,

Regulus aprius.

Ein Schneekönig/

Baumkönig/

Baumsehlflyßlin/

Winterkönig/

Monse König/

Wössel König.

Avicula omnium minima, Regulo excepto, cui paulo major, & ex fusco spadicea seu testacea. Pectus cinereum, Venter infimus, & Alarum remiges lineis vicissim nunc

nigris nunc albicantibus non-nihil transversim interstinguntur. Caudam longam & semper erectam ex fusco castaneam, albo colore retrò interpunctam habet. Sub Collo nigris candidisq; punctis variatur. Rostellum fuscum, tenue, longiusculum, acutum. Petioli fusci, ungviculis lucidis albidis, calcare maximo. Lingula exilis bifida.

Solivaga est, æstate in sylvis vivit & parit. Nidum struit ex musco foras, intus ex plumis. Ova parit plura, circiter novem uno tempore, bis in anno.

Venatur vermiculos, araneas, & brevi volatu se exercet.

Hyeme ad oppida & pagos cernitur, cantu sylvæ.

Adversus Calculum Renum & vesicæ maximopere commendatur, si integer evulsis pennis, sale conditus crudus devoretur. Novi quosdam, qui quotannis unicum comederunt, & ab affectione minus fuerunt vexati.

Eadem præstare creditur combustorum cinis.

Cum sanguine hircino ex vino potus præstantis. lithontripticon,

Pavo

Pavo,

á voce,
 Ταῦς, Τοῦ α Caudæ exten-
 sione ἀπὸ τῆς Τάσεως τῶν πτεῶν.
 παγώνι Hodie,
 περισκόμ, μηδικορ ὄρνεον
 Avis Medica, Persica.

Pavus.

Junonia avis.

Ἐν Πάω/ Πάω/ mas

Πάωιν/femina.

Avis est admirabilis, omni-
 um pulcerrima, & pulcritudi-
 nis studiosa. Caput ei par-
 vum, & quodammodo ser-
 pentinum, maculis ornatum
 duabus oblongis candidis; in
 cujus vertice apex instar cri-
 stæ, ex nudis quodammodo
 scapis tenerimis viridescenti-
 bus, veluti Liliorum flores fe-
 rentibus, conspicuus. Ro-
 strum candicat crassum, in ex-
 tremo aliquantulum recur-
 vum; in eo nares satis patulæ.
 Collum longiusculum, admo-
 dum tenue & exile, Sapphyri
 colore lucidum. Alæ superi-
 ores juxta Dorsum cinereum,
 dilutæ ad ruborem declinans,
 nigricantibus maculis trans-
 versim cymatili ductu & vi-
 rentibus nonnihil. Clypeus
 ad Caudam usq; per Dorsi
 longitudinem aureus. Pen-
 næ majores seu remiges ru-

bent, numero duodecim cir-
 citer; reliquæ inferiores ni-
 gricant ex cæruleo nitentes.
 Cauda duplex inferior fusca,
 brevis, extensa, vulgò
 Schwemmfedern/superior hu-
 ic veluti incumbens longissi-
 ma, pennis plumosis, & in fi-
 ne pennarum habet Orbes
 (ὀφθαλμοὶ τοῦ πτεῖον) ex viri-
 di quasi chrysoliti splendore,
 & Auri & Sapphyri coloribus
 distinctos. Pedes cinerei sunt,
 maculis nigris conspersi, &
 calcaribus more gallinaceo-
 rum armati, Digiti fissi. Ven-
 ter prope ventriculum ex cæ-
 ruleo viridis, prope podicem
 fuscescit.

Pavo femina, fusci est
 ad cinereum vergentis colo-
 ris. In vertice aliquot macu-
 læ exigua veluti puncta vire-
 scentia interferuntur. Men-
 tum totum candidum. Colli
 pennæ undatim positæ viri-
 des. Venter albet. Iris plum-
 bea, in Mare lutescit.

Avis olim rarissima, Regi-
 bus saltem nota: hodie plus-
 quam frequens in aulis No-
 bilium, ubi cum gallinis simul
 pascitur. ποιόλογος enim est,
 gramine victitat & frugibus.

Pupillat Pavo, trinitat Hi-
 S f 3 rundo

rundo vaga. Clamore suo Serpentes & omnia venenata animalia pellit, & nocturno tempore incendia & furta facile advertit. Noctu plerunq; rectis domorum insidet.

Pavo insigniter salax est ac libidinosa, adeo ut Mas unus qvinis sufficiat conjugibus.

Ova parit 9. 10. 12. interpolatis diebus: excludit tricenis diebus. Cum parit, fugit Marem & incubat, facile enim franguntur a Mare, desiderio incubantis.

Vivit annos 25. secundum Aristotelem. Tertio anno incipit fundere colores gemmantes.

Caro Pavonis dura est, & fibrosa, frigida & sicca, non minus concoctu difficilis, quam aut vaccina aut bubula, saporis & ori grata: at crassi & modici alimentis, ac difficilis concoctionis, & Melancholici succi.

Ob id per biduum suspensa relinqui debet, ut durities ejus non nihil remittat.

Assæ eduntur juniores, superinfuso liqumine, ex vino aromatibus condito.

Ab hac abstinendum iis, qui mala intemperie Hepatis aut Lienis afficiuntur: item otio deditis & hæmorrhoidibus crebro vexatis.

Ova ut inutilia a cibo abdicantur.

Plumæ remigum pennarum rasæ a sagittariis expetuntur.

Cauda verò ad Muscaria colligitur.

Orbes quinque seu Corculi in aqua decocti, gargarizatu, faucium inflammationi medentur, exprimento nobilis femina. Qua ratione, ignoro.

Fumus plumarum Oculis immixtus rubentibus & lippientibus Oculis non inutilis.

Ossa exusta pulveriz. ex aceto Leporam & Lentigines abstergunt.

Stercus Epilepsiam sanat ex destillato Cardui, Millefolii, vel Tiliæ, Podagrasq; lenit.

Carnem Pavonis mortui non

non putrescere *Augustinus lib. 21. de Civitate Dei cap. 4.* refert. Sic enim ait. Qvis enim, nisi Deus Creator omnium, dedit carni Pavonis mortui, ne putresceret?

Pavo candidus.

Pavo albus *Vlyß. Aldrov.*

Ein Weißer Pfau.

Totus colore Cygnum representat candido; à priori magnitudine non differens.

Olim ut res rara, aliundè advehebatur; hodie ex Ovis, quamvis difficilius, propagantur. Pulli diligentem requirunt curam. Nam facile pereunt.

Pavones hortis Olitorius nocent,

Perdix.

πέδιξ, περδίκις & πότις πέδιξ
à sono vocis.

πέδιξ Recent.

Perdix minor seu cinerea
Vlyß. Aldro.

Ein Kabbun/sil.

Feld Hun/

Wild Hun.

Pulveratrix est avis, duorum ferè dodranum longitu-

dine, Colore omnino vario. Rostrum subfuscum est, Dorsum fuscum, sublavum & rufum saturum, colores obtinet per transversum alternatim dispositos. Alæ fuscae sunt, & lineis longiusculis, maculisq; albicantibus & rufis majusculis per transversum asperguntur. Caudæ pennæ utrinq; lateritii coloris senæ, mediæ totidem cum Dorso similes. Sinciput, partes circa Oculos, & prora Capitis cum Mento simplici rubore insigniuntur. Collum & Pectus dilute cinerea sunt, exiguis punctulis nigris quasi per versus crispis & undantes interstincta. In medio ventre pennæ rufi coloris ad fuscum tendentes. Venter inferior & Crura albicant. Pedes ex glaucescencia succi.

Ingluvies Ventriculo præponitur, & appendices paucae, quæ definit Intestinum. Coitus tempore testes habent insignes, alias verò omnino obscuros: hyeme adeo exiguos, ut nullos habere quidam arbitrentur.

Caccabat hinc perdix, hinc gratitat improbus Anser.

Pascitur

Pascitur gemmis Coryli & Betulæ, gramine & segete virenti. Æstate legit semina & ova formicarum.

Humi nidum textit in condensis spinarum & fruticum, ac furculis confepit.

Nec facit in ramis altoq; cacumine nidos,

Propter humum volitat, ponitq; in sepibus ova.

Ova parit æstate plurima alba, 15. 18. 20. Sicut Gallina incubat, & educit pullos, quos mira calliditate ex insidiantium Aucupum manibus eripit.

Amplius quam ad sedecim annosejus vitam durare existimatur. Ad quinque & viginti annos vitam protrahere Aristoteles scripsit.

Capiuntur retibus, canibus, falconibus.

Hyeme gregatim volant. Duodecim, quindecim, aut plures unico incubatu exclusi tota hyeme invicem degunt, ad fonticulos & sub nive in agris virentibus latitantes. Cui Bosck Rabbiner. Vere cum mas femellæ se adiungit, bimatum volant. Saginantur inclusæ Tritico.

Perdicum caro nobilissima ac lautissima, palato maximo-

perè arridens. Medii ferè est temperamenti, concoctu facilis, probumq; succum gignit, præsertim si non ilico post occisionem, minus diem suspensa comedatur. Fit enim friabilior.

Recrementi in se habere parum, nutrimenti multum. Sangvinem procreat generosum, crassitie & tenuitate mediocrem.

Iis alimentum optimum, qui se non exercent, & vitam degunt otiosam, quiq; imbecilliores & in validi sunt, tum etiam attenuante victus ratione, assuetis & hydropicis, quiq; humido sunt ventriculo. Vitiosos enim & corruptos ipsius humores consumit atq; abstergit.

Memoriam assidue mansa corroborat, impingvat, semen augeat & venerem excitat, sed ventrem stipat. Unde si assum aceto ingeratur, Diarrhoea laborantibus fit edulium accommodatissimum.

Cum Cydoniis & vino cocta stiptico, Cæliacos & Stomachicos juvat.

Jus recreat Stomachum, & Morbo regio resistit.

Jecur Comitiali correptis auxilio est. Nostrates frequenter

quentes affant. Aliquando
assam jure gallinarum, in quo
Caryophylli, Cinnam. Macis
&c. ferverint, perfundunt,
& offerunt.

Ova in Cibo iis, qui im-
potes sunt, conferunt, & fe-
minis lactis copiam faciunt.

Fel incipientes Suffusiones
discutit, Oculorum caliginem
& Palpebrarum aspredinem
cum Mellis æquo pondere il-
litum tollit.

Pennæ Alarum majores &
Caudæ crematæ, & linteolo
ad olfaciendum porrectæ, fe-
minas utero strangulatas ex-
citant.

Perdix rustica
major.

Σκοδόπαξ Arist.

Ασκαλώπαξ Vet. Feuc.

Gallina rustica,

Gallinago Gaz.

Sneppa vulgò

Ein Schnepffe/

Schnep Hun/

Pusch Schneppe/

Wald Schneppe/

Holz Schneppe/

Werg Schneppe.

Magnitudine est paulò in-
ferior villatica Gallina, &
major Perdice campestri seu

vulgari. Colore per Dorsum
vario, qui declinat ad cinere-
um, cum quodam rubore &
flavedine distinguitur. Ven-
tre cinereo transversim lineis
nigricantibus variato. Alarum
pennæ majores fuscae, macu-
lis lateritiis secundum longi-
tudinem tinguntur. Cauda
brevis, cujus latera maculis
rubentibus insigniuntur, api-
cibus exterioribus phaopis,
candidis internis.

Caput habet magnum, &
Rostrum amplius palmum
longum, rectum, antèrius ni-
gricans & asperiusculum,
Lingva longa, gracili, ner-
vosa. Crura rubent, digiti
fissi.

Currit velociter, & philan-
thropos est. Montibus no-
stris familiaris. Gaudet hu-
midis & palustribus locis. So-
lis vermibus alitur, nunquam
grana attingit. Rostrum
molli luto infigit, & Cibum
vermium inquirat.

Æstate recedit, hyemis ini-
tio redit.

Tendiculis seu laqueis ca-
pitur.

Caro ejus optima est, mi-
nus albet quàm Perdices, ad
rubedinem inclinans, saporis
non ingrati, nec mali succi.

T t

Martialis.

Martialis.

Rustica sum Perdix, quid refert, si sapor idem est?
 Carior est Perdix, sic sapit illa magis.

*Perdix rustica
 minor.*

Gallinago seu Rusticola minor,

Gallinago Paludana,
 an Aig, Arist.

Capella caelestis, á voce capram imitante Mec, mec, mec.

Ein Wasser Schnepffe/
 Grafe Schnepff/

Heer Schnepff/ id est dominorum & nobilium gallinago.

Wasser Hünstin/
 Weuch Schnepfle.

Himels Ziege /stiles.
 Himels Geiß /stiles.

Priori forma & colore prorsus similis, magnitudine differens. Rostrum obtinet quinque digitos longum, antérieurius latiusculum, asperiusculum, fuscum, superiore parte inferiorem obtegente. Corpulentia Coturnicis, at major, Colore macularumque varietate distincta, ex fusco, cinereo, nigro, albicante & la-

teritio; at minus quam major. Crura obscuré rubent, Venter albidus. Cauda cinerea, nigris & rubris maculis aspersa.

Advena est, post æquinoctium vernum. Aestate á lacuum & piscinarum marginibus nunquam discedit. Udis nidificat.

Vermibus & aliis. Insectis palustribus sustentatur.

Rarius occurrit.

Pingvis admodum evadit. Caro ejus tenera & sva vis est, in Mensarum delitiis nobilis.

Vox ejus audita, pluviae prognosticon.

Petronella.

πετροφίλος,

Saxicola. an Staparola,
 Vlyß. Ald.

Ein Steinsfletsche.

Avicula est Moracillae magnitudine, at breviori cauda. Caput, quod maculis nigris conspergitur, Collum, Tergus atque Cauda subfusca. Alæ cum Caudæ extremitate fuscae sunt. Gula cum Pectore obscuré flavent, Ventre pallido. Oculi pupillam nigram ambit

ambit circulus Castanei coloris. Supra Oculos secundum longitudinem linea candida porrigitur tenuis. Inter hos & Rostrum plumulæ veluti pili rigent nigri. Rostrum longiusculum nigrum, sensim acuminatum. Crura, Digniti circulis veluti incisuris distincti, Ungvicolis minutissimis acutis.

In montibus declivibus & apricis ad saxa frequens, secus itinera territorii Hirsbergensis passim obvia, sub quibus nidum parat, fossula in terram acta.

Junio & Julio parit ova quinque ut plurimum. Vermiculis & Muscis in cibo utitur.

Vulgi opinio est, Ova illius à Bufonibus foveri & excludi, propterea quod frequenter sub saxis ad earum nidos inveniantur. Hyeme discedit. Caudam ut Moracilla semper quatit, sursum deorsum.

Phasianus.

φασιανός, Arist. à Phasi vel Phaside amne apud Colchos, quod illic abundet.

ὄρνις φασιανός, Arosteph.
ὄρνις φασιανός, Polluc.
an ἱνός, Varin?

Ein Fasan/
Phasian.

Avis est sylvestris seu peregrina è Gallorum genere, perpulchra, pennarum plumarumque varietate & splendore mirabilis.

Martialis lib. 13.

Argiva primum sum transportata carina,
Ante mihi notum nil nisi Phasis erat.

Rostrum ei crassum, elevatum, pollicis lati longitudine, coloris cornei.

Vertex Capitis eleganti micat cinereo.

Inter Aures & Rostrum ad latera macula est coccinea, nigris punctulis variegata.

Supra hanc & prope Rostrum viridis color elegantissimus totum Collum occupat.

Colli pars prope Pectus fusco, aureo & viridi colore adornatur. Hunc alba ovalis macula percurrit.

Alæ & Dorsum totum ferè ferruginei coloris ad rufum vergentis.

T t 2

Pectus

Pectus & ventriculi regioni-
dem cum Collo coloribus sed
obscurius coruscant; prope
anum & in femoribus ex fer-
rugineo fuscescit.

Cauda dodrantesq; longa
inæqualis, ex pennis sedecim
coloris cinerei, ad latera fer-
ruginei. Tibiæ & pedes cine-
rei, Digitis membranulis in-
tertextis, & ungibus fusce-
scentibus. Femina Mare de-
formior est, colore ferè Co-
turnicis.

Rarissima avis in Silesia
nostra: nec nisi Magnatibus
familiaris, qui eam magno &
singulari studio alere solent.

Fructibus, baccis, granis,
feminibusq; vescitur. Avena
quàm maximè delectatur.

Parit vere. Ova gallina-
rum speciosiora, punctis ni-
gris undiq; maculata. Semel
in anno fœtificat, & 20. die
pultos maturat. Quidam
Phasianina Ova gallinæ vil-
laticæ incubanda commit-
tunt, ut una matrix ova quin-
decim cooperiat.

Caro ejus temperata est,
alba, tenera, facilis concocti-
onis ac laudabilis succi, in ci-
bo delicatissima.

Alimenti bonitate conco-
ctionisq; facilitate galli-

nam æquat, sva vitate verò in
edendo par.

Corroborat extenuatos, &
eos qui à Morbis consumti
sunt.

Per biduum aut triduum
prius suspendi debet, anteqvā
coqvatur. Ob nimium atq;
immensum precium princi-
pum ac ditiorum duntaxat
mensis Phasiani dicati sunt:
In supremo enim honorum
lumine semper habiti sunt.

Fel visum acuit Ocularibus
mixtum.

Adeps Renum affectibus
Galenī auctoritate.

Phoenix.

φώνιξ,

Ein Phœnix.

Aquilæ narratur magnitu-
dine, Capite Pavonis. Pen-
næ rubore perfunduntur. Au-
ri fulgore circa collum mi-
cant, cætera purpureus, cæru-
leum roseis caudam pennis
distingventibus, cristis faciem
caputq; plumbo apice coho-
nestantibus Herod. Plin. & Ty-
rio pinguntur crura veneno.
Ovid. Nec fruge nec herbis,
Sed thuris lachrymis, & suc-
co vivit Amomi.

Vivere 540. annos, vel ut
aliis placet 660. fama est, Se-
nescentem

nescentē Casia Thurisq; sur-
culis, seu Xylobalsamo, aut
Cinnamo construere nidum
in loco, qvi Solis ara dicitur,
replere odoribus, & super e-
mori tradunt. Ex ossibus de-
inde ac medullis seu cineri-
bus nasci primò ceu vermicu-
lum, inde in avem crescere, &
fieri pullum tradit *Manilius*.

Resurrectionis mysterium,
Femina sit vel masculus hæc,
fortasseq; neutrum,
Felix quæ Veneris fœdera
nulla colit.
Ipsa sibi proles, suus est pater,
& suus hæres:
Nutrix ipsa sibi, semper a-
lumna sibi.

Lege de hac *Herodotum lib.*
2. cap. 5. Melam. lib. 3. cap. 4. So-
linum. cap. 35. item Ambrosium
Hieronymum. & alios.

Phœnicem Nicolaus Reus-
nerus Christo Servatori com-
parat Elegiaco sequenti:

Quæ thuris lachrymis, & suc-
co vivit Amomi,
Fert cunas Phœnix, busta
paterna, suas.
Unica semper avis: pater &
sibi filius ipsa:
Morte sibi vitam dat sibi
sola novam.

Nam quoties super orbe de-
cem jam secula vixit:
Supremi moriens nascitur
igne rogi.
Sic Christus vitam sibi reddit
morte, suisq;
Christicolis, sibi qvos jun-
git amore pari.
Verus homo, verus Deus u-
nus, & arbiter ævi:
Lumine qvi lustrat, numi-
ne cuncta fover.
Felix qvi Christo per sancta
lavacra renatus:
Amne sacro vitam dum
rapit, amne capit.

Pica.

Σίτῃς

περικτλῖς ἰδ' αὖ τὸ ποικίλον τὸν
ῥῶσ' αὖ varietate.

Κίτσα,

Pica varia seu caudata *VL.*
Aldrov.

Avis pluvia *Veter.* quod
amplius solito stridens im-
brem certò indicet.

Ein Aglaster/

Agaster/

Agarte/

Agle/

Ester/

Egerste.

Avis Germanis notissima,
alba & nigra varietate distin-
ta. Ala-

T t 3

cta. Ala-

Sta. Alarum brevitatem Cauda compensat. Caput, Collum, Cauda, Uropygium, Femora nigra sunt : Venter & Alæ superiores cum Dorsi parte, clypei figura candidæ sunt. Remiges majores decem mediotenus ad nervum candidæ sunt, altera parte cum apicibus extremis virent. Reliquæ superiores & inferiores majores cum Cauda ex fusco virore splendent.

Rostrum, crassum, nigricans. Pedes atrii splendent ungribus nigris.

Carnivora est. Ova & pullos gallinarum populatur. Aviculas etiam rapit.

Nidum in arboribus construit altissimis, ex luto, lana & pilis; extrâ & suprà spinis munit, relinqvens tantum arctissimum foramen in latere, per quod ingreditur, & hodeo in loco, quo nidus inaccessibilior est. In opposita ostii parte aliud foramen relinquit, per quod caudam emittat. Ova parit circiter v. vj. viridia notulis purpurascensibus respersa.

Imitatur sermonem hu-

manum lingua sua, quam latiore habet : Unde

Martialis.

Pica loqvax varias modulatur gutture voces,
Scurrili strepitu, quicquid
& audit, ait.

Picæ caro est temperie calidissima, ingrata & abominabilis : nec nisi à Pauperibus & raro quidem in cibum admittitur. Calefacit, exiccat, digerit & venenis resistit, Convulsionibus, resolutionibus & Contracturis eximium remedium.

Ante annos circiter quindecim, & ante decem annos, malum quoddam inauditum inter Monticolas pauperculos præsertim, populariter grassabatur, quod vulgus Contracturam das Fromme / vocare solebat. Adeo enim exagitabat & dilacerabat eorum Corpora, Articulos maximè, ut non solum Crura & Pedes fuerint contorti quasi & contracti acutissimis doloribus; verumetiam Mente turbati adeo, ut plures miserrimè perierint, Medicastris indocti & feminae

feminae purgantibus huic Affectui, incognita causa, cum mederi vellent, omnes ferè qui eorum opera usi sunt iugularunt. Reversus in patriam Basileam inclytam, diligenter de causa inquirens genuina, deprehendi ex veneno quodam in cibo hærente prodidisse. Plerisque enim Suditorum montium convallibus, Manna quadam aëria maligna, seu Kore venenato Sili-go jam maturescens adeo inficiebatur, ut omnes ferè qui panem ex eo coctum in cibumsumerent, eo gravissimo Morbo corripereantur, inprimis senes, otio dediti, feminae, & pueri.

Bajuli verò & laboriosi, licet aliquo modo perciperent veneni vim, minus tamen offendeantur. Grana adeo fuere veneno contaminata, ut licet abluta pinguedinem quandam quasi spumofam abjicerent; attamen in mola trita, farina pessimum spirabat odorem. Igitur solis antidotis mox curari venenum postulabat, adhibitis etiam topicis externis; quibus Dei gratia plurimi fuere restituti.

Pauperculi non frustrato successu Picarum elixarum carnes comedebant, & brodium hauriebant.

In testaceo vase cremata Pica, adjecta cautione ne aduratur, & in cinerem redacta, datur Maniacis, Epilepticis, Cardiaca tentatis, & a frigida causa Melancholicis.

Curat Cancrum in pudendo virili, si lixivio ejus frequenter abluatur.

Ad Oculorum asperitatem, obscuritatem, ruborem, dolorem vehementer à Practicis laudatum remedium, quocumque modo sumta vel adhibita.

Aqua Picarum.

℞. Picarum pullorum uno atque altero nido exemptorum no. ix. frustatim incisarum.

Aq. Primulae Veris, flor. Paeoniae ana. q. s.

Decoq. in fictili probe obturato ad justam consumptionem. Expressionem facta fortiter addantur:

Rad.

Rad. Pæoniæ, sem. Pæo-
niæ an. unc. i.

Visci quercini iusto tem-
pore collecti.

Coriandri præpar. Cubeba-
rum.

Cardamomi,

Cinnamomi.

Galangæ Caryophyllo-
rum.

Nuc. moschatæ, Macis.

Zedoariæ, fol. Lauri.

Cortic. Citrii, granor. Pa-
radyfi,

Castorei an. unc. f.

Zingiberis.

Pyrethri.

Sem. Erucae.

Flo. Stæchad. Arab. an.
drach. 2.

Rosarum rubr.

Rosmarini.

Lavandulæ,

Majoranæ.

Salviæ.

Flor. Primulæ veris.

Lilii Convallii.

Pæoniæ,

Tiliæ.

Melissæ.

Betonicæ an. M. j.

Croci orientalis drach. i.

Sacchar. albiss. unc. 3.

Xyloaloes opt. drach. 2.

Oss. é corde Cervi vera nu.

iiiij.

Ungulæ Alcis drach. i. f.
Spicæ.

Piperis longi an. drach. i.

Fol. Senæ m. unc. 2.

Aq. Primulæ Veris

Salviæ an. ff. vj.

Hæc omnia incis. & contus.
permixta infund. per dies
quatuordecim : dein destil-
lentur in B. M. in fine adde
Croci drach. i.

Aqua est præclara & effi-
cax in frigidis Cerebri & Ner-
vorum affectibus, Medetur
Apoplexiæ, Paralyfi, Spasmo,
Contracturæ inprimis ex vi-
tiato frumento, Loquelam
amissam reparat, & Epilepsiæ
ac Convulsioni succurrit.

Pica glandaria.

Καρχαῖος.

Pica glandaria Gesn.

Garrulus Recent.

Sitta Arist. Eber. & Penc.

Ein Daus-Hâr/sil.

Muß-Decker/

Häbler/

Holschreier/

Herrenvogel/

Marcolfus.

Columbæ ferè est magni-
tudine, tota varii coloris. Ro-
strum breve, nigrum, robu-
stum. Pedes leucophæi, quo-
rum digiti multis articulis
flectuntur,

flectuntur, ungviculis cinereis quodammodo aduncis armati. Cristam in Capite erigit ex plumis antèrùs albidam, maculis nigris variam, retrorsum versùs mixtus est ex cæsis rufisq; color: similiter per totam pronam, nisi quòd in Dorsò minò rufi, plus cinerei admiscetur. Pennæ ab uropygio ad Caudam candidæ extenduntur. Cauda palmos ij. & sesquidigitum longa pennis constat nigris. Alarum pennæ oblongæ & validæ sunt, partim prorsus nigrae, partim candidæ, partim ex nigro albicante & cæruleo coloribus ordine distinctos variantes.

Supina pars ejusdem ferè coloris cum prona, sed remissioris, maximè verò quòd propius caudam fuerit, eò magis ad album vergit. A rostro plumæ aliquot atræ antrorsum subter oculos tendunt. Alæ interiores cineræ. Lingua latiuscula divisa.

Frequens in sylvis. Vesceatur glandibus quernis, juglandibus, Carne, aviculis, Sorbi bacculis, quibus autumno frequenter appositis, laqueis decepti capiuntur.

Nidificat in arboribus.

Hæc ne brumali tempore pereat inedia, glandium, quibus tum victiter, acervos, non aliter ac formicæ fruges, in terram seu arbores recondit.

Edibilis est, nec pravi succi. Calculosis in cibo commendatur.

Garrula est. In juventute educatur, & caveis includitur, edocta varias imitatur voces & hominum sermones, & cantu delectat.

Epilepsia facillè corripitur.

Picus.

Δρυοκόλωψ,
δρυοκολάπης Arist. τὰς δρυὸς
κολάπης ἅ pertundendo arbores.

δρυοκόπος,
καρκύνισκος
πελέκας ἅ perforandis lignis.

Ein Specht/

Baum-Hecker/

Picorum plura sunt genera, magnitudine & colore differentia. Rostrum inest omnibus rectum, durum, rotundum, robustum. Lingua longa acutissima, in extremitate quodammodo cartilaginea ad lancinandos Vermiculos. Pascuntur formicis & Cossis.

V u

Perreptant

Perreptant arbores, humi raro consistunt, scanduntque in subrectum, felium modo.

In cavis Arborum nidulantur.

A quibusdam ad mensas expetuntur.

Picus niger seu formicarius.

Picus maximus, Gesn.

Picus maximus niger, Vlyß.
Aldrov.

Picus 3. Arist.

Picus cornicinus.

Pyrrhocorax, Agricola,

Cornix sylvatica.

Ein Holtrabe/ sil.

Holz Krahe/

Krah Specht/

Grosser Specht/

Schwarzer Specht/

Holz-Hun.

Maximus Picorum, major Graculo, minor Cornici cui similis. Niger est, Capitis Vertice coccineo, Rostro longo, valido, fusco, acumine albo. Pedibus insitit subcaeruleis, quibus ungues unci ante & retro bini. Cauda nigra rigida, pennis extremis divisis. Lingva donatur longissima, per occiput verticem

versus extensa, bipartita, in faucibus mox divisa, apice corneo, acutissimo, asperiusculo, quo vermes & formicas figit. Ventriculo praponitur gula amplissima. Fel vesicula longiuscula Hepati & Intestinis apponitur.

Sonum terribilem æstate in sylvis instar tubæ ædit: passim occurrit.

Formicas majores in cibum deligit.

Picus viridis.

Κολιός, Arist. Gesn.

Picus viridis nostras,
Vlyß. Aldrov.

Picus Martius Latinor.

Turneri, quia Marti facer-

Picus medius, Eber. & Peuc.

Picus Graminis,

Ein Grün Specht/
Gras Specht.

Magnitudine est Turturis, longus dodrantem & sesquipalmum: latus spithamarum ii. & palmum f. Cirrum in Capite habet rubrum. Collum, Dorsum, Alæ superiores, ut Chloris virent. Majores

jores pennæ fusca, maculis seu notis per intervalla candidis distingvuntur. Pectus, Venter & Latera ex viridi & flavo pallent. Rostrum cornei coloris, majoris seu nigri simile, Lingva eadem acutissima. Macula Oculos ambit nigra. Juxta Nares plumula ceu pili rigent. Cauda pennis denis condita, fuscis rigidis in mucronem duplicem divis, mediis quaternis per intervalla maculosis. Crura, ex fusco obscure virent, digitis utrinq; binis, ungviculis latiusculis, phæopis.

In cavernis arborum putrefactarum nidificat.

Picus Martius torrefactus ad eminentias internas & externas Ani, cum sale applicatur.

Ossa ejus comminuta ex vino adversus Calculum utilissimè bibuntur.

Contra ligationes Coitus, & clausuras assa vel elixa, superstitione decantatum, remedium.

*Picus varius
major.*

ringa, Arist.
Pipo, Gaz.

Picus, major, Vlyß, Aldrov.

Picus i. Arist.

Picus picarius,

Picus marinus,

Ein bundter Specht/

Gespregelter Specht/

Elster Specht/

Weis Specht.

Merula est paulo major, Picæ instar albo nigroq; distinctas pennas habens.

Capitis vertex medius saturo Cocci colore ruber.

Dorsi & Caudæ pennæ quatuor longiores mediæ ex cæruleo nigricant.

Alæ nigrae punctis albis maculosæ.

Gula, Pectus albidum obscure flavescens, Ventre extremo sæviter rubente.

Caudæ laterales & breviores pennæ nigrae, maculis albis aspersæ, extremæ bicuspidato flavent.

Rostrum crassum, rectum, canaliculatum, lingua longis. musculosa, duro nervo aculeata.

Pedes subvirides, ungviculi fuscii, latiusculi.

Oculi nigri circulo includuntur, spadiceii coloris.

V u 2

Ex

Ex vermibus & Cossis vivit, qui in putridis lignis nascuntur.

Ovidius 14. Metamorphos.

- duro fera Robora rostro
Figit, & iratus longis dat vulnera ramis.

Purpureum Chlamydis pennæ traxere colorem,

Fibula quod fuerat, vestemque moni orderat Aurum,

Pluma fit, & fulvo cervix præcingitur auro.

Picus varius minor.

Picus 2. Arist. vlyß. Aldrov.

Ein klein Dunder Specht/

Priori prorsus similis, præter maculas rubras in vertice, & circa uropygium, quæ huic desunt. Dorsum magis varium, ex albo nigroque promiscue maculatum, paulo major Passere.

Picus subcæruleus.

Σίττα seu σίττα Arist.

Σείστρογγίς

Κύναδος quod uropygium motitet.

Κακκίς

Sitta vlyß. Aldrov.

Picus cinereus Gesn.

Picus parvus cæruleus.

Ein Blau Specht/

Mey Specht/

Baumhecker/

grosse Baumfletter.

Fringilla paulo major, Alaudæ ferè crassitie. Rostrum longiusculum, rectum, nigrum, rotundum. Caput parvum. Oculi exigui. Collum, Dorsum, Alæ, nec non & Cauda superior è plumbeo ad cinereum vergunt. Gula candidat, pectus ex luteo pallet, venter sub alis è castaneo ad rufum tendit Linea nigra à Rostro retrorsum per Oculos ad occipitium ducitur. Pedes ex glauco, nigricante, & modico flavo tinguntur. Digtos habet ante ternos, & retrò unum, Lingva divisa.

Arbores scandit, ut cæteri Pici.

Pascitur formicis & aliis vermiculis.

Hyeme alvearia advolat, & Apes, rostro fisso alveario, allicit & devorat.

In cavis Arborum nidulatur. Prolem numerosam felicemque gignit.

Dum puer essem sæpè in decipulis, imposito sebo, captus fuit.

Picus muralis.

Picus murarius vlyß. Aldr.

Ein Mauer Specht/

Mur-

Mur Specht/

Kletten Specht.

Passere domestico pauló major, Sturni feré crassitie. Rostrum oblongum, tenue, nigrum, acutum. Caput, Collum, Dorsum cinerea. Pectus albicans. Alæ partim cinereæ partim rubeæ. Cauda brevis, pennæ Alarum longiores. Dorsum inferius, venter & Crura brevia, nigra. Ungves adunci & acuti.

Muris omnibus, turrium veró maximé adhæret, araneas vermiculosq; in eorum rimis qværit: frequens in arcibus montosis. Ad muros brumali tempore sæpé conspicitur.

Volat sola, & qvandoq; binæ simul.

Hilaris est & svavem vocem edit.

Nidulatur in Parietum foraminibus.

Platon.

πελεκάν Arist.

πελεκάν,

ῥάμφορ ἀ ροστρο magnitudine,

Pelecanus Gesn.

Anser Cochlearius.

Cochlearia, Anser plato-

runchos.

Eln Löffel Gans/sil.

Löffler/

Pelecan.

Magnitudo pauló infra Anserem, Colore candido, præter ultimas & maximas Alarum pennas, qvæ ex inferiori nigricant. Pedes & Crura nigra. Lingva brevissima. Ungves breves, nigri, acuti. Oculiglauci. Cauda brevis. Digni pedum membrana junguntur. Rostrum latum, fuscum, feré Cochlearis similitudine. Collum longum decem circiter digitos.

Avis Agypto familiaris, partus sui amantissima. Aliquando autumnno apud nos capitur. Vescitur herbis aquaticis, piscibus, Conchulis, Ranis.

In cibum recipitur á Qvibusdam, sapore feré Anseris,

Singularis benevolentia in pullis suis enutriendis apparet, ut, cum aliunde cibus non suppetit, esculenta qvæ prius comederat, evomat, & in educandos foetus convertat.

Pullorum attamen suorum proterviam atq; impietatem merita morte ulciscitur, Mox veró facti pœnitens, pertuso latere suo pullos mortuos vi-

V u 3 tali

tali sanguine quo animantur irrorat. Quod præter Isidorum D. Hieronymus, commemorat, non eadem tamen fide. Sic enim inquit: Pelecani, cum suos à Serpente filios occisos inveniunt, per triduum lugent, seq; & sua latera percutiunt, & sanguine excusso, Corpora mortuorum sic reviviscunt.

Per Pelecanum præfiguratur Dominus & Servator noster Jesus Christus, qui, ut spiritualis Pelecanus, pullos suos seu filios, id est nos miseros homines, in Paradiso à serpente pestifero Satana lethaliter demorsos, sanguine suo vivificante, quem pro nobis effudit, reseros vivificat, & vitæ restituit.

Psittacus.

ψιττακος η σιττακος *Arriani.*

ψιττακος α ψιττακος, quæ est iuxta Tigrin, Persiæ urbs celebris.

παπαγας, Ανδρωπόγλωσσος.

Ein Papagen/ Papagen/ Siclus/ Sittich.

Avis est Indica, Corporis habitu Accipitri quodammodo similis. Caput enim habet prægrande, Rostrum hamatum seu aduncum, durum instar rapacium, unde frustra ligneis clathris coërcetur cum

omnes perfringat; sed ferreis opus est. Lingva ei crassior & latior cæteris Avibus, Cucurbitini seminis ferè figura, unde articulata verba exprimit. Pectus rotundum. Pedes Pico seu Iynge cognati, digiti utrobiq; antè & retrò bini, ungribus aduncis, quibus escam instar rapacium complectitur, & humano more Ori escas admoveat.

Gaudet Psittaci cælo & solo calido: hinc infinitam eorum copiam gignit India cum orientalis, tum occidentalis, Calecut, Cananor, Seclan, Darien, Hispaniola &c.

Vescuntur frumento & omnis generis seminibus & fructibus, veluti sunt Maizum, Carthamum, Oryza, Amygdala. Cicures etiam panem, carnes & saccharum edunt.

Potus eorum Aqua, libentius tamen vino utuntur.

Nidificant in Arboribus. Nidum pilæ modo rotundum artificiosè contextum, ramulo tenui pensilem, instar Orioli alligant, foramine ad ingressum & egressum perquam exiguo relicto. *Aloystus Cadamustus.*

Autor est Columbus, quosdam Indiæ populos Psittacos magno studio saginare, & in

delitiis Ciborum habere.

Luxuriosa est Avis aspectu virgineo, vino delectatur & inebriatur. Caudam summo studio componit, pennasq; rostro frequentius extergit.

Humanos sermones edoctus imitatur, unde *Statius*.

Psittace, lux volucrum, Domini facunda voluptas, Humanæ solers imitator *Psittace* lingvæ.

Hodie plura genera observantur ab iis qui Indias frequentant, magnitudine, & colore differentia, quorum quædam ab Hispanis & Hollandis in Europam & nostram quoque patriam mittuntur.

A Nobilibus & Divitibus aluntur ferreis caveis, ut pulcritudine & facundia, grataque garrulitate, ac formæ raritate animū exhilarent & recreent.

Psittacus Erythrociæus.

Περτακὸς ποικίλος seu versicolor,

Psittacus varius.

Ein Rottblauer Papagey/ oder Sittich/

Papagey vñ mancherley farbē.

Rostrium huic grande subnigrum. Caput, Collum, Pectus cærulea. Oculorum regio albicat. Uropygium luteum, Alarum tegetes viridibus, luteo, roseo promiscuè conteguntur. Summum dor-

sum dilutè cæruleum. Cauda partim rubet, partim ad cæruleum inclinat. Crura & pedes cinerei coloris.

Hic aspectu suo colorisq; gratiā mirè intueres oblectat.

Psittacus Erythroxiæus.

Ein geelber Sittich/

Sichust der viel geeles auff den Flügeln hat.

Psittacus cyanocroceus.

Ein Rotgeelber Papagey.

Psittacus viridis torquiminiaceo.

Ein grünger Papagey mit ein pomeranzenfarben Zirkel umb den Hals/

Viret caput & totum Corpus, sed Collum, pectus, & pars tota inferna & prona dilutiùs, cætera plenius. Circulus miniaceus collum instar torquis ambit. Cauda è flavo virefcit. Pedes cinerei. Rostrium crassiusculum coloris miniati.

Psittacus viridis minor.

Ein grüner Papagey.

Paulo major est Turdo majore. Rostrium subrubet. Iris crocea. Corpus herbaceo virore amœnum, venter tamen dilutior, saturiore remiges. Cauda angusta, acuminata.

Quercula.

Αιγιδος Arist. Peuc.

Linaria rubra Gese. & Vl. Al.

Salus Gaz.

Linaria

Linaria cinerea, truncalis,
Grifola *Nonn.* à gridare id
est lamentari.

Qverula mibi qvòd luctuo-
se clamiter.

Ein Zörscherlin/sil.

Schöfferle/

Stoßhenßling/

Todtenvogel/

Meuservogel/Rust. Sil.

Avicula Linariæ similis, at
paulò minor. Rostellum ei
crassius, acutissimum, flavi-
cans. Cruscula fusca seu ni-
gra splendentia: digitì qua-
terni ungviculis acutis fuscis
donati, posteriore majore cæ-
teris. Masculus Pectore &
Ventre svaviter & dilutè ru-
bens, in albedinem circa uro-
pygium definit, vertice coc-
cineo colore insignis. Alæ
nigricant, quas lineæ latius-
culæ albæ interfecant. Cau-
da ex duodecim pennulis con-
dita fusca, ad latera candicat.
Dorsum cinereum.

Femella tota cinerea seu
grisea, maculis fuscis passim
respersa, Mentum nigrum.
Pectus ex albido lutescit.

Vesiculam obtinet in gut-
ture more gallinarum, in qua
feminula seu cibus alterantur:
sub hac ante ventriculum
(qui callòsus minor) sinus

fungosus longiusculus, per
quem cibus in ventriculum,
ut perfectè concoqvatur, de-
mittitur. Hunc sæpè arenula
minutissima infarctum repe-
ri. Victitat seminulis Car-
duorum, Alni, Lini, Papave-
ris, Cannabis, Arenulis. Ubi
nidificet non constat. Rusti-
ci monticolæ quidam has
Murium progeniem esse ar-
bitrantur, rursusq; Vere acce-
dente in eas transmutari, cum
per æstatem nulla conspiciat-
ur.

Advolant aliquando tur-
matim ad montes nostros, ut
vulgus credit, singulo septen-
nio, & brevi pestilentiam se-
qvuturam.

Hoc anno 1602. dum hæc
scriberem, incredibilis fuit ea-
rum captura hyemis initio.
Cum enim sit simplicissima,
facilimè visco hæret. A no-
stratibus ad mensas recipitur,
carne plena & pingvedine fla-
va abundans: saporis boni,
& succi laudabilis, minús ex-
crementitii.

Assa ut plurimum editur.

Regulus.

Ῥέγαννον Arist.

Ῥέγιλος Plin.

Ῥέγιλος

Ῥέγιλος

βασιλεῖς.

ὄρχιλος ὄρνις.

Regulus cristatus vl. Aldr.

Regillus, Regaliolus.

Acanthis sylvatica.

Ein Gold-Hänlin/sil.

Döbsen Euglin/

Streuslin/

Ein Meteslin/

id est Parulus Abietum.

Wald-Zinslin.

Avium omnium minutissima, pauló major Locusta, Cristam gerit in vertice auream, ex pluma latiuscula pauculis nigricantibus. Dorsum citrinum. Cauda & Alæ fuscæ partim, partim subcitrinæ. Venter ex pallore flavet. Rostellum rectum, longiusculum. Pedoli flavent. Linea alba. Alas medias dirimit transversim.

Senator est & Rex Avium, cantu s'avavis. In sylvis nostris frequens Hyeme & æstate. Nidificat in cavis arboribus, & plurimas parit.

Muscis, vermiculis & Coscis vivit.

Bis parit. Ova edit piso pauló majora, novem, decem.

Autumno & hyeme Noctua capitur.

Pingvescit & boni est ali-

menti.

Minima quidem est omnium, & parva quidem Corpore, ausu tamen magno contra Aquilam pugnare creditur.

Rubecula.

Εἰς τὰν ὅν Aristot.

Εἰς τὸν ὅν, Εἰς τὸν ὅν, Δάκτυλος,

Rubecula sylvatica, Sylvia.

Ein Rottkästchen/

Rottbrüstlin/

Wald-Rötelin/

Rottkröpfelin/

Winter-Rötele.

Avis est solitaria, cuius notissima, Rostello nigro, exiguo, gracili. Dorso, Capite, superiore Alarum parte & Cauda, cinereo obscuré flavente. Pectus totum exornat color aurantius, ad ferrugineum accedens. Venter albus totus. Caudam duodecim pennis instructam sæpé motitat. Alarum remiges nigricant. Pedunculi fusci, Lingva fissa.

Æstate in sylvis ac desertis vivit, hyeme ad oppida & pagos propius accedit. Muscis, vermiculis alitur, acinis

X x

item

item Sambuci, Frangulæ & Sorbi aucupariæ.

Nidulatur in sylvis, densissimis vepretis & frutigeris. Nidum congerit & struit ex stipulis gramineis aridis & Musco.

Ova parit ut plurimum quinq;.

Hieme in hypocaustis servatur, cantus sylvæ gratia. Captiva Muscis, mixis Panis & nucleis Juglandium incisus vescitur. Admodum mansuescit, ut in iis ova pariat & evolans revertatur sponte fenestrâ apertâ. Parem non facile domi admittit. Continuo enim inter se pugnare solent ad cædem usque, - Hinc

Alciatus.

In modicis nihil est quod quis lucretur, & unum Arbutum geminos non alit Erithacos.

Cum lemmate: Parvam Culinam duobus ganeonibus non sufficere.

Laqueis, visco & decipulis Autumno capitur, & in cibum sumitur.

Rubicilla.

φαινίκου, Arist. ἀπὸ τῆς φαινίξης οὐρᾶς.

Ruticilla, Gaz. á rubente Cauda.

Rubicellus,

Rubecula domestica, æstiva,

Luscinia murorum.

Ein Haus Röttele/

Wistling/ sil.

Rottschwanz/

Rotzager/

Sommer Röttele.

Magnitudine est Ficedulæ seu Currucæ, Colore per Dorsum ex cinereo fusco. Alæ fuscæ; Rectrices superiores in medio albescunt, ceteræ totæ nigrae. Rostrum gracile, longius quàm Rubiculæ. Gula & Pectus nigricant, flavidine intermicante. Cauda ex luteo phœnicea, pennis duabus exterioribus nigricantibus. Pedes graciles nigricant.

Æstate tota nobiscum degit. Circa Muros seu parietes ut plurimum habitat. Muscas & araneas ad cibum persequitur. Nidificat in muris, parietibus, summiscaminis, & arborum foraminibus, Ova parit cærulea quinq; ut plurimum

plurimum vel sex : pullos
Majo excludit.

Cantillat suaviter verno
tempore, cum ad nos redit,
præcipue summo diluculo.
Hyeme appetente avolat, aut
se abscondit.

Ova, si afflentur halitu
vel digirellis tangantur, citò
in alium locum transferun-
tur.

Rubicilla major saxatilis.

Κύανος, Aristot.
Petrocoflyphus, Bellon.
Cæruleus, Plin. Gesn.
Passer solitarius, Vlyß, Ald.
Rubecula saxatilis,
Turdus, Turdela saxatilis,
Merula solitaria,
Merula cærulea.
Merula saxatilis, Placentinis.

Ein Blaw Vogel/
Stein Kuckuck/
Blaw Stein Amsel/
Stein Drossel/
Klein Blaw Zimmer.

Avis est saxatilis, solitaria,
minor Merula, major quam
Fringilla, Sturni ferè magni-
tudine. Caput, Gula, Col-
lum, Cervix pulchrè cyanea,
Dorsum obscurius ad nigre-

dinem rendit. Alæ superio-
res totæ fuscae, interiores cum
Ventre & Cauda, ex flavo
rufescunt, ut in Ruticilla.
Crura Merula nigra, digiti
quaterni, ungviculis nigris
aduncis. Rostrum rectum, fu-
scum, sesquidigiti longitudi-
ne. Caudam frequenter mo-
titat.

Saxa incolit, & præcipitiis
delectatur. Nidum in rupi-
bus construit. Rarissima apud
nos. Unicam habui à filio
judicis Fischbacensis, quam
in altis montibus, non procul
à Schmiedeberg, solam in ru-
pe offenderat.

A nonnullis haberi in ma-
gno precio ob cantus suavi-
tatem, diligentissimus Natu-
ræ scrutator Conradus Gesnerus
testatur.

Scandulaca Arborum.

Κέρδιος, Aristot. Turn.
Καλίδρις, Eber. & Peuc.
Κέρδιος, propter astum,
δριποφάγος,
Κυπολάγος.

Certhia, Vlyß. Aldrov.
X x 2 Calidris

Calidris cinerea,
Crepera id est Avicula re-
pratrix Turn.

Ein Baumfletterlin/sil.

Baum-Heckel/

Hirngrille/

Kinder Kleeber.

Avicula est parva, Regulo paulo major. Color verticis & Dorsi ex cinereo flaves; dilutius ad uropygium, punctulis candicantibus interstinctus. Cauda ex pennulis decem rigida ex luteo virescit, in extremitate quodammodo acuta. Alæ fuscae lineis candidis transversim distinguuntur. Pars prona tota candidissima instar serici nitet auditorii admodum. Rostellum longiusculum sensim arcuatum, superius ex fusco rubens, inferius albet. Lingula tenuissima, acutissima, ossea. Pedunculis insistit ex cinereo flavescentibus, digitis quaternis, geniculis seu internodiis quod distinctis, quibus ungviculis armantur curvis, acutissimis, lucidis, ternis ante, & posteriore calce longissima.

Vox ei clara. Domicilium apud Arbores, in quarum caveis nidificat. Parit maximum Ovorum numerum. Vivit ex Cossis & araneis.

Nunquam quiescit, sed perpetuo ferè, nunc in hanc nunc in illam arborem volitat, nec hyeme avolat.

Scops.

Σκῶψ παρὰ τὸ ἐν σκιά ὃ ἐστὶν
νυκτὶ ἀφίεναι ὅπα quod noctu
maximè cernat.

Αἰσκῶψ

Scops seu Asio Peuc.

Noctua parva,

Noctua aucuparia.

Ein Klein-Keuschlin/

Stock Fule/

Kleine Wald Fule.

Turturis est magnitudine, ἄφωτος, Coloris ex fusco sub-
rubi, punctis albicantibus per
intervalla plurimis.

Venter albicat. Crura cinerea plumosa ad digitos usque. Rostrum aduncum fuscum. Oculi Iris flavens pupillam exornat nigram.

Nidificat in cavis arboribus.

Aucupes hoc venantur Aves.

Smerillus.

Αἰσάλω Arist.

quod omni tempore appareat.

Aesalo Gesn. & Vlyß. Aldr.

Accipitris

Accipitris 2. genus *Gesn.*
 Ismerlus *Petr. Cresc.* quasi
 falconellus.

Merillus *Isidor.* Avis parva
Plin.

Smerla, Æsalon, Assalon,
 Azalon *Albert.*

Falco parvus, Merlinus.

Ein Smyle/

Smylein/

Myrle.

Cognatum Falconello na-
 turam obtinet: cui & Corpo-
 ris specie & pennarum colore
 similis. Falconello minor,
 Merula major.

Rostro adunco, coloris In-
 dici, & ungibus uncis nigris.
 Crura subflavent.

Vertex, Dorsum, Cauda,
 Alæq; fusca sunt, notis & ma-
 culis castanei coloris undique
 maculata. Venter subflavet,
 ut Turdela, longiusculis ma-
 culis varius. Gula albicat.
 Caudam transversim zonæ
 latiusculæ obscuræ rubentes
 distinguunt senæ. Alarum
 remiges notis rubentibus ju-
 xta spinam, ut Cuculus, asper-
 guntur. Faciem & collum
 veluti circulus guttulis refer-
 tur exornat. Oculi Iris ex cæ-
 ruleo nigricat, pupilla obscu-
 ré rubescente.

Omnium Avium velocissi-

ma, & quamvis cæteris ma-
 gnitudine inferior sit, nulli
 tamen animo aut audacia ce-
 dit, pro Corporis & virium
 suarum portione, præcipué si
 peritia & usus accedant.

Nidificat in montium syl-
 vis.

Aves minores, Alaudas,
 Passeres, Cardueles ut pluri-
 mum insectatur, ad summum
 Perdices & Columbas.

Vulpi est inimicus.

Stoparola.

á stipulis,

Ολοθυρόν *Eber. & Peuc.*

Acredula,

Glariana *Lat. Gesn.*

an Calandra *italis.*

Ein Stoppelvogel/ }

Stöpling/ }

Spies Lörche/ }

Grienvogelin/ }

Greinerlin/ }

Gückerlin. }

sil.

Avicula parva ex Alauda-
 rum genere. Color univer-
 sim in Capite, Dorsio, Alis &
 lateribus ex fusco subviridis,
 maculis nigris distinctus. Pe-
 ctus subflavum punctis nigri-
 cantibus, ut in Turdela vari-
 um. Venter, Alæ interiores
 & Cauda inferior albicant.

X x 3

Alarum

Alarum majores pennæ fuscae sunt, superficietenus secundum longitudinem subvirescentes: minores seu medii ordinis nonnihil, ut in Fringilla, candicant. Cauda nigra, extrema penna utrinque mediotenus ad nervum alba. Crura obscurè rubent, unguiculis aduncis, excepto posteriore, qui veluti Alaudæ longiusculus. Rostrum rectum acutum, superius fuscum, inferius flavet. Oculi subcastanei.

Autumno demessa segete in agris inter stipulas, unde ei nomen, frequens gregatim volat. Vermiculis nec non granulis vivit. Capitur nocturno tempore cum Alaudis, retibus tractoriis.

Vox ejus pist, pist, pist.

In cibum venit ut Alaudæ.

Struthiocamelus.

στρουθιόκαμηλος

στρουθὸς μεγάλη,

στρουθὸς λιευκός,

Struthio.

Cin Straus/

Strausvogel.

Maxima Avium vel pen-

natorum est Struthiocamelus Ægyptiaca, quæ Hominis equo insidentis magnitudinem excedit. Dorsum ei admodum latum. Crura alta & similia Cruribus Camelorum, crebris corticibus seu squamis intertexta, usque ad geminos duos poplites. Caput exiguum quidem, sed Cervix magna & procera, partim avem, partim quadrupedem refert; quippe qui non quadrupes pennas habeat: at ut non avis sublimè non volet.

Non enim pennas ad volandum commodas gerit, sed pilis similes. Alas quidem erigit, sed volare nequit.

Corio fortissimo contra frigus tegitur.

Miraculosa est ejus ventriculi in coquendo Naturæ vis, ut cui nihil sit indomabile. Ferrum enim & numismata ex ære conflata deglutit & concoquit.

Struthiones gignit Africa nec non Arabia. Rarò in nostras terras advehuntur. Ante sexennium in aula Electoris Sa-

ris Saxoniae duo enutriti fuerunt.

In desertis habitat nec in sublime fertur.

Nidum in solo humilem ex fabulo confingit. Ova parit maxima, durissima, & quasi lapidea crusta munita, quæ sæpè ad nos ex Italia & Constantinopoli feruntur, ex quibus transversim sectis & expolitis vasa potoria fiunt, argento adornata seu inclusa.

Pennæ in Cauda variis coloribus tinguntur, quibus juvenes passim pileos suos adornare solent.

Strausfedern / Pichhartsfedern.

Interior ventriculi cortex Calculos dissolvit.

Adeps nervis salutare remedium affert: ad durities Lienis illius præstantissimum remedium.

Pellis cum plumis mollioribus, Stomachicis applicatur.

Sturnus.

Ἰὰς Arist.

Ἰόγος.

Ἰὺττα; Ἰὺττος, Hesych. & Ἰόλμω.

Sturnellus barbæ.

Ein Staar/

Rinder Star/

Spreche/

Avis est Merulæ ferè magnitudine, variis coloribus picta, ut plurimum nigra cum splendore insigni, ut etiam in pectore, ventre, alis & prope Oculos viridescat, emicante Circa Collum præcipuè cuprea rubedine, maculis albis distincta, quæ aliquando rubescunt, nonnunquam flavent. Alarum pennæ extremitatibus luteæ sunt. Cauda brevis & nigra, Rostrum robustum, longiusculum, acutum, luteum, in fine fuscum. Pedes subrubentes, ungues nigri.

Rufus Festus.

Mox picturati convertit pectoris artus

Sturnus edax.

Philomela.

Dum Turdus trutilat, Sturnus tunc pinfitat ore,

Sed quod manè canunt, vespere non recolunt.

Degit locis humidis & palustribus maximè, ubi pecora pascuntur,

pascuntur, ex quorum ster-
coribus nutrimentum qua-
runt.

Hoc anno mense Junio, in
pulli ventriculo inventi fue-
runt lapilli octo, lupini ma-
gnitudine majores & latiores,
Silicem colore & duritie ad-
æquantes.

Nidificat in sylvis, in ca-
vis arboribus, veluti in sylva
quæ vulgò der Lindwald / ad
Quadam fluvium, non procul
à Gryphiberga, & aliis pluri-
bus, ex quibus cum adhuc pu-
er, sæpè pullos extraxi, ut plu-
rimum in lignis excavatis, in
arboribus suspensis, aut ædi-
um Parietibus, seu pertica cul-
minibus affixis : nec oppida
reformidant.

Nidum congerit ex Musco.

Bis in anno parit, quinque
ut plurimum, nonnunquam
sex pro vice excludit pullos,
Majo & Junio.

Voracissimus est. Vescitur
Limacibus nudis, lumbricis,
mica panis & carnibus domi
educatus, in primis delecta-
tur scarabæolis rutilis, qui
Junio mense Arborum folia
renella & Rosas arrodere
solent, vulgò *Brachæferlin*.

Qui pullos e nidis auferunt,
in singulis singulos relinque-

re pro more habent, ut anno
sequenti libentiùs redeant.

Catervatim volitant, o-
mnesque in orbem pilæ circum-
aguntur, & in medium ten-
dunt agmen. Cum Corni-
cibus & Monedulis amicitia-
m ineunt, cum quibus Au-
tumno & veris initio, prius-
quam nidos struant, volant.

Capiuntur retibus, allectri-
cibus mutis terræ apposis,
dum à volatu cum impetu
prorumpunt, & cum noctu
in palustribus super arundines
pernoctant.

Hyeme in tepidiora loca
abeunt, vel in Montium re-
cessibus occultantur, Martio
redeunt,

Canori valde sunt, & quo-
rumvis Animalium, ut Pec-
dum, boum, Caprarum, Suum,
Eqvorum, Asini, Galli, gal-
linarum, Orioli, Fringillæ,
Pari &c. voces & concentus
imitantur, nemine illis præ-
ceptoris aut institutoris of-
ficium præstante. Lingvam
habent latam, & perfectè lo-
qui discunt.

Sturni in cibum quidem
cedunt, at ob saporem minùs
gratum, & carnem duram, ac
Ventriculo inobedientem, ut
ignobiles & nullius precii ut-
plurimum

plurimum negliguntur. Pul-
li á pauperibus & Agricolis
frequentur esitantur, capiti-
bus abjectis. Autumno eti-
am á nonnullis nobilibus in
cibum recipiuntur.

Caro eorum calida est &
sicca, palato insuavis, crassi
succu, & alimenti illaudabilis.
Succum gignit Melancholi-
cum & vitiosum, ob id Me-
lancholicis, Biliosis & ab Hæ-
morrhoidibus divexatis inu-
tilis.

Galenus 6. de sanit. tuenda, in
Calculi Renum vitio, tan-
quam cibum tenuis alimen-
ti approbat.

Kiraniides autor est, Sturnos
in Cibo sumtos juvare omnes
qui mortiferum aliquid bibe-
runt, & si quis prægustaverit
omninó non lædi.

Fimus faciem exornat, Ad
alphos, pannas, impetiginem
& morpheam á veteribus
commendatur.

*Sturnus ut Pica
varius.*

Ein Elster Staar!

Magnitudo ei vulgaris
Sturni.

Color rostri medii caput
versus, Verticis, Colli, Pen-
narum remigum, Caudæ ni-

ger: cætera candidus totus.
In Polwitz apud nobilem
Georg. Eekium á me conspe-
ctus fuit.

Sturnus candidus.

Ein gang Weisser Staar!

Aliquando occurrit niveo
colore, in Nobilium aulis.

Strix.

Σύγλον,

Avis nocturna.

Ein Nischfanger!

Kinder Nischfer.

Striges aves inauspicatæ,
quæ σύγλον græcè nuncupan-
tur, maleficis mulieribus no-
men indiderunt, vulgò Nis-
schfanger/ der Nisch.

Vetularum quarundam a-
pud nos firma persuasio, Stri-
ges seu Lamias nocturno tem-
pore Infantulos recens natos
emulgere, & Mammillis eo-
rum lac maternum & sangui-
nem exugere, eosq; omni nu-
trimento defraudare. Quæ
ut suam opinionem confir-
ment, & vulgò plausibilem
reddant, inditia proferunt:

Quod pueruli præter soli-
tum inquieti, insomnes &
queruli sint. Deinde licet á
Matribus probè lactentur,
paulatim tamen absumentur
& tabescant.

Y y

& tabescant. Præterea diligenter advertentibus, lactis indicia in Papillis eorum conspiciantur.

Quæ superstitio ab Ethnicis originem traxisse videtur; quod ex Ovidio 6. *Fastorum* apparet.

Sunt avidæ volucres, non quæ Phinæia mensis
Guttura fraudabant, sed genus inde trahunt.
Grande caput, stantes Oculi,
Rostra apta rapinæ,
Canices pennis, ungivibus hamus inest.
Nocte volant: puerosque perunt Nutricis egentes,
Et vitiant cunis Corpora rapta suis.
Carpere dicuntur lactentia viscera rostris,
Et plenum poto sanguine guttur habent.
Est illis Strigibus nomen, sed nominis hujus
Causa; quod horrenda stridere nocte solent.
Sive vigitur nascuntur aves, seu carmine fiunt.

Pharmaca huic malo occurrentia, Quintus Serenus carmine perscripsit:

Præterea, si forte premit Strix
alta puellum,
Virosa immulgens exertis ubera labris
Allia præcepit Titini sententia neci,
Qui veteri claras expressit more togatas.

Nostrates feminæ Cunis imponere solent speculum & forficulam, Antirrhinum, Absinthium ponticum, Allium, & insuffire Succino.

Quamvis haud negarim, Infantulos effascinari posse à maleficis, permittente Deo, attamen frequenter hujus mali physicam causam deprehendi, quæ Medico diligenti facile innotescit. Addo, vestigia lactis, ut ajunt, esse pus album, quod sæpe ex pustulis minutis papillarum Infantium exprimitur. Cui malo ut succurrendum ex methodo, norunt physici causam cognita.

Effascinationis verò remedium docent Sacræ literæ omnium efficacissimum, Preces Parentum, qui si ventris sui fructus primum per baptismum

mum

mum utpoté lavacrum regenerationis & renovationis Redemptori Christo obtulerint, deinde quotidie Summo Rerum conditori & conservatori, sine cujus voluntate ne capillus ex capite nostro decedit, precibus immolarent & commendarent, eosque tutelæ suæ subjecerint, facile eos ab ejusmodi Satana & suæ farinae vetularum incantamentis, præservari & liberari posse certò credant. Quod Luca 8. Servator noster confirmat inveniens: Sinite parvulos ad me venire, quoniam talium est regnum Cælorum. Item, Psalm 34. v. 8. Angelus Domini castra metatur, circa timentes eum, & eripit eos.

Hoc verum Succinum spirituale ex pharmacopolio S. Sancti desumptum, quo incenso, ab ædibus nostris, tanquam Antidoto efficacissimo omnia Diaboli venena fugantur arcenturque.

Tarda Recent.

ῥῆτις, Arist. vlyß. Aldr.
τέττις, ὄυζαξ, Aristot.

Erythrontaon Olai magni,
Tetraon Longol.

Trappus,

Tardus, quod gravi & tardus volatu detenta nequam ut cæteræ volucres, velocitate pennarum attollatur.

Anser - Trappa,

En Trappe/

id est:

Piger vel tardus,

Trapp Sans.

Acher Trappe.

Avis post Struthiocamelum ferè maxima. Color in Dorso & alis, qualis Urogallina seu perdicis rusticae, sed magis rufus, subnigris maculis undantibus ferè eleganter distinctus. Rostrum Gallinae robustum valde. Caput & Collum cinereum, sed supina Colli parte ad album vergit. Pectus quoque & Venter & Crura, quatenus plumis vestiuntur, ad mediâ usque femora alba sunt. Cauda quatuor palmos longa, peninis pulcris, rufis, cum tæniis quibusdam, & maculis nigris,

Y y 2

superiore

superiore interioreq; parte albis, verumetiam extremitate ornata. Alarum pennæ majores candidæ, circa finem nigrae. Crura fusca, digiti terni antrorsum, nullus retró, & ungues ut in Gallina. Vola seu pars interior densa torosaq; est. Lingva serrata utrinq; acuta.

In campis degit spaciosis, Arboribus insidet nunquam, nec aquas frequentat. Vescitur herbis, maximé veró legit grana & fruges. Hyeme aliquando solitaria in montanis colliculis nive denudatis stabulatur. Nidificat in terra inter segetes.

Ova si ab homine contrectata, aut ejus anhelitu & afflatu vel leviter imbuta senserit, extemplo relinquit.

Caro ejus dura nigra, concoctu pervicax, excrementis redundat; & humori Melancholico procreando apta: Valenter tamen alit, si concoctionem in ventriculo fuerit adpta exquisitam.

In cibo laudatur juvenis, si per dies aliquot post jugulationem reservata fuerit.

Torquilla.

Ιουγξ vel Ιουξ Aristot. ἀπὸ τοῦ

ἰούξ qvód est derivare, clamare Gesn. & Vl. Aldrov.

Κρυαῖος Hesych.

Collitorqves á Colli circumactu reliquo Corpore quiescente.

Turbo, qvoniám Collum ac Caput circumagens turbinis imaginem præfert.

Verticilla, Verticollia Scalliger.

Formicarius.

Ein Windhals/

Wendehals/sil.

Trayhals/

Waternwendel.

Varií coloris volucris, ex Picorum genere, Alauda palmos & digitos ij. longa. Color ei cinereus ut plurimúm. Caput, Cervix, Dorsum, uropygium ex fusco cinerea sunt, punctulis minutissimis lateritiis nigricantibus varia. Macula juxta Oculos retró versus longiuscula, fuliginis colore. Linea á cervice latiuscula atra, secundum longitudinem utrinq; juxta alas per dorsum ducitur, ad extremas Alarum longiusculas pennas Corpori vicinas excurrens. Cauda longiuscula cinerea, punctis infinitis aspersa, & maculis transversis

sis latiusculis, fuliginosis distincta.

Alarum majores pennæ, partim rubris partim fuscis maculis transversalibus alternatim distinguuntur. Mentum, gula, pectus obscure flavent, lineis nigris transversalibus, quæ versus pectus semper longiores evadunt, tinguntur. Venter maculosus. Rostrum rectum, crassiusculum in acutum definens, cornei coloris. Pedes breviusculi fusci, in quibus digiti quatuor ante & retro bini subvirides, geniculis quasi distincti, ungviculis latiusculis acutissimis, ita ut utrobiq; longior alter exterior, cum altero longiore extrinsecus, & brevior cum breviori extense jungatur. Lingva longissima, acutissima, quam mensura IIIJ. digitorum porrigit, rursumq; contrahit intra rostrum, cui aculeus præfixus ossis, teres, validissimus, infra arteriæ sinum subit, & supra cranium reflectitur prope Nares.

Collum circumagitur in aversum reliquo quiescente Corpore modo Serpentum. Voce *Tzi* stridere dicitur. Vivit in sylvis. Rostro ligna tun-

dit, & strepitum qualem Picus edit, Arbores sursum & deorsum perreptando. Cossis & formicis alitur, quas magna celeritate aculeo suæ lingvæ exertæ, transfixas vorat, nec unquam illas rostro suo attingit, ut ceteræ aves suos cibos.

In Arboribus nidulatur excavatis. Uno partu plures septem, octo, novem excludit.

Si quis prope eam accesserit, non mox refugit, verum iratus Collum in sublime erigit, ac rostro pinrens, sine morfu tamen, ac idem retrahens extendensq; per vices, tanquam minando iram declarat. Plumis Capitis interim instar criste riget, & Caudam erigit dilatatq;.

Marem aliquando manibus detinui, qui collum circumagebat in aversum, prorsum & retrorsum, reliquo Corpore quiescente, mox Oculos clauderat, quasi obdormisceret.

Pingvescit & in cibum admittitur.

Fel Oculorum affectibus utile, adversus pilos in palpebris pungentes illinitur.

Antiquitus Veneficis ad
Y y 3 philtrea.

philtrā & illecebras amatorias in usu erat.

Aviculam alis supernē & infernē pedibus, advocato amantis nomine, ex rota agitabant, aut cum Cerea rotam super ardentē prunas ambu-
rebant. Alii asserunt, viscera Jyngis exemta radiis rotarum implicare sagas, quibus versis sollicitare ad reditum amantes. Hinc Theocritus :
Per te Jynx meus ille domum vir quæso trahatur.

*Emblema Contr.
Gesneri.*

Cur vinctam Jyngem picta
detinet manus?
Avis hæc Amoris, & voluptatis nota est,
Quæ sita philtris: fortē quod
quovis agat.
Antē & retrorsus collo, in orbem, liberē.
Sic & voluptas Corda agit
mortalium,
Mirumquē torquet in modum
quovis liber.
Hanc tu nisi vinctam cum ratione rexeris,
Mentis peribit quicquid ac
sensus habes

Hoc fascinum putabis, atque
maximum

Philtrum, veneficiumque; quam
miserrimum.

Hoc torquet animos, turbat
& retrō mover.

Aut igitur omnem tu voluptatem
fuge,

Aut si libet uti, vincla semper
admove,

Non cicuratur, semper est vin-
clis opus.

Invidos etiam alienæ fortunæ spectatores notat, qui aliena facta serpentino veneno maledictis incessant.

Invidus varius est, ridet in alienis miseriis, deflet alienas felicitates, linguam exerit in omnia beneacta, Collum avertit & caput, ne videat virtutum alienarum splendorem.

Turdus.

Κίχλα Arist.

Κίχλα Varin,

Ζίχλα

Turdus à tarditate. Hymis enim initio se referunt,

Ein Ziemer /

Kramervogel /

Weckholter vogel.

Avis

Avis est advena & peregrina, quæ æstate nunquam videtur: in hyemis initio verò sæpè tanta copia advolat, ut nullius avis major sit.

Pabulum quærit ex fructibus Arborum, Fagi, Sorbi, Juniperi, Oxyacanthæ.

Ferunt Aucupes, Turdos nidificare in Livoniæ, Transylvaniae & Moscoviæ vastis sylvis, tandem deficiente pabulo ad nostros Montes advolare ac perhibernare. Circa Paschatis festum iterum redeunt.

Nidos ex luto, ut Hirundines facere ajunt, in arboribus excelsis, ita deinceps continuato opere, ut quasi catena quædam nidorum contexta videatur.

Retibus & laqueis, inescati Sorbi & Juniperi baccis, appensis allectricibus ejusdem generis, à nostris Aucupibus capiuntur.

Turdus maximus.

Ἰξίόγος Aristot.

Ἰξίφάγος Athen.

Turdus visci vorus Gesn. & Vlyß, Aldrov.

Turdela Isidori.

Ein Schnarre/

Schnerre/sil.

Mistel Ziemer/

Mistler/

Primarius in suo genere, & reliquis major, pauló infra Picam. Capite, Alis & ventre fuscus, plumis tamen juxta caudam aliquid flavi admixtum apparet. Cutim intra rostrum pallidus & subruber color mixti tingunt, Pedes digitique flavescunt, præsertim posteriore nervo tibiæ.

Ungues & Rostrum nigricant. Collum parte prona, venterque totus nigris punctis in albicantibus plumis & alibi flavis variant.

Plumæ sub alis candidæ.

In sylvis vivit. Visci, aliarumque arborum & fruticum baccas devorat, ut Juniperi, Sorbi alpinae &c.

Minoris est precii, nec adeo acceptus in Cibo apud nostrates.

Turdus medius.

Ἰξίχας Arist.

Turdus

Turdus pilaris Gaz. Vlyß.
Aldrov.

Turdus major,
Ein Grosziemer /
Blawziemer / Sil.
Kramervogel.

Major est paulo Merula.
Rostrum ei subflavum; rectum, in extremo nigricans, Vertex Capitis, Collum pronum, cum Dorsi extremitate dilute sunt cærulea, sed nigris punctulis aspersa. Dorsum charopum seu rufum obscure & per medias pennulas nigricans. Collum supinum & pectus varia sunt. Nam flavescens in eis plumas nigrae distinguunt maculae; Alae interiores albæ sunt. Plumæ ventris similiter albæ. Ungues digitique pedum fusci. Pennæ Alarum partim nigricant, partim rufo colore, ut Dorsi minores præsertim & breviores apparent. Macula utrinque ad Oculum Rostrum versis nigra, plumulis ceu pilis rigentibus nonnullis.

Cauda longa nigra.

Aliunde advolat. Nidos enim ubi ova posuerit, aut Ovorum fragmina nusquam reperias.

Tardius apparet Viscivora, cui & saporis gratia præfertur

& in delictis habetur.

Martialk.

Inter Aves Turdus, si quis me
judice ceter,

Inter quadrupedes gloria
prima Lepus.

Boni & præcipui est saporis, sæpe Juniperi baccas redolens. Caro suaviss, laudabilis succi, mediocre gignit alimentum & siccum.

Prodest Arthriticis, Paralyticis, Stomachicis, aliisque ex frigida causa subortis Morbis. Suggestit enim nutrimentum calidum & siccum.

Dysentericis & Calculosis commendatur, urinas prolicet, & alvum cohibet.

Ab eorum esu abstinendos svaadet Arnoldus eos, quibus hæmorrhoides fluere solent.

Vescitur non solum bacculis Juniperi, Sorbi, verum etiam micis panis & carne, si in hypocauftis detineatur.

Suaviter canit. Agrippina conjux Claudii Caesaris prima Turdum habuit imitantem sermones hominum. Plin. libr. 10. c. 42.

Turdus pilaris.

λεοκοκέφαλος,

Ein Grosziemer mit einem
weißen Kopffe/

Autumno

Autumni fine Anni 1602.
in montanis territorii Hirs-
bergensis captus fuit.

Turdus minor.

Ιλιὰς Aristot.

Ιλιὰς,

Ιλιὰς Theod.

Turdus Illas vl. Aldr.

Turdus Iliacus,

Turdela montana,

Turdela sylvestris,

Turdulus Bohemicus,

Winfela Gesn.

Ein Klein Ziemer /

Heide Drossel / fsil.

Pfeiff Drossel /

Heide Ziemer /

Derg Drossel /

Winfel /

Wein Drossel /

Rot Drossel /

Geyerle / Basiliens.

Turdi genus minimum,
Turdi Mulici forma & magni-
tudine similis. Totus ut vul-
garis Turdela fuscus per Dor-
sum. Pectus varium, flavum
& candicans nigris maculis
refertum: Medius & infimus
venter candicant utrinq;, sub
alis ex rubro flavescent. Crura
flavent ex fusco. Maculae seu
lineae subluteae, utrinq;, juxta
Oculos binæ, à rostro Collum

versus extensa.

Exotica est, advolat hye-
me initio cum Turdis. Vi-
ditur plerumq; gregatim, &
inter humiliores sylvas, Ju-
niperos & Sorbos alpinas de-
git.

Saporis est non nihil ama-
riusculi.

Turdus muscus.

Turdus simpliciter dictus
vlyß. Aldrov.

Turdus domesticus,

Turdela domestica.

Turdus minor alter Gesn.

Collurio, Collyrio Turn.

Ein Drossel /

Sang Drossel / Eber. &

Peuc.

Weisse Drossel /

Zier Drossel.

Minor est Turdo, Sturni
magnitudine varius & macu-
losus. Tota pars supina fu-
sca. Alæ ex fusco rufæ, ma-
culis subflavis pictæ. Pectus
ex subflavo & rufo colore
commixtis in unum adorna-
tur: Ventrem album & late-
ra, puncta nigra insigniunt.
Rostrum rectum nigrum. Ti-
biæ ex fusco albent.

Per totum annum apparer.
In sylvis nidificat. Nidum in
ramis arborum aut fruticum

Z z

tingit

frigit ex luto aut lignorum carie & musco. Aprili & Majo ovis incubat, parit quatuor plerumque.

Similem cum Turdis reliquis cibum quærit. Vermiculis insuper & scarabæis fruitur.

Musica est avis canens vere, vocis multiplicis: ob id à multis cantus gratia in caveis alitur pane, lacte, carnibus, & farina hordeacea lacte mixta.

Dulce palam resonat quam dicunt nomine Drostam, Sed fugiente die nempe quæta silet.

Autumno etiam ex remotis locis singulari Conditoris optimi max. providentia advolant. Tanta enim copia in montibus & sylvis Silesiæ nostræ sæpenuerò capiuntur, ut non solum sufficiant alendis incolis præsentis temporis, verum etiam semiasæ & aceto immersæ in sequentem æstatem incorruptæ serventur.

Laqueis verò ex pilis equinis candidis seu nigris. appensis sorbi alpinæ bacculis, decipiuntur, & jugulantur.

Saporem omnibus ferè præ-

feruntur, qui saporis est, & palato arridet.

Caro ejus laudabilem procreat succum, facile digeritur & probe alit. Alvum interim sistit.

Turdus Musicus cristatus.

Ein Kobel droffel.

Anno 1599. circ. captus fuit Turdus Musicus, ceteris colore & magnitudine similis, præter cristam, quam in vertice gerebat albidam instar Alaudæ, & circulum album, qui prona parte collum mediotenus cingebat.

In sylvis Cortzanensibus ducatus Lignicensis.

Turtur.

Οὐκ ἔστιν ἡ τρυγὰ, ἀπὸ τοῦ τρυγῆν, ἃ sono vocis.

Τρυγόνι,

Τρυγόνα, Hodie.

Ein Turtel Taube.

Turtel / à voce, vel ut Goropius derivat, Ein Turtel. Taube / quasi Trotteldaubel / à verbo Trottelen /

quod

quod idem est, quod blandiri & omnibus modis & gestibus conari cuiuspiam placere, & propriè id facere suaviis & amplexibus, quod in Turturibus docemur. Præterea & sonus ejus hac voce quodammodo exprimitur, & significat fidei excellentiam, quæ in Turturum conjugio tanta est, ut meritò princeps fidei dici possit. Trout, Trau, fidem notat. Trout, trauer, idem quod conjugio copulat. Et Excellentiam denotat. Hinc Tourteltaube, trouteltaube, quasi Traute taube.

Minimus est in Columbaeo genere, colore ferè Liviae, sed dilutior, in Pectore præsertim, cui in Dorso superficietenus ferruginei seu rufi quiddam elucet.

Pars præona ventris candidat.

Collum torquis ambit retrò aterrimus, Viridibus maculis eleganter splendens, antè vix conspicuus.

Femora, tibiæ, ferruginea.

Pedes rubore nitent. Uropygium fuscum seu coloris fumati.

Ungues breviusculi, nigri, parùm adunci.

Rostrum tenue, ut Columbae, obscurè caruleum.

Pupillam Oculi nigram exornat Iris lutea.

Et castus Turtur atq; Columba gemunt.

Virgilium.

Nec gemere aërea cessabit
Turtur ab Ulmo.

Frugibus vivit, glandibus & arborum gemmis. In Montium sylvis & desertis commoratur locis, æstate frigidis, hyeme se condit aut discedit ad tepidiora.

Nidum ex virgultis super ramos arborum colligit & suspendit.

Bis anno parit, ova plerumq; bina, raro terna.

Ad annum octavum vitam extendit. Oscula, antequam procreanda soboli indulgent, permiscunt.

In hypocaustis & intra ædes diutius asservatur, ubi sæpè ova parit, eaque excludit.

Volat gregatim, cum accedit & discedit. Adventu suo vernum tempus prænunciat.

Avis est casta inprimis
Z z z & pudica

& pudica. Amisso enim pari suo, alterius copulam non requirit, solitaria incedit, solitudines diligit, hominumq; consortia fugit, perpetuóq; gemit, siccis arborum ramis tristis insidens.

Ambros. Deus Turturibus infudit hunc affectum, hanc virtutem Continentiæ dedit, qui solus potest præscribere, quod omnes sequantur. Turtur non uritur flore juventutis. non tentatur occasionis illecebra. Turtur nescit primam fidem irritam facere, quia novit castimoniam servare, prima Connubii sorte promissam.

Turtur temperamento est calido & sicco, præsertim adultior & senescens: Ob id eligantur tenelli, per aliquod dies saginari.

Carnes habet neq; durissimas, neq; pravo succo vitiosas, neq; concoctu difficiles. Ipsarum veró durities, si mortuo uno die asservetur, facile vincitur, suntq; friabiles omnino atq; inculpatæ. Benè alunt, & probum ac medio cre gignunt alimentum, sanguinem laudabilem humore atq; calore temperatum procreant, spiritusq; animales

peragendis ratiocinationis & intellectus cogitationibus aptissimos,

Dysentericis in cibo Platina præscribit, Trallianus tympanicis. Galenus inter eustomachos numerat.

A nonnullis ejus esus pestilentiae tempore laudatur.

Sanguis Oculis cruore suffusis eximie prodest, & ad Oculorum ictus cruentos efficacax.

Fimus Albugines extenuat & ad Oculorum ictus cruentos utilis. Ustus ex Mulsæ Calculos per urinam exturbat.

Pictorius.

Si fluxus ventrem nimium infestaverit ingens, Turtur combustus, terq; quaterq; juvat.

Turtur Turcicus.

Turtur Indicus VI Aldr.

Turtur exoticus *Ἰνδοῦ γένους*.

Ein fackendes Teublin/sil.
á sono vocis quem ridentis instar edit Ha, ha, he.

Türkisch Teublin

Indianisch Turtur Teublin.

Turturi nostrati similis est, pauló major. Color Capitis, Colli,

Colli, Pectoris, Dorfi, Alarum ex candore rufescit. Pennæ Alarum longiores, uropygium cum cauda fufcescunt. Collum exornat torquis tenuis, nigra, quæ tamen circumlum non absolvit integrum. Iris miniati coloris elegantissimè splendet. Rostrum nigrum. Pedes pulchrè rubent.

Femina tota candida est, exceptis pedibus rubris & rostro nigro.

Peregrinus est, & paucis ab hinc annis importari cepit. Par duobus aureis nummis æstimabatur, jam minoris vaneunt.

Passim in Nobilium & divitum hypocaustis aluntur. Ova edunt bina pullos excludunt, eosque enurriunt: licet in primiparis aliquoties intereant.

Tritico aluntur.

Turtur mixtus.

Emixtus Turtur Doube/

Magnitudo ei Indici. Dorsum cinereum totum, ex quo rubedinis subobscuræ quid elucet, absque nigris & ferrugineis maculis. Vertex, Collum, Pectus dilute rubent. Ventris plumæ & Caudæ extrema pars per transversum, Alæ interio-

res secundum latera dilute Indici coloris sunt. Remiges Alarum pennæ fuscæ. Pedes rubor sanguineus tingit. Rostrum subcæruleum ex fusco.

Par huius Turturis pluribus annis in hypocausto aluit ampliss. Dom. Pancratius Syssbachius M. Syndicus Reipub. Hirsbergensis, amicus meus optimus, quod habuit ex conjugio Turturis nostratis maculi, & Indicæ famellæ.

Vanellus.

Alæ Arist.

Γαῶς & γγίος, hoc est Pavo sylvestris, quod cristam in capite gerat.

Πεῦξ Νονν.

Capella *Gaz.* quod Capræ similem vocem edat.

Vanellus quod alis vanni aut ventilabri instar, commotis strepitum excitat.

Parcus, Parra *Plin.*

Gavia cinerea *Eber. & Penn.*

Kyvitta.

Γίνε Ονβίς/

Ονβίς/

Ονβίττ.

Avis est sylvestris, satis pulcra, Columbæ magnitudine, rostro longo, nigro. Color per totum Dorsum viret, maculis quibusdam purpureis utrinque

Z z 3

trinque

trinq; partim viridibus, partim cæruleis, Extremæ veró & longiores Alarum pennæ nigræ, quæ inversæ atro splendent colore. Venter & Alarum interior pars plumas habent albas. In capite cristæ plumacea nigra, oblonga, retrorsum tensa conspicitur. Gula ex nigrore splendet, ut & Caput summum, cujus partes laterales sub oculis candidæ sunt, tantillum rubentes. Cauda sesquipedale longa, candida, extremè nigra. Pedes rubent, ungibus nigris, digiti membranula junguntur.

Ad paludes, piscinas, vermium gratia, quibus vescitur, degit. In planis, pascuis ac ericetis nidificat. Ova parit. Majo, ut plurimum quatuor Columbinis paulo majora, pallida, notulis fuscis variegata.

Autumno gregatim volant, & retibus capiuntur. In cibum veniunt saporis boni, nec succi improbi.

Vespertilio.

Quasi vespertino volans crepusculo.

μυρτίνος.

μυρτίνος.

μυρτίνος.

quod vesperi & noctu volat.

Ein Fladermaus/

Fladermaus/

Spectmaus/

Δεξιόπτερος est, mediæ cujusdam inter avem & murem speciei, Corpore instar Murium piloso, alis cutaneis; pedibus Murinis incurvis. In utraq; parte Mandibulæ, dentes instar Murium habet. Auriculæ eminent. caret cauda.

Non tam voce resonat, quam stridore. Τετρίπ id est tenui voce stridere.

Ovid. Minimam pro corpore vocem

Emittunt, peraguntq; levi stridore qverelas.

In cibatu Muscæ & Culices ei gratissimæ sunt, quas sub noctem circumvolitans capit. Vescitur & libentissimè Larvæ & Carnibus suillis & trabe suspensis. Candelas & pingvia quævis instar Murium ambit.

In

In cavis arboribus, ædificiis desertis, sub tectis domorum & templorum later.

Parit ut Quadrupeda, non ova, sed pullos viventes, quos mox ad motis uberibus lactare solet, secundum illud :

Ein Vogel ohne Zungen/
Der ander sauget seine Zungen.

Sanguis ad Serpentium ictus valet, & philothri vim obtinet, addito Chalcantho aut semine Cicuta. Urina abstergit & valde calefacit, Ungulam & albuginem curat.

Cinis visum acuit, & cum Melle suffusioni medetur.

Ulula.

ΑΥΛΙΟ Eber. & Peuc.

Ulula Gesn. & Vlyß. Aldrov.
ἡ πὸ τοῦ ὀλῆζερ.

Strix, Ovid, Nonn.

Eine Eule/ Ble/á fletu, Hul enim idem est quod fleo cum tristi voce, seu ploro.

Pusch Eule/
Graw Eule/

Avis Gallinae magnitudinis Nocturae cognata. Lon-

gitude á Cauda ultima ad Rostrum extremum dodrantum duorum. Latitudo extensis alis dodrantum quatuor & palmi unius semis.

Color partis supinae, Capitis, Dorsi, Alarum, Caudae cinereus, obscurus, ad raram inclinans, maculis albicantibus & nigricantibus ubivis varium. Venter albet maculis majusculis fuscis respersus.

Caput obtinet grande, rotundum, admodum plumosum; anteriori parte plumulas exiguas, graciles, candidiusculas in orbem velut flammam positas.

Oculi grandes, pupilla maxima ex nigro caerulea, circulo ambiente obscuré baticeo. In horum ambitu ad palpebrarum oras lippientium instat rubescens circulus conspicitur. Superiori tantum palpebra inter nictandum Oculum contegitur latitante periophthalmio, seu tunica crassa dilute caerulea, á supra dorsum porrecta integrum Oculum operiente. Rostrum aduncum subvirescens. Nares patulae.

Primulae

Primula rigida inter Oculos & Rostrum multæ, densæ, nigrae radicibus albis.

Ala maximæ longitudinis duorum dodrantum. ad extremam usq; caudam protensa. Crura habet albicantia fuscis notis respersa ad ungues usq; leucophæos, aduncos, acutissimos hirsuta. Dígiti quatuor, bini antè, retró & ad latus singulus.

Lingva latiuscula, bifida. Gula ampla. Ventriculus rugosus, crassior. Fel majus prassini coloris, adhæret Intestino, & dextro Hepatis rubicundi lobo. Appendices binæ Intestino quâ desinit hærent.

Colit saxa & speluncas in sylvis Montium.

Nocte vagatur & pascitur, die raró apparet, aviculas & Mures venatur.

Aliquando oppida & pagos advolat hyeme præsertim rigida, & carnes inquirat.

Fel ad Albugines, Suffusiones, Caligines prædicatur.

Adeps ad claritatem similiter facit.

Ulula flameata.

Ἰὼς Eber. & Peuc.

Otus Turn.

Ἰδρυς.

Aluco vlyß. Aldr. vom Eosen.

Ulula flameata Gesa.

Ein Schleier Eule/sil.

Kirch Eule/

Kauz Eule/

Eximii candoris est in gutture & ventre, alioqvi candidis, nigris & flavis lineis & maculis alternis distincta. In faciei ambitu plumarum albarum finem, ea figura dispositum habet, ut flameum, quo Mulieres Caput & faciem obvelant, quodammodo referat.

Habitat in rimis antiquarum turrium, templorum, arcium, aut quercuum cavernis in quibus & nidificat.

Aviculas & Mures integros deglutit ob gulam amplam.

Upupa.

Εποψ,

Αλεξάνδρ γέλασος Hesyeh.

Αγριονόκος hodie.

Gallus lutosus,

Gallinaceus stercorarius.

Ein Wiede Hopffe/

Kot-Han/

Avis est spurcissima, Turdi ferè magnitudine, nigris maculis colorata, Cristam plumeam, rufescentem, punctis &

Ais & apicibus nigris distin-
ctam in capite gerit plicati-
lem, quam contrahit, erigitq;
secundum Capitis longitudi-
nem. Pennæ Alarum nigræ
transversim lineis intercisæ.

Gula subflava, ut & Col-
lum sed cinereo dilutum. Ro-
strum fuscum, tres digitos
longum, aliquantulum fal-
gatum Certhiæ instar. Pe-
des fufci, ungues adunci. Sub
ventre uropygium versus al-
ber. Lingvam obtinet par-
vam trilateram.

Melancholicæ est comple-
xionis. Desertas qværit Ne-
morum & invias plagas. In-
ter aves nocturnas & tenebra-
rum amicas, lugubris ac lu-
ctum amans. Vox ejus Cu-
culi non absimilis. Pollux
ποπύζειν scribit.

Nidum ex stercore huma-
no fingit in arboribus excava-
tis, & circumlinit, ut fæto-
re suo homines á nido depellat.
Qvòd ipsemet expertus sum
dum puer adhuc, nidum in
Qvercu cava offendens, pul-
losq; extrahere volens, manus
sordibus & fæto- re inquina-
rem.

Ova plerunq; parit qva-
ruor.

Vermiculos in stercorebus

qværit, Erucis, scarabæis ali-
isq; vermiculis nutritur, in-
primis verticillis, vulgò Wer-
ren/delectatur.

Hyeme in cavernis arbo-
rum dormit, circa æquinocti-
um vernum prodit. Variè
mutat colorem & speciem, æ-
state & hyeme.

Caro austera est & cibo in-
utilis.

Upupæ cineres ex vino po-
ros, Colum sanare Marcellus
annotavit. Cor in lateris do-
loribus laudatur.

Pennas ejus Capiti imposi-
tas Hominis Cephalalgiam
sanare creditur.

Fertur Pullos, parentes su-
os senes fovere sub alis, & an-
helare super ipsorum Oculos,
donec visum recipiant.

Urogallus major.

τέτραξ Arist.

Ουγαξ Atheniens.

Tetraon Plin. Gesn.

Gallus alpinus.

Gallus urus.

Uragen.

Ortygometra Veterum

Albert.

Ein Auer-Han.

Patria lingua, fortè propter
magnitudinem & pulcritudi-

A a a nem,

nem, veluti & Ein Auer-
Schſſe / Urotaurus denomi-
natur.

Ohr-Han/
Berg-ſaſan.

Avis gallinacēi generis
omnium maxima.

Corporis magnitudine An-
ferem ferē æquat, longa do-
drantes quatuor cum dimi-
dio.

Colore tam atro, ut tan-
quam Palumbi collum re-
splendeat.

Rostrum ei gallinæ vali-
dum, gibberum, fuscum.

Macula rubra utrinq; cir-
ca Oculos ad tempora infi-
gnitur.

Collum dodrantale, ni-
grum, cinereo diluto colore
sparsim respersum, pronum,
punctis cinereis varium, qui-
bus pennæ virides succedunt.

Caput nigrum, pars infra
rostrum atra.

Pectus & Venter nigri co-
loris.

Alarum remiges palmo-
rum quinque; fuscae sunt, reli-
quæ minores obscure casta-
neæ nigricantibus punctis di-
stinctæ.

Alæ interiores albæ.

Cauda palmos quinque; lon-
ga, extensa semicirculum

reddit trium in circumferen-
tia dodrantum, ex pennis du-
odecim nigris condita, macu-
lis paucis albissimis extreni-
tates minorum pennarum &
punctis variarum, insignien-
tibus.

In Dorso superiore plumæ
Castaneæ coloris, punctis
asperæ, ut in alis: in inferi-
ore Dorso cinereæ magis va-
riæ punctis quam in Collo,
longè pulcerrimæ.

Poplites & femora plumis
albis vestiuntur, quæ Cruribus
fuscae usque ad digitos pedum
descendunt.

Digitus glauci utrinque, qua-
si serrati, seu pectinis instar,
tunica aliquatenus jungun-
tur, & ungibus fuscis fir-
mantur.

Excolit altissima Sudeto-
rum juga maximè circa mon-
tem, cui à gigantibus nomen
impositum est, & alia altiora
& frigidiore loca, nec hyeme
discedit.

Gemmas & folia Arbo-
rum in cibum sumit. Visci
baccas, Myrtillos, Fraga le-
git.

Lapillos candidos rotundi-
usculos ad concoctionem
promovendam in Ventricu-
lo fovet.

Circa

Circa festum D. Georgio
sacrum coit. Et cum voce
gallinas allicit & invitat,
Wenn er pisset oder locket /
bombardâ facile feritur: tunc
enim visus & auditus interci-
piuntur, alioquin auditus a-
cutissimi: at maxima celeri-
tate opus est.

Autumno laqueis in ter-
ram positis capitur.

Caro ejus dura & sicca,
subnigricans, saporis grati, &
probi succi.

Siccum Corpori suggerit
alimentum, & alvum fistit.

Magnatum & Nobilium
mensis lautè atq; exquisitè
apparatus, assus, & liqvine
aromatico perfusus apponi-
tur.

Lapilli Oculis commen-
dantur, læves enim sunt &
lubrici: ob id sine sensu &
molestia iis induntur, si festu-
ca aut aliud quid eos incide-
rit.

Aetas dignoscitur colore.
Iuniores passim candore re-
sparguntur, qui in senibus
prorsus deperditur.

Urogallina major.

ρυρόγκυς,

Grygallus major, Gesn.

Tetrix Nemesiani seu Gry-
gallus major, Voss. Aldrov.

Cine Auer-Henne/ sil.

Grugel-Han. Gesn.

Avis hæc reverâ est femi-
na Urogalli: quam sapissi-
mè diligenter consideravi.

Cum enim frequens sit in
vicinis alpibus, facile eam
habere potui.

Minor est pauló Mare, ma-
jor Gallina decumana, Ro-
stro simili fusco.

Color varius ac multiplex.

Toto Corpore enim Per-
dicis rusticæ instar colorata,
& punctis distincta ubiq; ma-
culisq; nigricantibus: reli-
quus color rufus est, maximè
sub Collo ad Pectus usq;.

Est & cinerei aliquid in
Collo præcipuè.

Sunt & albæ quædam ali-
cubi maculæ, circa uropygi-
um maximè.

Iris Oculorum flavel, Pu-
pilla intus ex fusco cærulea.

Color circa Oculos retró
præsertim angustius rubet:
ima Colli pars prona rubet,
intercedentibus lineis ex cæ-
ruleo virentibus: in Ventre
plurimum alba est.

Crura, pedes & digiti, ut in
urogallo.

A a a 2

Cauda

Cauda octodenis constat pen-
nis, palmos duos & digitum
longa, maculis nigris transver-
sim colorata, fimbria exte-
riore albida. Alarum majores
pennæ fuscae.

In Ingluvie ejus, aliquoti-
es ressecata, Myrtilli, Salicis
latifolia folia & theculæ cum
semine tritici vaccini reperti
fuere.

Nidum in terra sub frutici-
bus & Filice parat, substratis
plumulis propriis, inter medi-
as nives. Ova parit, primi-
para octo; adultior 14. 15. 16.
majora ovīs Gallinæ decu-
manæ.

Vrogallus minor.

Tetraon minor.

Vrogallus seu Tetrao mi-
nor VI. Aldrov.

Attagen alpinus.

Phasianus montanus,

Grygallus, Gallus Betula-
rum.

Ein Virel-Han/sil.

Spishan/

Laut-Han.

Magnitudo totius alitis, in-
star Gallinæ villaticæ, sed
paulo major & oblongior, tres
dodrantes æquans, ab Vrogal-
lo majore, magnitudine sal-

tem differens, cui colore fere
similis.

Totus enim niger plumis
integitur splendentibus, circa
collum & caudam Indicis, præ-
ter Alarum interiores & me-
dias exteriores ac superiores,
quæ candidæ sunt, majores
seu remiges fuscae sunt. Ro-
strum nigrum, breve, superi-
us utrinque juxta Nares plumu-
lis nigris densis, q. lanugine
densa intectum. Supra O-
culos pellicula rubens major,
quàm in Vrogallo. Cauda
nigra ex duodecim pennis
condita, quarum tres extre-
mæ utrinque longiores extror-
sum reflexæ, interiores octo
breviores Liliæ figuram, si ex-
tendantur, præsentant. Cir-
ca uropygium & poplites plu-
mæ densissimæ quæ ad digi-
tos usque pedum extenduntur,
ut in Vrogallo majore, ne fri-
goris injuria lædatur. Digi-
tis pedum squamatim com-
pactis, utrinque squamosæ
quædam vel corticæ appen-
dices eminent. Plumæ Pe-
dum nigricant, sed maculis
albis distinguuntur.

Plurimis Montium locis,
sylvis item densis, ac betule-
tis maximè, ubi Betularum
abundantia

abundantia, ut Venatorum insidias fugiat, stabulatur.

Cibus ejus sunt folia, Betularum gemmæ, ac juli Corylorum, Autumno baccas Vitis idææ, & hyeme sub nive vaccinia palustria legit.

Caro delicata alba ἐὺσώματος in Nobilium delitiis.

Urogallina minor.

Grygallus minor *Gesn. & Vlyß. Aldrov.*

Gallina Betularum, Tetraon minor femina.

Ein Birek Henne/
Birek Hum/

Tota alium quàm Mas colorem refert. Longa est spithamas ij. & digitos tij. Color Dorfi & Alarum superiorum ex lateritio flavus, maculis nigris respergitur. Mentum & Collum dilutiùs flavent. Supra Oculos visitur macula, ut in Masculo. Pectus album. Ventrem obscurum interstingunt notæ partim nigræ, partim subflavæ. Alarum remiges fusæ totæ: sequentes quindecim mediotenus spinam versus candidæ, lineam candidam constituentes, quarum quatuor majores extremæ fusæ, reliquæ

fusæ quidem, sed notulis partim albidis partim lateritiis maculantur. Cauda sinuata pennarum decem & octo ex lateritio rubet, & maculis nigris transversim coloratur, apicibus extremis subalbidis.

Crura pluma obscurè flavente integuntur, Rostrum & digiti ut Mari.

Hyeme gregalis est, densa fruteta & betuleta occupans. Vere appropinquante mas femina se adjungit, & bimatim volat.

In terra sub fruticibus nidificat, densis & opacis locis. Ova parit. 12, 14, 16. complurimum, longiuscula, gallinarum minorum magnitudine.

Vultur.

ρεψ.

γύπαξ *Recent.*

Vultur á volatu tardo. Ob Corporis enim magnitudinem tardè volat.

Ein Geyer/

Gyr.

Avis est rapacissima & carnivora; media inter Milvum & Aquilam, Rostro adunco, Oculistruculentis, fœdis Pennulæ seu pili, instar velleris tenuiss. sub Mento veluti bār-

A a a 3

ba pro-

ba prominent. Crura ad extremos digitos flaventes tabellis intectos plumis hirsuta ungves adunci nigri. Corpus totum, maximè Alarum interior pars leni vellere tota integitur.

Degit in montibus altis, & varii generis animalia persequitur ac deperdit. Cadaveribus vivit, quæ olfactu eminus venatur, ac unice appetit.

Dum clangunt Aquilæ, Vultur pulpare probatur.

Vulturem Ova non parere, vanum est credere. Raro visa sunt ob id, quod in altissimis montibus & desertis sylvis metu pariat.

Homer.

Hi autem, sicut Vultures, ungvis curvis & rostris ad uncis, Scopulo in excelsis valde clangentes pugnant.

Vulturem ad centum annos vitam prorogare Isidorus auctor est.

Avibus omnibus odorandi vi præstare creduntur Vultures: ob id trecentis miliaribus ad cadavera Trojæ advolasse historiæ tradunt.

Nos Aper auditu præcellit, Aranea tactu,
Vultur odoratu, Lynx visu,
Simia gustu.

Magna est miseratio & pietas in liberis Vulturum, qui parentes extremo senio alunt, unde

Baptista Mantuanus.

Patrem senio jam gelidum fituq; fractum,
Nudo Capitis calvitio atq; glabritate,
Ecce reficit munere Vultur Africanus,
Hoc idem grata Ciconia &c.

Cor pulli Vulturini adalligatum, contra morbum Comitialem prædicatur. Idem de jecore affirmatur.

Fel oculis prodest.

Pingvedo calefaciendi & dissolvendi vipollet, emollit, nervorum dolores tollit, nodisq; medetur. Arthetis utilis.

Si vero occultus nervos dolor urget inertes,
Vulturis excisas adipēs, Ruramq; remitte.

Aut

Aurceram, & tali recrea-
bis langvida fotu.

Fimus nidore partus excu-
titur.

Penna Vulturina subjecta
pedibus parturientes adjuvat.
Plin. Earum nidore fugantur
Serpentes. Suffitu Lethar-
gicos, suffocatas utero &
Phrenitidem sanari, *Kirani*des
affirmat.

Vultur leporarius.

γύψ λαγοθήρας

λαγωφόνος *Arist.*

ανωσσοειδέεστος *Arist.*

Vultur Anserinus,

Vultur Cadaverum,

Vultur cinerius,

Ein Aßgeyer/

Ribgeyer/

Rosgeyer/

Ganse Aß.

Ossifragi feré est magni-
tudine, Rostrum adunco, nigro,
fædis oculis, Corpore firmo
& magno, alis latissimis.
Cauda longa & directa, colo-
re in rutilo nigricante, pedi-
bus flavis.

Volat magno & sonoro
impetu.

Omnis generis aves perfe-

quitur. Ex feris venatur Le-
pores, Hinnulos, Vulpes, Cu-
niculos, nec piscibus parcit.

Nidificat in densis sylvis, &
altissimis arboribus,

Pellis si præparetur, evul-
sis majusculis pennis, relicta
pluma, & ventriculo applice-
tur, ejus calorem & conco-
ctionem promover.

Vultur.

λευκοκέφαλος,

Vultur albo capite.

Ein Weissköpfflicher
Geyer.

Weiss Köpff/

Grimmer. sil.

Corpore est fatis crasso.
Longitudo spithamarum *ij.*
à rostro extremo ad caudam
extremam. Latitudo spitha-
marum sex & palmorum *ij.*
Rostrum duos digitos lon-
gum, intus subcæruleum, ex-
tremè nigricans admodum.
Lingva latiuscula. Ora Ri-
ctus croceæ, cum tunica supra
Rostrum, quâ Caput contin-
git. Pinnulæ ceu pili nigri u-
trinque juxta Rostrum & O-
culos rigent, & sub Mento in-
star barbulæ propendent. Cru-
ra integra dodrâté feré longa,
villosa

villosa lanugine & plumulis investita, ad digitos usq; coloris ex obscuro flavescentis, maculis longiusculis tinguntur. Digni crocei, tabellis intesti ungibus aterrimis acutissimis.

Caput, Collum, Alæq; interiores insigni candore nitent, quæ maculis seu lineolis longiusculis potius resperguntur, alis exceptis.

Dorsum & Alæ superiores fuliginiei sunt coloris, intermicantibus maculis subrubris, præsertim in alis, quarum pennæ majores extremæ nigricant mediotenus, calammum versus candidæ sunt.

Pectus veluti clypeo coloris obscure castanei insignitur qui ad alas usq; excurrit, elu-

cente paucula rubedine, ventre & sub uropygio ex obscura rubedine albet, maculis Castanei coloris respersus.

Cauda spirhamalis longitudinis, decem pennarum, dorsum versus candida, extrema fusca, apicibus albidis.

Fel obtinet magnum rotundum, prassini coloris, quod Hepatis cavo & Intestino adhæret.

Ventriculus rugosus crassior.

Oculi pupillam includit Iris obscure rubens.

In montibus vivit ex raptu, Aviculas & Mures capit pro cibo.



LIBER

LIBER QUINTUS.

Pisces Silesiæ.

DE PISCIBUS IN
GENERE.

Ἰχθυός, quod vocem compressam habeat, *Plutarch.*

Ἐἰς ἰσχύ /

Ἰχθυόσιον,

Pisciculus,

Ἐἰς ἰσχύλιον.

Piscis est animal aquatile seu ὕδατιον, in aqua vitam agens,

Sedes propria Piscium est Aqua: extra quam si diutius retineantur, celerrimè moriuntur; tanquam naturali Elemento seu pabulo caloris destituti. Aqua enim generati, eadem educati augescunt, nec potiore cibo pasti, ocyus ad justum incrementum perveniunt, in eadem commodissimè omne vitæ tempus transigunt.

Quemadmodum Aër externus Corpora nostra ambi-

ens, ea nunc calida reddens, nunc frigida; aliàs supervacaneo humore perfundens, aliàs præter modum exiccans, aliisq; multis modis afficiens & commutans, sic Piscium naturam atqve substantiam Aqua similiter immutat, undiq; circumfusa eos suo humore imbuit, atq; pervadit, ac intrò alimenti & refrigerationis necessitate attracta, similem invehit temperaturæ suæ constitutionem.

| | | | |
|-------|----------------------|----------|-------------|
| | | | Salsarum ut |
| | | Residū | Marini |
| | | seu stas | Lacus |
| Pisc. | gnanti | | stres |
| alii | um | Dulci | |
| sunt | | um ut | Palu |
| | | | stres |
| Aqua | | | |
| rum | Fluitantium, ut Flu- | | |
| | viatiles, | | |

B b b

Pisces

Pisces Marini.

θαλάτσιοι, Meerfische/ sunt, qvos ultró citroq; Mare gignit nutritq;. Hi sunt vel Maris puri, vel impuri.

Impuri Maris seu Stagnorum. λιμνοθαλάτσιοι, id est, Marino stagno degentes nominantur, & Carnis firmitudine, succi bonitate, saporis suavitate multó Marinis inferiores. Et quidem Stagni instabilis, parvi, adhuc deteriores: Stabilis, immoti plané, ex quo nihil omnino effluit, pessimi.

Puri Maris, pelagii, optimi sunt, tum ob Maris puritatem, tum ob Alimentorum præstantiam

Horum ob Regionem, quam Mare alluit, alii sunt Pisces

Oceani Germanici seu Belgici, ut Haleces.

Cymbrici & Britannici, Salmones.

Maris Africani, Thrissæ seu Alofæ.

Armerici, Lampetræ.

Orcadum, Orce & Cetacci.

á loco Mark profundo vel non profundo.

Profundo πελάγιοι, Pelagici, specialiter dicti, qui in profundo Maris, in imis & altissimis locis versantur: & sunt vel

Cetacci κητώδεις, grandes sunt, & perfectum animal ex semine non ex ovo generant, Sunt enim ζωτόκα τὰ κητώδη πάντα, ut Balæna, Delphinus, Physeter.

Duram omnes habent carnem, pravi succi, & excrementitiam.

Non Cetacci iique vel Corpulenti & crassi: qui rursus aut

Lati, λεπίσσωτοι, Squamei, squamosi, ut Auratæ, Coracini, Alofæ, Mugiles.

Rotundi, rubescences, qui vel squamis teguntur, ut Merulæ, Corvi: vel iis carent.

Plani πλατῆς, ψηχειδεις Passerini, qui iterum aut

Spinosi, Ακανθώδεις, Aculeati; quorum quidam aculeis extra & intra spinis præditi sunt, videlicet: Uranosco-

pus,

pus, Ania, Falx, Aper, Lyra, Araneus &c. alii aculeos habent extrá, intús veró Cartilagine pro spinis, cujusmodi sunt Aquila, Squatina, Raja, Pastinaca, Rana piscatrix, Torpedo.

Cartilaginei σελάχη, σελάχωδης, χαρδίακονθα, ut Galei γαλεοί, γαλεωδής, Mustelarum genera : & rotundiores seu serpentini, Muræna, Lampetræ, Congri, Acipenser.

Non Profundo, sed vel Continenti terræ vicino, Littorales, Αἰγιαλώδεις, qui littora terræque propinquas sedes petunt, captant, & possident, ut Canthari, Scarabæi, Oculata, Mugiles, Mulli, Gobii.

Saxis proximo, Saxatiles, Πετρώτοι, qui in petrosis promontoriis delitescunt & pariunt. Hi Musco aliisque Marinis herbis pascuntur, ob id proxima saxis domicilia eligunt, & in illis puriora salubrioraque pascua carpentes consenscunt, veluti Scari, Cynædi, Turdi, Merulæ, Per-

cæ, Exocæti. Carnem habent Saxatiles omnes molliorem ac fragiliorem aliis Piscibus, & alimentum quod ex iis sumitur, non modò ad coquendum est facile, sed hominum etiam Corporibus saluberrimum, Hinc Diphilus, Siphnius, autore Athenæo : Τῶν θαλασσίων ἰχθύων, οἱ μὲν πετρώτοι ἐστὶν εὐφραστοί, εὐχυλοί, σμικτικοί, κῆφοι, ὀλιγότσοφοι. Ex Marinis piscibus, Saxatiles facile corrumpuntur, boni sunt succi, abstergentes leves, modicè nutrites.

Pisces Lacus- stres.

Αἰμνῶτοι,
Seefische.

Sunt autem Lacus vel Naturales, vel arte facti.

Naturales, Mari vicini, propinqui, Mari extra littora diffuente, vide suprà inter Marinos : vel á Mari remoti, aquis ex montibus, irruentibus, in iisdemque asservatis, vel spontè inundantes é fontibus, aut fluminibus.

B b b 2

His

His Pisces quidam sunt Proprii, ut Lavaretus Lemano Sabaudia lacui : Carpio Benaco Italiae : Pigus Lario & Verbano in Alpium radicibus; Trutæ nigrae Gigantæo in Sudetis Silesiae montibus.

Alii Plurimis Communes, ut Barbae, Lucii, Percae, Cyprini, Brama.

Arte facti, ut Piscinae, quarum in Silesia ubivis magna frequentia. Weiher/ Teiche. Piscinarii pisces sunt maximè, Cyprini, Lucii, Characes, Percae, Rubelliones &c.

Pisces Palustres.

Τελματιῶν: Ψυλφίς/ qui loca sordida & cœnosa, & paludes exudatione fluminum, alluvione, aut torrentium impetu cavatas impletasque amant. Pravi hi sunt saporis, insvaves, mali succi, & pessimum gignunt sanguinem.

Pisces fluviatiles.

ποταμίων, Ψυλφίς. Pisces sunt, qui flumina rivulosque incolunt à Mari procul distita. Horum alii sunt.

Verè Fluviatiles, qui in fluviis geniti, ibidem perpetuò vivunt, suisque sedibus con-

renti, sua læti carpunt pabula, externa minimè conquirentes. Inter quos alii incolunt.

Flumina majora : Padum Italiae, Seqvanam seu Rhodanum Galliae, Rhenum Helvetiae, Danubium Austriae, Viadrum Silesiae, Vistulam Poloniae &c. Veluti sunt, Accipenser, Hufones, Alofae, Salmones, Siluri.

Fluvios minores, & sunt vel *Torrentium alumnæ*, & patria lingua Wachsfißlin nominantur ut, Bdellæ, Gobiones, Perculae, Alburni, Sqvali & alii.

Rivulis Montium limpidis delectantur, ut Saxatiles, qui in saxis stabulantur, & vitam agunt, in iisque perpetuò manent & consenescent, ut Trutæ, Thymali.

Participant cum aliis : vel cum *Mari*, Ἀνάσσοι. Quorum alii in Mari marinisque stagnis procreati, sua fastidientes alimenta, utpote quæ ingratiore sint, sedes mutant & dulces Amnium undas subeunt, illic Ciborum copia & svavitate deliniti, aquarum tranquillitate alleciti, recessuum amœnitate capti reliquum vitæ tempus transigunt, pristini domicilii.

domicilii vitæq; immemores.

Hujus rei fidem facit, quod in fluviis, statis Anni temporibus, ejusdem semper generis Pisces capiuntur, aliis minime ut Salmones.

Alii Mare deferunt, & in flumina se insinuant, sed natalis soli non omnino obliti, ut profectiois, sic reversionis certa stataq; habent tempora, ut Lampetræ, Sturiones, Husones, Alofæ. &c. Etenim maximè ineunte vere domo exeunt, totam hanc Anni partem in fluminum pascuis amantissimè transacturi, æstate verò appetente, æstum & ardorem pertimescentes, humore dulci saginati in suas sedes redeunt.

Terra, Αμφίεροι. Inter hos Alii nascuntur in terra, ut δρυ-
αλοι Fossiles pisces, veluti Angvillæ, Ostrea fossilia in littore Celtico, attestantibus *Aristotele*, *Theophrasto*, & *Plinio* lib. 9. cap. 57. In Paphlagonia pisces effodiuntur ex locis, qui neq; fluviiorum influxiones neqve aquas calidas habent.

Alii in fluminibus generantur, & suis aquis naturalibusqve sedibus relictis, in terram prodeunt, & in terra subter-

ranesq; locis uliginosis, vel perpetuo degunt, ut Pæciliæ, vel ad tempus saltem; aut.

Longius li, quibus sunt Pulmones, Vitulus marinus, Crocodylus, Cordylus, Testudo lutaria, Rana : Item quibus branchiæ minus hiantes ductæq; Angvillæ, Murænæ, Serpentes marini, Exocatus.

μαλακόδεμα, Astaci, Locustæ.

ὀστράκωδες, Ostrea, Mytuli, Purpuræ, Spondyli, Cochleæ.

Molles, Polypi, Sepiæ, Urticæ.

Brevius. Breviori tempore seu difficilius, qui pulmonibus carent, quique patentes minusq; constrictas habent branchias.

*Pisces Ancipitis
vitæ.*

Piscium tandem nonnulli aquarum dissidentem contrariamq; consecretantur naturam & ædem in fluviis, lacubus, palustribus, urbium Arciumq; fossis reperiuntur, nec minus hic quàm illic gratis pabulis fruuntur, ut Cyprini, Lucii, Bramæ, Percæ, Tinchæ, Mugiles.

B b b 3

Item.

Item, Piscium alii sunt Ἀγέ-
λαιοι, qvi gregatim semper
incedunt, ut Haleces, Thynni,
Bdellæ.

Alii ὠροαδικοὶ qvi solitariè
natant.

*Alimentum Pi-
scium.*

Ut terrena Animalia ap-
petunt varia, vel naturæ suæ,
vel libidini accommodata :
sic Aquatilia quoq; aliis atq;
aliis pabulis delectantur.

Alimentum autem Pesci-
um in universum sunt : Aqua
permista paulò crassior, lu-
tum, arena, caro, vermes,
pisces, herbæ, radices, stercus,
mucus, terræ excrementa,

Dissectis enim ipsorum
Corporibus, tale quid in eo-
rum visceribus reperias.

Escas varias cùm simplices
tùm compositas, pro allicien-
dis & capiendis Piscibus,
præparare norunt Piscato-
res.

Hinc Piscium aliquot dif-
ferentiæ exurgunt : ut alii
sint

πανφάγοι, Omnivori,
Multivori, qvi Alga, lapillis,

stercore, limo, carne, cæte-
risq; omnibus alimentis pro-
miscuè vescuntur, ut Mulli,
Lupi, Cancri, Gammari flu-
viatiles, & alii crusta inecti,
μαλακόςσακα omnia.

Μονοφάγοι, qvi uno alterò-
ve alimenti genere contenti
sunt, vivuntq; ut Mugiles,
Sardinæ, Aphyæ. Horum
alii.

Σαρκοφάγοι, ζωοφάγουντες,
qvi piscium tantùm carne
vescuntur, ut Cartilaginei
quidam : Molles quidam ut
Polypus, Loligo, Sepia, μαλα-
κόςσακα, sed minus propriè :
Squamei pleriq; Duriore
siccioreq; sunt carne.

φυκοφάγοι, qvi Alga pa-
scuntur, ut Salpa, Perca, Ju-
lis.

φυτοφάγοι, qvi radices, her-
bas depascuntur, ut Μάνα,
Tragus, Atherina.

μυξοφάγοι, Cænosi, Luta-
rii, qvi luto cænoq; delectan-
tur : ideò voluptatis explendæ
caussa é finibus suis egressi,
loca cænosa adeunt, ut Mul-
lus lutarius, Bos, Salpa cæno-
sa, Tincha, Pæcillas.

† αμμίται

ταμιῖται, Arenosi, in littus, exeunt, & arena fabuloq; se operiunt, illic aliquandiu vitantes, ut Funduli, Lampretæ fluviatiles minimæ, Hippus, Cuculus.

Λιδόκοποι, Saximordæ, qui sub petris latentes eos veluti lambunt, ut Lampetræ, Cobitis aculeatus, Capitones, Lepades.

ῥυχοτρώφοι, Alfiosi Calca-guino, frigida seu aqua nutriti, ut Angvillæ, Ostrea, Holoturia, Mugiles, Sardina, Aphya, Trichides, Ostracoderma.

Ἰσσιότροφοι, qui naturæ proprietate quadam singulari alimentis quibusdam fruuntur & delectantur, quibus Aliis sine detrimento uti non licet : ut Mullus, alga, conchis, carne, cæno, cancellis : Salpa Cucurbitam avidissimè persequitur : Scarus amat Mercurialem : Aurata cochleis, Muræna Loligine, Polypus ostreis delectatur.

Partes Piscium.

Piscium genus á cæteris variat Animalibus forma numerosiore, Mutilatius est atq; imperfectius, quàm Avium, partibus exterioribus. Piscium etenim nulli Cervix; nulli manus aut Pedes; nec Alas habet, sed pinnulas quasdam; nulli Testes aut intus aut foris; nulli Mammæ; neq; meatum Genitalium ullum habet Piscium genus foris conspicuum; sed continuo ac simplici Corpore á Capite in Caudam usq; porrigitur.

Partes Piscium vel sunt :

Simplices, Arteriæ, Venæ, Ossa, Cartilagines, Vincula, Membranæ, aculei, squamæ.

Compositæ, quæ ex simplicibus componuntur, ut Cerebrum, Oculos, Pinna, Cor, Branchiæ, Pulmones, Hepar, Splen, Venter, Intestina, Venter, Testiculi, Mentula, Pedes, Caput.

Item Partes aliæ Piscibus propriæ, aliæ cum aliis communes.

Partes

*Partes propria
Piscium.*

Pinnæ, πτερυγες, πτερυγία.
Stoßfedern / Stossen.
Fischgefieder.

Alis Avium proportionē re-
spondent, in Dorso, Ventre,
ad latera, Podicem & Caudæ
extremum. His enim & re-
migrant & incitant propel-
luntq; sese. Differunt mul-
tipliciter.

Magnitudinē. Magnæ; ut
Milvo, Cuculo, Hirundini.
Parvæ,
Longæ,
Breves,
Latæ.

Substantia. Quædam ex fibris
tenuibus seu filis constant &
membranis, ut in Squillulis.

Cartilagine, ut in Cartila-
gineis.

Cartilagine & osse, ut in
beluis marinis.

Figura. Quædam,
Pedum figuram imitantur,
ut vituli marini priores pin-
næ vrsi pedibus.

Alis sunt similes, ut Testu-
dinis marinæ.

Rotundæ sunt, ut in Luna
pisce.

Alis Avium sunt similes, ut
Hirundinum ungribus muni-

untur, aliæ non item, ut vitu-
li Testudines.

Colore. Aliæ sunt

Albæ,
Cinereæ,
Fuscæ,
Flavæ,
Rubræ,
Ceruleæ.
Variæ.

Numero.

Binæ plurimis tantum ad
Branchias, Angvillis.

Ternæ quibusdam.

Quaternæ, binæ ad bran-
chias & binæ ad ventrem.

Senæ, duæ ad branchias,
duæ in medio ventre, una in
dorso & juxta Podicem.

Unica parva : interdum à
Capitis fine ad Caudam con-
tinua.

Nullæ, Raiis, Pastinacæ,
Murænis.

Tactu,

Læves.

Aculeatæ πτερυγες ἀκνυδω-
δæ stachelichte Stoßfedern.
In Squamosis.

Branchiæ, βράγχια, βράγ-
χια, Ohrwangen / FischOh-
ren.

Der Kampf.

Piscium sunt partes, velu-
ti pili dense confertimq;
ordine

ordine dispositi, semicirculo osseo infixi, utrinq; Cor respicientes, ut nimirum Cibus per hiatum illum ad respiracionem à Natura comparatum non efflueret, sed branchiis veluti claustris contentus recta ad ventriculum delabatur, & aqua simul cum Cibo hausta ejiceretur.

His ossea Opercula imponuntur, quibus obteguntur, & more folium dilatantur & comprimuntur.

Branchiæ aliæ sunt.

Imperfectæ iis, qui nec scissuram longam habent, veluti squamosi; nec foramina multa, veluti Cartilaginei, sed unicum tantum, ut Murænæ, Congro, Caprisco, Orthogorisco.

Perfectæ Reliquis.

Testæ Squamosis. His scissura longior est, & in lateribus existunt, ut Lupo, Auratæ, Scaro, Cynædo, Tunno, Xiphias, Sphyrænæ.

Detectæ Cartilagineis omnibus, præter Sturionem & Attilum, quibus osseo operculo integuntur branchiæ, etsi cartilaginei sint.

Hæc foramina habent, quidam utrinq; singula, ut Murænæ, Angvillæ, Congri: qui-

na Cartilaginei: septena Lampetræ, vulgoq; nuncupati Catuli.

Detectæ rursus *aliæ* sunt in parte supina, ut Torpedini, Raiis, Pastinacæ: *aliis* in lateribus, rotundis & longis cartilagineis, ut Galeis. addo Ranam piscatricem & Squatinam.

Branchias nullas habent, nec Pulmones, Ostracoderma, quibus paucus inest calor, & satis per Cutim perspirant.

Branchiis quidem carent, sed pulmonibus donati sunt, ut Balænæ, Delphini. Hi fistulâ quæ ἀνὰ τὸ φλεβοεισόδον Arist. seu Ἀνωτὸς ἀπὸ τοῦ σπένδοντος Rondel. dicitur, ad pulmones pertingente spirant, & aquam ore collectam rejiciunt.

Branchias obtinent.

Singulas utrinq; Murænæ, Angvillæ, Congri.

Quaternas simplices, Elops, Dentex.

Quaternas duplices, Turdus, Perca, Glaucus, Cyprinus, Mustela fluviatilis.

Quinas & duplices, Galei ut Acanthias lævis & Canicula.

Octonas Xiphias ob ingentem scissuram.

Squamæ, λεπίδες,

Schuppen / Fisch Schuppen.

C c c

Aquatilium

Aquatilium sunt tegmen-
ta, veluti pili Animalium,
quibus Pisces ab externis in-
juriis, ut calore, frigore nimio
aquæ vel aeris &c. defendun-
tur. Quod enim teste *Aristote-*
le lib. 1. hist. Anim. c. 1. in Avi-
bus penna est, id in Piscibus
est squama, & ut plumis ob-
ducitur Avicularum Corpus,
quò sint à caloribus & frigo-
ribus tutiores (hyeme enim
calefaciunt plumæ, æstate
Corpori umbram præbent)
sic ad propulsandas injurias
muniuntur frequentibus squa-
mis Piscium nonnulli.

Harum quædam sunt
Majores, Cyprino,
Mediæ,
Minutissimæ, Trutis,
Argentei candoris, Blicæ,
Alburnis.

Flavent Cyprinis aliquan-
do, Caraso.

Rubent, Trutis nonnul-
lis.

Nigricant, Tinca.
Asperæ, Lucioperca,
Læves Tinca, Trutæ.

Spinæ Anaxodori
Fischgräden/
greten.

Omibus terrestrium Ani-

mantium, proportionē re-
spondent, in eum finem con-
ditæ, ut carnem fulcirent &
continèrent.

Spinis carent : Beluæ ma-
rinæ iiq; Pisces, qvi pulmo-
nibus spirant; quarum vice
ossa sunt dura & densa, qva-
lia Terreſtrium Animanti-
um: Cartilaginei *χρυσόσαν-
δα Arist.* qvi neq; spinis neq;
ossibus fulciuntur, sed carti-
lagine. Knorpelfische.

Spinæ verò habent omnes alii, ut squamosi, læves, fluviatiles, & qui relicto Mari flumina subeunt, ut Alofæ, quæ plurimis spinis abundat, & Murænæ: alii paucioribus firmanantur.

Sunt verò aliæ minutissimæ, tenues admodum & brevës, quæ ἀκρόγια spinulæ fletine græcè / Capillorum tenuitatem referunt, separatim per carnem in hærent, & sine noxa sæpè devorantur; quales habent Sardinæ, Mænæ, Alofæ, Aphyæ, Albiculi, Capirones, Barbi &c.

Aliæ majores, ut Cyprinis,
Luciis, Salmonibus.

Pedes

Pedes Οἱ πόδες, πλεῖστα-
 ναί *Plin.* Jūsse/Piscibus qvibus-
 dam Pedes inesse, præter com-
 munem loqvendi usum, &
 autoritatem *Aristotelis lib. Ani-
 mal, 4. c. 1. & lib. 9. c. 29 30. &
 37.* ipsa inspectio docet: ut Po-
 lypis, Locustis, Astacis, tum
 fluviatilibus tum marinis, Le-
 onibus, Elephantis, Squillis,
 & reliquis crusta inectis, præ-
 ter unum Echinum.

Mollium pedes constant ex
 carne dura & flexibili, suntq;
 glabri & sine Articulis, ut Po-
 lyporum, Sepiarum, Loligi-
 num, qvibus qvafi ab ore pen-
 dent, & habent acetabula.

Crusta inectorum, ad latera
 situm obtinēt foris ossei, intus
 carnosi, articulis aliquot con-
 stantes, asperi, in qvibusdam
 hirsuti.

Pulmonis marini, qvafi ex
 vitrea pituita coagulati.

Octoni polypis.

Deni, Loligini, Sepiæ, Lo-
 custis, Cancris.

Duodeni, Squillæ qvæ
 Mantis dicitur.

Manus Piscibus nullæ
 sunt, neq; perfectæ, nec im-

perfectæ; sed particulæ qvæ
 Manibus respondent.

Ut enim manu cibos appre-
 hendimus; iisdem Corpus ab
 injuriis tuemur, illatas pro-
 pulsamus: sic Cancris, Astaci,
 chelis cibos apprehendant,
 ac ori admovent, iisdem vel
 se defendunt, vel alios impe-
 tunt.

Chelæ, χῆλαι. Forcipati
 pedes. *Gaz.* Flagella, Forci-
 pes denticulati, Brachia *Plin.*
Krâbeschâren.

Harum inferior mobilis, su-
 perior immota, *Qvædam sunt*

Maxima, Elephantis, Astaco,
Parvæ & lata, Urso.

Media, Cancro, Paguro.

Glabra, Cancro.

Hirsuta, Leoni.

Coloris Indici, Elephantis.

Rubri, Leoni.

Fusci, Astacis fluviatilibus.

Extremè nigricantes, Paguro.

Cirri, πλῆκται, ἰσχυρεῖς,
 κέρατα *Aristot.* Cornua *Gaz.*
 sunt contorti crines seu protu-

C c c 2 berantiæ,

berantiæ, à Capite ad modum
Corniculorum prominentes,
quibus Limaces & Cochleæ
iter præterant, veluti in
Squillis, Astacis, Leone.

Barba *Plin.* appendices
sunt carnosæ, maximè circa
os Piscium, ut pisciculi ver-
mesq; alliciantur; in aliis ut
arceantur, quæ in os incidere
possent. Hinc Pisces alii sunt
Barbati γενεα ἰδιόες, ut Barbatu-
li, Mulli.

Imberbes ἀπώγονες non bar-
bati.

Differunt appendices hæ,
numero & situ.

Una, Uranoscopo & Mu-
stela fluviatili, quæ tanquam
escâ allectos pisciculos capit
& devorat.

Bina Ranæ piscatrici, Squa-
tinæ.

Ante os Barbo Gobioni, Stu-
rionibus.

In lateribus sive sine scissuræ
Oris quasi μύσανες, Cyprino.

Sub Mento, Mustela fluvia-
tili, Mullo.

Supra Oculos, Scorpioni, Scor-
pænæ, Lepori vulgò dicto.

E Collo tanquam juba, Hip-
pocampo.

Per totum Corpus sparse or-
namenti gratiâ, Raiis mari-
nis.

Lapides Piscium.

Lapides in Capite gerunt Pi-
scēs magnitudine, forma, na-
tura & usu differentes, ut Lu-
pi, Mugiles, Corvi, Coracini,
Umbræ, Pagri, Auratæ, Spa-
ri, Hepati, omnesq; ferè squa-
mosi: ex planis Solea: ex lu-
bricis Mustela fluviatilis.

Partes Piscium cum aliis communes.

Cutis, Corium, Integu-
mentum. Die Haut / Fisch-
Haut.

Integuntur Pisces vel Co-
rio vel Cortice. 1. Corio sim-
plici non simplici. Simplici

Lævi ut δερματώδεις, Cuti-
culari, μαλακώδεια, μαλά-
κια *Arist.* Mollia glatte Fische
ohne Schuppen / Black Fische /
Ruttel Fische / Molli, lævi &
lubrica foris obteguntur cute,
veluti homines, ut Angvilla,
Polypi, Loligines. Piscium
lævium triplex est differentia
1. eorum qui plani dicuntur,
ut Rhombus, Barbuta, Passer-
um quinque species, Solearum
quatuor. 2. Oblongorum.
ut Muræna, Lampreta, Con-
ger, Mustela. Barbotta, An-
gvilla, Acus, Spondyle, Ser-
pens marinus. 3. Cum lævo-
re mollitiem

re mollitiem habentium, & pro sanguine saniem sive atramentum, ut Sepia, Polypus, Loligo.

Aspero, scabro, noctu splendicante, σελάχη, σελαχῶδης, σελάχια ἀπὸ τοῦ σελας εἶχειν, quod noctu Cutis eorum splendat ut Cartilaginei, Sturio, Torpedo, Pastiriaca.

Non simplici: *Pilis* referto *Vitulus marinus*.

Squamoso, ut λεπίδιωτοι *Squamiei*, *squamosi* Schuppenfische / *Trutta*, *Salmones*, *Afelli*, *Orphus*, *Aurata*, *Dentex*, *Lepas*, *Rubellio*, *Caprisus*, *Novacula*, *Mormyrus*, *Sparus*, *Salpa*, *Scarus*, *Abramis*, *Cantarus*, *Castaneus*, *Cyprinus*, *Coracinus*, *Melanderinus*, *Sargus*, *Melanurus*, *Milvus*, *Hirundo*, *Mullus*, *Phycis*, *Merula*, *Cynædus*, *Hepatus*, *Perca*, *Latus*, *Exocætus*, *Umbra*, *Glauci*, *Eqvisolis*, *Lucius*, *Alaufa* seu *Trissa*, *Turdi*, *Julis*, *Thymalus*, *Channa*, *Tinca*, *Sudis*, *Chromis*, *Luciscus*, *Nasus*, *Gobiones*, *Liparis*, *Myftus*, *Bopigrus*, *Salpa*, *Mæna*, *Smaris*, *Capitones*, *Cythari*, *Lacerti*, *Lupi*, *Scorpius*, *Blennus*, *Halec*, *Chalcis*, *Hæcæula*.

Aculato, aculeis referto, U-

ranoscopus, *Amia*, *Falx*, *Aper*, *Lyra*, *Cucullus*, *Araneus*, *Draco*, *Scomber*, *Seferinus*, *Eperlanus*, *Orchii*, *Aquila*, *Squatin*, *Raia*, *aculeata*, *Rana piscatrix*.

II. Cortice seu putamine

Testaceo, ut ὀστρακόδερμα *Arist.* ὀστρεὰ *Gal.* λυδοόστρεα *Hart.* schalige Fische / Schatfische / die sich in Harten oder steinsten schalen halten. *Testa dura & silicea conclusa* muniuntur, hoc est quibus pars carnea intus, solida foris, fragilis atq; ruptilis, non collifilis. *Horum Quidam* altera parte testam, altera testæ loco scopulo adhærent, ut *Lepades*.

Quidam intra testam conditam latent, solo capite exerto, aut extremis utrinq; sunt vel.

Ostrea. μονόδυνα, quæ univalves habent testas.

διδυνα, quæ bivalves, ut *Tellinæ*, *Chamæ*.

Conchæ, propriè dictæ, *Cochleæ*, *Testudines*.

Turbinata, τρομοῦδης, ut *Purpuræ*, *Turbines*, *Buccina*.

Crustaceo, μαλακόδερμα *Arist.* ὀστρακομάλακα, μαλακόδερμα, *Pisces crustacei*, Linde oder

C c c 3

Weich-

weichgeschalete Fische. Ope-
riuntur crustis tenuibus, non
æqvè duris ac densis, ut Te-
stacea, veluti Cancrī, Carabi,
Astaci, Locustæ, Squillæ.
Hoc genus latissimè patet :
estq; varium admodum &
multiplex.

Caput, κεφαλή, Der
Kopff / Pesci pro portione
Corporis maximum.

Magnum, Ranæ piscatrici,
Uranoscopo, Cephalo, Labe-
oni, Lupo, Myxo.

Parvum Cestreo, Oxyryn-
cho, Angvillis.

Longum, Myxo, Lupo.

Rotundum, Auratæ.

Quadratum Mulloni imber-
bi, Cuculo, Lucernæ, Coraci.

Depressum Mugili barbato.

Exertum, Squamosis, Asta-
cis, Locustis.

Mitinné, Cancrorum generi.

Inter pedes & alvum, Sepiæ,
Polypo, Loligini.

Inliferetum, omni Ostreo-
rum generi. Item Urticæ,
Echini, Stellæ.

Capitis substantia seu te-
gumentum, vel est

Cartilagineum, ut Cartilagi-
neorum generi.

Osseum, Delphinis, Balænis,
Orcis, Physteri, Vitulo ma-
rino. Quod munitur

Cute, adipe, pilis, Vitulo
marino.

Cute glabra & adipe mul-
to, Delphino, Balænæ, Pistri.

Pelle tenui, Murænis, An-
gvillis.

Testa dura, ut Hirundini,
Testudini.

Caro durior, Sepiis, Loligini-
bus, Leporibus marinis.

Cutis & Cerebro & toti
Corpori communis, Ostreis.

Collum, Τράχηλον, Pi-
scibus deesse Aristoteles affir-
mat : sed reverá habent Vi-
tilus marinus, Balænæ, Del-
phini, Testudines marinæ.

Oculi, á terrestrium A-
nimalium oculis, supercilio-
rum defectu differunt, ut
commodè nictare possint in
aqua, duriores facti, ne faci-
lé ab aquæ falsedine, quæ
arrodit

arrodit, laderentur. Palpebrarumq; defectum Corneæ duritie pensavit natura, quæ undiq; Oculum ambit, non ex adverso pupillæ tantum, ut in Hominibus.

Primi fiunt, primi q; pereunt.

Oculos Pisces habent alii

Magnos, Boops, Melanurus, Oculata, Hepatus,

Parvos Torpedo.

Supra Caput; rectâ sursum, Uranoscopus: magis è lateribus, Plani, ut Rana piscatrix, Raja, Buglossus, Passer, Rhombus; exceptis paucis, qui oculum utrinq; habent, Faber, Tænia longa.

Magis in lateribus: superiore supra os, ut Araneus, Thunnus: inferiore ad oris scissuram, Delphinus, Phocæna: medio inter hæc loco, Scarus, Lupus, Aurata, Mugil, Mullus, Lacertus aliq; permulti.

In Capite prominentes: semper, Locustæ, Astaci, Cancelli: cum volunt, Crusta intacti, Cancræ.

Cassios,

Nigros,

Rufos,

Aureos,

Virides,

Cæruleos.

Multiplices, Vitulus marinus.

Color in suo tamen genere cuiq; similis.

Aures Piscium Nonnulli obtinent quidem, at imperfectas sine auriculis. Cum enim minus audiant, neq; iis perfectiore auditione opus, meatus saltem angustos & exiguos tribuit Natura, ne si apertas & patentes habuissent, aqua subinde repleretur, & Auricularum amplitudo natationi esset incommoda.

Aliis Aures defunt, quibus non sunt Oculi, ut Mytulis, Ostreis, omnibus dura testa intactis, Spongiis.

Os omnes Pisces obtinent, loco, structura, figura, magnitudine distinctum, *Das Maul*.

Situm: in promtu parteq; primum obvia, Mullis, Mugilibus, Lupis, Sparis, Rubellionibus, Delphinis, aliisq; innumeris.

C c c ;

in parte

In parte omnino supina,
Galeis omnibus, Raiis, Pasti-
naxis, Torpedini, Sturioni.

Alii *Απαρτογός*, apertum,
hians, rescissum *Γάζα*, quod
iis Oris scissura ventrem ver-
sus protendatur, Sarcophagis
& quibus dentes serrati.

Μύζον, μείονζον, compres-
sum, contractum, coarctatum,
iis, qui carne non vescuntur,
ut Acui, Sphyræ, Muræ, Delphino.

Alii. Rotundum, Sturioni,
Lampretæ.

Ovatum, Hippocampo, Sa-
gittario, Acui non dentatæ.

Fissum secundum Corporis
longitudinem, vel per trans-
versum, secundum latitudi-
nem, secundum crassitudi-
nem, altitudinem, Uranosco-
po, Hippocampo, Acui 2. A-
phyis, Atherinis quibusdam.

Os protrahunt, retrahunt:
brevius minus Saxatiles: lon-
gius, Faber, Lupi, Mulli.

Non item, Sturiones, Phy-
rænæ Acus, Xiphia.

Rostrum aliis porrectum;
acutum unde *ῥέγυχοι* dicun-
tur, Sturioni, Xiphia. Et vel
bifidum, ut Lyræ, Holostio:
non divisum, ex utraque Ma-
xilla componitur, Acui, Sphy-
rænæ, superiore tantum, Xi-

phia, Sturioni, Attilo.

Oblongum quidem, sed
obtusum, ut Acui 2. Hippo-
campo, Sagittario.

Breve, Mugili, Turdo, Cy-
nædo.

Nullum, Phocænæ, Squa-
tinæ, Ranæ piscatrici, Vitulo
marino.

Maxillæ Piscibus datæ
sunt, non ut mandant, sed ut
apprehendant, seseque tuean-
tur, exceptis paucis.

Maxillas habent Pisces,
quibus os scissum est, quales
sunt squamosi omnes, quique
rostro sunt oblongo.

Maximas Balænæ.

Minores Reliqui.

Æquales.

Inæquales: inferiorem su-
periore maiorem, Sphyrænæ,
Delphini, Channæ: superio-
rem inferiore maiorem, Xi-
phia. Cute carneque muni-
untur, in Galeis & squamosis.

Nuda pelle integuntur, &
ossæ totæ sunt, pyxidisque; mo-
do altera in alterâ inferitur,
usque adeo duræ acutæque, ut
vice Dentium ad dividendos
cibos utantur, veluti Sepiæ,
Polypi, Loliginis, Testudi-
nis.

Figura varia. Superior ab in-
feriore differt, ut Squatinæ
inferior

inferior in angulum definit :
superior verò in arcum infle-
ctitur, quæ in Salmone utroq;
in acutum definit, sursumq;
recurvatur.

Maxillæ intus latiores
sqvamosis nonnullis.

Ossea tubercula, ut Stellæ.

Quædam: dentibus muniun-
tur, Lucii. Sine dentibus sunt,
& harum aliæ leves, aliæ aspe-
ræ, ut Mustela fluviatilis.

Maxillis carent, qui fistu-
las pro ore habent: Ostraco-
derma: Holoturia; Vermes,
Hirudines marinæ, Crusta-
cea, Stella.

Dentes, ad captandos &
retinendos Cibus potius, quæ
ad incidendum, Natura Pesci-
bas quibusdam tribuit; quæ-
vis haud negandum, quosdam
iis ad morsum abuti.

Julides enim venenato
morsu exanimare creduntur.

Καρχαράδοντες, ferrati ma-
gna ex parte, pectinis in mo-
dum coeuntes.

πλατυδόντες, Lati, plani,
Phycophagis.

Καυλίσδοντες, exerti.

Recurvi.

Recti, Delphino.

Ad latera spectant, Galeo

glauco.

In Maxillis tantum, ut qui
latos habent.

In Maxillis & Lingva, A-
selli.

Maxillis, Lingvæ, Palato
& Gulæ, Ranæ piscatricis.

Ordo, simplex, Auratæ.

Duplex, Galeorum non-
nullis.

Triplex Malthæ.

Quadruplex, Squatinæ.

Quintuplex, interdum

Sextuplex, Lamia.

Sine ordine huc illuc sparsi,
ut Coracino.

Multi,

Innumeri,

Quinque, Echinis, Stellæ,
Soli, Arbori.

Bini aliis, in utraq; tantum
Maxilla, sed magni, ut Orchi
& Lima.

Carent dentibus, Balænæ,
Sturiones, Artilus, crusta in-
tecti, Echinorum unum ge-
nus, Ostracoderma, Malaco-
straca, Testudines, polypi, Cy-
prini, Sepiæ, Loligines, & re-
liqvorum qui pamphagi di-
cuntur.

Anterioribus, Cyprini: Mo-
laribus tamen planis utuntur.

Nares Pisces non ha-
bent, nec ullum manifestum

D d d

Olfactus

Olfactus organum: sed in quibusdam ut squamosis foramina ante Oculos apparent, Odorandi tamen sensu præditi sunt.

Labra carnosæ vera, perfecta & mobilia habent Nonnulli, ut saxatiles, qui musco pascuntur, Labrisq; tanquam manibus cibos apprehendunt.

Lingva quibusdam omnino deest.

Hic ejus vice palatum obtinent carnosum, qui aqua lutoq; vescuntur, ut Cyprini, Bramæ, Tineæ: vel aliud quid Lingvæ proportionem respondens, ut Locustæ, Cancræ, Astaci, Sepiæ, Polypi, Loligines, Echini.

Lingva carent Crocodyli, Cyprini, qui sola aqua vivunt, ut testa simplici & turbinata omnes & duplici operiti, quidam toti membranosi.

Lingvam quæ habent, Alii

Exertam & liberam, ut Delphini.

Herentem, planè immobilem ac imperfectam, Squamosi.

Carnosam, spissam, Balænæ,

Delphini, quibus lingua similis.

Osseam vel cartilagineam tunicam tantum carnosam obductam, qui dentes in lingua habent.

duram & spineam, Truttæ.

Palatum Piscibus omnibus, sed aliis Carnosum & molle, ut Cyprino.

Durum, Cartilagineum, osseum, tenuiq; membrana oblitum.

Fistula *Αὐλὴ, Ora Plin.* Est meatus seu ductus Piscibus quibusdam per Pulmones spirantibus, quo spiritum hauriunt, & aquam in ore collectam rejiciunt, ab intima palati parte ad extimam perforato, duplex, septoq; distinctus, Nariumq; nostrarum foraminibus, ad palatum ductis quodammodo proportionem respondens. In extrema parte unicum foramen apparet figura C. literæ, in quo operculum est ex carne pingvi fistulis impositum, quod eas aperit & operit.

Fistulæ sunt Balænis, à fronte: & Delphinis à Dorso.

Fistula

Fistula carent Vitulus marinus, cujus vice Narium rimas habet:

Testudo, quæ foramina obtinet pro naribus, quibus aquam rejicit.

Plani & Cartilaginei bina foramina ad os deducta, ejusdem utilitatis gratia comparata.

Arteria aspera est veluti ductus & via quædam Pulmonibus præfixa, in iis Piscibus qui spirant Pulmonibus, ducendi spiritus & respirandi gratia constructa, ejusque aliquando retinendi cohibendique, ut sursum facilius ferantur. Aër enim retentus velut suspendit, in aqua demergique prohibet.

Constructio ab arteria terrestrium Animalium minimè discrepat. Nam iisdem partibus eademque planè structura constat, ut & Pulmones.

Pulmones Pisces non habent, præter Balænas, Delphinos, & vitulum marinum: sed earum, quas Bran-

chias vocamus constructio, ipsis vice Pulmonis est. Cum enim crebris ac tenuibus foraminibus sint Branchiæ hæ interceptæ, aëri quidem ac vaporis perviis, subtilioribus tamen quam pro mole aquæ, hanc quidem foras propellant, illa autem promptè intromittunt.

Diaphragma, Septum, *διάφραγμα*, præcipuum Respirationis instrumentum, omnes Pisces ferè habent.

1. Nostro simile ac æquè perfectum ad respirationem, excrementorum expulsionem, & vociferationem à natura obtinent, qui Pulmonibus spirant, ut Balæna, Orca, Physter, Vitulus marinus, Testudo, Delphinus, Phocæna.

2. Imperfectum, non musculum sed membranam obtinuerunt, Squamosi & Galei, ut quibus minore opus fuerit respiratione.

Cor Eorum Piscium qui Pulmonibus respirant, à terrestrium Animantium Cordè ferè non differt.

D d d 2

Aures

Aures enim habet utrinq;, similiter sinus duos & arterias φλεβώδεις, & venas ἀρτηρώδεις: Pericardio quoq; involvitur, nutritur á vena é parte inferiore ipsum cingente ac coronante. Situm est pauló inferiús.

Squamosorum veró qui per branchias respirant, Cor propius Os locatum est, & mucro ejus non ad Pectus spectat, sed ad Caput, & os respicit contrá quám in aliis Animalibus. Tribus constat partibus.

1. Infima sangvineá, sanguini coagulaio similis est & substantiæ Hepatis crassitudine: in hanc vená ab hepate ascendens inseritur, dextro Cordis ventriculo reliquorum Animalium respondens.

2. Media, colore est Carnis, solidiore duriorq; substantia, habetq; in medio sinum, quo venam ab infima parte excipit, sinistri sinus reliquorum Animalium vicem gerens.

3. Suprema, huic connectitur membranosa, alba, dura, quæ verrucæ non absimilis, intrinsecus parvulis fibris veluti lineis distincta: inde meatus prodit tendens ad medium

in quo branchiæ omnes inter se copulantur.

Peritonæum περιτοναϊον simplex est membrana, omnes sub Diaphragmate sita viscera contegens ac involvens; quæ facillè in coctis præsertim ab aliis partibus seceratur.

Album est plurimis: Asello, Mugili, Auratæ, Salpæ nigro colore perfunditur.

Gula Οισόφαγος, σόμαχος ductus seu via, quæ cibus ab ore in ventriculum tanquam in cellam penuariam demittitur.

Ingressum Cibi pisces omnes, qui in perfectis Animalibus numerantur, habent: Gulam nō omnes; verum ii maximè, qui pulmonib; spirant, ut Delphini, Vitulus marinus, Balæna, Orca, Testudo omnis. Illi ventriculum Ori continentem habent; hi, Pulmonum causâ satis procul distinctum, & multo inferiorem.

Pulmonibus carentes Pisces multi gulam habent: Qui oblongo & tenui sunt Corpore, ut Congri, Serpentes, Accus, Angvillæ, Sphyræ, Lucii: item Mollia longam & angustam:

angustam : Crusta intesti,
Aftaci, Caneri, qvod præter
autoritatem Aristotelis & υ-
τοψ/α manifestum est.

Gula omnibus rugosa in
longitudine & latitudine :
brevior in Aftacis,

longior, in Echinis, Ser-
pentibus marinis, Muræna,
Lampetra & longis omnibus.

latior, in Lamia seu Lamy-
ro, á gula lata nomen adepto.

Ventriculus gulam se-
qvitur, qvi cibos retinet &
concoqvitur, totius Corporis
nutriendi causa unus & sim-
plex est, magnitudine, figura,
situ varius.

Magnis magnus, parvis
parvus.

Rotundis brevis, latus, ro-
tundus.

Amplius & membranofus
gulosus & fargophagis, Lupo,
Lucio.

Exiguus & carnosus Avi-
um modo, mucro viventibus,
Sturioni, Mugili.

Oblongus Intestino simi-
lis, ut Scaro, qvi & solus pi-
scium ruminare creditur.

Ori statim seqvitur iis qvi
gula carent, Lamia, Canicu-
læ, Glaucos.

In medio feré cavo Corpo-
ris situs æqualibus feré spaci-
ciis distans á podice & ore, iis
qvibus Pulmones sunt & gu-
la.

Appendiculæ, Appen-
dices ἀποφύαδες ἢ ἐκφύαδες,
magna ex parte superné circa
Ventriculum exeunt, ut in iis
qvafi lacunis cibum condi-
tum macerent atq; conco-
qvant,

Complures in utraq; parte
habent, Gobius, Mullus, Ga-
leus, Scarus, Perca, Scorpio.

altera parte plures Mugil.
una tantúm inferiore, Mu-
stela fluviatilis, Thymalus,
Truta.

Paucas, Hepatus, Glaucus,
Aurata, Asinus.

Qvi pulmonibus spirant,
his carent, qvoniā plus ha-
bent Calidi innati, ideoq; me-
liús concoqvunt.

Intestina Piscibus varia
sunt.

Densa & lata, Cartilagi-
neis.

Densa & angusta, Sturio-
nibus, & iis qvi per Pulmones
spirant.

Recta ad Podicem descen-
dunt, Galeis & Longis aliis.

Replicantur, sursum recur-
runt,

D d d 3

runt Lucio, Cyprino, Brama.

Pingvia & esui apta, Mugilibus, Sturionibus, Balænis, Delphino, Scaro, Cyprino, quæ vulgò vocantur, das Gesbündel / ac si diceres fasciculum.

Podex ποντοδ, meatus seu ductus, per quem superfluitates alienæ à nutrimento expelluntur, Magnitudine & situ distinguitur.

Magnus patens Turdis, Merulis, Cynædis.

Parvus.

Situs: in extrema Cauda, Locustis, Sepiis, Astacis, Squillis, omnibus crusta intectis.

paulò superiore loco, Longis tenuibus, Angvillæ, Murænæ, Serpentibus, Acui, Congro, Sphyrænæ.

magis à Cauda distans, Auratæ, Lupo, Mugili, Sauro, Turdo, Percæ, Merulæ.

medio ferè Corpore, Buglossis.

Ori propior quàm Caudæ, Rotundis, & qui rhomboide figura sunt.

In ore, Holoturiis, Purpu-

ris, Cochleis, & omnibus ferè rotundis, demtis Echinis, in quibus in parte Ori adversa situs est.

Hepar Venarum origo & sangvinis fons.

Unicum, simplex, Lucio, Lupo, Afello, Auratæ, Mullo, Percæ.

Geminum in duos longissimos lobos divisum, Galeis, Acanthiæ, Caniculæ.

Pingve, adiposum, ut liquefieri possit & in oleum resolvi, Cartilagineis.

Sangvineum.

Rubrum Respirantibus, Delphino, Balænæ, Phocæ.

Pallidiusculum, ex rubro albidum, Mustelæ, Lucio.

Cinereum Galeis, Raiis.

Croceum, Pastinacæ.

Cœruleum Lampetræ.

Saporis grati & delicati, Mulli, Mustelæ fluviat. Lucii.

ferini, ingrati, Galei, Sturionis, Cetaceorum.

Lien in Nonnullis magnus est & longus, in Cetaceis maximus: in quibusdam exiguus

exiguus & niger, ut in Scaro.
In aliis sanguinis colore est
ut quibus Hepar albet, iis
Splen rubet. In quibusdam
triqvetra figuræ, ut in Muste-
la fluviatili.

Positus est in Mullis juxta
Hepar, in aliquibus sub ven-
triculo, in Lucio in fundo
ventriculi.

Fel omnibus inest, (exce-
pto Vitulo marino, Delphi-
no) minus acre quàm Vola-
tilium aut Qvadrupedum.

Hepati adhæret: in ipfius
summa parte per venulas bi-
lêm trahens, Mustelæ, Siluro,
Sqvatinæ, Thunno, Pilamy-
dis, Glauco, in ipsa Hepatis
substantia sic immersum qua-
si, ut vix appareat, nisi inqu-
ras studiosius, ut Aphyis ἐγ-
κασσιχέλοις, & Galeis.

Intestino annectitur: aut
toti, ut in Amia: aut Jecori
simul semotius, propinquius,
Ranæ, Acipenseris, Dentici,
Murænæ.

Magnum Uranoscopio.

Minus aliis.

Viride, Galeis & aliis plu-
ribus.

Nigrum Scaro.

Croceum Pastinacæ & a-

liis permultis.

Renibus & Vesica
carent squamosi, læves, Car-
tilaginei: at habent omnes
qui pulmonibus spirant ut
Balænæ, Physter, Orca, Vi-
tulus marinus, Delphinus,
Testudo. In fluviatilibus re-
peritur Vesica alia aëre plena,
& in quibusdam ut Cyprino
gemina, ad faciliorem navi-
gationem propter aquarum
dulcium tenuitatem, ne vel
submergerentur, vel potius
ut in aqua suspensi facilius
narent. Marinis non item
propter densiorem & natatui
magis idoneam Maris natu-
ram.

Vulva omnibus respiran-
tibus bifida est, infra tenuis,
membrana constans & longa.
Cartilagineis utrumq; fitum
obtinet. Oviparis humeris
adhæret.

Sunt quibus vulva duos fi-
nus habet, perinde ac si duæ
essent, ut in Piscibus Ova pa-
rientibus, quales sunt Lupus,
Mugil. Iis, qui ova quidem
conciunt, sed intra se ex his
fœtus suos excludunt, dein-
de vivos pariunt, qualis est
Galeus.

Galeus, Acanthias & alii, iis vulva prope septum transversum sita est, cui adjacent Corpora duo rotunda, vitellis Ovorum gallinæ similia, quæ videntur veluti seminis cellula, quod in Vulvæ capacitatem inde derivatur.

Utero feminæ, & meatibus spermaticis Mares carent Pisces, qui sine Maris & feminæ coitunaſcuntur.

Mammas habent Balæna, Delphini, Vituli marini, Phocanæ, ac omnes qui ex semine sine Ovo pariunt, non in superiore parte, sed prope genitale sine papillis, ne nationis impulsus & motum impedirent.

Cauda non omnibus similis, longa, brevis, gracilis, spinosa, carnosæ.

Sanguine nutriuntur Aquatilia omnia, vel humore seu ichore sanguini correspondente. Hinc Aquatilia alia *Εναιμα* id est sanguinea dicuntur, ut pisces perfecti. *Αναίμα*, Exanguia sunt.

1. Μαλάκια ἢ μαλακόδεσμα id est Mollia,

2. Μαλακόσρακα ἢ σκληρό-

δεσμα, Crustata, Crustis intacta.

3. Οσσεόδεσμα ἢ ὀσσεα, id est dura & silicea testa intacta.

4. Εντεμα Insecta palustria, Scolopendra marina, Hippocampus, Hirudines.

5. Ζωόφυτα plantis & animalibus cognatam habentia naturam, ut Echini marini, Holoturia, Vertibula, Vrticæ, Stellæ, Spongiæ.

Lactes *Πλιν. γαλακτίδες, ἔγκυατα*, Lac vulgò, quod Lactis instar candidum. *Die Milch* Marium semen candidum sed crassum compactumque.

Ova ὡς ἰχθύων *Roogen* *Fisch* *Roogen* semen feminæ, quod

album squamosis ferè omnibus.

Coralli colore, Hirundinis, Cancrorum aliorumque crusta intactorum.

Bicolor Testudinis.

Genituræ loco Pisces *ῥόγον* habent, id est genitale, quoddam virus sui generis, quod *ποροίς* seu meatibus quibusdam continetur, qui a septo venaque majori exorti bifurces utrumque spinæ latus perreptant.

reptant, coeuntq; superné in unum Caput, atq; ita ad ostium excrementi finiunt. Hoc ergó inferitur, atq; in locis tenditur feminarum. Tempore coitus pleni redduntur humoris fœtifici, latissimeq; patent: eo tempore, etiam imperitis æqvé in Maribus atq; illi qui in feminis in Matricem feruntur, attrituq; Piscium mutuo, atq; adeó etiam si confricéris, facile ipsum effluit semen genitale candidum: ubi veró tempus id præterit, incerti vel meatus ipsi interdum redduntur.

Generatio Piscium.

Pisces generant, vel non generant, sed nascuntur vel sponté, velex sobole.

Pariunt, vel generant: Vivum Animal ζωόντα: & vel statim á semine Quadrupedum Animalium modo concipiunt perfectúq; edunt, ut Vituli marini, Phocææ, Delphini, Balææ, Orcæ, Phyceteres, Homines marini, & monstra marina omnia, quæ & lacte fœtus suos nutriunt.

Vivum quidem pariunt a-

nimal, sed prius ova prope Septum transversum in utero concipiunt, quod ibidem excludút, unde vivus fœtus prodit, ut in terrestribus Vipera, In piscibus Squatina, Acanthias, Galeus lævis, Centrina, Lamia, Vulpecula, aliq; per multi Cartilaginei.

Ova pariunt ζωόντα ut Squamosi, λεπιδωτά Crusta intercepti, Squillæ, Cancræ, Astaci, Testudines, Molles.

Cartilaginei, Sturiones, Lampetræ, Rajæ, Galeus.

Quorum Nonnulli perfecta, alii imperfecta edunt.

Perfecta Ova sunt, quorum testæ, postquam conformata sunt, rumpuntur, unde perfectus prodit Piscis, qualia sunt Ova Rajarum, Ranarum, Canicularum, quæ τέλειοι dicuntur.

Imperfecta infinitorum sunt Piscium, parva scilicet & mollia, tum quia uterus angustior est, quam ut tantam Ovorum, si majora essent, copiam capere posset: tum quia frigidiore & humidiores sint, quam ut tot Ovorum partem extimam & ambientem, duriorém solidiorémq; possint reddere.

E e e

Hæc

Hæc foris tempore auge-
scunt perficiunturque (instar
fermenti, quod ex parvo
magnum fit, solidiore parte
humefcente, humida spiritu
distenta) insita fecunditate.
Quare mas in hoc Piscium
genere Ovis vitale virus,
quod aspergit, ὄσος in
Piscibus, Arist. in aliis Ani-
mantibus γόνι seu γόνος, dici-
tur. Mas enim plus feminis
habet, quam ad coitum satis
sit, mavultque id Natura in
Ovorum jam repositorum
incrementum absumere, quam
in primam ipsorum constitu-
tionem. Confert etiam ad
incrementum marini humo-
ris divina vis, & fecunditas
ex spiritu & animali calore.

Ovis enim suis non incu-
bant Pisces, nec laborioso
fœtus suus alunt, nec nidifi-
cant, sed Ovum ab iis accepta
Aqua, tanquam matricula
fingit in Piscem & alit.

Ova alia generant femi-
næ, sine ullo cum Mare con-
gressu, ut Erythrini, Chan-
næ, & quoddam Passerum,
genus.

Spontè nascuntur

Αυτομάτως, Sponte nata,
qui marini humoris vi, sine
semine, sine Mare & femina
procreantur, ut Ostracoder-
ma, λιμνόςτρεα, Urticæ, Pin-
næ, Ungves, Lepades, Pecti-
nes, & omnia quæ sedibus
hærent Purpuræ & c.

Ex spuma Mari superflui-
tante post multos imbres,
Aphros seu ἀφρίτις.

Putredine & limo, Purpu-
ræ, Buccina, & Ostracoder-
ma.

Cæno, Ostrea, Limnœstrea.

Ligno putrescente, Aves
Anatibus similes.

In arenosis locis, Conchæ,
Chamæ, Ungves, Pectines.

In petrarum cavernulis,
Holoturia, Balani.

Per summa adhærent, Le-
pades, Neritæ.

Ex sobole proveniunt,
seu ex Adgerminatione, ut
ita loquar, Mytuli, Purpuræ
& Buccina, quæque favos con-
ficere creduntur eodem mo-
do. Hæc enim μυδικήσας,

Javaginem

Javaginem, *Gaz.* salivarium humorem seu lentorem, *Plin.* ceu favum Apum, veluti à feminis natura, (semen verò eorum nullum esse existimandum est) mutuo attritu salivant: ex cujus ichore seu tenuiore parte in terram effusa, fiunt Murices & Purpuræ, non aliter quàm effuso in terram fungorum decocto, fungi permulti brevi enascuntur. Cum enim hæc omnia sponte fieri contingat, rationi consentaneum est, cum origo aliqua præcesserit, multo plura formari.

Coitus.

Coëundi ratio in Piscibus varia, nobis est obscura & incomperta. Congressuri enim latebras quærent, & recessus suos petunt cæterorum Animalium ritu, vel etiam in profundum Maris, quamvis partem incolant, se recipiunt, & tanta celeritate rem peragunt, ut visum fallant, & complures Piscatores lateat. Nemo enim eorum aliquid tale cognitionis gratia observat: veruntamen Coitus Eorum aliquando visus est.

Modus.

Coëunt autem vel:

Attritu superiarum partium omnes, præter planos Cartilagineos. Sese applicantes, & supinis partibus supervenientes feminarum pronis, Plani & quibus cauda est, ut Rana piscatrix, Pastinaca.

Mutuo partium supinarum complexu, Pisces longi, ut Anguillæ, Serpentes, Congri, Muræna.

Aversi, Canum terrestrium modo coherant, femina scilicet Marem dorso admittente, ut Cartilaginea nonnulla, Testudines marinæ, palustres.

Aversi Quadrupedum retró mingentium, ut Leonum, Leporum.

Lyncum ritu, veluti Vituli marini, Malacostraca, Locustæ, Astaci, Gammari, Squillæ, Cancrorum genera. Fit autem is Coitus, femina Caudam protrudente, Mare semen superponente.

E e e 2

Mutuo

Mutuo Brachiorum complexu & Ore Ori fistulâ composito, non ore. Cûm enim fistula pariunt, eadem ut coeant necesse est; Molles, ut Polypi, Sepiæ, Loligines.

Tempus.

Ut varia Piscibus Veneris explendæ ratio : ita variis temporibus & concipiunt & pariunt, vulgò *Streichen*.

Quovis tempore, omni Anni parte, Murænæ, Sepiæ, Cyprini, Vitulus marinus.

Vere plurimi, Molles, Solitiorum genus.

*Æstat, Pelagici magna ex parte, Molles, Anthiæ, Auratæ, Lupi, Mormyrus, & omnes qui *Σεμάδες* vocantur.*

Circa solstitium Delphini, Thynnides.

Autumno Squatinæ, Trutæ.

*Hyeme Mugil qui *Χελών*, Mustela fluviatilis.*

Numerus.

*Semel tantum in anno ii maximæ, qui *Χυτοί* & *Χύδης* id est, fusanei, ex argumento, quia fusim retibus capiuntur, dicuntur: item Thynnus, Pelamys.*

Sexies Cyprini, qui in vivariis nostris Vere potissimum

perficitur.

Ter Mullus, Mustela fluviatilis observatione nostrorum Piscatorum.

Quæ, Saxatiles ferè omnes, Lupus, Trichias, Squatina, Scarus.

Locus.

Loca in quibus pariunt Pisces eligunt diversa, tum propter pascua Naturæ suæ convenientia: tum propter teporem partui fœtuumq; educationi magis accommodatum. *Alii*

Totum Mare peragrant, ut in Ponto pariunt, ut Thynni, Scombri, Pelamydes.

Littora quærun, ex Galeis multi, Atherinas, Corvus.

Stagna Marina subeunt, Mugiles, Lupi, Auratæ, Passeres, Buglossi.

Flumina, & magnorum fluviorum ostia, Mugiles, Auratæ, Lupi.

In saxis pariunt & vivunt semper, ut verè Saxatiles, Cynadi, Turdi, Merulæ.

Ep φύκας in Alga, Phyci, Gobii, Hippocampi.

in limo, Mullus.

juxta terram, Ranæ.

Interra juxta aquas, Testudo, Vitulus marinus.

In stagnis fluviorum & arundinetis

rundinetis lacuum, phoxini,
Percæ.

Copia.

Pisces, quorum imperfe-
cta sunt Ova, innumerabilia
ferè & parva edunt: quippe
cùm magna eorum pars pere-
at, genus hoc piscium valde
fecundum est, natura inte-
ritum Ovorum copia com-
pensante.

Pauciores fetus concipi-
unt, qui ex Ovo vivum pari-
unt. Etenim cùm ex Ovis sa-
tis magnis concipiantur, fieri
non potest, ut uterus multo-
rum & magnorum Ovorum
sit capax.

His pauciores edunt, qui
Quadrupedum ritu è semine
statim concipiunt, sæpius uni-
cum, ad summum geminos
edunt, ut Balæna, Vituli, Del-
phini.

Motus Piscium.

Pisces vel:

Natant solùm.

I. *Pinnis præditi*, Squamofi
omnes, Galei & Plani, quo-
rum alii latitudine sua tan-
tùm natant, ut Rajæ, Pasti-
nacæ: alii latitudine & pin-
nis, quæ in quibusdam ad
branchias, in ventre & in cau-

da fixæ sunt, ut in passeribus,
Buglossis, Rhombis, Rana,
piscatrice: in nonnullis in
cauda tantùm, in quibus vel
Cauda in pinnam desinit, ut
in Torpedine, Squatina: vel
super caudam pinnam erecta
est, ut in Raiis & Pastinaca.

2. *Longi*, vario Corporis fle-
xu, & qui pinnas habent, ut
Anguillæ. Congri, Serpentes,
Ophidion Plin. & qui iis ca-
rent, ut Murænæ, Lampretæ.
Qui longi & rigidi sunt, pin-
nis natant, ut Acus genera,
Sphyræna, Glanus.

3. *Belue marine,*

4. *Ex Mollibus* Sepia.

5. *Ex crusta intectis*, Squillæ,
Astaci, Locustæ, Cancri, Mææ,
& imbric.

Gradiuntur tantùm, Cancri
omnes, quibus Crura brevia
sunt, non natant autem, tum
quia Caudam Corpori appli-
catam & appressam extende-
re nequeunt, tum quia pinnis
carent,

Natant & gradiuntur, Vitu-
lus marinus, Cordylus, Cro-
codylus, Testudo marina &
lutaria, Scolopendra minor.

Natant & volant, Hirundi-
nes, Milvi, Mugilis species
quatuor pinnis, Loligo quasi
voligo.

E e e 3

Natant

Natant & se trahunt Polypi. Hærendo se trahunt Hirudines marinæ & palustres ore & cauda.

Moventur : tardissimè, Beluæ marinæ, ob Carnis & adipis copiam. Celerrimè, Delphinus, Thunnus. Velociùs feruntur, inter squamosos Mugil : item qui ὀξύγυγες sunt, ac pinnas habent neq; parvas neq; longas admodum, quicq; gracili sunt Corpore.

Tardiùs, qui magno sunt Capite, ut Rana piscatrix, Uranoscopus, Orchis : Plani & qui pedibus natant, ut Polypi, Sepiæ : Crusta intesti; Cauda & Pedibus natantes.

Respiratio.

Pisces respirant in aqua omnes in suo genere, pro caloris ventilandi & spirituum reficiendorum magnitudine vel exiguitate. Quidam Pulmonem habentes, Aerem unâ cum aqua hauriunt, eandem fistulâ rejiciunt, ut Balæna, Delphini, Physeteres.

Alii Pulmonibus spirant sine fistulâ, ut Testudines.

Nonnulli, quibus branchiæ

vel apertæ vel opertæ sunt, aërem attrahunt, & aquam simul haustam emittunt, ut Molles, Sepiæ, Crusta intesti, Ostrea,

Vox.

Vocis expertis sunt, sed sonos quosdam stridoresq; movent, ut Lyra, Chromis. His enim grunnitus quasi emittitur quidam.

Chalcis stridet,
Cuculus obstrepit.

Somnus.

Quiescunt & dormiunt non aut potius quàm interdiu : & magna ex parte vel ad arenam vel ad lapidem aliquem procumbentes quiescunt, imò gurgitibus, vel sub saxo aut limo abdit, ut reficiant vires. *Plin. hist. nat. lib. 9. cap. 7.*

Sanitas.

Piscium genus maxima ex parte annis pluviis benè vivit : ita enim non modò plus Cibi nanciscitur : verù etiam omnino pluvio humore juvatur.

Ægritudo.

Ægritudo.

Morbus pestilens nullus incidere Piscibus universis videtur, q̄ualis plerūq; Homi-
nibus & Quadrupedibus. Æ-
grotare tamen & ipsi putan-
tur, & nonnulli Morbi inci-
dunt proprii.

Figura.

Figura Piscibus varia. Alii
sunt

Longi,

Lati,

Plani,

Compressi.

Lyriformes à Lyræ specie.

Serpentini à Corporis spe-
cie, q̄vòd serpentibus sint si-
miles.

Lacertis similes.

Orbiculati, q̄vi in orbem
& rotundam figuram circum-
acti sunt.

Magnitudo.

Piscium quidam vastam Cor-
poris molem obtinent, &
ὕπεροιοι dicuntur, ut Ceti,
Balænæ, Alii parvi sunt & mi-
nuti λεπτόιοι Pisciculi, ut
Apuæ, Bdellæ, Nonnulli μέσοι
sunt, mediæ inter utrosque
magnitudinis, ut Cyprini, Bar-
bi &c.

Color Piscium.

Animadvertendum est,
cūm dicimus Piscem hunc ni-
grum esse, illum rubrum, ali-
um flavum, deniq; q̄vovis
alio Colore depictum, id ac-
cipiendum est non de toto
Corpore, sed de ejus majore
parte: Vix enim invenias ex
infinita Piscium turba unum
aliquem, q̄vi unius omnino
sit coloris, sed eorum q̄vi mi-
nús varii sunt, maximè illu-
stris in eo color prædicatur.

Pisces alii sunt

Albi Esperlanus, Capella-
rius, Aphya alba, Atherina,
λευκίσκος à candore carnis.

Flavi Aureolus, χρυσόφρυς,
Cynædus.

Virides, Gobionum & Tur-
dorum aliqui.

Ex viridi cœrulei Turdi ali-
viridi nigri. Squi.

Glauci, Glaucus.

Ex cœruleo virides, Lacerti
minores.

Purpurei violacei, Turdi
nonn. Anthias Oppian.

Rubr

Rubri permulti, Mulli barbati, non barbati, Lyra, Cataphractus, Synagris, Pagrus, Erythrinus, Cancrī, Leones, & ferē omnes crustā intecti, cum cocti fuerint,

Nigri Antipolis, Elephas, Coracinus.

Indici, Turdorum quidam species.

Fusci, Galeorum quādam Cinerei, species.

Varii, & Æolii vocantur, quales potissimū sunt Saxatiles.

Odor Piscium,

Injucundus.

Marinus sive pisculentus, omnibus Piscibus communis.

Ferinus, Cetaceis.

Gravis, Cartilagineis, ut Pastinacæ, Ranæ piscatrici, Galeis omnibus, Hepati Sturionis.

Vulpinus, Vulpeculæ vulpis terrestres.

Ingratissimus Lepori marino.

Putrilaginosus, ex Piscium putredine ortus pessimus & gravissimus. Citius putrescunt fluviatiles: tardius marini ob saluginem

Jucundus.

Spirant Violam, Esperlanus.

Sal nuper concretum, Scari Intestina.

Thymum, Thymus.

Moschum, Osmylus ex Polyporum genere.

Sapor Piscium.

Quod Pisces ejusdem etiam formæ generisqve, Carne, succo, saporeq; adeo differant, Pabuli varietas sola in causa est: Alii enim aliis pabulis delectantur, & vel magis sibi familiaria vel gratiora naturali impetu persequuntur.

Piscosæ, proprius, qui in omnibus ejusdem generis, eodem in loco degentibus, percipitur.

Communis vel: Acris, Thynni cauda, Sardynæ caput.

Acris & pingvis: Alofæ mar. Thynni Venter.

Subamarus; Olothuria æstate, Mytuli, Bdellæ æstate.

Dulcis, nupai Squillæ, Cancrī, Pectūculi, Chamæ nigræ, Aselli, Saxatiles ferē omnes.

Salsus, Pectines, Conchæ, Locustæ, Polypi, Loligines.

Inspidus, Pholis, Passer fluviatilis.

Natura Piscium.

Pisces

Pisces minús nutriunt
quám Pedestria Animalia,
sangvinem enim gignunt te-
nuiolem, unde non affluen-
ter nutriunt, & celerius discu-
titur.

Omnes natura sunt frigi-
di & humidi, etsi alii quám
alii plus & minus, pro ratione
scil. natura & consuetudine
Elementi, ex quo ortum ha-
bent & victum quærent, &
ob eorum frigiditatem & vi-
scositatem difficilius conco-
quuntur: Sangvinem quoque
frigidum generant & phleg-
maticum: unde multi iidem-
que graves oriuntur Morbi:
Nervos enim molliunt & ad
Paralysin præparant: Sto-
macho frigidiori & humidiori
nocent, ut contra bilioso & ca-
lidiori valde conferunt.

Caro præstantissima: boni
succii & gustu saporis, iis qui
in Mari sincero victitant; qui
inter saxa & scopulos degunt,
πετσατοί saxatiles, alimento
non vario utuntur, nec loca
mutant, nec fluviatilibus a-
quis gaudent. Hi carnem
obtinent mollissimam, fri-
abilem, concoctu facilem, pro-
bi succii, sangvinem consi-
stentia gignunt medium, hu-

meant modicé, Corpus re-
cté & alunt & augent, neque
excrementosi sunt; neque fla-
tus gignunt. Otiosis, imbe-
cilibus, ægrotis salutare.

Pessimam habent Carnem,
mucosam, excrementitiam &
mali succii, qui in aquis sta-
gnantibus, limosis & sordidis
degunt.

Pisces cum impleri incipi-
unt, a Coitu boni omnes sunt,
sed procedente tempore, alii
præstant, alii non.

Pisciculi recens nati facile
in Ventriculo corrumpon-
tur.

*Partibus Piscium ma-
xima inest diver-
sitas.*

Partes Caudæ proximæ,
sunt saporis & meliusculæ
nutriunt, ut quæ sui motione
exercitentur magis: Quæ
ad ventrem pertinet, pingue-
tudinis nonnihil habent, ac
proinde Stomacho innatant,
& per alvum facilius reddun-
tur. Dorsum carnem durio-
rem, Caput minus præbet ali-
menti, & quod non facile di-
geritur.

Caro Piscium.

F f f

Duræ.

Dura, σκληρόσχημοι sunt Pelagici omnes, Draco, Cuculus, Mullus, Scorpius, Orpha, Corax, Uranoscopus, Hirundo, Trachurus, Cartilaginea omnia præter Tórpedinem, Pastinacam, Mollia omnia : Ostracoderma omnia, dentis Ostreis, Mytilis.

Succum habent crassiores & ægré conficiuntur.

Mollis, μαλακόςχημοι sunt : Aphyæ, Sparus, Cantharus fluviatilis.

Trichides, Manæ.

Molli donantur carne humoreq; multo diffuente.

Media, id est duro molliq; temperata, Lupus, Coracinus, Aurata, Dentices, Rubelliones, pagri, Murænæ, Lacerti, Passeres, Rhombi, Cythari, Sciæna, Hepatus.

Friabilis φαδυσά Saxatiliū, Thymali, Trutarum, Percarum.

Febrientibus, picrocholis in cibo utiliter datur.

Tenera ἀπαλόςχημοι, Iis qui a morbo convalescunt magis idonei, Ventrem quoq; & urinam vehementi-

us cient. Saxatilibus humidiorē præstant succum.

Crassa, tenax & velut glutino compacta γλισχρόν Glutinosum dicunt Αἶα, Congro, Ichthyocollæ, Longis omnibus.

Pingvis λιπαρή, Mugili.

Macra ἀλιπαρή, Crusta intactis, Mollibus.

Dura & fragilis, Rhombo, Mullis.

Dura & glutinosa Buglosso.

Dura & pingvis, Cetaceis, Thunnis.

Dura & macra Galeis.

Mollis & fragilis Saxatilibus Passeri.

Mollis, glutinosa & pingvis Angvillæ.

Mollis & non pingvis, ut Aphyæ, Atherinæ.

Excrementitia penitus mucosæque, qui sordidas limosasque aquas incolunt, λιμνοθαλάττης.

Piscium

Piscium præparatio.

Pisces vel conservantur vel præparantur.

Conservantur: Muriâ conditi seu salsamento macerati, *Eingesalzene Fische*/ ut Hales, Lucii, Angvillæ, Salmones,

Exiccati & durati: Aëre frigidissimo, Passeres, Aselli: Fumo omnis generis, Salmones, Trutæ, Cyprini, Lucio-percæ, Bramæ.

Hi omnes concoctu difficiles & insvaves.

Nonnunquam assi seu elixi aromatibus respersi, aceto immerguntur, ut Lampetræ, Sturiones.

Præparationis duo potissimum sunt genera. Unum Correctionis, cum Piscium vitium corrigitur, veluti cum saliuntur, ut crassus humor salis vi extenuetur, & generando sanguini accommodatior fiat: vel cum decoquuntur Apio, Cepis, Porro, Cerefolio, & aliis additis, ad crassi humoris attenuationem, quæ

præparatione meliores redduntur omnes Pisces, qui crassum glutinosumque succum gignunt.

Alterum quo sæpius utimur, voluptatis potius quam valetudinis rationem habentes, cum condimentis ea permiscemus, quæ ad gulam irritandam titillandumque palatum faciunt.

Cocorum enim opera ita variè miscentur ac temperantur ex aromatis, herbis, obsoletisque omnis generis, ut genuinum saporem odoremque nullo pacto retineant. Nam quæ salia, nitrosa sunt, frequenti dulcis aquæ intercoquendum mutatione, Mellis vel Sacchari permixtione fiunt dulcissima.

Contra iis, quæ insipida sunt natura, tantam Salis copiam inspergunt, ut sapidissima reddantur. Quæ acrimonia nulla linguam pungunt, palatumque irritant, Cæpa, Porro, Aromatibus, Omphacio Vino, Aceto, ita condiunt, ut acri acidave sint.

F f f 2

Pisces

Pisces aqua & sale,
elixa ἰχθύες ἐφθότ. Fisch im
Saltz gesotten/ Purgati & fru-
statim incisi aquæ ferventi,
cui sal injectus, immittuntur,
& usq; ad humoris consum-
tionem in lebeate cupreo co-
quuntur: tandem cum aceto
vel Raphano rustico, aut aliis
condimentis mensis inferun-
tur. Ventriculo humidiori
conducunt.

Pisces assi Ἀνδρανίδες,
ἰχθύες ὀπτοί; Bratfische / vel
simpliciter, vel infarcti sale
respersi, craticula assantur &
butyro illinuntur. Nutriunt
magis, nec tam facile perme-
ant.

Pisces frixi, ἰχθύδια τη-
γανισὰ gebackene Fische/ Fische
im Schmals / in lebeate cum
butyro friguntur: Gustu sva-
ves, sed Stomacho minus gra-
ti, facileq; concoquuntur, mi-
nus nutriunt, & Ventriculo
innatant.

Pisces jurulenti minus
exhibent alimenti, & citius
permeant.

DE PISCIBUS
IN SPECIE.

Acipenser.

Ακίπενσες veterum Rondel.

Ουίσκος Dorioni.

γαλαξίας Galeni.

Οξύγχορ.

Ελοφ Appian. Ιλλοφ ab
ἰλλοθα, id est prohibere & ὀφ,
id est vox, quia voce caret:

Aqipenser,

Silurus Paul. τοῦ. & Peuc.

Sturio, Stora vulgò

Piscis scrutator.

Ein Stür / vom stüren á
scrutando.

Stór.

Piscis est anadromus, carti-
lagineus, solitarius, ex Galeo-
rum genere, tegumento aspe-
ro armatus, Delphino non
dissimilis, demta asperitate.
Teres est triangulari ferè figu-
ra, coloris obscuri, μακρογυ-
χότερος, Rostro longo, bran-
chiis utrinq; quaternis, oper-
culo osseo scabro tectis.

Oculi parvi: Os in prona
parte rotundum, semper hians
absq; dentibus, magis ad su-
gendum quàm masticandum
accommodatum, ante quod
propendent appendices car-
nosæ quatuor numero, Oris
maximè muniendi, & festuca-
rum cohibendarum aliorum-
q;ve

que Corpusculorum occurrentium causa. Venter planus, latera & ossa utrinque posita angulos duos, Dorsum inter hæc eminens latiusculum angulum constituit. Ventriculus ei crassior ut Avium: Hepar magnum dulce, Cor ut Ovis. Pinnæ subalbidae, quarum binæ ad branchias, totidem ad ventrem sitæ sunt, unica Dorso non procul à cauda inest.

A Capite per Dorsum ad Caudam usque, instar medullæ funis seu nervus digiti crassitudine excurrit, integrum Piscem roborans & firmans: unde & roboris nomine indigetur, dicitur Sterese. Coqui dum mactare volunt, eum extrahere solent.

Differentias aliquot patriæ nostræ piscatores in Viadro circa Beutenam observarunt.

Sturio maximus, Ein Haubstier/ Aqua dulci saginatus aliquando ad sex septemve Cubitorum longitudinem captus fuit.

Sturio minor, Sturio parvus Ein Stierle/Störlein.

Sturio πλατύγυγος, cui rostrum est obtusius Ein Breit schnabel.

Sturio ὀξύγυγος, cui rostrum

acutius Ein Spitz schnabel.

In Mari degit, ubi parit & educatur; tandem aquæ dulcedine allectus in Viadrum excurrit: in quo circa Æquinoctium vernum maxime, singulari dexteritate capitur.

Occultatur limosis & arenosis Viadri locis. Aëre & vento puro eum nutriri assentunt: Quidam limo & arena: Alii pisculis. Verum quoties secui, in ejus ventriculo nihil præter spumam & mucum deprehendi.

Piscis imprimis nobilis, pingvedine flava abundans, palato optimus.

Caro candidissima, mollis, delicata, saporis, boni succi, Stomacho idonea, succum gignit dulcem, alit, facillimeque excernitur.

Apud vereres Romanos Piscis fuit maximi precii, & summæ nobilitatis, adeo ut eum à Coronatis ministris cum tibiis, quasi quadam non deliciarum sed Numinis pompa, in convivium inferri consueverint. Hinc

Martialis lib. 13.

Ad Palatinas Acipenseram mitto mensas,

F f f 3

Ambrosias

Ambrosias ornent munera
raró dapes.

Albiculus.

λευκίσκος,
Albula cærulea,
Ein Deselete.
Deseleu.

Parvus est piscis latiuscu-
lus, argentei candoris, præter
dorsum quod fuscum seu
subcæruleum est. Venter albi-
cat, pennæ subfuscae.

Passim in fluviis & lacubus
capitur. Cuius notus.

Parit Aprili, Majo & Ju-
nio.

Carnem obtinet candidam,
mollem, dulcem, suavem &
gratam. Salubris est, nec ma-
lum gignit sanguinem.

Alburnus.

Albulus,
Ein Geuster/
Guhstern/
Weißfisch.

Ex Albularum genere Pi-
scis, longitudinis dodrantalis,
Erythrophthalmus ferè simi-
lis, at latior, colore candido,

in ventre & lateribus, per
dorsum ad cæruleum vergit,
pinnis & oculis subrubenti-
bus.

Abundat circa Beutenam
& Glogoviam in Viadro, nec
non Vuratslaviæ, ubi Vere
ubertim capitur. Aprili pa-
rit.

De hoc observatu dignissi-
mum Piscatores memoran-
tur, confirmante *αὐτοψία*,
quod nimirum Alburnus no-
ster non solum sui generis
pisciculos pariat, verumetiam
Angvillas procreet. Aprili e-
nim mense branchiis ipsius
innascuntur minutissima quæ-
dam animalcula, quatuor,
quinque, vermium specie,
fili candidi instar contorta seu
convoluta, quæ cum moveri
incipiunt in aquas abscedunt,
celeriter vivunt, adolescunt,
& Angvillarum formam
nascuntur. Hinc vulgatum
Piscatoribus, Die Geuster
streichen einen Aisl. id est Al-
burni pariunt Angvillam.

Optimi est saporis, ut Albi-
culi qui vulgò Deseleu di-
cuntur: Caro dulcis, mollis,
facilis digestionis.

Elixantur

Elixantur cum aqua injecto sale, vel cum butyro additis Cepis præparantur.

Assi etiam in cibum reperiuntur, saporis minimè ingrati.

Angvilla.

Εγχελυσ ab ἔγχω, id est strangulo, obtrorta gula coercito, obtorto Collo præfoco: & Ιλυσ, id est lutum, limus.

Angvilla ab Angvium similitudine.

Ein Nahl/
Dehl.

Piscis est notus, longus, lævis & lubricus, Angvibus similis.

Binas habet pinnas juxta branchias, quas utrinque; quaternas gerit simplices, easque; exiguas. Gula illi exigua: fel in jecore inest, in omento sebum pingueque; paucum.

Mari caput est majus, rostrumque; obtusius. Femina minus acutiusque; rostrum.

Degit in profundo fluviorum, cœnosis & limosis locis: aqua discedente se occultat.

Paucæ certisque; locis vescuntur limo, atque; edulis si quis apponat: sed plurimæ dulci humore vescuntur. Unde in vivariis, nisi aqua sit clara, affluatque; semper & effluat per ripas, brevi strangulantur. Vivæ exemptæ aquis, vel ad quintum sextumque; diem, & Aquilone flante diutius durant, Austro minus.

Circa Vergilias maximè capiuntur in fluminibus Viadro, Bobero, Qvado, &c. tum præcipuè turbidis. Pascuntur noctibus, interdum in luto quiescunt.

Vita nonnullis ad septem octoque annos protrahitur.

De Angvillarum procreatione variæ sunt Autorum sententiæ. Oppianus 10. ἀλιευτικῶν.

Angvillæ mutuo Corporum internexu coeunt, & ex his lentorem quendam spumæ similem destillant in arenam & limum; ex quo Angvillæ procreantur. Ea strigmata viviscunt.

Qvidam

Quidam ex aqua sola generari, eaq; purissima, nulla seminis intercedente natura, statuunt.

Nec præter dulces aquas ulla sunt iis principia. Ronderet.

Alii ex putredine & limo nasci crediderunt, veluti Mizaldus.

Angvilla Angvillâ, ceu Tincham Tinchâ secundam

Non parit: Has limus putris & Alga parit.

Quomodo Alburnus Angvillas pariat, ex longa observatione suprà docuimus.

Carnem Angvilla habet mollem dulcem, sed quæ glutinosum & pituitosum frigidumq; succum gignat, & obstructions faciat. Unde febricitantibus, Podagricis, Cachecticis, frigidiori Ventriculo vitanda.

Frequens & copiosus ejus in vitæ periculum conjicit.

Elixatur vino, & Petroselinno recenti seu aromatibus conditur.

Ad ignem assata, affixâ Salviâ melius convenit.

Deterior muriâ asservata, ac minus sva vis.

Aqua Angvillæ destillata tabidis propinatur.

Pingvedo coctæ supernatans Alopeciam, emendat. Cum axungia Anserina, succo Rutæ, Absinthii, Hederæ terrestris fit unguentum Surdastris utile.

Astacus fluviatilis.

Ἀσάνδος quasi ἄσαντος, id est non destillans sed abunde fluens.

Κάμματος,

Gammarus fluviatilis.

Cancer vulgò improprie,

Cancer caudatus.

Ein Krebs/

Flus Krebs/

Astacus è genere est μαλακωσάνων, Astaco marino colore & forma quàm similimus, magnitudine saltem differens: Corpus ei, ut Locustæ marinæ, à qua paucis discernitur, longiusculum, crusta tenuiore intectum, fusci coloris, concoctum toto rubente. Cornua ante oculos duo habet initio articulata, longa, tenuia, quæ sensim adeo gracilescunt, ut tandem in tenuissimum cirrum desinant, in omnemq; partem pili instar flecti possint. E media fronte

dia fronte existit aliud par-
vum latiusculum utrinq; fer-
ratum. His subsunt Cornua
veluti cirri, qvatuor alia, for-
ma qvidem similia, sed mul-
tò tenuiora & brevissima, qvi-
bus, ut opinor, pisciculos alli-
cit & venatur. Supra hæc O-
culi apparent parvi, cornei,
semper prominentes & exer-
ti, ex obliquo mobiles. Frons
acuta & aspera veluti aculeus
eminet. Oris lateribus ex
parte inferiore, juxta Pedes
Ori proximos, Appendices bi-
næ frequenter hirsutæ, velu-
ti parvi pedes ad tutelam ad-
nascuntur, & veluti branchiæ
os circumdant. Pedes in
ventre enascuntur deni, in
obliquum flexi, utrinq; qvi-
ni, qvorum anteriores bi-
ni grandes & crassiores,
chelis magnis seu forcipibus
grandioribus quasi denticula-
tis æqualibus donantur, qva-
tuor ad grandes dispositi, u-
trinque bini, bisulci seu bifur-
ces & hirsuti, chelis glabris,
rostris Avium similibus, qva-
rum superior pars movetur,
inferiore immobili, reliqvi
qvatuor posteriores simpli-
ces & indivisi ex toto perten-
dunt. Flectuntur omnes ino-
bliqvu, chelæ verò introrsum.

Cauda, Τράχηλος, Col-
lum, lævis sine aculeis, ex
qvinq; tabellis contexta, in
qvinq; pinnas extremitatibus
hirsutis, natandi causa, desi-
nit, qvibus innatando quasi
remo utitur: estq; in hac ro-
bur totius Corporis, in cujus
supina seu interiori parte ap-
pendices qvædam hirtiusculæ
ex utroq; latere qvatuor, pin-
nis similiter hirtiusculis, in
qvas feminae foras pariunt o-
væque deponunt, qvibus eti-
am duplices sunt ad contigen-
da & conservanda Ova, Ma-
ri simplices & parvæ. Inter
Caudam supernam & pedes
novissimos, veluti calcaria
majuscula prominent acuta,
qvæ femina parva habet &
leviora. Dentes bini magni
plani in intimo Pectoris ori-
ficio ad latera positi: in Ore
caruncula lingvæ specie: se-
qvitur gula brevis: hanc ven-
triculus membraneus excipit,
cujus ostio tres infixi sunt
denticuli, duo adversi, reli-
qvus infrâ: inde Intestinû in
ventriculi latere simplex, pa-
ri semper crassitudine in Cau-
dam terminatus, qva excre-
menta excernit, & ova edit.
Præter ista meatus est, qvi à
pectore pendens in anum ter-
minatur,

G g g

minatur,

minatur, in feminis Vulva est, in Maribus feminis receptaculum, hic juxta Carnis cavum continetur, ita ut media caro inter Intestinum & meatum sita sit, meatu carnis cavum Intestino connexum contingenti. Hoc meatu mas á femina differt. Nam in utroque á pectore pender, tenuis est, candidus, humorem qvendam pallidum intra se continens. Capitis Colliq; testa subtús tota perforata apparet.

Coëunt Astaci more Quadripedum retró mingentium scilicet, ut Caudam femina supinam exponat, Mas suam superponat & applicet: Et qvidem vere juxta terram. Ova utero gerunt tribus mensibus, Majo, Junio, Julio: deinpe Ova in appendicibus illis supinæ partis caudæ reponunt, quæ deinde Verminum more augentur.

Differunt: *Alii*

Nobiliores EdetKrebsse.
Magnitudine alios superant,
& magis nigricant.

Petroß, πετρώτοι, Stein-

Kräßse/EdetKrebsse. prædictis minores, subtús albidiores, in dorso nigriores.

Lacustres, SeeKrebsse/ In piscinis & lacubus asservantur. Cæteris fluviatilibus sapore inferiores.

Crusta exuti, Meuser.

Omnibus vita est diuturnior.

Crusta exuuntur, qvemadmodum Angves senectute: id quod consultó á natura factum est. Crusta enim densior reddita motum impedit, eiq; veluti graviiori oneri succumbentes Astaci, longé seniores ad motum redduntur. Is excrementis, quæ in eam abibant, in aliam quæ subest, gignendam absuntis, formaq; á superiore accepta, illa alimentis destituta siccior efficitur, faciliq; colliditur.

Eo tempore quo crustam eximunt, in capite duos gerunt lapillos albos rotundosq; semiglobuli figura, singulari Naturæ providentia,

ad

ad crustæ substitutionem, qui dein exuto tegumento veteri, rursus paulatim absumuntur, & in crustam abeunt.

Sarcophagi sunt,

Autumno & Vere pingvescunt, & plenilunio magis; quia fidus nocte tepido fulgore mitificat.

Capiuntur manibus, hamis, maximè dum fulgurat: tum enim ex cavernis ad pascua procedunt: etiam carnibus seu coxis Ranarum, virgulis divisis in summitate infixis, ordineque, juxta gurgites aut loca quæ habitare solent, dispositis.

Naturæ sunt frigida & humida.

Duræ carnis & difficilis concoctu. Quæ superiora, teneriora sunt: quæ Caudæ proxima, duriora, candida. Somnum conciliant, optimè nutriunt, Hæcticis & rabidis utiles.

Præfertur Caro in Caudis & forcipibus.

Astacos, Nostrates frequenter in aqua seu Cerevisia secundaria tenuissima, addito Sale & Carveos semine, elixare & mensis inferre solent.

Divites crusta spoliatos in frusta dividunt, aromatis, aceto saccharoque condiunt, Petroselini foliis aspersis, vulgò *Krebse im Bensch*. Edulium Calculosis profuturum.

Alii Carnes nudas additis Cingibere, Pipere, Croco, Mace, albumine Ovi & Petroselino, in massam fingunt, quæ testas vacuas replent, easque in butyro & aceto frigent, *Gefüllte Krebse*.

Astacorum multo usu, Oculorum aciem hebetari, experientia constat, nec sine ratione. Cum enim difficiles concoctu sint, flatuum, crassiorumque & glutinosorum humorum magnum proventum adferant, crassos ex his caliginososque spiritus effici necesse est:

G g g 2. quorum

q̄uorum perspicuitatem & splendorem ad clariùs cernendum necessarium esse necesse est.

Astacus vivus acero tufus expressus, gargarizatu faucium medetur inflammationibus, vulgò dicitur Dreune.

Succus recens expressus cum farina hordeacea & oleo violato, ad Cataplasmatum consistentiam coctus, Renum fervorem mitigat, Calculiq; coagulum dissolvit.

Ova auxiliantur morsui Serpentium Venenosorum.

Testa oleo Rosaceo permixta, scabiem puerorum ex falsis humoribus prògnatam sanat illita.

Mense Julio uruntur, quorum Cinis plurimùm exiccat: in Cancro & morsu Canis rabidi laudatum remedium.

Pulvis cum Cranio humano, Eboris rasura, Cinnamomo & Croco, ex vino utiliter bibitur contra paroxysmum febrium intermittentium.

Lapilli Astacorum Krebs Anguicordiales sunt, refrigerandi, siccandi & abstergendi facultate præditi. Calculosis & ab alto devolutis, commode propinantur.

Aqua ex carnibus per alem-

bicum extrahitur Hæsticis: & si Lithonriptica addantur, Calculosis pro auxilio.

Unguentum potabile rubrum.
Notte Krebs salbe.

Æ. Astacos fluviatiles à foribus in capite hærentibus repurgatos. No. 60.

Butyri recentis insulsi despumati ℥ ij. f.

Astaci contusi ad pultis consistentiam butyro permisceantur. Add. Cortic. Sambuci recentium M. iij. rad. Lau reolæ M. ij.

Cum butyro permixta in lebetæ ad mediæ horæ spaciū fervescant. Exprimantur per pannum fortiter, Adde iterum.

Sanguinis hircini unc. i. f.
Rad. Pimpinellæ, Urticæ majoris.

Lumbric. terrestrium purg. Græci albi an. unc. 2.

Castorei drach. 2. Pulveriz. Butyro permixta diligenter frigantur.

Colaturæ adhuc ferventi permisce:

Spermatis Ceti non ranc. unc. f.

Boli Armeni q. f. ad colorem.

Agitentur probè ad unguenti

gventi consistentiam.

Sanguinis grumos dissolvit, alvum lubricat. Adversus Contusiones, Casum ex aceto seu Cerevisia frequenter usurpatur pōdere drach. i.

Dorion quidam apud Athenæum festivè admodum dixit, Locustam marinam tria in se habere, *Διατρίβη* ἢ *ἐυωχία* ἢ *δωδία*, id est Exercitationem, edulium & contemplationem. Idem Astacis nostris aptè accommodari potest. Cum enim integri mensis apponantur, frangendis pedibus & branchiis, Thorace divellendo, Cauda distrahenda, manus oculiq; exercentur: tum edulium est cibusq; Convivis non ingratus. Interea mirabilis & ingeniosa, spectatur animalis hujus fabrica.

Barbus saxatilis.

Ἰσίδης Arist. *Peuceri* qvōd ter in anno pariat. *γινεατὶς.*

Musōs.

Μυσάκ'ε.

Mullus *Peuc.* à colore mulleorum calceamentorum.

Barbatulus *Cicer.*

Barbatus *Varr.*

Barbo.

Ein Barbe/

Barbel/

Barne.

Piscis notus & frequens, squamosus, crassiusculus, aliquando ad Cyprini ferè magnitudinem accrescens, Capite parvo acutiusculo, Color Dorli fuscus, latera ex fusco flavent, ventre candido. Pinnas habet senas, singulas in dorso & ad podicem: in ventre medio & ad branchias duplices ex rubore liventes, maculis nigris coloratas. Oculi centrum nigrocæruleum, Iris angusta aureo micat fulgore. Appendices Ori adnatæ quatuor, binæ superiori, totidem inferiori labro carnosæ, lividæ. Ventriculus nullus. Intestinum ad gulam capacius sensim gracilescens replicatur; cui Jecur apponitur pallide rubens, inhærente vesicula fellis rotunda cærulea. Splen exigvus sanguinei coloris, ut & Branchiæ, quæ quaternæ utrinq; duplices, ac in Cyprino. Cor triangulare latiusculum.

Muscis, Vermiculis, Mucos & Pane vescitur.

Capitur æstate vermiculis, nec non noctu manibus, facibus ignitis perterritus. In profundis gurgitibus ut plurimum stabulatur Viadri, Bobe-

G g g 3

ri, Qvadi

ri, Qvadi, Præstat Majo.

Carnem obtinet satis laudabilem, candidam, friabilem, svavem, Ori gratam, qvamvis mollem, spongiosam.

Barbatuli in delitiis habentur, sanis & ægris commodi, Sale elixi & aqua mensis inferuntur.

Ova venenata creduntur, adeo ut si largius sumantur, eos qui hauserunt, in magnum vitæ periculum adducant.

Bdella.

Φόδρος λέος á capite acuminato.

Βδέλλα,

Phoxinus lævis Gess.

Ein Eideris/sil.

Elderich/Altische/

Bachbante/

Milling/

Erting/

Bitter-Fischlin/

Pfellen.

Pisciculus est fecundissimus, vilissimus, ubivis in rivulis & torrentibus abundans. Cuticula integitur lævi absq; squamis, albicat & flavet ad

latera, punctis nigricantibus respersa. Pinnarum inferiorum extrema rubent. Venter candicat, in Dorso, nigro variat colore.

Ovis ferè semper turgentes reperiuntur. Statim ferè ut natus est, & admodum parvus adhuc ova habet.

Piscis neglectus & minus svavis, ob fel majus plerunq; amaricat multum, pauperum cibus.

Elixantur ex aqua & sale: aliquando Butyrum addunt cum Petroselino aut Cerefolio: nonnunquam acetum & cepas pro sapore.

Blicca.

Ballerus,

Plestya.

Ein Blähe/

Blene/

Blief/

Blief ling/

Breitele.

Latiusculus est piscis, Bramæ ferè similis, at tenuior: cujus pinnæ posteriores cum Gauda ex rubro livent, superiores fuscae. Capite parvo, squamis

Squamis mediocribus albican-
tibus.

Amat profundos lacuum
gurgites. Majo cum parit,
ad littora prodit. Hyeme ex
lacubus vicinis Glogoviam
affertur.

Caro spinis referta, non ad-
modum improbi succi: Vi-
lis est & parvi precii.

Capito fluviatilis
Ceruleus.

Alofa Nonnullis.

Eine Zese/

Jyse/sil.

Zentling Gese.

Brattfisch/

quod frequenter tostus men-
tis offeratur,

Blauer flus Alet.

Piscis est latiusculus, squa-
mosus, coloris caerulei, præ-
fertim dorso & partim capite.
Latera & Venter argenteo
nitent colore. Pinnae ferme
rufae sunt & cauda. Longi-
tudo cubitum non excedit, nec
latitudo tres aut quatuor di-
gitos.

In Viadro, Bartha, Wei-
da, lacubusque nonnullis fre-
quens,

Parit Aprili. Vivit ex ver-
miculis, Majo præstantissimus
est, præ pingvedine flavet, &
sapore viget.

Pinguiusculus est & savis
satis, minus vero salubris.

Assus præfertur elixo. Pa-
ratur etiam cum liqvamine
croceo. Im geelen Sode.

Capito fluviatilis
rapax.

Koganiyog Squamosus &
latus, Peuc.

Coracinus fluviatilis,

Corvulus fluviatilis,

Ein Rappe/sil.

quod Corvi instar rapax &
vorax sit.

Raub Alet/
Bras Alet.

Squamis tegitur latiusculus,
tenuibus, perspicuis. Longus
est aliquando duos cubitos,
crassus, carnosus, & carne ari-
stis plena, longitudine ad la-
titudinem quintupla. Den-
tes ei sunt in faucibus. Pinnae
fuscae seu lividae, Rostrum la-
tiusculum.

In

In Viadro nascitur & capitur, non advena est. Parit Martio & Aprili. Duræ & lentæ est carnis.

Piscis admodum laudatus & boni saporis, tum assus tum elixus, si ritè coquatur, quod plerique ignorant: facile enim in partes delabitur, si in fervidam immittatur. Itaque ab initio in frigidam statim præparatus immitti debet, ut pariter cum aqua concalefiat.

Charax.

Carasus,
Ein Karis.
Karuge/Karuge.
Karas.

Forma staturaque non multum à foetu Cyprini absimilis est, nisi quod paulo latiore Corpore distendatur, & dorsum habeat asperioribus spinis vallatum (unde ei nomen) quodque juxta Caudam squamis inauratis magis impalle-scat.

Charax vulgaris,
Carasus vernaculus,
Gemeiner Karis/
Klein Karas/
Gilsbichen / á colore lu-teo.

Charax crassior, longior,

Carasus dimidius,

Halb Karis/

Karp Karis/

Karrugen/

Karusken Karp.

In piscinis, lacubus & fluvio-oritur.

Carnem habet dulcem, suavem, satis laudabilem, Cyprini non dissimilem.

Cobitis.

Κίχλη, κωσίδες, κωσίδης, γερνιάδης.

Gobio fluviatilis Agric.

Cobitis barbatula seu Cobitis fluviatilis 3. Rondel.

Turdus Penc,

Turdellus,

Fundulus seu Fundula Albert.

Mustela fluviatilis minima vel Pœciliæ minimus Nonnull.

Ein Gründel/

Gründling/ sil.

Bar Gründel/

Smerle/ Misnensibur.

Schmirlin. f

Pisciculus vulgaris notissimus, spithamam longus, ut plurimum lævis, cirris tenuibus Rostro barbæ modo pendentibus. Ventrículus longiusculus phaseoli ferè magnitudine

tudine & forma; qvo dissecto fitas aquaticas aliosq; vermiculos reperi. Pinnis donatur senis.

Aqvis & rivulis Montium delectatur limpidis, locis faxosis, petrosis & arenosis. Cattus maximos & nobilissimos gignit. Capiuntur manibus, reticulis, lumbricis terrenis & laqueis hyeme sub glacie.

Pariunt Martio & Aprili.

Ori sunt grati, svaves, facilis concoctionis, & probi succi. Puerperis, febricitantibus commodi & salutare.

Ceruleum colorem acquirunt, si aceto vini tepidiusculo, priusquam elixentur, aspersi fuerint.

Caput exenteratum representans vultum virginis, assatum Calculosis medetur,

Cobitis aculeatus.

Δακτυλίος.

Διδόκοπος,

Cobitis fluviatilis 2. *Rondel.*

Mustela fluviatilis parva imberbis.

Echeneis fluviatilis,

Turdus saxatilis.

Ein Steingrindel.

*Steinschmerlin/
Steinbeisser/
Dorngrindel.*

Pisciculus sui generis, priori cognatus & similis, Rostro acutiore, Coloris ex fusco viridantis, maculis & lineis nigricantibus varius, non autem rotundus; sed quasi columnalis compressus absq; branchiis.

In arena & sub saxis plerumq; stabulatur. Leobergæ capitur & alibi. Parit Vere.

Minus svavis est, neglectus ob carnem duram lentam & mucilaginosam.

Ichthyopolæ hunc pro lævi, parum cautis vendunt.

Cochlea palustris.

Κόχλος,

Κοχλίας,

Concha palustris turbinata,

*Pfuschnecken/
Wasser Schnecken.*

Forma à terrestri parum differt. Oblonga est, tenuis, obscura, acuto turbini similis.

In paludibus nonnullis degit. A cibo abdicantur ob virosi odorem & saporem. Anates mediæ in cibo iis fruntur.

H h h

Concha

*Concha fluviatilis
longa.*

Cochlea longa dulcium
aquarum,

Wasser Schnecken.
Lange Fluss Muscheln.

Testa operitur seu muni-
tur oblonga tenui, extrinse-
cus striis seu lineis, secun-
dum longitudinem ductis, ru-
gata, Coloris subflavi, subvi-
ridis, interdum fusci coloris
exterius; interiore parte can-
dida & lævis.

In Piscinis fluviisq; non-
nullis passim occurrit.

Virus olet Caro, nullius
usus.

In cibo Quartanarios fa-
nare fertur. Ad quem usum
salo conditæ asservantur.

Testis Pictores ad contem-
perandos colores utuntur.

*Concha Margari-
tifera.*

Concha fluviatilis Marga-
ritas ferens.

Mater Perlarum,

Concha Unionum.
Ein Perlen Muschel/
Perlen Schnecke/
Perlen Mutter/

Bivalvis est Concha, prio-
ri non multum absimilis, figu-
ra longiuscula, compressa,
putamine externo fusco, stri-
is multis scabro, intrinsecus
verò lævis, lubrica, pellucida
Argenti nitore, ut Conchæ
orientales Margaritiferae, re-
fulget.

Margaritas hæc gignit mi-
nutas quamplurimas, quæ
ipsi Carnis substantiæ inna-
scentur.

Magnæ verò trinae aut plu-
res raro, sapissimæ unica
tantum insignis inter carnem
& testam inest libera, quæ
divulsis crustis sponte exci-
dit.

Littora incolit arenosa
Quadi fluvii, qui in Sudetis
enatus Silesiam à Luzatia di-
rimit, & infra Saganum Bo-
bero infertur.

Caro ejus mucilaginosæ, lu-
brica, mollis, odoris ferini,
ingrati,

Margaritæ

*Margaritæ Sile-
siacæ.*

Uniones fluviatiles seu
Qvadi fluvii.

Lapilli Concharum preci-
osi.

Schlesische Perlen.
Quets Perlen/
Wasser Perlen.

Differunt forma, magnitu-
dine, splendore. Aliæ exa-
ctè sunt rotundæ Pisi instar:
qvædam oblongæ, teretes, cy-
lindricæ: nonnullæ latiuscu-
læ; aliæ inæqvales.

Qvædam sunt majores, Pi-
si Italici magnitudine: aliæ
minores: multæ longiuscu-
læ: plurimæ Milii aut papa-
veris semen æqvant.

Colore etiam discernun-
tur.

Minus nitent parvulæ, ma-
jores partim fuscæ sunt, par-
tim rubent, ac si essent cruore
perfusæ: Nonnullæ in ex-
tremis argenteo nitet candore,
in medio rubent, Pauca
perfectæ, integrè maturæ de-
prehenduntur.

Elegantissimæ ac pulcer-
rimæ in arenâ extra Conchas
à Piscatoribus sæpè legun-
tur.

Margaritas in ipsis Conchis
qvovis anni tempore reperire
licet.

Qvidam turbidas & im-
perfectas Gallinis ac Colum-
bis devorandas offerunt, inde
candidiores fieri persuasi.

Margaritæ ob splendorem
& puritatem Cordi amicæ,
Oculis gratæ. Siccant, abster-
gunt, roborant, Cordiali-
bus, Ocularibus medicamen-
tis & dentifriciis commodè
adduntur.

Cyprinus.

Κυπρινος.

Cyprianus Dor.

Cyperius Oppiani.

Carpo, Carpus.

Carpa, Carpena.

Ein Karpff/

Karp.

Piscis patriæ huic plus-
qvàm notissimus, & mensis,
Autumni fine hyemisq; initio
freqvens.

H h h 2

Gregalis

Gregalis est, latiusculus, squamis latiusculis refertus, pinis quaternis, duabus ad branchias, una in dorso & ventre donatus. Branchias habet utrinque quaternas easque duplices. Rostrum, cui assunt bini cirri seu apophyses, porrigit & retrahit. Palatum carnosum admodum & molle, ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse videatur. Colore ventris albicat, ad latera subflavus, Dorsum subfuscum. Intestinum replicatur & sursum recurrit, cui annexum Hepar cum felle subcæruleo amarissimo. Vesica duplex.

Limo & mucro nutritur, non item carne.

Cyprini alii sunt

Lacustres, qui in Lacubus oriuntur & crescunt, maximi sunt & pingves See Karpf-fen.

Fluviatiles, qui in fluminibus magnis, Viadro, Bobero, Nisso, Catto, Qvado, & aliis vitam agunt.

Piscinarum, *Weiber Karpf-fen* / *Teich Karpffen*, qui in lacubus arte factis seu piscinis, passim à Nobilibus & Villicis aluntur propagantur, cum vitæ tum quæstus gratia.

Cyprinus mas Ein Miltcherne Karpff.

Cyprinus femina, Ein Rogerne Karpff.

Cyprinus maximus Ein grosse Heubt Karpffe.

Cyprinus admissarius Eine Sahm Karpffe.

Quovis Anni tempore, quinqvies aut sexies, ex sententia veterum partum faciunt. In Silesia nostra verno tempore ut plurimum partus peragitur. Vada petunt cum parturiunt, ac sæpenumerò singulas feminas, Mares 12. 13. aut quatuordecim sequuntur. Mox femina Ova procedendo emittit, & mutans continuo parit, quò fit ut dissipari ova necesse sit, videlicet ea quæ non in materiam inciderint aliquam: sed Cyprinus tunc ea custodit, cum congesta repererit. Hinc Piscinarum præfecti opinantur foetum Cyprinorum interire, si Cyprini admissarii è piscinis exempti fuerint.

Pro ætate variè appellantur.

1. Foetus annuus *Striech* / *Einsommeriger Sahme* / *Seslge* / *Jähriger Sahme* primo anno.

2. secundo anno, foetus bimus

mus Zwenjährtiger Striech/
Sprel.

3. tertio, foetus trimus, drey-
jährtiger Striech.

4. quarto, Carpæ Karpf-
fen.

Fœtum Cyprinorum bi-
mum interire, si in profun-
dum Piscinarum injectus fu-
erit, suffocari seu interire qui
dam crediderunt.

Inter Cyprinos præferun-
tur fluviatiles : dein qui in
piscinis, quæ rivulos Montium
seu aquas limpidas recipi-
unt, enutrientur.

Caro Cyprinis mollis, pin-
guis, non insuavis : abunde
nutrit, minimeque mali succi.

At frequens ejus usus ven-
triculo frigidiori nocet, nec
non Calculosis, & Colicis do-
loribus divexatis: Pituitosum
enim & frigidum succum gi-
gnunt, facileque obstructions
pariunt, nec non Quotidianas
febres gignunt.

Optimi sunt Autumni fine,
& hyemis initio, ubi piscinis
eximuntur, & vivariis per
hyemem reservantur.

Apparatus horum varius
est: Velenim simpliciter a-
quâ addito sale elixantur: vel
liqumine cum lardo, pane
candido tessellatim incisis ex

aceto frixis perfunduntur.

Karpff im Specke gesotten.

Alii variis liqumminibus ex
aceto, vino, additis aromati-
bus, Melle aut saccharo con-
diunt, Karpffe in der Würge.

Aliquando super carbones
ignitos assantur, Brat Karpf-
fen.

Caput præfertur ob saporis
præstantiam. Intestina cum
Hepate vulgò das Karpffen-
gebündel/in delitiis habentur,
cum Pipere, Zingib. & sale
eduntur.

Pinguedo illita, Nervos ex
calida caussa dolentes lenit.

Fel illitu, Oculorum nube-
culas discutit.

Lapis Carpioni in faucibus
forma triangulari, magnitu-
dine & figura ferè Lupini, na-
scitur Karpffenstein / qui ore
detentus flavæ bilis ebullitio-
nem & ardorè infringit, Cal-
culos exterit, à Colica præ-
servat, Narium hæmorrhagi-
am cohibet tritus, & cum la-
nugine Cydoniorum immis-
sus. Contra Caducum à qui-
busdam commendatur.

Supra Oculos existunt alia
duo ossicula, semicircularia,
altera parte quasi denticula-
ta, quæ à feminis nobilibus

H h h 3 diligenter

diligenter adversus Lunaticum morbum reservantur.

Cyprinus latus.

Κυπρινος πλατυς,

Αεραμυς Bellon.

Prasinus Albert.

Prassius,

Abramis fluviatilis & lacustris.

Brama,

Bresma.

Ein Bresse/

Brasse/

Prach sine/

Meze March.

Breiter Karpff.

Piscis est fluviatilis & lacustris latissimus. Capite parvo, pro Corporis magnitudine, Dorso repando & cultellato, Corpore compresso, squamis magnis albicantibus recto.

Viadro & lacubus Ducatus Glogoviensis familiaris.

Capitur hyeme & æstate.

Carnem obtinet non ingrati, at satis difficilem.

Frequentius assus offertur: quamvis etiam elixetur:

Fumo exiccatur in cibum pauperum.

Erythrinus.

Ερυθρόπτερος,

Rutilus à pinnarum colore.

Ein Rott Sieder.

Minor est Rubellione, squamis grossis latiusculis, pinnis rubentibus non Oculis.

In lacubus & piscinis frequens.

Caro aristis referta & minus proba.

Gobio fluviatilis

Ausonii.

Κωτιςπος Ρενε.

Ανθωποφάγος,

Merula,

Turdus Nonn. improprie.

Ein Kresse/

Wach Kresse/

Sand Kresse/

Smerten. Nonn.

Ex eorum est numero, qui perpetuo manent parvi, squamulis ad latera argenteis & dilute caeruleis tectus. In dorso fuscus, punctulis nigris varius. Venter albet. Pinnae ad branchias subrubentes & in ventre binæ. In dorso & extremo ventre simplex cernitur.

Gregalis

Gregalis est, & Martio parit: quamvis sint, qui singulis mensibus eum partum edere affirmant,

Vescitur vermibus, pisciculis & limo.

Fluviis, rivulis & torrentibus familiaris: in quibus hamulis, scirpiculis, & retibus per integrum annum ferè capitur.

Svavis est & concoctu facilis, simulq; ad digestionem & succi bonitatem optimè comparatus.

Apparantur ut Funduli. Aliquando farina triticea involuti cum butyro frigentur.

Gobio fluviatilis capitatus.

Κωϊο,

Κωϊίτης Peuc.

Κίτη,

Κοϊίς á Capitis magnitudine.

Cottus Gess.

Capito,

Ein Müller/

Kaulheubelsin/Peuc.

Kaulfisch/

Groppe/

Kopp.

Pisciculus est lævis, Corpore oblongo sensim in acutum desinente, coloris cinerei, capite magno, latiusculo. Ventrículus ejus Ricinum refert.

Fluviatilis, & torrentibus notus optimus, qui in aquis limpidis sub saxis capitur.

Capitones gustu sunt svaues & dulces, Carnis mollis, nec lentoris expertes. Succum gignunt probum & laudabilem.

Tabidis & Phthificis commendantur.

Lampræta major.

γαλεώνυμος,

γαλεΐα,

Ασεΐας,

Εχενίς Oppian.

μύραινα ποταμία.

Muræna Paul. Iovii.

Muræna fluviatilis.

Mustela Plin. Massar.

Mustela stellaris Peuc.

Lampræta á lambendis petris: seu á fulgore

Oculata major.

Ein Lampred/Sil.

Lampren/

Lamprey/
Lampress/
Grosser NeunAug.

Piscis est marinus & fluvialis, veteribus incognitus. Angvillis vel potius parvis Murænis assimilatur, lubricus colore cæruleo subnigro, septem parvis fistulis seu foraminibus mirabili ordine distinctis aquam reddens. Os ei patulum orbiculari figura sine dentibus.

Veris initio fluvios ingreditur, ut illic ova pariat, in Mare deinde rediturus.

Rarissima est, & minus nota Silesiæ. Ad Crossenam in Viadro aliquando capta fuit.

Verisimile hunc piscem videri fuisse olim, nec mensis lautioribus apponi solitum: cum nulla ejus mentio à quovam Veterum facta fuerit.

Hodie in delitiis habentur à Magnatibus. Svavissimæ sunt, sed Martio & Aprili tantum: at succum gignunt viscosum & glutinosum, qui difficulter conficiatur.

Lampreta media.

γάλεος λῆος Ρευς.
ἐννεόφθαλμος,

τυφλῖνθ,

Mustela lævis,
Mustela parva fluvialis
Oculata minor,
Lampreta minima Rondel.
Lumbricus aquaticus minor.

Ein NeunAuge/
NeunOefe.

A priori magnitudine saltem differt, & in Viadro circa Beutenā post natalia Christi sub glacie magno numero, Martis circa Boleslaviam in Bobero capitur.

Aqua & sale elixæ, cum turgent ovis, ut delitiæ mensis Nobilium inferuntur. Cum aceto & pipere frigida eduntur.

Fumo indurata vulgò, nomine Briscen: assæ verò aromatibus resperæ aceto condita, nomine Morenen/ ad nos feruntur ex Belgio & Borussia.

Gustu sunt svaves, sed difficilis concoctionis.

Lampreta minima.

Lampetra minima i. Gesh.
Gobio fluvialis,
Lumbricus fluvialis minimus,
Saximorda,

λιδόκοπθ,

ΛΙΔΟΚΟΠΙΣ.

Ein Steinbeißer.

Lampetræ genus minimum, calamo scriptorio Anserino paulo crassius, palmos 11 longum, colore obscure subcæruleo, ventre argenteo, fistulis utrinque septenis. Oculis binis nigris, quos ambit circulus candidus. Cauda latiuscula. Martio & Aprili, cum semine turgent, in rivulis & fluviis limpidissimis capiuntur: reliquo Anni tempore profundis gurgitibus, catenatim quasi implicata, in arena delitescunt. Tunc etiam temporis cibo inutiles.

Saxum perpetuo mordent, quibus Hirudinum instar adherent.

Caudis & capitibus abscissis ac purgatis, aqua addito sale elixantur, cum pipere & zingibere mensis offeruntur, divitum delitiæ, quas Pauperes negligunt.

Gravioris sunt concoctionis, & sanguinem gignunt crassum ac biliosum.

*Lampreta minima
cænosa.*

Lampetra minima 2. Gesn.
Lampreta minor spuria,

Cæcula,

Pæciliæ minor Nonn.

Ein Mur Meim Auge/Gesn.

Schlambesker/

Querder/

Schlam Querder/ 1 sil.

Priori adeo similis, ut Nonnulli pro vera in cibo usi sint.

Ejusdem magnitudinis & formæ, fistulis totidem, septem nimirum, sed Oculis orba, coloris ex fusco subvirentis seu cinerei, Sangvisugarum ferè lineæ, à capite crassiusculo ad caudam per Dorsum dilutiore porrecta.

In luto & cæno quovis tempore delitescit & occultatur.

Mensis non admittitur, utpote sordida & cænosa. Hamis infigitur à piscatoribus ad escandos Thymalos, Angvillas, Lucios, aliosque pisces.

Lucio-Perca, Gesn.

Asellus fluviatilis,

Ein Behend/

Zant.

1 sil.

Schill.

Nag Maul.

Piscis est longus asper squamosus, medius inter Lucium & Percam. Capite & rostro
1 i i Lucium

Lucium refert, reliquo Corpore Percæ similis, & maculis nigris varius. Pinnæ livent, extremis apicibus rubentibus. Aliquando cubiti longitudinem excedit.

In Viadro frequens. Vorax & rapax est ac sarcophagus.

Captura ejus circa Beutenam, Glogoviam, Steinam, Vratislaviam & alibi. Aprili parit.

Mire pingvescit. Carnem obtinet candidam, lentam, concoctu difficilem; at suavem & laudabilis succi.

Sale maceratus doliis includitur & in varia loca devehitur.

Fumo etiam induratur.

Lucius.

Λύσραξ, Nonn. fals.

Λύκος,

Lupus,

Em Hecht.

Longus est Piscis ex Asellorum genere, voracissimus & edacissimus, fluviis, lacubus atq; aliis dulcibus aquis peculiaris, Color ei per Dor-

sum fuscus, ad latera subflavus, Ventre albo, squamis minutis densissime compactis. Pinnæ ad branchias & Ventrem binæ, toridem ad caudam, supra & infra unica dilutè fusca. Branchiæ senæ, utrinq; ternæ. Oculi nigri. Iris aurea. Cor sub branchiis minutum saturè rubet. Hepar longiusculum simplex pallet, cui anteriore loco fel jungitur majus cæruleum. Ventriculus oblongior, Intestinis continuus, quæ ut Cyprini replicantur. Splen latiusculus ferè Cordis figuram æmulatur, sanguinei coloris.

Partus ejus numerosior vere perficitur.

Rex atq; tyrannus aquarum, Pisces ad sui magnitudinem devorat, Pari quoq; sui generis non parit, & propria femina persequitur.

Horum insignis captura in Bartha fluvio, ubi sale macerari & condiuntur, & fumo exiccantur.

Varia à Coqvis & Piscatoribus sortiuntur nomina.

Lucii

Lucii maximi, *Grosse Heube-Hechte.*

Lucii mediocres, *Mittel-Hechte/ Schlüssel-Hechte.*

Lucii parvi, *Zahl-Hechte.*

Lucii Martiales, *Mers-Hechte.*

Lucii lacustres, *See-Hechte/ nigricant.*

Lucii fluviatiles, *Flus-Hechte/ alben.*

Lucii in Viadro capti, *D-der-Hechte.*

Lucii piscinarii, *Teich-Hechte.*

Commendantur fluviatiles, juniores, mediocres, qui teneri, boni succi, & stomacho idonei. Maximi verò, & qui jam consenuerunt, carnem habent duram, tenacem, difficilimæ concoctionis, Ventriculo molestam, & quæ difficile excernatur.

Carne præditus est Lucius alba, duriuscula, non multi alimenti, *Εὐπεπτός*, & optimi succi, Carnem gignit tenuiorem.

Variis modis apparatus a Coquis.

Vel enim integri torrentur supra carbones ignitos, butyro illiti.

Vel infarciuntur mixtura ex Pane candido, Ovis, Carne propria, Saccharo, Petroselino, Majorana, Rosmarino, Butyro, additis Pipere, Zingib. Macis, Caryophyllis Sale, & deinde assantur, ac mensis inferuntur simpliciter, aut liqumaine aromatico perfusi, *Gesüllete-Hechte.*

Vel diviso Ventre secundum longitudinem, in craticula, suppositis carbonibus ignitis, torrentur, & brodio ex aceto, butyro & multo Pipere ac Zingibere perfunduntur, *Ein Kohl-Hecht.*

Elixantur pluribus modis :

1. ex aqua cum sale elixantur, qui si prius aceto vini calidiusculo imbuti fuerint, pulcherrimum colorem acquirunt, *Werden schöne Blau/ vom anblähen.* Cum aceto vini offeruntur.

2. elixantur & cum jure albo ex aqua, butyro & radicibus Petros. præparantur.

I i i 2

Alii

Alii addunt tantillum aceti : cum mica panis candidi pro sapore. *Hechte in der sauern Butter.*

Hæc præparatio ægris accommoda.

3. ex vino coqvuntur, additis Limonibus, mica panis candidi, aromatibus, Zingib. Cinnam. Pipere, Croco, saccharo condiuntur. *Hechte in Lemonien.*

4. Alii liqvamini ex Cepis copiosis, multo pipere, Croco, Zingibere, immergunt & mensis inferūt, more Polonorum. *Hechte im Polnischen Sode.*

Ova abijciuntur ut inutilia, cum nauseam & diarrhœam commoveant, instar Barborum.

Cor Lucii adversus febrium paroxysmos devoratur.

Fel in Oculorum affectibus haud contemnendi usus.

Extæ cum jecore, felle, incisa, & additis herba & sem. fœniculi destillantur. Liquevisum egregiè acuit.

Pingvedine plantulas & pectuscula infantulorum feminae illinire solent, contra tussim ex calida causa prognatam.

Mandibulæ ficcatae *Hechtfyßer* / in pulvere adversus

Pleuresin, Renum sabarram, Vesicæ calculum, Alba Mulierum menstrua, Secundas retentas, ex vino & aquis appropriatis bibuntur.

Cinis ad ulcera inveterata, tineas, & Melicerides Chirurgorum *Stiede Wasser* usurpatur.

Pisciculi in ventriculo ejus reperti, siccantur, & a paupercula plebe, tabe consumptis propinquantur. *Sehr Fische.*

Officulum in capite Lucii, Crucis figura, periapton singulare *Quibusdam*, adversus incantamenta, superstitionisum.

Lucius candidus.

Ein weißer Hecht/

Ante quadriennium in piscina quadam ampla baronatus Trachebergensis, repertus fuit Lucius albidus coloris, longitudine cubiti unius & semis, Ore, pinnis, notis, maculisq; per Corpus rubentibus.

Muranula Silesiaca.

Albula Silesiaca lacustris.

Albiculus lacustris.

Muranichen / ab oppidulo Marchiæ *Moryn* / ubi frequensejus captura.

Murenen /

Morenen.

Morenen.

Piscis est lacustris squamosus, ex Alburnorum genere, qui vulgò *Defetien* / quibus colore & magnitudine respondet. Halecis ferè similis, longitudine duorum palmarum, dorso latiusculo, squamulis argenteis.

Hæc cum Smyræna illa Romana nihil commune habet, nisi forsan snavitatem intellexeris. Piscis enim pelagius est, duos cubitos longè, Angvillæ aspectu proximus, sed latior, pelle lubrica, dentibus longis acutissimis in os recurvis. Sarcophagus est, & frigidioribus hyemis mensibus latet in saxis, & parit quocunq; tempore. Extra aquam longiori tempore vivit. Carne molli & pingvi, ut Angvillarum. In tanto honore à Romanis fuerunt habitæ, ut iis magno sumtu vivaria ædificarint, (autore Varrone) magno implerint, & tandem, magno aluerint. *Plinius* refert lib. 9. c. 55. Murænarum vivarium primum ex cogitasse Hirtium ante alios, cænisq; triumphalibus Cæsaris Dictatoris sexmillia numero Murænarum appendisse. Idem scribit, Hor-

tensium Oratorem Murænam adeo dilexisse ut exanimatam flevisse credatur.

Nostra verò Murænula squamosa est, lacubus quibusdam inferioris Silesiæ familiaris, veluti qui sunt ad Svibosium & ad Paradysum. Bis in anno parit.

Captura ejus fit hyeme ut plurimum sub glacie, & circa solstitium æstivum. Quamprimum extra aquam venerit, moritur.

Caro ejus candida, mollis, dulcis, snavis, ori grata, boni ac laudabilis succi, adeo ut in Piscium delitiis non postremas partes habeat.

Elixantur aqua fervente, & sale condiuntur, & cum aceto mensis inferuntur. Etiam frigidi eduntur cū aceto.

Sale conditi etiam cadis asservantur, & usus tempore elixi ex aceto eduntur.

Mustela fluviatilis.

Ῥάγος,

Mustela Bellon.

Gobius fluviatilis *Jovio.*

Lota gallica *Rondel.*

Lacertus *Eber. et Peuc.*

Ein Ohstrup/

Alstrup/

Altraup/

I i i 3

Trusche.

Trusche.

Piscis est ex Angvillarum genere, longiusculus, crassus, capitosus, pelle obscura, aliquando subflavente, maculis & punctulis innumeris ceu asteriscis nigris & lutescentibus respersa, Venter albus est. Pinna donatur senis lividis maculosis, quatuor ad branchias sitæ sunt, & quidem majores duæ ad latera, reliquæ minores in imo ventre. Duæ tandem solitariae, una Dorsi, altera ventris: utraq; à media ferè piscis parte ad Caudā perpetuè excurrentes Cauda excipit latiuscula maculis obscurè cæruleis plena. Podex in medio ferè ventre apparet. A Mento Apophyses dependent longiusculæ ternæ: binæ aliæ minutissimæ ad latus utrumq; Mandibulæ superioris, ceu vermiculi quidam visuntur.

Oculi cærulei, Iride emicante aurei coloris.

Oris rictum amplissimum Ranæ instar constituunt asperiusculæ. Lingua albet lata.

Faucibus apponitur Gula ampla, quæ recipit Ventriculum crassum, intus rugosum,

plicis acetabulisque refertum, forinsecus ad Intestini exortum appendiculæ plurimæ Lumbricorum instar hærent, cum nonnihil amplexantes. Intestinum sensim gracilescens, ad podicem ferè Avelanæ minoris magnitudine protuberat, excrementa collecta per podicem rejiciens. Hepar pallet maximum, cui jungitur Fel longiusculum, transparens & instar Smaragdi virens. Lien obscurè rubet, triquetra ferè figuræ longiusculus.

In Capite gerit ossiculum seu Lapillum duplicem Pericarum ferè, candidum, triplo majorem. Differt magnitudine & Colore.

Aufonius.

Quæq; per Illyricum, per stagna binominis Ictri, Spumarum indiciis caperis Mustelâ natantum,

In nostrum subvecta fretum: ne lata Mosellæ

Flumina tam celebri defraudarentur alumno.

Qvis te naturæ pinxit color? atra supernè

Puncta notant tergum, quâ lutea circuit Iris,

Lubrica

Lubrica cæruleus perducit ter-
gora fucus.

Corporis ad medium fartim
pingvescis: at illinc

Usq; sub extremam squalit
Cutis arida Caudam.

Nutritur limo, mucos, ligno
putrido, nec pisciculis par-
cit.

Ter in anno partum edere
Piscatores observarunt, circa
solstitium hybernium, nimi-
rum Decembri, Aprili & Au-
tumno.

Fluviatilis est, & in Viadro,
Bobero aliisq; fluviis hyeme
& æstate capitur.

Carne donatur dulci, can-
dida, palato non ingrata, quæ
minus lentoris obtinet quam
Anguillarum.

Mucus seu lentor aqua fer-
vente, vel potius Cutis detra-
hitur, dein assatur, vel elixa-
tur vino, aceto, Aromatiza-
tur Zingib. Pipere, Petroseli-
no & aliis, quibus sapor me-
lior fit, & lentor corrigitur.

Hepar pro summis deliriis
habetur. Ejus liquor calo-
re Solis vel fornacis in vitro
resolutus, adversus Oculo-

rum nebulas & maculas ma-
gnæ commendationis.

Stomachus commendatur
potu in Matricis affectibus,
Trahit mirabiliter secundas
hærentes aut relictas à partu:
tormina etiam ventris miti-
gat & aufert. Spina vino ab-
luta, siccata in pulvere, Mor-
bum Caducum, Nobilium fe-
minarum usu, expugnat.

Mustelam fluviatilem cum
Ranis aquaticis coire Quidā
crediderunt, sed contrarium
Experientia evincit.

Nasus piscis.

Σημὸς Γεση.

Platyrinchos,

Labco,

Chelon fluviatilis,

Naso, Nasutus.

Ein Nase/

Schreiber/

Nsche.

Piscat. Vratkaviensibus.

Piscis est plebejus è Leu-
ciscorū genere, Capitoni flu-
viatili non dissimilis, magni-
tudine palmorum trium aut
spithamæ unius, rotundus
ferè, squamis mediocribus.

Latera

Latera & Venter argentei sunt candoris, Dorsum ad cæruleum tendit, circa Caput subflavet. Oculi iris aurea. Pinnas habet miniati coloris sex, singulas in dorso & circa podicem, duas ad branchias, totidem in ventre medio. Cauda ejusdem coloris sinuata. A capite utrinq; per medium piscem excurrit linea fusca ad Caudam usq;. Os ejus veluti labra habere videtur. Labrum seu Rostrum superius crassum, simum, obtusius. Nares patulæ sunt. Branchiæ octo, utrinq; quatuor. Viscera tunica nigerrima involvuntur. Intestina replicantur, quibus adjacet Hepar longiusculum sine felle. Ossicula tenuissima circularia crenata in occipitio hærent.

Parit vere, Aprili & Martio.

In fluviis degit, Viadro, Catto & aliis.

Limo vescitur. Aprili capitur, ubi pingvior & melior est.

Caro ejus mollis, pingvis, laxa, minus grata, spinulis referta. Assa melior quam elixa. Vilis & neglectus piscis.

Perca major.

πέσκη & περκαίνα, id est variari. περκαίνα.

Perca quasi parca per & ὑψί-φρασις quod minimè parcat: vel quasi porca, à spinis quibus in Dorso instar setarum Suillarum muniuntur.

Ein Perfke/

Beerfing/

Beerfich/

Pars/

Egle.

Piscis & amni & lacui communis, toto Corpore squamosus & argenteus, virgulis, lineisq; subrubentibus varius. Branchias habet utrinq; quaternas easq; duplices, novissima excepta. Ventriculus amplior longiusculus, sub cuius medio enascitur Intestinum, tribus apophysis donatum, inter quas hæret vesicula fellis, instar appendicis longiuscula. Podex in medio ferè est Corpore. In dorso impares eminent aculei, tenui inter se membrana juncti, Pinnæ rubent.

Ιχθυοφάγος est, omnis generis pisciculis nutritur, nec sui generis parcat, & Astacos aggreditur. Aliquando in e-

jus

jus ventre integer repertus fuit.

Vere & Autumno parit in profundis gurgitibus. In partu continentem emittit foetum suum, eo quo Ranæ modo. Adeo enim foetus ipse continuo filo sibi cohæret, ut eum piscatores interdum ex arundinetis colligant.

Omni tempore in cibum recipiuntur. Meliores sunt Augusto & Septembri. Præferuntur fluviatiles.

Differunt ætate. Primo anno Horni, Hürlinge quasi Heuerlinge. Secundo anno Stichelinge/ id est spinosi, ab aculeis in dorso binis seu ternis: Terrio anno Eseln/ id est Perculæ: Quarto Rhelinge/ Percæ perfecti.

Perca maximus, Ein grosser Heubi Perske.

Perca truncalis, Ein Stockpersing/ à truncis in quibus occultatur.

Perca torquatus, à circulo qui ipsum ambit albo, Ein Ringel Persing.

Perca fluviatilis Ein Flus Persing.

Perca lacustris Ein See Persing.

Alimentum Perca gignit saluberrimum, & quod con-

coctu facile est.

Caro ejus duriuscula, friabilis, svaavis, laudabilis succi, Langventibus, ægris, febricitantibus, puerperis & vulneratis salubris.

De quo Ausonius cecinit.

Nec te delicias mensarum Perca filebo,

Amnigenos inter Pisces dignande marinis.

Solus puniceis facilis contendere Mullis,

Namque & gustus iners, solidæque in Corpore partes Segmentis coeunt, sed dissociantur aristis.

Præparatur ad cibum ut cæteri saxatiles.

Jus ex Percis alvum emollit.

Coercent carcinomata Percarum salforum capita.

Lapillos binos & rotundos Perca in capite fert, juxta spinæ Dorfi initium, qui contra Calculum laudantur.

Perca rotundus.

Perca fluviatilis minor.

Cernua fluviatilis Bellon.

Aurata fluviatilis Træg.

μελανοῦρος Eb. & Penc.

Ein Kaulpersich/

K κ κ Kaulbars/

Kaulbars/
Goldfisch/

Piscis fluviatilis Percæ cognatus, sed varius, notis plurimis aureis insignis, Trutæ non absimilis.

Caudam habet nigris lineis distinctam.

Passim in fluviis capitur.

Perca minor ὤχουλος est, & ori gratus, Majorem antecellit. Lapillos gerit in capite candidos, longiusculos, planos, seminis Lini magnitudine, altera parte quasi dentatos, proportionem tamen piscis. Kaulpersing stein.

Ad Calculum amovendum efficax medela. Cordialibus etiam medicinis & dentifriciis miscetur.

Pacilias.

ποικιλίας id est varius.

γάλεος ποικίλος Eb. & Peuc.
Cobitis varius.

Mustela fossilis seu varia
Agric.

Ein Weisfcher.

Schlambelsther/
Pfulfisch/

Schachsfeger/
Polnische Gründel.

Vilis & contemptus est piscis, lubricus, spithamalis ferè longitudinis, Cobioni fluviatili similis, at major & colore varius. Dorsum cinereum plurimis notis & maculis transversim pingitur. Ad latera utrinq; lineæ candidiusculæ & obscurè rubentes porriguntur.

Venter albicat, maculis & punctis flaventibus conspersus. Branchiæ utrinq; quaternæ. Ab ore cirri seu carneæ particulae instar barbæ eminent, quas nando extendit, extra aquam contrahit. Pinnis donatur ut Cobites senis, Ventriculo longior, Intestino similis.

Lutosus & cænosis aquarum locis vitam agit, copiosus in Viadro, aliquando latrinarum sordes sectatur.

Longo tempore asservantur vivi, aqua simplici in vitro angustî orificiî inclusi.

A tenuioribus, & Polonis maximè mensis adhibentur.

Malî

Mali odoris sunt ut plurimum, limbumque sentiunt: insuaves & mucosi. Suecum gignunt pravam, lentum & viscidum, utpote qui improbo & impuro utantur alimento.

Priusquam elixentur, probe purgandi & sale abluendi: deinde liqvamine acidiusculo nigro perfunduntur.

Rubellio.

Ερυθρόφθαλμος
Erythrinus *Peuc.*
Rubellus,
Rubiculus.
Rutilus,

ΜοττΑγε/
Μοττελε.
Μόσσην.

Latiusculus est, Albulis similis, squamis argenteis nitens. Dorsum purpurascit, ventre pallido. Oculorum circulus miniatus pupillam cingit nigram. Os rubet. Pinnae inferiores & Cauda Cinnabrium imitantur colore,

Marem non reperiri varium est credere.

Piscis cuiusvis notus, fluvio-

rum, lacuum & piscinarum incola.

Palato non ingratus, praesertim si pingvis fuerit. Caro mollis, spinis referta; ob id minoris aestimationis.

Salmo.

Σάλαγγξ,

Elox,

Esox *Peuc.*

Salmo á saltando, quod saltet citra montes,

Ein Lachs/

Salm/

Ein Salm/Majo, Helve-
Lachs/ Autumno. *Stik.*

Maximæ nobilitatis & gratiæ apud Silesios piscis, grandis, squamosus. Dorsum purpurascit obscurius, supinum, ad latera dilutius & savius cum splendore, punctis nigricantibus passim conspersum. Venter totus albus. Branchiæ quaternæ utrinque coloris sanguinei,

Pinnae visuntur in dorso quatuor, quinæ in ventre. Oris rictus parvus. Lingua alba ossea spinosa, Oculi Iris subrubra pupillam claudit nigram.

Κ κ κ 2

Anadromus

Anadromus est. Viadrum subit ē Mari Pomeranico, in quo melior & præstantior redditur. Virus enim illud marinum exuit. Cujus aqua semel gustata, vix in Mare regreditur. Autumno parit in fluviis, fætus tandem Mare repetit, & in eo adolescit: ex quo dein iterum fluviis ascendit. Vere plerunq; capitur, Circa Beutenam, Glogoviam, Steinam & Vratislaviam, tunc & melior. Autumno pejor est & vilescit.

Caro ejus rubet, plana, pingvis, Ori grata, & Stomacho idonea.

Flatus gignit & succum crassiolem, ac difficulter concoquitur. Cū probè confecta fuerit, copiosè nutrit.

De Salmone Ausonius in Mosella.

Necte puniceo rutilantem viscere Salmo
Transferim, latæ cujus vaga verbera Caudæ,
Gurgite de medio, summas referuntur in undas,
Occultus placido cūm proditur æqvore pulsus.
Tu loricato squamosus pectore frontem

Lubricus, & dubiæ facturus fercula cænæ,
Tempora longarum fers incorrupte morarum,
Præsignis maculis Capitis: cui prodiga nutat
Alvus, opimatoq; fluens Abdomine venter.

Recens svavis est, & ori gratus, salitus multum de bonitate amittit: fumo induratus saporis ingrati, difficilis concoctionis, & pravi succi.

Silurus.

Σίλουρος ἁ σείω & δουρά ἁ movendo caudam.

Αἰλουρος Diosc.

Amia Eber. & Peuc.

Accchia Accolis Danubii.

Solaris vel Solaus, quod Soli in ripis fluminum se exponere delectetur.

Vellus,

Ein Welsch/

Wilsch/

Weller/

Salutt/

Scheide Fisch.

Piscis fluviatilis semper, ingentis magnitudinis, effigie Gobium seu potius Mustelam fluviatilem refert. Cute nigra, seu fusca & lubrica, maculis obscurè flaventibus nonnunquam

nunquam respersa. Caput prominet magnum, Os amplum, Maxillæ asperis denticulis ad retinendam prædam refertæ. Oculi minutissimi albicant pupilla nigra; juxta quos cirri ceu cornua visuntur. Ad Mentum appendices propendent. Venter totus subflavet. Pinnis donatur septem fuscis, & branchias obtinet octo, quatuor utrinque.

Hepar subminiati coloris minutum, dulcissimum ac delicatum, Ventriculo crassiusculo adjacet. Lien sanguinei est coloris. Felle dilute cæruleo maximo.

In vastitatem ac longitudinem maximam crescit, ad decem, quatuordecim dorsantes.

Carnivorus est, & morsu petit omne animal, quod sibi obviam fit.

Parit Junio, Quovis Anni tempore in Viadro capitur hamulis, pisciculis.

Carne est pingvi, molli, lubrica, insuavi & excrementitia.

Recens in cibo nutrit, & facilem præbet alvum. Coquuntur vino, & aromatibus seu Petroselino conditur, ut Angvilla & Mustela fluviatilis.

Sale conditus minimum suppeditat alimenti, Arteriam expurgat, & vocem expedit.

Saliti illita Caro, aculeos & infixæ Corpori spicula extrahit.

Muria ejus incipientibus Dysenteris prodest, si in defidentium fons adjiciatur. Fluxiones siquidem ad summa Cutis elicit.

Ischiadicis medetur.

Spinachia.

Centrissus,

Pisciculus aculeatus *Gesn.*

Pisciculus pungitivus *Albert.*

Columbus fluviatilis aculeatus, an perculus bimus?

Ein Stichling/

Sticherling/

Scharffling/

StachelFisch/

Wolff.

Pisciculus vilissimus, aculeis in Dorso munitus, e genere Percarum, Percæ minori similis.

In torrentibus degit putridis. In Viadro etiam capitur.

Sapore minus placet, propter aquas cœnoscas, in quibus victitat. Ob id à piscatoribus

K k k 3 tanquam

tanquam inutilis negligitur,

Squalus major.

Κέφαλος,
Squalus Plin. Bellonio.
Capito fluviatilis major.
Ein Matt/
Alte/
Elte/
Alande/
Dübel/
Meuser.

Piscis est coloris albidī, argenteis squamis latiusculis decoratus. Capite & Ore magnis pinnis rubentibus, quarum extremitates livent. Ad Cyprini magnitudinem excrefcit.

Desquamatus aureus apparet.

In fluviis passim occurrit.

Optimus est Septembri & Vere; neglectus ob spinularum copiam.

Carne est molli, sapore pingvi minús svari,

Præfertur craticula assus.

Stomacho infestus creditur, nec boni succi, secundum tritum illud.

Man foche oder brate den
Dübel/

So schmecket er allzeit vbel.

De hoc ita cecinit
Ausonius.

Squameus herbosas Capito
interlucet arenas,
Viscere præteneris fartim
congestus aristas:
Nec duraturus post bina tri-
horā mensis.

Squalus minor.

Λέκισκος Ed. Walton.
Alburnus Eber. & Peuc.
Capito fluviatilis minor.

Ein Häseling/
Hefling/
Häsele/
Weis Fisch/
Schnott Fisch.

Squalo majori usq; quaq; adeo similis, nisi quod minor, colore paulo candidiore, & capite minore. Dorsum fuscum. Pinnæ superiores & Cauda ad caeruleum vergunt, inferiores in ventre subrubent.

Angustior, crassior & longior est Albiculo, vulgò Dese, lte dicto.

Fluviatilis est & passim notus. Mollis est, saporis boni & svari, sed Squalo majore acutioris.

Thryssa

Thryssa.

Ἰθυσσα,

Alofa fluviatilis.

Ein Zerte/quasi Zart.

Piscis oblongus, major Capitone fluviatili cæruleo, argentei candoris, parvis squamulis intectus, cujus Dorsum nonnihil purpurascit, Pinnæ cæuleæ, Oculi flavent ut Aurum.

In Viadro, & fluvio á Svidnicensibus denominato das Schweidnische Wasser/ capitur.

Optimus est & boni saporis, maximè si fuerit assus,

Thymallus.

ἀλγος ἑβ. & Ρευ.

Umbra fluviatilis,

Thymus Ael. Temelus.

Aschia.

Ein Asche/

Esche/

Iserr/

Tithymili Nonnulli.

Piscis spectatu dignissimus, squamis durissimis argentei coloris tectus, ad latera juxta Caudam Aeris rubedine splendet, & Pinnis donatur subcæruleis, notis rubentibus maculatis, Fel Hepati ann-

ctitur vesicula rotunda, coloris ex cæruleo nigricantis, Lien sanguineus. Ventriculus longior crassiorq; rugosus intus, foris candidus, Cartilaginis instar durus, appendiculis plurimis ceu lumbricis donatus.

Verè saxatilis est, & non nisi rivulorum limpidissimorum ex montibus defluentium incola.

Vescitur gryllis aquaticis, Muscis, lumbricis & similibus insectis. Parit Majo.

Carnem habet candidam & durissimam, planam, valde friabilem, lentoris expertem; difficilem ad corrumpendum, ad excernendum autem mediocrem; præterea Ori gratam, Stomacho idoneam, & boni succi.

Axungia Thymalli, Aschen-Schmalz liqvata Sole, & Melli permixta, Oculis claritatem affert. Rubedinem, maculas, ungves abstergit: item Aurium affectibus medetur, ut vermibus, sordibus, fluxionibus. Ambusta ex igni & aqua sanat. Foveas post variolas relictas explet illita.

Tinca,

Tinca.

Σκόπι & Eber. & Peuc.

τύλωρ,

Merula lacustris.

Tenchæ.

Etn Schleye / á lubricitate
vel muco.

Ténche.

Piscis latiusculus, squamulosus, tactu lubricus, mucosus, ad nigredinem tendens, pinis cœruleis. Celeriter ad justam magnitudinem accrescit. Quod facile fieri potest, cum muco & sordibus vescatur, in iisq; locis degit, quæ harum copiam permagnam suppeditant.

Piscinis, lacubus & fluviis quibusdam limosis. Parit vere & æstate, cum Triticum floret.

Vilis & neglectus, improbi succi & glutinosi, ægrè conficitur. Pauperum & bajulorum cibus.

Vulgi solatia Tenchæ.

Excrementitius & totus lutosus.

Ejus esô facile gignit febres.

Corrigitur aceto & aromatibus.

Tinca umbilico imposita Ictericam sanat vulgi experimento. Plantis pedum per

medium secta supposita, in peste venenum divertit, nec non calorem febrilem.

Fel Aurium affectibus, fluxibus, & vermibus efficax medela.

Tinca atricoloris.

Etn Kosschwargē Schleye.

Atro colore Tinca, in piscina baronatus Trachebergensis ante quinque annos reperta fuit.

Tincas ex limo sponte nasci Quidam scripto prodiderunt.

Trutta.

Χρυσόφρυξ Eber. & Peuc.

Aurata Eid.

Variola,

Variolus,

Vario.

Lucius maculatus Quibusdam.

Trutta, Trotta quasi trusilis á trudendo.

Eine Sohre / q. varius, á punctorum varietate.

Forelle / quasi Variolus, Forinne.

Varius admodum est Piscis, squamulis minutissimis tectus, Purpureis seu rubentibus guttis sive maculis totum Corpus pingentibus, Carne intus rubra,

rubra, quemadmodum in Salmone, Lingva ossea & spinosa. Ventriculus longiusculus, cui parte inferiore & Intestino, appendices longiores adnascuntur, quarum superiores Ventriculum attingunt.

Aqvas desiderat Montium limpidas & frigidissimas: tepidiores & lutosas seu turbulentas fugit. Sursum contra aquam semper movetur,

Carnivora est, Muscis, Vermiculis, hirudinibus, Ranis & pisciculis vescitur. Extra aquam citissime expirat.

Piscis gustu suavissimus & ori gratus, Carne friabili, in qua parum lentoris & pinguedinis inest, unde alimentum ex eo sumitur Corporibus alendis saluberrimum, & Aëris commodum.

Pingvedo Mariscis & Anis fissuris utiliter illinitur,

Plures differentiae observantur,

*Truta lacustris
nigricans.*

Schwarze Föhre.

Hæc nigricat exterius, carne albida & subrubra.

In lacu minore ad Gigan-

taum montem gignitur, & sæpenumeró maximæ capiuntur.

Optimi saporis.

Truta Salmonata.

Salar, Aurata χρυσόψυς.

Salmanculus,

Salmo parvus.

Truta magna rubea.

Eine Lachs Föhre/

Gold Föhre/

Selmling/

Grund Föhre/

Truta est major fluviatilis, maculis rubentibus picta, Carne veluti Salmonum suaviter rubente.

Ex his in Mare decurrentibus Salmones nasci, vulgus opinatur. In Bobero, Zaco, Qvado & aliis Montium fluviiis aliquando capitur.

Omni tempore bona est & savis: sed præstat Majo.

Caro elixa rubet, ut Salmonum savis & grata, succi laudabilis, & facilius quam Salmonis digeritur.

Truta Piscinaria.

Ein Teich Föhre/

A Nobilibus sæpè Trutæ in piscinis veluti Cyprini aluntur, cæteris similes: at bonitate longè inferiores,

L I I

Sunt

Sunt præterea Trutæ aliæ lucidiore, quæ passim in Montium rivulis stabulantur, Weisse Föhren.

Quædam semper parvæ manent; aliæ longitudinem Cubiti unius & dimidii acquirunt; sed rariores.

Pisces marini aliunde in Silesiam de-
vecti.

Asellus.

Ὠρίκος.

Ὠρί, Gal.

Merlucius, quasi Maris Lucius,

Salpa, Peuc.

Asellus, à colore cinereo Asinorum.

*Ein Meer Esel/
Stoek Fisch/ sil.*

Piscis est pelagius, cubitali longitudine, aliquando major, Dorsò cinereo, ventre candido & argenteo, Cauda quadrata, Capite prominente & depresso. Oculis magnis & magna Oris fissura.

Voracissimus est, omnis generis Pisces depascitur. Latet æstate, longo tempore. Gregatim vivit.

Asellorum magna captura fit in Anglia, Scotia, aliisque locis; ex quibus per totam Europam sale condito & exiccati convehuntur.

Optimi censentur, qui in Mari puro degunt.

Non nisi ferula verberati, & aqua probè macerati coqui possunt.

Caro ejus sec. Galenum, candida, mollis, ori grata, sed non æquè ac saxatiliū friabilis.

Exiccati duriores sunt, & difficulter à Ventriculo concoquuntur, imbecillibus ac delicatis minùs commodi.

Elixantur aqua ut mollescant, dein affuso lactis flore, butyro, Cepis, Pipere, Zingibere & Croco apparantur.

Asellorum plura recensentur genera: de quibus consule *Cunradum Gesnerum* in sua *Animalium historia*: & *Gvil. Rondeletium* de Piscibus.

Buglossus.

Buglossus.

Βόγλωσσος, quod lingua magnitudine vincat.

Solea; à figura soleæ, quod solo pedis subjicitur.

Lingulaca, Varr. & Plaut. Saxaulis,

Ein Scholler

Sol Fisch/

Meer Sole/

Meer Zunge.

Piscis est planus, tenuis, longiore contractioreq; Corpore quàm Passer, pedali magnitudine vel majore in Oceano, supina parte candida, prona nigricante, in qua Oculi insunt ore incurvo sine dentibus. Branchiis donatur quatuor, Corde compresso: reliqua viscera omnia eadem habet cum Passeribus, Squamis tegitur parvis, Cauda lata, unica pinna constans.

Inter lautos cibos habetur. Caro ejus alba, firma, dura & nonnihil glutinosa; difficilis corruptionis, diutius servatur, neq; longa vectura putrescit, immò melior efficitur & salubrior.

Suavitate, alimenti copia, succi bonitate Passere præstantior est: at carne duriore solidioreq;. Bonum gignit succum, & qui sat facile excernitur.

Halecus.

Ματις, Arist.

Αλεξ Μena, Plin. Rondel.

Halec, Halecus,

Harengus, Nonn.

Arenga,

Ein Haring/

Hertg.

Piscis est marinus notissimus, ex squamosorum genere, minoribus Thryssis, & Sardinis majoribus ferè similis. Dorso cæruleo, Ventre albo & falcato, squamis acutis & tenaciùs hærentibus munitus, Aloæ modo, reliquis facile deciduis. Intestinulum ei rectum excrementis vacuum.

Vivit aqua, extra quam citissimè moritur, ob magnam branchiarum scissuram.

L 112

Gregatim

Gregatim natat, & tractus amat littoreos. Parit semel in anno circa æquinoctium autumnale.

Qvo tempore uterum fert, melior & præstantior est, ut & reliqui Pisces ferè omnes.

Ingens Halecūm vis capitur post Autumnale æquinoctiū, ad insulam Soluuc Maris Balthici, ubi sale conditi, hinc inde in Europam transvehuntur.

Carne sunt media, pingvi & molli, saporis non ingrati.

Meliores sunt recentes, & suaviores salitis & fumo induratis, & quidem sartagine coctæ, quàm elixæ.

Duo ejus genera: Majus & Minus: item alii qui ex Dania vulgò *Sundische*/alii ex Belgio *Stemische*/à Mercato-ribus nominantur.

Halecus muriaus.

Haringa muriata,

Halecconditane.

Eingesatzener Haring/

Rostiger Haring.

Minus suaves sunt recentibus, & difficilioris concoctionis.

A pauperibus, Agricolis & bajulis crudi cum pane eduntur, quos probè nutriunt,

Alii per dies aliquot prius aqua macerant, dein vel in craticula super carbones ignitos torrent; vel elixant, & cum brodio ex Cepis & butyro perfusos mensis inferunt.

Haleces muriatos crudos Nonnulli Pedibus Podagra infestatis imponunt, non infelici successu, præsertim si ortum habuerit ex pituita crassa seu congelata. Crassum enim vel glutinosum humorem incidunt & attenuant, ac sua siccitate absumunt: congelatum verò dissolvunt, & dissolutum discutiunt. Cum felle taurino umbilico illiti, alvum solvunt.

Jus etiam eorum sumtum alvum solvit.

Intestina numero novem pulver. ex vino pota, urinam retentam elicere valent.

Capita aliquot filo alligata & straminibus lectorum, imposita Cimices abigere ferunt.

Muria Halecūm.

Salimuria,

Fischlæcke/

Haringlæcke oder Sülse.

Jus salsum seu salugo, in qua Haleces asservantur.

Acris est, incidit, attenuat, abstergit, extrahit, siccit, dissolvit,

solvit, discutit, alvum subducit.

Ex Melle cum Halecum cinere strumas dissipat, & ad Anginas valet.

Ulceras sordida, putrida & foetida cum Oris tum Intestinatorum abstergit. Thymos sanat, & mor sui Canis rabidi medetur.

Halecus passus.

Halecus fumo correctus.

Harengus passus & infumatus,

Harengus niger,

Ruscupa,

Ruburnus fortè à rubente obfimum colore.

Ein Wüschling/

Wüschling.

Cæteris peiores sunt, difficilis concoctionis, & pravi succi. Frequens enim ejus esus biliosos & adustos gignit humores, & sanguinem depravat.

Super craticula tosti butyro illiniuntur, & cum acetariis eduntur.

Passer.

Πλάτεις,

Plagitia,

Passa,

Passer à colore Passerum

Avium.

Πλάτεις, tanquam πλατεις.

Halbfisch/

Piscis è genere planorum, Rhombo figura similis, sed contractior, Lingulaca latior, supina parte albicat, prona fuscus est & terrei coloris, instar Passerum Avium.

Pinnæ totum ferè Corpus ambiunt. Cauda in unicam latamq; definit.

Stagna subit & fluvios, delectatur aqua dulci.

In Oceano horum maxima est copia. Exiccati Antverpia in Germaniam & vicinas regiones devehuntur.

Passeres marini minùs humida molliq; sunt carne, quæ qui in stagnis vixerunt. Molliores sunt & ferè insipidi in dulcibus aquis educati.

Aqua præmacerati elixantur, & Cepis, Petroselino, butyro & sale condiuntur.

Passer minor.

Quadratus Gesn.

Passer.

Kleine Plätzlin.

Magis est quadrata forma, maculasq; rufas sive subflavas plures habet.

L 113

Carne

Carne est candida, molli, valde humida.

In Oceano frequens, ubi magna copia capitur.

Raja.

Ῥατῆς,

Ῥατῆς á Rubi similitudine,

Raja ab aculeorum asperitate, á radendo.

Ein Nooch/

Nouche/

Genus est piscis plani & cartilaginei, in tergo & cauda longa spinas habentis, his similibus quæ in Rubo visuntur, Corpore tenui, & in amplissimas alas expanso.

Carnivora est, & in locis victitat cænosis, nec longé á littore.

Genitale feminae simile muliebri est. Coeunt non solum ad motus invicem partibus supinis, sed etiam tergo feminarum supinis Marium superpositis.

Mira Rajarum fecunditas, cujus causa eadé quæ in Galinis. Unicum enim ovum, aut ad summum duo, testaceum uno partu ponunt, cum

interim imperfecta quamplurima in utero gestent, quorum singula postea, ut prius absoluta fuerint, ita prius eduntur.

Plura centenis sæpé in dissectione numerantur.

Rajæ omnes sunt duræ, sicca, exuccæ, concoctu difficiles, insalubres, succi mali. Odorem ferinum & marinum quendam fetorem recipiunt, qui in diutius servatis feré evanescit: unde longa victura tenescunt & saviore efficiuntur.

Ad nos aère indurati feruntur, & ut Passeres ad cibum præparantur.

Plures numerantur differentia.

Raja levis.

Ῥατῆς ῥατῆς,

Ein glatter Nooch.

Cute est glabra, lævi, ab aculeis nuda, excepta media Dorfi linea & cauda.

Raja oculata.

Ein Spiegel Nooch.

Augen Nooch/

A specu-

A speculorum parvorum
similitudine.

Raja aspera.

Ein raucher Kooch.

Ab aculeis parvis quam-
plurimis quibus horret.

Spongia marina.

σπόγγος Diosc.

σπογγία,

Tungus marinus.

Ein Meer Schwam.

ζωόφυτον neq; animal, neq;
frutex, Corpus marinum, la-
xum, rarum ac cavernosum,
plantæ simile, quod ad se li-
quores attrahit, & eos quos
attrahit, nisi vi exprimantur,
asservat. Adhæret petris &
nutritur succo cruento. Mo-
ventur Spongiæ ab animalcu-
lis, quæ copiose in spongiis
morantur, vivunt: Cum se
petri sentiunt, & se præ metu
contrahunt, spongas simul
contrahunt. Renascuntur ex
radicibus, ut & aliæ plantæ.

Differunt inter se mollitie
duritiæq;.

πικρὰὶ λεπτότῃσι Diosc.

λεπτότατοι Wolt.

Isáγος Nonn.

Kramer Schweimme/

Feine Schweimme/

Mämlin.

Fistulas habent densas, spis-
sas, exiguas, albas: & Maris
nomine indigetantur.

Μαῦραι id est, raræ, & solu-
tæ maximæ Africanæ Plin.

Spongiæ albæ marinæ Tab.

Foramina habet multa ro-
tunda, & feminæ nomen ob-
tinent.

Bade Schweimme.

Weisse Meer Schweimme.

Addunt alii tertiam speci-
em, continentem intra se la-
pides duros, & plurimas ca-
vernas,

Optimæ juxta oras compe-
riuntur, si gurgite alto de-
mersæ sunt. Commodè enim
temperantur per altitudinem
gurgitis.

Color illotis vivisq; nigri-
cans est, candida autem cura
fiunt.

Calefaciunt imo. & sicc,
2do. gradu.

Recentes seu novæ non mo-
dò materia sunt, quæ humo-
res infundendos excipiant;
sed

sed etiam manifestè deficiant, tumores reprimunt, recentiaq; vulnera ex aqua poscave conglutinant. Nec mirum. Servatur enim in nova Spongia etiamnum ea, quam à Mari accepit, facultas modicè Corpora exiccandi.

Veteres sinus, ex decocto Melle inungunt,

Aridæ ligato ligno, si penicilli modo adigantur, occulta ulcera callosq; laxant.

Siccæ recentes & vacuæ senilia ulcera, & quæ fluxione laborant, aut cumularim exedunt, impositæ siccant, sanguinis profluvium sistunt.

Spongia usta.

Gebrandter Schwamm.

Aeris est & digerentis facultatis.

Spongia recens nova, aceto acerrimo imbuta, pice liquida circumducta, & trito bitumine, galla vel re simili conspersa, & fictili vase cremata, efficacissimum remedium ad sanguinem profluentem, sive per se insufflatus pulvis, sive aliis permixtus.

Alii aceti loco, taurino sanguine imbuunt.

Pulvis datur ex vino Dysentericis, Menstruis & internis profluviis. In Ovo forbili Hæmoptoicis, & iis qui sanguinem vomunt.

FINIS PISCI.

16 M.



LIBER



LIBER SEXTUS.

Insecta Silesiæ.

DE INSECTIS IN
GENERE.

ENTOMA, Aristot.
Insecta, Plinio.
Annulosa, Albert.
Rugosa, Alis.
Ingeleser/
Gewirme.

Insecta, Animalia sunt ex-
angvia, immensæ subtilita-
tis, sic ab incisuris dicta, quæ
nunc Cervicū loco, nunc
Pectorū atq; Alvi præcineta
membra separant, tenui qua-
dam fistula cohærentia.

Continent Hæc non san-
guinem, sed humorem alium,
qui sanguini proportionē re-
spondet, nec osseum quic-
quam discretum aut carne-
um; sed quiddam inter hæc
ipsa medium. Ergo vivunt
non tantum ut Arbores &
Plantæ, sed & spirant ut Ani-
malia, & Cor refrigerant.

*Insectorum Ortus &
Generatio.*

Oriuntur Insecta omnia
vel ex Semine: sui generis Ani-
malis per coitum, modo eo-
rum quibus est sanguis, ut Lo-
custæ, Crabrones, Vespæ, Ci-
cadæ, Aranæ, Formicæ.

alterum sine coitu, sed ver-
miculis, ut Pulices, Muscæ,
Scarabæi. Hæc quidem co-
eunt & generant, at non sui
generis Animal, sed vermi-
culos tantum; neq; ex Ani-
malibus procreantur; sed ex
putrescente humido aut sicco.

Spontè, sine marium & fe-
minarum congressu: & vel ex
Rebus:

Animath, iisq; vel:

I. *Sentientibus*, Animalium vi-
delicet:

M m m

Carne

Carne recenti, ut Termitibus.
Carnibus diu sale inveteratis, ut Barbegia & Carpæ.

Cadaveribus, ut Apes, Crabrones, Vespa &c.

Excrementis retentis
intrinsecus; In Cerebro Scorpiones: in ventre Lumbrici, Tineæ; in Vesica, Vermiculi aliquando.

extrâ, in toto, ut Comedones in infantulis: Ricini in Ovibus, Canibus, Capris & Bobus.

In parte; hirsuta, In Capite Pediculi communes & Lentes: sub Axillis & circa Pudenda, Piatole, Sylphe & Scolyx.

Glabra, Cyrenes in Manibus; Bracunculi in Cruribus & Brachiorum Musculis: Litta in lingua Canis.

Excrementis excretis, veluti ex fimo Equorum, Crabrones, Scarabæi pilularii: Mulorum, Fuci: aliorum Animalium, Vermium examina.

Vapore humidior, ab Animalium corporibus foris collecto, ut Cimices lectularii.

II. Vegerantibus, plantarum videlicet seu Stirpium.

Radicibus Angelicæ, Eru-

læ &c. Spondyli, & alii vermiculi.

Foliis virentibus Malvæ, Brassicæ, Erucae.

Frondibus, Vitis, Butyros, Cirsii: Illicis, Vermiculi rubentis coloris. Kermes dicti; Sambuci & Fraxini, Culices.

Floribus, Blattæ in Blattaria, Muscæ, Napelli in Aconitolycoctono cæruleo.

Fructibus, Vermiculi varii; sic Vermiculationem sentiunt, Poma, Pyra, Gallæ, &c.

Seminibus, Curculio, Midas.

Capitulis Dipfasi & spongiolis Rosarum, Vermiculi albicantes.

Folliculis Ulmi, sui generis bestiolæ Pfenes dictæ.

Oleribus, in Porro, Prasocuris: in Brassica, Crambides.

Arborum caudicibus & lignis, Cossi, Terebrantes.

Anima carentibus, iisque vel Aëre utpotè Rore veno.

Melleo autem Honigtau / Mel Thau / veluti Terebrantes in flosculis Arborum & Plantarum.

Salivari,

Salivari, vulgò, Buccu-
fpey/qvòd instar falivæ plan-
tis adhærescat, ut Eruca qvæ-
dam, Araheci, Muscæ, Culi-
ces, &c.

Nonnunquam etiam hy-
berno, qvoties tranquillum
Australeq; tempus diutius
consistit.

Non Aëreks : & vel

Aqvaticis, ut plurima In-
sectorum Aqvaticorum ge-
nera ex limo & putredine
nascuntur, veluti sunt, Pulex
marinus, Scolopendra mari-
na, Seta aqvatica, Scrophulæ,
Phrygana, &c.

Terrenis, ex terra Lumbrici,
Juli, Scolopendræ; ex pul-
vere terræ, Ranæ tempora-
riæ.

In Metallis & aliis Mine-
ralibus vix reperias Insecta,
cū ob nimiam siccitatem
putredini resistent. Qvòd in
Succino sæpè inveniuntur
Ranulæ, Lacerti, Muscæ, Cu-
lices, & plura alia; ea potiùs
extrinsecus accedere, dum ad-
huc fluidum est, credendum
est, qvàm ut in ipso Succino
generentur.

Insectorum Partes.

Insecta quasdam Corpo-
ris particulas manifestas &
distinctas habent, ut sunt :

Cutis omnibus, sed ad-
modum tenuis.

Integumentum aliis mol-
le, aliis durum & crustaceum.
Hinc annulosa qvædam sunt
Molliora, ut Eruca, Vermes
terreni, Hirudines: alia Duri-
ora & Crustacea, ut Locustæ,
Scarabæi, Apes.

Incisuræ sunt lineares
qvædā divisuræ, ut per qvos-
dam annulos videantur esse
commissa & distincta. Aliis
binæ, ternæ, aliis senæ & plu-
res Corpus distinguunt.

Caput habent plurima
Insecta, qvædam capite ca-
rent, ut Lumbrici terreni, A-
scarides.

Antennæ, *κεφαλαία*, id est,
Cornicula ignava Qvibus-
dam ante Oculos prætendun-
tur, ut Papilionibus, Locustis,
Harum aliæ sunt capillorum
instar tenuissimæ: aliæ læves,
aliæ hirtiusculæ: qvædam ge-
niculis seu internodiis distin-
ctæ. Lucano ob duritiem
Cornua & forcipes dicuntur.

M m m 2

Oculi

Oculi duriusculi, in omnibus ferè patent; sed nulum ex his Palpebram habet.

Lingva, proboscis, quæ & gustant & cibum recipiunt seu attrahunt, quæ vel:

mollis infirma, & intra Os Formicis, quibusdam foris prominet veluti promuscis fungosa & cava; ut ea simul gustare & cibum attrahere possint, ut Apibus.

dura & valida, Tabano, Afilo. Omnia enim quibus non in Alvo aculeus est, lingvam ejusmodi veluti arma gerunt.

Ex cæteris partibus Sensoriis nulla manifesta est. Olfactus tamen sensum Ea habere, perspicuum est. Cibum namq; sibi peculiarem, vel eminús odore sentiunt, ut Apes Mel, Sentiunt autem præcinctu ipso odoris, & nativo quodam sui Corporis spiritu qui à natura insitus est, non adventitius.

Dentes, quædam obtinent, at diversos, nec aliorum Animalium similes, ut Apum Muscarumq; genus: *Alia* Cibi conficiendi aut capiendi

admovendiq; gratia ut Scarabæi, Formicæ: *Complura* non victus tantum, sed armorum gratia possident.

Alia Dentibus carent, quæ Cibo videlicet utuntur humido.

Venter, *κῦτος Arist.* Ventris alveus, Alvus, truncus Corporis cavus ac penè rotundus.

Pectus & Dorsum inter Caput & ventrem situm habent ut in aliis.

Præcinctus, *ὑπόζωμα, διάζωμα Had. lun.* Procinctus, Interseptum medium inter os & ventrem, ubi illa refrigerantur. Huic insitus est spiritus, is quandoq; foras movetur, quandoq; verò é diverso: unde contingit nunc elevationem fieri, nunc depressionem ejusdè pelliculæ. Cum enim exit spiritus, attollitur; sicuti ingrediente deprimitur. Perinde enim Insectis hæc portio mobilis est ut in spirantibus Pulmo, in piscibus Branchiæ.

Uropygium & Caudam non habent, præter Scorpionem, inquit Plinius: idq; in causa est, quod quæ volucres sunt

sunt, tanquam navigium temone privatum in volatu agitentur, & quocunq; fors tulerit impingant.

Aculeus, κέντρον, Spiculum, Geritur aliis parte prior, aliis posteriore. Aut enim in ore aut alvo extrema aculeos habent pleraq; Insectorum; & vel intus conditos ut Apes & Vespe, vel extra prominentes, ut Scorpio. Der Stachel oder Angel. Aculeo carent Scarabæi.

Pennæ, Alæ, πτερόν, πτερίδα, Volucris Insectis præter cætera Membra, quædam membranæ siccæ annexæ sunt, quibus volant, quæ neque fissæ sunt, neque caulem habent veluti Avium pennæ.

Alæ aliis : binæ, iis scilicet quæ minora sunt, aut aculeum in prior parte gerunt πτερόν, ὁλόπτερον Totipennia, Totalia, ut Muscis, Tabænis, Culicibus.

quæternæ, utroque, scilicet latere binæ, iis quæ aut grandiora sunt, aut aculeo armantur in alveo, ut Apibus, Perlis dictis &c. quæ scilicet pabuli causâ necesse habent evagari.

detectæ, apertæ, iis quæ Avéληται vocantur, ut Muscis, Apibus, Vespiis, Crabronibus.

Crustæ integuntur tutelæ causâ, & intus quasi vaginâ inclusæ geruntur, unde κρυπτοπτερον, Vaginipennia dicuntur, ut Scarabæis.

Quædam Alas habent, sed iis ad volandum non utuntur, ut Curtilla.

Alis carent, Eruca, Centipeda, Lumbrici. Hæc pedibus gradiuntur aut rependo se movent.

Alæ rescissæ Insectis non renascuntur.

Pedes non omnia habent.

Multipeda sunt omnia, quæ pedibus fulciuntur, variè tamen pedum numerum (qui nulli impar) sortiuntur. Quæ enim Corpore sunt longiore, & plures habent incisuras, ea numero præcipue superant, ut Julorum genus, Eruca. Quibus autem Pedes pauciores, hæc volucres ferè sunt, ut pedum inopia, adjumento penarum compensetur.

Pedes priores Nonnulla ex iis longiores habent, quibus abstergent oculis incidentem molestiâ, ut Muscæ, Apes, &c.

M m m 3

quæ

quæ oculos habent duriores. Posteriores etiam mediis longiores, ut ambulent melius, & attollantur facilius de terra; cum vel avolare vel salire libet, ut locustæ, Grilli. Quæ namq; saliant, hæc vel Crura posteriora habent majora, vel gubernaculis quibusdam salui accommodatis fulciuntur retrò curvatis, ut Crura Quadripedum. Atq; iis omnibus pedes seni, nulli pauciores.

Ad Partes Interiores quod attinet, Insecta non videtur Nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pingvia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quædam Marina, nec quæ jure dicatur Cutis: sed mediæ cujusdam inter hæc omnia naturæ; Corpus arenti simile, nervo mollius, in reliquis partibus siccius veriùs quàm durius. Et hoc solum his est, nec præterea aliud nihil inter, nisi admodum paucis Intestinum implicatum. *Plinius l. 11. c. 4.*

Cordi proportionem respondens pars, inter Caput & Alvum est: quæ etsi magna ex parte simplex, tamen in nonnullis multiplex, ut Julis

& similibus prælongis, quò fit ut præcisa vivere possint.

Intestinum paucis ab ore intrà situm, directum ac simplex usque ad ostium excrementi porrigitur. In quibusdam retortum in anfractus est. Quædam ventrem ori adjunctum, Intestinumq; à ventre revolutum habent, ut quæ, cum edaciora majoraq; sint, conceptaculum Cibi obtineant copiosioris.

Membrum in feminis, quod pro Vulva habetur, fissum seu bifidum est, juxta Intestina positum, in quo fœtus generatur. Minoribus incertum propter Corporis exiguitatem.

Sanguinis loco, est Vitalis humor, simile quiddam sanguini.

Insectorum Actiones.

Insectis neq; vocis neq; Locutionis ulla facultas, sed Sonus tantum iis spiritu interiore movetur non exteriore. Nullum enim ex iis spirat, quoniam visceri interiori nexus spirabilis non inest.

(Sonus

(Sonus $\Sigma\iota\psi\omega\varsigma$. Sic Apes bombilant, bombissant, fufurrant. $\Sigma\acute{o}\nu\epsilon\omicron\varsigma$ Murmur, Sufurrus. Cicadæ canere dicuntur.)

Præterea etsi non sunt Membra seu instrumenta conspicua, quæ velut carina, sensus invehant, esse tamen His auditum, olfactum, gustum, eximia præterea Naturæ dona, solertiam, animam, artem, quis facile crediderit?

Coitus. Coeunt Insecta aversa, dein quod minus est, supervenit major, hoc est, mas feminam (inter ea enim quæ coitum exercent Insecta, feminae maxima ex parte majores suis maribus evadunt) nec Mas in feminam genitale ulum inferere membrum, more Animalium cæterorum, videtur; sed femina sursum in maris receptum, Caudæ ultimum suæ meatum quendam procedens reflectit, qui in nonnullis major, quam pro portione totius Corporis esse videtur, cum ipsa parva admodum sint.

Tardo, quæ coiverint, se junguntur digressu, diu namque copulatio eorum durat. Brevi

à Coitu pariunt, maxima sui parte quæ solent coire. Verum autem omnia faciunt, excepto quodam genere Papilionum, quod durum quiddam, simile Cartamo id est, Cnici semini producit, sed intus fluidum, *Arist. 5. hist. Anim. cap. 19.*

Motus seu incessus.

Insectorum alia: ambulant, ut Piatoli, Formicæ gradiuntur tantum, Erucae, Afelli volat, ut pennata, Apes, repunt seu serpunt, Lumbricorum genus.

faliunt seu subsultant, Grilli, pulices.

incessu $\iota\lambda\alpha\sigma\acute{\alpha}\sigma\epsilon\iota$ utuntur, ac si per limum trahi dixeris, præcedente parte priore progrediuntur, & quod reliquum est Corporis, ad illud attrahunt, ut Sangvisugæ, Vermes terreni.

Cibus.

Omne femine insectorum genus minimo alimento contentum est, & propè sibi ipsa sufficiunt, non tam Corporis exiguitate quam frigiditate. Parvis enim sufficiunt pauca. Frigida deinde sunt exagvia, proinde minus quam calida

ali

ali expetunt, nec cibaria tam facile citoq; concoquere valent.

Quædam sunt *Omnivora* id est, sine discrimine omnibus vescuntur, Apes quædā quas Lupos Albertus nominat.

Quædam multum comedūt & varia, quæ dentes habent.

Quædam parum, & humore aliquo contenta sunt, quibus aculeus, aut promuscis in ore, ut ἐκχυλίζοντα, Exugentia.

Alia Sangvivora sunt, sanguine vivunt, ut Tabani, Pulices.

Alia Venatu vivunt, ut aranei, qui Muscas, Apes &c. in cibum venantur.

Alia solo Rore & humore in cibo fruuntur, ut Apes, Cicadæ.

Nonnulla Arborum & herbarum foliis pascuntur, ut bombyces, Mori; Erucæ, Brassicæ; Scarabæi rubeoli, Rosarum, Quercus, Betulæ, aliarūq; Cātharides, Fraxini &c.

Quædam putrida prosequuntur, ut Muscæ quædam & Culices.

Quædam limo & cæno oblectantur, ut Hirudines.

Locus.

Insectorum alia sunt :

Aërea, quæ in aëre vivunt, ut volatilia & Pennata, Apes, Vespa, Cantharides, Papilio-nes.

Terrena : & vel supra terram vitam agunt, ut Formicæ : vel in ipsis visceribus, ut Lumbrici, Spondylis.

Aquaticæ quæ in aquis degunt & stabulantur, & vel in Mari, ut insecta marina, Hippocampus, Scolopendra marina, Pulex marinus : in fluviiis, Squilla fluvialis.

fontibus, Tineæ aquaticæ, cisternis.

paludibus, Hirudines.

Hyeme omnia penè conduntur, præter ea quæ vitam in domiciliis cum hominibus agunt, quæque prius intereunt, quæsi annum tempus excedant. Latent hæc hyeme, alia diutiùs, alia quàm diu algor vehemens est, ut Apes. Conduntur autem quæq; locis apricis abdita, & ubi sibi cubile constituere tutiùs solent.

Natura.

Ut perfectorum Animalium temperatura varia est, ut alia sint calidæ, frigidæ alia; quædam humidæ, quædam siccæ complexionis; similiter de Insectis judicandum arbitror.

tror. Quamvis enim Philosophus libro de Respiratione frigida omnia Annulosa asserat, forsitan collatione facta cum perfectis Animalibus, quæ sunt sanguinea, hæc verò ex sanguine: attamen si in sese considerentur, rem aliter se habere astipulante experientia, quivis facile deprehenderit.

Calidæ naturæ censentur Cantharides, Vespæ, Crabrones, Apes, Fuci, Pythiocampi, Formicæ, Pulex terrestris.

Frigida sunt, Lumbrici terreni, Aselli &c.

Noxia sunt Insectorum quædam aculeo, ut Scorpiones, Apes, Vespæ, Crabrones: quædam morfu, ut Scarabæi, Erucae, Locustæ, quædam totâ substantiâ, ut Buprestis, Cantharides &c.

Maxima certè hominum generi Mortis pericula impendent, etiam à minimis bestiolis, ab exitiosis Hominibus. Quamquam nullum sit Animantium genus, si quis propius intueri velit, cui natura salutare medicinam non indiderit, adversus ea venena quæ noxia sunt.

Vigor & interitus,

Maxima pars eo tempore valet, quo gigni solet, videlicet cum annus tepidus & humidus est. Apes, Vespæ, Crabrones rectè se habent, cum æstas calida & sicca fuerit.

Admodum fragilis est Insectorum vita adeo, ut intereant solius olei aspersione seu tactu, & quidem celerimè si Capite illito exponantur Soli, propter respirandi meatus angustissimos: quoniâ oleum intersepit & claudit iter, ita ut spiritui omnis via denegetur. Obest quoque iis liquor omnis falsus. Aceti item vapore facile enecantur.

Mors iis varia. Pereunt secundum Philosophum striatis contortisque membris, ut senectute genus majorum Animalium moritur. Quæ pennata ex iis sunt, pennis etiam convulsis, autumno ferè moriuntur.

Senectutem renovant innumera, præcipuè quæ crusta integuntur ut Silpha, Culex, Scarabæi, Cicadæ, etc. *Arist. h. a. lib. 8. cap. 17.*

N n n

Insecta

Insecta divulsa. etiam vivere possunt omnia, exceptis iis, quæ vel admodum frigeant, vel præ sua exiguitate, quamprimum refrigerentur. Diutius autem vivunt ea divulsa, quibus corpus longum pedesque multi, ut Centipedes, Lumbrici terreni, utpotè in quibus vita majoribus radicibus fixa sit. *Idem H. A. lib. 4. cap. 7.*

Finis seu usus Insectorum.

Primò Annulosa animalcula universitatis harmoniam & concentum efficiunt. Omne enim Ens quatenus ens bonum est: Nec ullum adeò exiguum seu minutum animal, in quo non eluceat Dei πολυπικίλος sapientia.

II. Aëris & Terræ impuritatem auferunt. Quia cum sit rerum omnium ortus ac interitus, certissima lege naturæ definitus; nisi è stercore vel cadaveribus, vel quavis materia putri, Insecta prodirent, foedissima contagione proxima quæque loca & Corpora viciarentur. Talium autem Insectorum ortu, foetor omnis actales eligitur, & Avium ci-

bis aut mutuò sibi pabulo inserviunt: atque ita fit, ut nec viva noceant, nec odore mortua.

III. Alimenta sunt Brutis: Quadrupedibus, Vespæ, Vulpi, Formicæ Vrsi minori.

Aviculis, Pico, Cossi & Formicæ, Hirundinibus Muscæ, Erucæ Cuculo, Culices Vespertilioni.

Piscibus, Lumbrici terreni, Xylophthori aquatici, Muscæ, Trutis, Barbatulis, Thymallus, &c.

IV. Alimenta sibi sunt mutua, ut Musca quidem sanguinem aut foedum humorem ligurit, Aranei Muscas, Gallinæ Araneos, Homo Gallinæ in Alimentum suæ naturæ congruens convertunt. Sic enim prospexit Creatoris optimi sapientia ubique conspicua, ut minimis ac vilissimis quibusque Animantibus alimenta statis temporibus largiretur.

V. Homini inserviunt, dum præbent: Cibus, ut Locustæ in Arabia & Syria, Apes Mel, ad Ciborum obsonia: Pharmaca Lumbrici terreni, Scorpiones,

piones, Hirudines, Cantharides, Formicæ & plura alia : *Vestimenta* bombyces, quæ conficiunt tela, ex quibus vestes varii generis parantur.

VI. Admirationem pariunt. In hujusmodi enim minimis Animantibus Natura ipsa majora videtur collocasse miracula, quàm in enormibus Animalibus. Araneum in texendis telis quis non admiratur? Quis Apicularum solertiam & industriam in favis construendis, & Melle conficiendo non cum admiratione contemplatur? Quis Formicarum diligentiam & indefessum laborem cum attentione non considerat? Bombycis mors & resurrectio, nobis manifestam Resurrectionis memoriam inculcant. In summa, nihil est in Animalculis, quod non sit ad docendos Homines idoneum exemplum. Hinc *Augustinus lib. 3. de Genesi ad literam, cap. 14.* Inest, inquit in omnibus his Naturæ suæ decus, sic ut in his major sit admiratio benè considerantis, & laus uberior Omnipotentis Dei artificis. Majori attentione stupemus

agilitatem Muscæ volantis, quàm magnitudinem jumentii gradientis.

VII. Sunt instrumenta, per quæ Deus gravissima sua judicia in Homines, ac totas Gentes etiam potentissimas sæpenumeró exercet. Quod præter *Plinium* utpotè prophanium scriptorem, *lib. 2. Nat. hist. cap. 29.* confirmat Sacra Scriptura, quomodo nimirum per Muscas, Locustas, Pedunculos, Bruchos, Erucas. &c. gentem potentissimam, nempe Aegyptios debellârit, & sæpè populum suum gravissimè puniverit. *Exodi 8. & 10. Psalmo 105. v. 30. Joel 1. v. 4.* Sic nostra ætate, ob peccata in Divinam Majestatem commissa, Scarabæorum, Erucarum, Locustarum infelix proventus, herbas, olera, segetes, fruges & arbores sæpè arrodere & perdere solet: veluti accidit sub annum à Redempto Orbe 1553. ubi æstate tantus Locustarum proventus, ut sata virentemq; omnem herbam morfu urdineq; vastarent.

DE INSECTIS SI-
lefiacis in specie.

Apis

Μέλιττα,
ἢ μέλισσα παρὰ τὸ μέλαρ,
vel τῆς μελέτης, ἢ meditatio-
ne, exercitio & diligentia.

Apis, Ἀπὲς, vel quod sine
pedibus nascentur: vel quod
pedibus invicem se alligent.

Musarum volucris, Varro.
Apicula, Apacula.

En Bienen! sil.

Imme.

Apis οἰκονομικὸν ζῷον καὶ
ἐπιμελὲς, Muscum est ani-
malculum, exangve, penna-
tum. Vespa ferè simile, uni-
color, subnigricans, sex pedi-
bus, quatuor alis seu pinnis &
aculeo constans, Mellis col-
ligendi causâ conditū. Cor-
pus Api longiusculum, teres,
coloris subnigricantis. Crus-
cula sena, scabra, præsertim
posteriora, quibus ceram col-
ligit, & ad alvearia ad favos
extruendos comportat. Pa-
ropsis lingua prælonga fistu-
losa, quâ gustat & cibum si-
mul attrahit. Ventriculo, u-
terculo seu vesicula donatur,
in quam congerit Mel, quod
tandem in cellulas evomit,
Aculeus ipsi datus est imma-

nissimus, partim ad tutelam
tanquam arma quibus se de-
fendat, partim ad robor Inte-
stini, cui firmiter annexus est,
adeo ut si extrahatur, Intesti-
num simul extringatur & A-
pis pereat. Excrementum e-
jus rubrum est, ἰοδαίον Græci
vocat.

Inter omnia Insectorum
Animalia principatus Apibus,
& jure præcipua admiratio,
solis ex eo genere Hominum
causâ genitis. Mella contra-
hant, succumque dulcissimum
atque subtilissimum ac saluber-
rimum, Favos confingunt &
Ceras. Illæ ad usus vitæ la-
borem tolerant, opera con-
ficiunt, Rempublicam ha-
bent, consilia privatim ac du-
ces gregatim, & quod maxi-
mè mirum sit, mores habent,
Plin. lib. 11. hist. nat. cap. 5.

Apum ortus seu ge-
neratio.

Varia de generatione A-
pum, Autorum existit sen-
tentia.

Poëte Melissam fingunt,
mulierem fuisse pulcerrimam
specie, quam Jupiter in Apem
converterit.

Aristoteles hist. anim. lib. 5. cap.
21. varias adducit hac de re
opinionēs.

opiniones; neq; ipse post longam disputationem aliquid certi affirmare auder.

Alii, inquit, existimant, per coitum agi, Maresq; esse Fucos, Feminas veró Apes: *Alii* contrá.

Quidam eas páre, attamen non coire, sed deportare foetura contendunt, nec unde portent, constat.

Nonnulli, páre & coire negant, (Apum enim coitus visus est nunquam) sed é floribus Cerinthi, Arundinis aut Oleæ deportare judicant.

Sunt, qui Fucorum foeturam comportari putant, sed Apum ortum esse á Ducibus. *Et paulo post idem.*

Σχάδωνες, hoc est soboles optimé fiunt cum mellificatur, aggerunt suis cruribus ceram (kommen Gehäset sic loquuntur Curatores Apum) atq; Erythacum, Mel ore evomunt, in cellas, tragan Honig/fatu posito incubant Avium more, segen Bruth. Exclusus inde vermiculus dum parvus est, jacet in favo obliquus; post sua ipsa facultate se erigit, cibumq; capit, & favo ita adhæret, ut retineri videatur. Schadones, dum

membranâ involvuntur, & pedes & alæ innascuntur, atq; sub ea specie, cum scilicet formæ lineamenta receperint, Nymphæ appellantur: jam neq; cibum præterea capiunt, neq; ullum alvi reddunt excrementum, sed coerciti & contracti quiescunt, nec ullo pacto se movent, usq; dum species destinata perficiatur. Et cum jam ad finem generationis venerunt, rupta quâ cinguntur membranâ, evolvant.

Idem alibi videtur colligere, é Regibus generari Apes, subdens nisi hoc esset, ratione carerent, quæ finguntur in eorum imperio. Recte enim Reges intus manent immunes ab omni negotio, quasi nati ad sobolis procreationem. Magnitudine etiam præstant, quasi ad prolem procreandam, Corpus eorum sit institutum, Fucos autem castigent.

Postremo, Apes sine coitu generari argumento est, quod foetus exiguus admodum in cellulis favi cernatur, cum insecta, quæ per coitum oriuntur, coeant diu, pariant brevi magnitudine ad speciem ver-

N n n 3 mis.

mis. Hæc Aristoteles.

Plinius lib. II. nat. hist. cap. 16. Aristotelem secutus, certum esse affirmat, Apes Gallinarum modo incubare. Id quod exclusum est, primo vermiculum videri candidum jacentem transversum, adhærentemq; ita ut pascere videatur. Regem statim mellei coloris, ut electo flore ex omni copia factum, neq; vermiculum, sed statim pennigerum. Cætera turba cum formam capere cepit, Nymphæ vocantur, ut Fuci, Sirenes ac Cephenes. Si qui alterutris capita demat, pro gratissimo sunt matribus cibo. Tempore procedente instillant cibos atq; incubant, tum maximè murmurantes, caloris ut putatur faciendi gratia necessarij excludendis pullis, donec ruptis membranis, quæ singulos cingunt, Ovorum modo universum agmen emergat. Fœtus intra 45. diem peragitur. Fit in favis quibusdam, qui vocatur Cleus, amaræ duritia Cera, cum fœtum inde non eduxere, morbo aut ignavia, aut infœcunditate naturali. Hic est abortus Apum.

Alii partim ex Apibus, par-

tim ex bubulo aut equino Corpore putrefacto, Apes nasci crediderunt. Hinc Archelaus in epigrammate ait, eas esse

Βοδὲ φθνομένῃς πεποιημένα τέκνα. Idem ἰππῶν μὲν σφῆκες γίγνται, μὲν ὅσῳ δὲ μέλισσαι. Varro, lib. 3. c. 16.

Virgilius 4. Georgic priorem modum his verbis depinxit.

Illum adeo placuisse Apibus mirabere morem,
Quod nec concubitu indulgent, nec corpora segnes
In Venerem solvunt, aut fœtus nixibus edunt.
Verum ipsæ è foliis natos & suavis herbis
Ore legunt, ipsæ Regem parvosq; Qvirites,
Sufficiunt, aulasq; & cærea regna refigunt.

Ambrosius. Apes nullo concubitu miscentur, nec libidine resolvuntur, nec partus doloribus quatiuntur, sed integritatem Corporis virginalem servantes, subito maximum filiorum examen emittunt.

Itaq; cum singularis peculiarisq; sit Apum natura, ortum quoq; earum peculiarem meritò

merito esse conjicitur.

Apum differentia.

Apes vel sunt :

Immatura seu fœtus, qui aut vermiculi, & cùm formam capere ceperunt turba communis *Nymphæ, Fuci, Sirenes, Cephænes* vocantur : aut pennigeri statim fiunt, & Regis nomen merentur,

Perfectæ, aut Regales, principes, Duces seu Reges, qui imperant,

aut *Populares*, plebejæ, quæ vel Mella colligunt & favos conficiunt, ut Apes frugi : vel Apibus inserviunt, ut Fuci.

Apum Rex.

ἡγεμὼν πρυγῶν,

Apum dux seu princeps,

Der BienenKönig

Weisfel / Siles.

Paulo major & oblongus magis quàm vulgaris Apis, alvo in extremo acutior. Carribus rectioribus ad flavedinem vergentibus, sed minus amplis; pinnis, pulcri coloris ac nitidi, *brenntlicht* / lævisq; ac sine spiculo.

Generatur in cellis, quæ in fine Cerarum, plerunq; velut papilla uberum apparent

eminentiores, & laxiores fistulæ, quàm sunt reliquæ, quibus popularis notæ pulli detinentur.

Rex, inquit *Plinius*, statim mellei coloris, ut electo flore ex omni copia factus, neque vermiculus, sed statim penniger.

Aristoteles duplicem Regem constituit, unum fulvum, rufum, qui præstantior alterum nigrum magisq; varium.

Namq; duæ Regum facies; duo corpora Gentis, Alter erit maculis auro squallentibus ardens, Et rutilis clarus squamis, insignis & ore.

Atq; hic maximè probatur. Ei forma semper egregia, & duplo cæteris major, id est, paulo longior, pennæ breviores, Crura recta, ingressus celsior, in fronte, macula diademate quodam candicans.

ille horridus alter, Cùm venit, & sicco terram, spuit ore viator, Desidia latamq; trahens inglorius alvum; Dede neci; melior vacua sine regnet in aula,

Nam

Nam deterior fordido spuito similis fœtus est, & pulverulentus. Nec unus in quovis; Examine Dux tantummodò est, sed plures: peritque Examen, si duces vel non satis habeantur (quod non tam Principis desiderio quam ortus, ut ajunt, ad quem illi necessarii sunt, incidit,) vel plures quam satis: distrahunt enim Examen, Ob id plures & potissimum improbos si animadverterint Meliturgi, ne Principum multitudo seditiones faciat in Examine, necare solent.

Foris Reges nunquam videntur aut prodeunt, vel ut pascantur, vel alia causa, nisi universa cum plebe cum migratur: & tunc ita, ut reliquæ omnes circa ipsos Principes suos glomerentur. Qui si perierint, Plebs luget, ignavo dolore, non convehunt cibos, & ni subveniatur, fame moriuntur.

Ambrosius. Apibus Rex natura claris formatur insignibus, ut magnitudine Corporis præstet & specie, tum (quod in Rege præcipuum est) morum mansuetudine. Nam etsi habet aculeum, tamen eo non utitur ad vindicandum.

Sunt enim Regis naturæ non scriptæ literis, sed impressæ moribus, ut leniores sint ad puniendum, qui maxima potestate potiuntur.

Apes frugis.

Μελιτῆραι κηρύποιαι.

Εργοφόροι, μελιτῆραι.

Apes veræ, operariæ
Bienen.

Unicolores magis sunt, quam Crabrones, Vespe, aut feræ Apes.

Apes vel sunt domesticæ, Urbanæ, mansuetæ, Bismen Bienen / quæ parentibus naturæ urbanis, quæque rustico montanoque victu educatis prodierunt, & quæ cultis locis pascuntur. Harum rursus aliæ στρογγύλαι ἢ ποικίλαι breves, variæ & in rotunditatem compactiles, coloris ad cinereum vergentis hirtiusculæ, alvo obtusiore & capite majusculo. Hæ optimæ judicantur.

aliæ sunt μακραι longiores, Crabronibus vespiisque similes quæ sunt deteriores, etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Minores illæ officiosiores majoribus sunt.

Namque aliæ turpes horrent: Elucent

Elucent aliæ, & fulgore co-
ruscant Ardentem auro, &
paribus lita Corpora guttis.

Apes sylvaticæ, sylvestres, fe-
ræ Varroni, *Heiden Bienen*/
Wald Bienen sunt, quæ in
sylvis vastis & aliis sylvestri-
bus locis Mellificia parant.
Horridiores hæ sunt aspectu,
iracundiores & minores, sed
opere ac labore præstantio-
res.

Fuci.

Κηφύρε

μελιτῶν ὁ δροφός,

Apes mares *Nonna*.

Apes ignavæ,

Apum serotinus fœtus,

Fucus á fovendo, quód A-
pum fœtus foveat : aliis á
furando, quód furtim Mella
devoret.

Threnen vulgò.

Bruth Bienen/

Wasser Bienen.

Apibus sunt similimi, sed
duplo majores, Rege crassio-
res, coloris magis fusci, ac fi-
ne aculeis. Gignuntur ab
emeritis Apibus, & seorsim
aliquando, magna ex parte
favis Apum inseruntur, locu-
lis ipsorum amplioribus & al-

tioribus. Fœtus ipsorum, ut
Apum, candidus est, ex quo
sunt vermiculi, ex his Nym-
phæ, quas alii proprio nomi-
ne Seirenes vocant, quód in-
tra membranam contracti &
curvati jaceant.

Veris Apibus inserviunt,
vel ad procreationem sobo-
lis, ut Scriptores tradunt, quód
seminibus infideant, quibus
Apes figurantur. Cúm enim
cætera turba labori dedita in
Mellificio occupatur, Fuci in-
terim intra alvearia incubant,
suo calore fœtum foventes
& accelerantes. Ob id vide-
mus Apes operarias post Jaco-
bi festivitatem, cúm ampliús
non fœtificant, eos abigere &
expellere, utpoté eorum ope-
ra non ulterius indigentes.
Multæ singulos aggressæ tru-
cidant.

agmine facto

Ignavum Fucos pecus á præ-
sepibus arcent.

vel ut æstate aquam appor-
tent.

Sunt, qui & per se fingere
favos eodem in alveo, & cum
Apibus negotium conficiendi
favos partiri dicant; verúm
mellificandi nullam habere
facultatem, sed vesci tum
Eos, tum eorum pullos mel-

O o o le, quod

le, qvod Apes fecerint.

Manent magna temporis parte intus, cumq; exeunt, offerunt sese fufius in sublime, gyroq; volitant, & qvafi exercitum faciunt (inprimis cum jam Examina egredi moliantur) qvod ubi fatis jam fecerint, redeunt domũ, & epulis perfruuntur.

Apes fures.

ὄγῃς, Arist.

φωγίαι, Hesiod.

Maub Dienen/

Heer Dienen.

Apum genus est nigrũ, alvo ampliõre, paulõ minus fucis. Ignavæ sunt, nec qvicqvam operantur, sed cæteris, qvibus cum vivunt, injuriam faciunt, & alienos favos, si latuerint, subeunt: sæpe integra Alvearia depopulantur; nisi maturẽ represlæ vel igne cõbustæ fuerint. Adeõ in satietatem replentur, ut interdum vix qveant volare, sed ante alveum volutentur.

Apiarium.

Μελιτοτροφῶν,

Alvearium,

Mellarium,

Apum statio.

Apum castra,

Ein Biengarte.

Stationes ac pastiones Apum constituendæ, ut in tuto secretõqve Alvearia sint, maximẽ conversæ ad hybernum atq; vernum Solis exortum, loco neq; calido, neqve frigido nimis, utroq; enim offenduntur; sed temperato, ut & hyeme atq; æstate temperatẽ incallescant, & auræ salubritas Apes recreet. Procul à cætu ac tumultu tam pecudum qvàm hominum:

Qvo neq; sit ventis aditus, (nam pabula venti Ferre domum prohibent) nec oves, hædiq; petulci Floribus insultent, aut errans bucua campo Decutiat rorem, & surgentes atterat herbas.

Gaudent enim maximẽ quiete & hominum conspectum ægrẽ ferunt.

Absint & noxia Animantia, Rubetæ, Lacerti, Serpentes, Crabrones, &c.

Sedes

Sedes etiam in valle potius quàm editiore loco, sed ubi non resulet Echo, sono reciprocante Apibus inimica. Nam hinc expeditius evolant vacuæ ad altiora, & onustæ non ægrè devolant.

Si villæ situs ita patiat, commodè ædificio jungi Apiarium, & maceria cingi potest, sed ea parte, quæ à tetriss latrinæ sterquiliniis & balneis, tetrissq; libera sit odoribus.

Maximè expedit, ut sub oculis Domini constituatur, cujus interventu tutius custodiatur.

Ubicunq; fuerint Alvearia, quoniam accessum odeant, non editissimo claudantur sepimento. Quod si prædonum metu sublimius placuerit, tribus elatis ab humo pedibus, exiguis in orbem fenestellis Apibus sit pervium, aut raris lapidibus, quò ipsæ per cavernas involent, & aves ac rorem effugiant.

Jungatur Tugurium, quo & Custodes habitent, & condatur instrumentum, sitq; repletum maximè alveis ad usum novorum Examinum,

nec minùs herbis salutaribus, & si quæ sint alia, quibus Apes delectentur; & quæ languentes requirant, juxta Poëtæ consilium :

Palmaq; vestibulum, aut ingens Oleaster obumbret,
Ut, cum prima novi ducent
Examina Reges
Vere suo, ludetq; favis emissa
juventus,
Vicina invitet decedere ripa
calori,
Obviaq; hospitiis teneat frondentibus arbos.

Adsit, si fieri potest, Aqva perennis & pura, vel extructo canali deducatur è puteo. Nam sine aqva, neq; Mel, neq; favi, nec deniq; pulli figurari possunt : unde subdit Poëta :

Et liqvidi fontes, & stagna
virentia musco
Adsint, & tenuis fugiens per
gramina rivus.

Et mox :

In medium seu stabit iners,
seu profluet amnis,
Transversas Salices & grandia conjice saxa,

O o o 2

Pontibus

Pontibus ut crebris possint
subsistere.

In ambitu hospitii Arbu-
sculæ parvi incrementi, &
frutices herbæq; conferan-
tur, cum propter salubrita-
tem tum propter utilitatem,
maximè dulces & sva-vis o-
doris.

Alvearia.

Μελιτῶν κυψέλαι

Σμυνοί Arist.

Σμύνεα Dioscor.

Σίμελα.

Alvi, Alvei, á Mellis ali-
monia.

Apum tuguriola.

Wienstöckel sil.

Beuten vulgò.

Wienen Henslin

Yminen Körbe.

Apum sunt domicilia, quæ
variant, & diversis modis
conficiuntur, pro regionum,
locorumque consuetudine &
oportunitate.

Alia sunt: *immobilia*, ut Ar-
bores naturâ concavæ, in
quas sæpè Examina migrant
ut Tiliæ, Quercus & aliæ: vel
studio & industria Hominum
excavantur, veluti plurima
in vastis sylvis Pinastri Sile-
siæ inferioris visuntur,

Mobilia, aut: *Straminea* sunt,
é stipula viminibus contexta,
opere textorio facta. sesqui-
pede aut pedibus duobus in
rotundum latis, ac totidem
aut ampliùs pro frequentia
Examinis alta, veluti in Al-
satia, Helvetia, & alibi ha-
bentur.

Lignea rotunda, teretia fre-
quentissimè in Silesia nostra
vicinisq; locis, ex Arborum
truncis, veluti Tiliæ, Pina-
stri, Piceæ, Salicis, Populi ni-
græ, Alni, &c. cubitorum ij. f.
altitudine á Meliturgis paran-
tur. *Foramina*, quibus exitus
& introitus datur, sint angu-
stissima, ut solùm unius Apis
Capiant transitum, partim ut
quàm minimum frigoris ad-
mittant, partim ne Stelliones,
Lacerti, Scarabæi, Papilio-
nes lucifugæ, & reliquæ no-
xiæ bestię per laxiora for-
amina in favos populentur. U-
tile igitur pro frequentia Exa-
minum, duos aut tres aditus
in eodem operculo inter se
distantes fieri. Sint ex latere
opercula longa, ut tempore
vindemiarum possint com-
modè auferri. Forinsecus
bubulo stercore oblinuntur:
minùs enim sic computresce-
re Florentinus tradit.

Collo-

Collocantur super lapides, seu in suggestu lapideo aut ligneo, qui extendatur pertotum Apiarium, in tres pedes altitudinis, totidemque crassitudinis, isque sic extructus, & diligenter opere tectorio lævigatus sit, ne ascensus Lacertis aut Anguibz, aliisve noxiis Animalibus præbeatur.

Ora Cavearum, quæ præbent Apibus vestibula, proniora sint quam terga, ne influant imbres, & si fortè tamen ingressi fuerint, non immoretur, sed per aditum effluant: propter quod Alvearia porticibus seu tegmine supermuniri convenit, quo frigora & pluviae arceantur, umbraque æstus contemperet seu infringat. Cum verò hyems generi huic sit noxia, ad hybernium orientem obversa collocari debent, ut apricum habeant egressum, & sint exporrectiores.

Apum pabulum.

Apes non alio cibo utuntur quam dulci: ob id si naturale pabulum deficit, Dominum oportet serere ejusmodi plantas, quas maximè se-

quuntur Apes, quales sunt, quæ flores calyculatos producant, item quæ dulces, & suaves sunt odoris, veluti sunt.

Inter Arbores, Abies, Amygdalus, Cedrus, Cerasus, Ilex, Lentiscus, Malus, Perficus, Picea, Pinaster, Pyrus, Salix latifolia, Tilia, Ziziphus &c.

Frutices Amellus, Crespinus, Cytisus utilissima. Etenim post Æquinoctium verum florere incipit, & permanet ad alterum æquinoctium autumnale, Frangula, Cœnista, Ledum Silesiacum inde vulgò Winheide nuncupatur, Ribesium, Rosæ sylvestres.

Herbæ, quibus Apes delectantur, sunt, Acanthus, Amaranthus, Antirrhinum, Apium, Artemisia, Azarum, Asphodelus, Borrago, cujus floribus mirè delectatur, Brassica, Buglossum, Carvi, Cnicus, Crocus, Erica, Ervilia, Fabæ, Hyacinthi, Hyssopus, Genista, Hepatica aurea, Majorana, Medica, Melissa vulgaris, Melissophyllum, Melilotus Italica, vulgaris, Myrrhis, Lilium candidum, Narcissus, Nardus, Origanum, Pastinaca, Plantago, Petasites, Rapistrum, Rosmarinus, O o o 3 Salvia,

Salvia, Satureja, Serpyllum, Sinapi, Trifolium album vulgare, Thymus, Thymbra, Triticum faginum, Tunica, Viola Martia. His & similibus Apes insidere solent, quarum flores summopere appetunt.

Cum verò non omnis tempestas patiat exire longius, præparandus interdum cibus, ne tum solo Melle cogantur vivere, aut relinquere exinanitos alveos. Alii aquam mulsam in vasculis proponunt, lanam purpuream addentes, per quam sugant, ne potu nimio impleantur aut ne incidant in aquam. Alii Ficum aridam, vel contusum vel aqua madefactam, vel defrutum, vel uvam passam cum pinsuerint, affundunt sapa, atque eo factas offas apponunt, idque tempestate & hyeme, cum procedere non possunt ad pabulum.

Cibi pars quoque potio. Aquam Apes libentissime hauriunt, quæ sinceri clarissimi; fontes scaturiunt seu quæ per asperos calculos defluat, incorrupta ac minimè turbida.

Apum opere.

Venturæ memores hyemis, æstate laborem,

Experiantur.

Omnibus una quies operum, labor omnibus unus.

Sunt foris & intus officia divisa. Operantur intra sexaginta passus, & subinde floribus in propinquo consumptis, speculatores ad pabula ulteriora mittunt. Nam ad opera provolantes gregatim, aliæ flores aggerunt pedibus, aliæ aquam ore, guttasque totius Corporis lanugine important ad cellas. Adolescentes ad opera provolantes convehunt. Seniores intus operantur. Quæ flores comportant, prioribus pedibus fœmina onerant, propter id naturâ scabra. Pedes priores, Rostro, totaque onusta remeant sarcina incurvæ; excipiunt eas ternæ vel quaternæ, atque exonerant. Intus aliæ struunt aliæ poliunt favos & dirigunt, aliæ cibum præparant ex eo, quod allatum est. Nul- lum his tempus certum conferturque est, quo operari incipiant: sed si cibariis non carent, beneque degunt, æstivo potissimum tempore opus aggrediuntur, nullusque, cum per cælum licuit, perit dies. De quibus *Poeta* canit.

Namque

Namq; aliæ victu invigilant,
 & foedere pacto
 Exercentur agris, pars inter
 septa domorum,
 Narcissi lachrymam, & len-
 tum de cortice gluten,
 Prima favis ponunt funda-
 mina : deinde tenaces
 Suspendunt Ceras, aliæ spem
 gentis adultos
 Educunt foetus, aliæ purissima
 Mella
 Stipant, & liquido distendunt
 nectare cellas.
 Sunt quibus ad portas cecidit
 custodia forse
 Inq; vicē specularunt aquas,
 & nubila cœli,
 Aut onera accipiunt venien-
 tum, aut agmine facto,
 Ignavum fucos pecus à præse-
 pibus arcent :
 Fervet opus redolentq; thy-
 mo fragrantia Mella.
 Et mox ! Grandævis oppida
 curæ
 Et munire favos, & Dædala
 fingere tecta.

Apes cum alveum recepe-
 rint mundum, primū favos
 construunt, ceram fingunt
 hoc est domus cellasq; faci-
 unt, deinde sobolem, postea
 Mella.

1. Comosis.

Κώνυς Arist.
 Κόρυμωτος Turneb.
 Μίτυς Purgamentum Ce-
 ræ.
 Tectorium Apiaris.
 Melligo Plinii Wottono.

Primum operis fundamen-
 tum, seu prima crusta, Ceræ
 est veluti excrementum pur-
 gamentumq; benè nigrum,
 quò pavimentum & alveum
 ipsum intus totum, & quò-
 dam tectorio illinunt, ne be-
 stiolæ nocuæ subeant.

Saporis est amari, & odo-
 ris acris. Medetur plagis, &
 hujusmodi suppurationibus.

2. Pissoceros.

Πισσόκερος
 Πισσόκερος Arist.
 Picatus cereus Gaz.
 Kleister vulgò.

Proximum à Mitye tecto-
 rium crustæve. Super eam
 venit Picantium modo ceu
 dilutior, Ceræ initium ple-
 runq; è mitiore gummi. Fit è
 lachrymis Arborum, quæ glu-
 tinum pariunt, Salicis, Ulmi,
 Arundinis succo, gummi, re-
 fina.

3. Propolis.

3. Propolis.

πρόπολις Plinii.

σμηγύον Diose.

Cera virginea Scribonii.

Winharn vulgò,

Worstos/Stopwachts/

Wetwachs.

Rudis est & crassa materia, seu gluten in alveorum foribus. Crassioris jam materiae additis floribus, nondum tamen cera, sed favorum stabilimentum, quâ omnis frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur, odore etiamnum gravi.

Differt colore, odore & consistentia.

Eligitur ad Medicum usum flava, odorata, Styracem vel Galbanum referens, in vehementi ariditate, mollis, & Mastiches in modum ductilis.

Recens per se satis est mollis & pingvis, tenuis essentia. Calefacit ordine 2do. aut 3tio. inchoante.

Leviter abstergit, attrahit, evocat, aculeos & omnia infixâ Corpori extrahit, dura concoquit, dolores Nervorum mulcet, ulceraq; desperationia cicatrice obducit. In veteri tussi suffitu juvat, &

Lichenas admota tollit.

Veteres pro Galbano utebantur.

4. Favus.

à fovendo.

Κηρίον Græcis inde κηρίαζειν favos conficere, cerificare.

Κύτταρος Suida.

πλωά, μελικηρίς.

δ'υγίδ'εζ, Loculi.

Loculamentum,

Cella Apum.

Weben oder Heuslein der Bienen.

Wien Roos/ sil.

Favus, cum Mellis tum prolis receptaculum, quem Apes fingunt ἑξαγώνον sexangulum, æqualium laterum, & Cera veluti cellam, cum singula cava sena latera habeant, quot singulis pedes dedit Natura.

Ab utroq; latere cellas obtinent: contra Crabrones & Vespa.

Favi superiori parte affixi, & paululum etiam lateribus hærent, & pendent unâ, Alveum non contingunt, nunc rotundi, qualiter poscit alveus. Primi tres versus Wetter vulgò ferè inanes struuntur, ne promptum

promptum sit quod invitet furantem : novissimi maxime implentur Melle, ideoque averfo alveo facile eximantur.

Favorum duo genera observantur : primum in longitudinem decurrit, die *Wienen arbeiten*, *scharff* / secundum transversim testis cavearum inhaeret, vulgò *Wret*. Differunt Favi, quòd Alii sint

Prols & vel : *Apum* popularium, parvi : *Regum* laxiores & eminentiores, qui sepimento tanquam muro quodam ad majestatem regiam tuendam circumvallantur : *Fucorum* ampliores & latiores, qui *Apum* cæterorum favis inferuntur.

Operis ut Mellis & Sandarachæ. Hinc Favi plerumque accipiuntur pro cellulis Melle plenis. Ex favis purgatis fit Cera, de qua in sequentibus.

5. Fætura.

Neotria Arist.

Neotres,

Wrett / sil.

Favos ubi confecerunt Apes, fætum iis instillant, què Avium more incubant & concoquunt, exclusi deinde ver-

miculi, dum parvi sunt, jacent in favo obliqui: post suâ ipsa facultate se erigunt, cibumque capiunt, & favo ita adhærent, ut retineri videantur, qui tandem in Apes Fucosque transeunt. Apes Novellæ tertio quàm prodierint die, statim negotium ineunt si cibus non suppetit. Duodequingvagesimo die ab Æquinoctio verno incipiunt Examina augeri. Ab exortu vergiliarum hoc est à 5. Idus Majas ad Solstitium Alvei examinant. Apud nos seriùs, paulò ante solstitium æstivum, usque ad Syrii ardorem.

Apes fætificant, examina ponunt, die *Wienen setzen* *Wrett*.

6. Mellificatio.

Μελιτογία

Mellificium

die *Wienen tragen* *Honig*.

Tandem Cibi causa mellificant Apes. Melleum enim liquorem è frondè ac pabulis in utriculos congestum, ore tandem in cellas evomunt, & Melle uno alterove die ad summum cellas replent. Crascescit autem Mel concòctum jam tempore, quod initio ut aqua dilutum est, & primis

P p p

diebus

diebus sine crassitudine cernitur, & fervet ut Mustum, seq; purgat, Quod si exemptum eo tempore sit, crassitudine caret, tum vigesimo maximè die spissatur, mox obducitur tenui membrana, quæ fervoris ipsius tenui spuma concrefcit. Mel enim Apibus tum æstate tum hyemè cibus est.

7. Cerago.

Κηράνδεμον, Dioscor.

Ερίδακη, Aristot.

Ερίδακη.

Sandaraca,

Cerinthus, Theoph.

Vernigo.

Böllich/

Zulch/ Meliturgk.

Alterum Cibarii genus, cui durities Ceræ proxima, ut Ceram suis cruribus congerunt, Apum dum operantur cibus, qui sæpè invenitur in favorum inanitatibus sepositus. Melle est deterior, acerbi saporis, sed plenus humoris cibus. Gignitur ex Rore verno & arborum succo, gummi modo. Quarundum Apum natura peculiaris est, ut plurimum Sandaracæ colligant & importent; aliæ non item;

quæ nisi, dum Mel paratur, diligenter eximatur, ei ingratum saporem conciliat.

Apum Examen.

Εσμός,

Σμῆνος.

Bienschwarm/

Ymenschwarm.

Nova est Apum soboles, quam parentes ex suis alvearibus, ad novas sedes quærendas exire cogunt. In Silesia nostra, ut antè dictum, circa solstitium æstivum, antè & post, Apes prolem ut plurimum emittunt. Idcirco diligentissimam curam desiderant, ne egressæ turbæ cum Rege fugam capiant, effugiantque: inprimis verò ab octava matutina usque ad secundam pomeridianam; quia antè & post hæc tempora non facile emigrare consueverunt.

Signa autem Examinis exituri sunt. 1. Uno aut altero die, maximè vesperi, multæ in vestibulo, seu ante foramen, ut Uvæ, aliæ ex aliis pendent globatæ, egressu suo sedis propriæ desiderium ostendentes. Legen sich heraus

vor

vor das Flugloch zusammen/
wie eine Traube. 2. Vox so-
litaria, & peculiaris quædam,
aliquot antè diebus intus mit-
titur, & biduo aut triduo pau-
cæ circa alveum volant. 3.
Evolaturæ jam, aut evolan-
tes etiam, consonant vehe-
menter murmure factò, pe-
rinde ac milites castra mo-
ventes. Quæ cum primò exi-
erunt, in conspectu volitant,
reliquas expectantes dum
conveniant.

Curator alveos novos a-
bunde in hunc usum præpara-
tos in promptu habear. Citiùs
enim in novum alveum se re-
cipiunt, quàm in veterem,
etiamsi proximum posueris
veterem, unde exierint, ta-
men novo magis delectan-
tur. Perliniatur autem her-
bis Apibus gratis, Melissa, Me-
liloto, Thymo, Ledo nostra-
te, aut Mellis guttis resperga-
tur. Adsit etiam Custos, qui
alveos diligenter observet,
eorumq; egressus & regressus
attente animadvertat. Si ar-
busculæ in propinquo desint,
Arboris ramus defigendus, in
quem se conferant, confiden-
tes, eamq; oblinere Apia-
stro aut Erithacæ ac similibus

illecebris, cæterisq; rebus qui-
bus Apes recreantur. Ubi huc
advolarunt & confederunt,
Alveo appposito, fumo levi
circumeundo, eas in novam
coloniam intrare cogas.

Apiarii hujus loci, manu
Melissophyllo illitâ, Apes
conglomeratas, in cribrum
ligneum ad id accommo-
datum, leniter alâ anseri-
na colligunt, injecto ramulo,
Regem scrutantur diductis
Apibus, quem apprehensum
cavæ minutissimæ, Ein
Weiselheusel/ includunt, affi-
xo baculo alvo, Alveari im-
ponunt; inde Apes sequentes
Ducem sine molestia in do-
micilium se recipiunt suffu-
migatæ.

Sin examen est abditum
specu, fumo expellitur, & cum
erumpit, æris strepitu coërce-
tur, ut in sylvæ parte vel fron-
de confideat: hinc á vestiga-
tore, accommodato vase re-
cipitur.

Arboris verò cavæ sedem
ubi habuerit, & extet ramus,
is ferrâ suprà infraq; rese-
candus, & munda veste coo-
pertus inter alvearia collo-
cetur.

P p p 2

Qvöd

Quod si in Arboris trunco sit, tunc si mediocritas patitur, primum superior pars refecabitur, quæ Apibus vacat, ac dein inferior, quatenus videtur in habitari, veste reclusus transferatur, & si rimis hiet, hæc diligenter obturanda.

Nonnunquam etiam vernacula Examina, patriæ pertasa, eruptionem moluntur: quod significatur, cum sic evadunt, ut nulla intro revoler, sed se confestim levet sublimius: tunc crepitaculis æneis, aut testarum vulgò jacentium sonitu aut plausu terreatur fugiens juvenus. Ea autem cum vel pavida repetierit alveum maternum, & in ejus aditu glomerata penderit, aut ad proximas Arborum frondes se contulerit, protinus Custos novum loculamentum in hoc paratum, perlitumque, herbis huic animalculo gratis, aut Melle respersum admoveat atque recondat, eoque loco relinquat, donec vespertinum tempus appetat, dein diluculo reponat in ordinem reliquorum alveorum.

Quædam solent, cum subito evaserint, sine cunctati-

one se prorepere, poteritque; Aparius fugam prænoscere vespertinis temporibus, Aurem singulis alveis admoveo: Siquidem ante triduum, quam eruptionem facient, veluti militaria signa movent tumultus, & murmur exauditur.

Si totum agmen glomeratum in proximo frondentis arboris ramo cõfederit, & totum Examen in speciem unius uvæ dependet, signum est, aut Regem unum inesse, aut plures reconciliatos, quos sic patieris, dum in suum revolent domicilium. Sin autem duobus, vel pluribus velut uberibus diductum Examen fuerit, indicium est, plures duces & dissidentes esse, atque in iis partibus, ubi maxime glomerari videris Apes, requirendi Duces erunt, ubi autem auctorem pugne repereris, eum elidere oportet.

Memini ante quinquennium in vicinia, uno ferè momento tria Examina ex diversis alveis evolasse, & se conjunxisse. Quæ ut dissidentia, cum reconciliari nulla ratione potuissent, amplo labro inclusa fuere; linteolo superinducto, & sic per noctem relicta.

relicta. Mané demto linteo reperta fuere Examina, quilibet Rex cum sua turba separatim conglomeratus: quæ mox à Curatore, utpotè sedata & mitiora facta, in alveos peculiares fuerunt reposita.

Mellis vindemia.

Μελίσσιος.

Mellatio,

Mellis Apum,

Apum castratio,

Honig Erndte/

(Castrare Apes Zeideln/
Wienen beschneiden / Honig
ausnehmen.)

Est Mellis exemptio. Tempus non idem observatur, nec modus omnibus communis. **Varro lib. 3. cap. 16.** eximendorum favorum tempus, primum vergiliarum exortum statuit: secundum, æstatem scil. actam, antequam oritur Arcturus totus: tertium, vergiliarum occasum. Signum sumi vult, cum plenos alveos habeant, cumq; illos geminaverint. Ex Apibus autem conjecturam facit, si intus bombum faciant, & cum introeunt ac foras trepidant, & si opercula alvei cum remota sint, favorum forami-

na membranis melleis obducta, videntur-

Dies castrandi matutinus eligendus, neq; enim convenit, medio æstu, Apes laceffiri; fumo abigantur, ne ad iram provocentur, aut avidè vorent, qui admoveatur per ollam commodam, cujus nido apes in priorem partem domicilii, & interdum, extra vestibulum adigantur, ut sic potestas fiat liberius inspiciendi.

Mellarii nostrates priore messe, post æquinoctium verum, quod sit plerumq; Martio aut Aprili, pro ut hyems fuerit aspera aut mitior, non nisi cellas inanes rescindunt scalpro, usq; ad favos, in quibus Mella & fœtus rudimenta, caventq; ne ea lædant, si quid tamen Mellis abundaverit, id demunt. Posteriore messe, nempe autumnali vindemia, melliti excinduntur favi, qui demtis vacuis in catinam reponuntur, vel mox unâ cum favis & pullitie Mel in cupas cogitur rudi modo, atq; sic cum excrementis venditur. Si fœcunda sit alvus, plus tertia parte Mellis, non eximatur, reliquum hyemationi relin-

P p p 3

qvatur

qvatur: sin veró alvus non sit fertilis, & hyems metuitur aspera, exemptio sit minima aut nulla, ne defectu pabuli hyeme animo deficiant & fame intereant: supervacuum vere tandem cum favis inanibus excindunt. Redduntur enim Apes ociosiores, si in eximendis favis plus Mellis relinqvatur.

Itaq; pro Examinis numero relinqvendum est. Agunt etiam anxius, si plus dematur, quam ut residuum cibo sufficiat, atq; etiam si alveus justo amplior sit, desidiores redduntur: ægrius enim, quæ si desperent, operi incumbunt.

Apum natura.

Apibus non mellificandi ars tantum, sed & diligentia ac in labore perseverantia inest.

Mos Apibus, ne plura florum genera petant uno eodemq; profectu, sed singulis singula v. g. á viola ad violam, nec aliud attingunt, quousq; suum in alveum redeant. Hic se qvatiunt, & singulas, tres aut qvatuor sequuntur.

Oderunt non solum fædos

odores, sed etiam unguentorum delicias, indeq; fit, ut homines his delibutos facile percutiant.

Carnem nullius Animalis tangunt, nec obsonium appetunt. Mundissimum enim hoc loco animal.

Student bonæ Apes, quoad fieri potest, ne quam intra alveum interimant: & si quæ perierit intus, statim foras cadaver educunt.

Mira quoq; iis munditia. Egerunt excrementa congesta in unum locum, turbidis diebus, & operis otio. Sæpenumeró, cum alvi necessitas est, avolant, & in secessu reddunt excrementum, quoniam male oleat.

Bestiolas, quæ in alveis nascuntur, melioris notæ Apes rollunt, & rem familiarem tuentur, sed alteras pro vitio suo negligunt, & perire patiuntur.

Seniores intus operantur, hirtioresq; moræ domesticæ ratione sunt. Adolescentes foris negotium exercent, & ea quæ res exigit portant. levioresq; sunt labore hirsutæ detritæ.

Socias, ociosas ac desidias, aut min⁹ parcas pellunt. Cesantium

tantum inertiam notant, castigant mox: & puniunt morte.

Gaudere plausu atq; sonitu videntur. Quapropter tinnitu æris aut fistilis, convocari eas in alveum ajunt: quanquam incertum, an audiant, & voluptatē ne an formidine ita faciant.

Præfagiunt hyemem & imbres ventosq; & tunc temporis se continent tectis.

Apum Respublica.

Politiam Reipublicæ observant humanæ optimè instituta assimilē. Regi parent, πολυκοισγίαρ tanquam inutilem fugiunt. Monarchiam amant. Functioni ac labori quæquē suo incumbunt.

Unde sapientissimi quique Rerumpublicarū institutores exempla, & in Regibus creandis, officiis distribuendis, fontibusq; puniendis imitati sunt. Vergilius admiranda levium spectacula Rerum, verissimè elegantissimeq; canit. Apum Rempublicam, regias, satellitia, prætoria, urbes, leges, mores, pugnas, expeditiones, sic depingens, ut vel una hac pictura admirandas ingenii dotes declarave-

rit, prorsus esse Apibus partem divinæ Mentis & haustus æthereos existimans, quod tum propè ad humanam mentem accedant, imò eam etiam superent. Tanta circa Regem obedientia, quem

non sic Ægyptus, & ingens Lydia, nec populi Parthorum aut Medus Hydaspes, Observant: Rege incolumi mens omnibus una est.

Ille operum custos, illum admirantur, & omnes Circumstant fremitu denso, stipantq; frequentes, Et sæpè attollunt humeris, & corpora bello Objiciunt, pulchramq; perunt per vulnera mortem, Amisso rupere fidem, construtaq; Mella Diripere ipsæ, & crates solvere favorum.

Rege prehensototum agmen tenetur, migrantq; ad alias. Esse utiq; sine Rege non possunt, ἀναρχίαρ fugientes, sicut & πολυκοισγίαρ. Defuncto Rege plebs mæret ignavo dolore, non amplius cibos convehunt, non procedunt, tantum tristi murmure circa corpus ejus glomeratur.

Magna

Magna profectó in hoc Animalculo admiratio, qvód Solæ communes natos, consortia tecta Urbis habent, magnisq; agitant sub legibus ævum. Et patriam solæ, & certos novére penates, Venturæq; hyemis memores, æstate laborem Experiuntur, & in medium quæsitæ reponunt.

Regias Monarchiæ in una parte alvei extruunt amplas & magnificas, separatas ab aliis, tuberculo eminentes, qvód si exprimatur, non gignuntur soboles, Omnes ut in exercitu vivunt, atq; alternis dormiunt, & opus faciunt pariter; & colonias mittunt. Hiq; Duces, inquit Varro, conficiunt quædam ad vocem, ut imitatione tubæ: tum id faciunt, cum inter se signa pacis & belli habeant. Statio interdum ad portas more castrorum: noctu quies in matutinum, donec una excitet bombo, ad quem mox provolant, qvód poëta eleganter expressit.

Omnibus una quies, operum labor omnibus idem,

Mané ruunt portis, nusquam mora, rursus easdem Vespere, ubi é pastu tandem decedere campis Admonuit, tum tecta petunt, tum corpora curant. Fit sonitus mussantq; oras & limina circum. Post ubi jam thalamis se composuere, siletur In noctem, fessosq; sopor suus occupat artus.

Nam cum ad vesperasceat, in alveo strepunt minus ac min⁹ donec una circumvolat, eodem quo excitavit bombo excitata, mox ruunt portis, sed non provolant, nisi dies sit seren⁹ futurus, id scil. natura præfagiente. *Arist. hist. anim. 9. cap. 40.*

Nec veró á stabulis pluvia impendente recedunt Longi⁹, aut credunt cælo, adventantibus Euris, Sed circum tutæ sub mœnibus urbis aqvantur, Excursusq; breves tentant, & sæpè lapillos, Ut cymbæ instabiles fluctu jactante saburram, Tollunt, his sese per inania nubila librant. Gerulæ secundos flatus captant, Si oriat⁹ procella, apprehensis

prehensis lapillis se librant, juxta terram volitantes, in adverso flatu.

Apum ætas.

Durant Apes, si diligenter excultæ sint, in annos septem, octo, aut decem; nec ullum Examen hanc ætatem potest excedere, quævis in demortuorum locum quotannis pullos substituant. *Plinius*. Nam fere decimo ab internecione anno gens universa totius alvei consumitur. *Columella*. Itaque ne hoc in toto Apiario fiat, semper propaganda erit soboles, observandumque; verè cum se nova profundunt Examina, ut excipiantur, & domiciliorum numerus augeatur.

Ætatem quidem sic tradunt internosci, quòd, quæ annum non exceßerint, nitescant, oleique similitudinem & speciem gerant: vetulæ verò aspectu & tactu horridulæ, & rugis plenæ at tamen fingendis favis præstantiores.

Apum sanitas.

Sanitatis signa sunt, si sint frequentes in Examina, si hilares, si nitidæ, si opus quod

faciunt, æquabile ac læve. Minus valent, si horridæ, si pilosæ & pulverulentæ, nisi opificii tempus urgeat, cum propter laborem asperantur & marcescunt; item tristitiâ torpent, & si conspiciantur aliæ mortuorum cadavera efferre, funerantiumque; more exequias comitari, aut intra tecta silentio torpère.

Apibus inimica.

Aversantur Apes; Adulteros, remulentos, fures, Mulierum menses, Ursos, Oves, Picos, Paros, Hirundines; Caprimulgos, Ciconias, Lacertos, Serpentes, Buffones qui flatu lædunt. Capras, Hædos, Crabrones, Vespas, Papiliones ignavos, Araneos, Formicas, Fullones, Blattas, Tineas, Culices, item Taxum, Ulmum, Cornum, Platanum, Absinthium, Allium, Cepas, Porrû, Cucumerem sylvest. Thapsiam, Tithimallos, Veratrum. Tandem offendunt Apes: Venti, Nebulæ, fumus Figulorum, Echo, Balnea libera, Cloacæ, Sterquilinia, & omnes fædi odores, olea, unguenta redolentia, & alia quæ amplurima.

Q q q Apum

Apum iracundia.

Nullum animal, nisi sui generis Apes fugiunt. Præliantur enim intra se, & cum vespis: sed cum ruri sunt, nec sibi invicem, neq; ullis aliis injuriuntur: at verò apud suos alveos pugnant acerrimè, & hostes quos vicerint enecant. Necant vel maxima Animalia ictu sui aculei, sed principes minime irritantur & feriunt.

Apum seditio.

Vere & æstatè ferè ter in mense animadvertas, ne Reguli plures existant; inutiles enim fiunt propter seditiones. *Varro lib. 3. cap. 16.*

Corda licet vulgi præsciscere: namq; morantes
Martius ille æris rauci canor increpat, & vox
Auditur fractos sonitus imitata tubarum.

Pugna vel unius inter se diffidentis, vel duorum Examinum ad prælium accinctorum facile compestitur;

Pulveris exigui jactu compressa quiescit.

Aut multo passòve, aut alio quovis liqore resperso, vi-

delicet familiari dulcedine sævientium iras mitigante. Eadem & Reges conciliant diffidentes. Quare si sæpius dimicantes notaveris, Duces seditionum necare oportet, & dimicantium prælia, prædictis remediis sedantur, *Column. lib. 9. cap. 9.*

Apum ignavia.

Si ex alvo minùs frequentes evadunt, ac subsidit aliqua pars, suffumigandum, & propè fumus apponendus bene olentium herbarum, maximè Apiastri & Thymi. *Varro lib. 3. cap. 16.*

Apum langvor.

Si Apes subita tempestate, aut frigore, aut imbre repentino jaceant prostratæ, colligendæ invas aliquod, & reponendum in tecto ac prono ad Meridiem, quàm maximè cælo clementi, & vas ipsum cinere factò è ficulneis lignis infricandum, paulò plus calido quàm tepido, ac deinde concutiendum vas leniter, ut manu non tangas, atq; sic in Solem prolatas incalescentes reviviscere *Varro* docuit. Cui subscribens *Columnella* subdit;

dit, de Apibus coacervatim sub favis repertis mortuis, eas per hyemem scilicet sicco loco servatas, circa vernum æquinoctium, cūm cœli benignitas invitat, in Solem proferendas, ficulneoq; cinere obrutas, intra paucas horas caloris halitu animari.

Apum interitus.

Intereunt Apes Rege amisso, aculeis infixis, Mellis inopia, Morbis.

Regum mors. Apes si omnes Duces suos amiserint, Wam sie Weisellose worden/mœrent ac tristantur, ignavæ evadunt, operas non attingunt, nec cibos convehunt, & tandem, nisi subveniat, fame moriuntur. Qvôd si vel ob mortem Ducum, vel per aliquam pestem, Apum multitudo fuerit subacta, ut eam repares, considerabis in aliis Alveariis abundantibus, ceras favorum, & extremitates quæ pullos habent, & ubi signum nascituri Regis inveneris, cūm sobole sua recides, & id in Alvearium pones. Sed tunc transferendi, quando proflis cooperculis ad nascen-

dum maturi, capita nituntur exerere. *Columella.*

Aculei infixi. Pennæ

Apis rescissæ non renascuntur, qvoniā ex humido radicali constant: similiter in aculeo evenit, qvando enim hunc amiserit Apis, emoritur, eō qvôd ad locum affectum multæ Corporis humiditates concurrant, & cūm ejicitur aculeus, ex multo affluxu humiditatis primô debilitatur, deinde moritur. *Albertus.*
Hinc *Nicander.*

Κέντρον γούρ πληγῇ περικάλ-
λιπερ ἔμματασσα,
Κέντρον δ' ἰ ζωὴν τε φέρει δά-
νατόν τε μέλισσῃ.

Mordentes siqvīdem linqvūt
proboscida fixam,
Quæ vitæ & mortis causa est,
mirabile dictu.

Cūm enim Natura aculeum Intestino annexerit, is nisi diffracto eo vix evelli poterit. Visæ tamen sunt aliquando evadere, si is qvī ictus est curam adhibuerit, ut infixus aculeus junctus cum alvo extringatur,

Q q q 2

Apum

Apum Morbi.

Apes ægrotant potissimum, cum sylva flores æruginosos tulerit, atq; etiam temporibus siccis.

Pestis. Pestilentia in Apibus rara perniciēs, neq; aliud remedium quam ut longius alvei transvehantur.

Alvi profluvium,
Cœliaca, Apum fluxus. Maximus earum annuus labor est initio veris, quo Tithymali flores, & quo Sameram ulmi promunt. Cum enim post hybernā inediā, hisce primitivis floribus illectæ, avidē vescantur, & sese replant, profluvio alvi, nisi celeriter succurratur, intereunt. Huic medetur Galbanum incensum; Mala punici grana tusa, & cum vino inspersa austero.

Uvæ passæ cum Rore Syriaco & vino austero insuccatæ.

Decoctum Mellis cum galla, vel arida Rosa, pulv. arundinaceis canalibus infusum.

Φαγέδαια. Voracitas. Cum tantum Cerae confingunt, quantum se explere putant,

postea tempestate oppressæ intereunt, & reliqua paucitas non sufficit implendis favis. Vacuæ cæterarum partes contumescunt, atq; vitiiis serpentes ipsæ quoq; Apes reliquæ corrumpuntur. Id ne fiat, duo Examina conjungantur, quæ possint integras adhuc Ceras explere: vel si non est facultas Examinis, ipsos favos præscindere oportet, antequam putrescant; idq; acuto ferro, ne hebetudine cultri, reliqui favi loco moveantur.

Βλαψιγονία. Causa sæpè interitus, nimia felicitas sua, veluti cum continuis annis plurimi flores proveniunt, & Apes magis Mellificiis, quam fœtibus student, nimisq; opere fatigatæ interdum pereunt, nullis juventutis reliquiis. Interdum Morbo, vel ignavia, aut infœcunditate fœtum, non peragunt. His proderit tertio quoque die Alveorum exitus præcludi, exiguis tantum foraminibus relictis, quibus tamen exire nequeant, atq; ita domi retentæ coguntur fœtibus vacare.

Κληροί. Clerus. Vermiculi sunt, qui in pavimento nascuntur, & quibus crescentibus, velut aranea alveo toti obduci-

obducitur, & favi carie pereunt. *Arist. b. 2. c. 27.*

Tineæ, Teredines *Nictymaden.* Adhærentes favis decidunt, si fimo medullam bubulam misceas, & his incensis nidorem admoveas. Generantur plerumque, cum Malus floret. Aliquando etiam ignavus & inhonoratus Papilio, luminibus accensis advolans, non solum Ceras depascitur, verum etiam excrementa relinquit, ex quibus Teredines gignuntur. Vitiofi si qui fuerint favi tollantur, deinde fumigentur.

Vermiculi. Vitiantur favi ex Aranea quandoque, nisi suis favis incubent Apes & concoquant.

Quod si ita se continere poterint, ut incubitu perseverent, efficitur aranea illis veluti alimentum, sin minus, pereunt toti favi. Gignuntur in iis, qui vitiantur vermiculi, qui mox pennis subnatis evolant.

Pediculi. Infestantur quoque Pediculis, quos ramulis mali arboris ac Caprifici incensis, ac suffumigatis curari tradunt.

Hebetudo videndi
Origani sufficu curatur,

Mellis inopia refarcitur appositione Mellis, vel ejus defectu, alterius nutrimenti appropriati. De quibus alibi.

Apum acquisitio.

Comparantur Apes tribus modis, vel precio, vel sylvestres capiuntur, vel examina reconduntur.

Emtio.

In Emptione considerantur.

1. *Frequentia*, apertis alveariis: vel si non fuerit inspiciendi facultas, aliis indiciis, veluti si in vestibulo plures consistent, & vehemens intrus murmurantium sonitus exaudiatur: aut si omnes in Alveario conquiescant silentes, Labris foramini aditus admotis & inflato spiritu, è respondente earum subito fremitu, poterimus aestimare vel multitudinem, vel paucitatem.

2. *Num sint sanæ vel infirmæ*, signa quære supra.

3. *Ætas.* Quæ annum non exceßerunt, nitescunt, oleique similitudinem & speciem gerunt.

Q q q ;

runt. Vetulæ verò & aspectu & tactu horridiusculæ, atq; ex ætate affecta rugis plenæ: quæ tamen favorum fingendorum experientia, industria & tempestatum præscientia excellunt.

4. *Locus.* E vicinis locis potius quàm é longinquis comparentur. Nam cœli mutatione & commotione laceßiri solent. Quod si é longinquo deferendæ, cavendum ne salebris sollicitentur.

5. *Tempus anni.* Transferuntur verno potius tempore, quàm hyberno, quod hyeme difficulter consvescant, in ea loca ubi serotinis floribus Thymi, Origani, Thymbæq; benignius & uberius alantur,

6. *Optimè* collo noctu deportentur, Interdiu enim quiescant, nec moveantur.

7. *Liquores* grati infundendi, quibus clausæ alantur.

8. *Mox* ubi ad statutum locum deportatæ fuerint, si dies supervenerit, nec aperire nec collocare oportebit Alveum, nisi Vespere, ut Apes placidè manè post totius noctis requiem egrediantur.

Alias fugitivæ fiunt; præsertim si é loco transferatur bono, in eum ubi pabulatio non est.

Captura Apum.

Accidit sæpè, ut vernacula Examina patriæ pertæsa, eruptionem moliantur, & universa turba cum Rege suo confestim se elevet sublimius, & avolet, nec unquam revolet. Has Agricola nonnulli, diligenter Examinis tempore inquirentes, capiunt, & in sua alvearia recundunt.

Examina ut reponenda sint. vide supra in Examine Apum. Sunt qui in totum amissas Apes reparari tradant, ventribus bubalis recentibus cum fimo obrutis,

M. Varro partim ex Apibus generari, partim é bubali aut juvenci corpore putrefacto scribit. Quod Vergilius eleganter sequentibus verbis expressit:

Sed si quem proles subitò defecerit omnis;
Nec, genus unde novæ stirpis
revocetur, habebit;

Tempus

Tempus & Arcadii memoranda inventa Magistri
Pandere, quoque modo cæsis
jam sapè juvenis
Insincerus Apes tulerit cruor.
Hic modus nostris Apiariis
planè incognitus.

Meliturgi officium.

Μελιτοργός,
Μελισσεύς,
Μελισσοκόμος,
Μελισσοβότος.
Apiarius, Mellarius
Curator, Pastor Apum.
Ein Bienen-Herr/
BienenMann/
Bienen Wärter.

Apiarius is dicitur, qui Apum curam habet. Hic à Venere sit liber & temulentia, non avarus, non venerus, alienus à balneis, abstinere à cibis acribus, Allio, Cepis &c. odoribus immundis, atque omnibus redolentibus salsa-mentis.

Fortis persuasio vulgi, Apes emori aut perire post obitum Mellarii, nisi Alvearia in alium locum transferantur.

*Instrumenta Meliturgo
necessaria.*

Cuculla Apiaria Eine Bienen
Kappe/Bienhaube.

Chiroteca.

Saccus amplus cum furca.

Cribrum Examinibus colli-
gendis commodum.

Securis qua possit aperire
alveos.

Cultri Bienen Messer. Al-
ter oblongus ex utraq; parte,
acie lata, uno capite aduncum
habens scalprum, quo favi
eraduntur, & quicquid for-
didum decedit, retrahitur. Al-
ter prima fronte planus &
acutissimus, quo melius favi
succiduntur.

Olla fictilis ansata Ein Bie-
nenKrug/altera parte acutior,
foraminibus pertusa, per quæ
fumus prunis accensis exha-
let: altera parte latior & pa-
tula, per quam afflari potest.

Materia fumo excitando
apta. Cum enim ægré ad-
mittant sibi auferri favos
mellitos, insigniter Melitur-
gum ulciscuntur, quapropter
ut fumo coërceantur, & ceu
torpidæ reddantur necesse est.

Galbanus, simus aridus,
Ligna putrida. Curatores hu-
jus loci utuntur corticibus Pi-
nastri & Picæ.

Ala

Alæ Anserinae, quibus sordes ex Alveariis everruntur.

Apum cura.

Cum curam assiduam desiderent Apes, per totum annum Apum Curatori suis quibusque temporibus labor.

Vere, Ab Æquinoctio verno, quæ sit plerumque; Martio, cum diei permittit hilaritas, & aeris temperies (nam tunc sine cunctatione jam passim vagantur, & idoneos ad fœtum colligunt flores seu succos, atque intra tecta comportant) nivibus delapsis, aperiendi Alvei, omnia purgamenta tollantur, & sordes, quas tempus hybernum contraxit, & Vermiculi, & tineæ, & araneæ, & mortuæ Apes eximantur, diligenter everrantur, vitiosi favi abscindantur, fumus est fimo bubulo, aut arborum corticibus factus immittatur, qui quasi cognatione quadam generis cumpri-mis Apibus est utilis, & licet molestus sit, saluberrimum tamen esse constat.

Favi melliti, si abundaverint, refecentur, Alimentum, si defecerit, subministretur.

Cum Malus floret, iterum aperiendi, & diligenter pur-

gandi alvei, & fumigandi, ne a tineis infestentur.

Æstate. Purgatio Alveorum usque in autumnii tempora celebretur. Inter Caniculæ & Arcturi exortum cavendum erit, ne Apes interceptantur violentia Crabronum, qui ante alvearia plerumque obsidiantur prodeuntibus.

Examina circa solstitium observanda, & recondenda.

Formicæ Cretæ illitâ repellendæ.

Autumno. Septembri etiam Mense Alvearia castrantur, more quo supra dictum est. Quæ tamen oportet inspicere, & si abundantia est, demere; si mediocritas, partem mediam relinquere, pro hyemis inopia; si verò sterilitas apparet, in cellis nihil prorsus auferre. Telæ araneæ frequenter abstergantur, ne Apiculæ telis irretitæ pereant.

Hyeme, quæ est circa initium Novembris, in nostro climate utpote algidiore, Octobri sæpe, urgente Cæli Aquilonia constitutione, Alvearia denuo aperire, & quicquid

quid est foridium repurgare, accums diligētia curare oportet. Nam hybernīs temporibus non convenit movere aut aperire Alvearia.

Proinde dum Cœlum temperatius, apricissimo die purgatis domiciliis, opercula intus usq; ad favos admovenda sunt, omni vacua parte sedis exclusa, qvo facilius angustia cavearum, per hyemem concalescant, idq; semper faciendum est, etiam in iis alveis, qvæ paucitate plebis infrequentes sunt. Si alimentum deficiat, Favi capsulâ commodē apponendi, ne per hyemem fame pereant. Quid rimarum est aut foraminum, luto fimoq; bubulo mistis illinendum extrinsecus, solo meatu relicto, per qvem possint spirare, ne suffocentur. Hunc quidam integunt lamina ferrea foraminibus pertusa, ne Pici aut Pari illis noxam inferant. Adversus frigora, nives & Aquilonum flatu stramine muniantur.

In summa omni tempore diligentem requirunt curam.

Repurgandæ, infumandæ, refocillandæ, circumlinendæ,

& à Morbis, externisq; injuriis vindicandæ.

Apum ictus.

Necant Apes vel maxima Animalia, ictu aculei sui, si quando irritatæ densiore agmine in ea involent.

Dolor statim consequitur ictum vehementissimus; Rubor loci cum tumore partium in ambitu sitarum, Stimulus in percusso loco relinquitur: Pustula deniq; seu vesicula assurgit, cum totius Corporis inquietudine.

Aculeus qvām citissimē extrahatur, Stercus bubulum, luto aut terra ex aceto illinatur.

Sigillata cum Malva & posca.

Hordeacea farina cum aceto.

Muscæ contritæ illitæ.

Lenticula palustris, Malva, Blitum, Thymbra, Melissa, Sifymbrium, Sulphur vivum saliva humana subactum,

Sal, acetum cum Bolo Armeno,

Ol. Scorpionum illitum, Plumbi lamina desuper posita.

Prodest Rob Ribium, Berberorum.

R r r

Syrupus

Syrupus Granatorum,
Succus uvæ acerbæ cum
Pſyllio.

Lactuca, Portulaca, Cicho-
racris.

Vitetur vinum.

Apum finis.

Agricolæ seu Homini ru-
stico, ex Apum pastionis stu-
dio non contemnendum ve-
ctigal provenit, citràq; sum-
tum. Etiam pauperculi, qui
amplis agris destituuntur, ex
hoc studio quæstum facere
possunt. Non enim flores atq;
stirpes, ut cætera Animantia,
depopulantur, sed libant tan-
tùm, ac incorruptas servant.

Morula, Varronem, narrat,
quotannis quinque millibus
pondo Mellis alvearia locas-
se: & in Hispania è parva
villa, unâ cum agello non
majore uno jugero, ibi Alvea-
rio factò, non minus dena
millia sestertia, ex Melle re-
cipi solitum.

Nec opere solum hujus in-
secti pastio, nobis dulcissi-
mum & saluberrimum suc-
cum colligit exhibetq;, ve-
rum etiam exemplo industriæ
humano generi utilis, ita ut
præter cætera Animalia, o-
mnia in usum Hominum,

hoc tam munificum & sapi-
entissimum Animalculum, à
Creatore Optimo Maximo
concessum, è quo simul, præ-
ter voluptatem, & fructum
operis percipiamus, & ad la-
borem industriamq; excite-
mur: Deniq; liberalissimi
Conditoris benignitatem in
hac Creatura contemplemur.

Apes siccæ pulveriz. ad-
ditis aliis ex Cera & oleo il-
litæ, Alopecii Capillum re-
stituunt.

Mel.

Τὸ μέλι Dioscor. & πὸ τοῦ μέ-
λει, quod est curare,

Doniz.

Μέλι τὸ πῖπτον ἐκ τοῦ αἵματος,
ἢ μάλιστα τῶν ἄσθρων ἐπιτο-
λαίς, ἢ ὅταν κατὰ σκλήρην ὁ στί-
γιος.

Mel, quod Apes colligunt,
oritur in plantarum foliis,
floribus, earumq; neq; suc-
cus neq; fructus, neq; pars ul-
lo pacto dici potest, sed ejus-
dem cum Rore generis. Ve-
nit enim ex aëre, & maximè
syderum exortu, sive ille est
cœli sudor, sive syderum sa-
liva, sive purgantis se aëris
succus. Et quamvis à fron-
de &

de & pabulo, ab uterulo Apum, succo florum & alveis alteretur, mutetur, inficiatur, & sordescat, magnam tamen cœlestis naturæ voluptatem affert. *Plin. lib. 11. c. 12.*

Præstantissimum gignitur Mel, ubi copia est Thymi, Thymbræ, Satureiæ, Serpylli, Cytisi, Meliloti, Borraginis, aliarumq; tum herbarum tum fruticum, quæ natura sicca calidaq; constant.

Æstate, cœlo sereno, & aura filente, sublucanis temporibus, succosus optimusq; terræ vapor elevatur, qui in aëre in dulcem liqvorem excoctus super arborum & fruticum folia decedit, qui mane Sole exoriente ab Apibus in vesiculas Melleas colligitur, & in alvearia comportatur.

Quocunq; die favi sunt demessi, eodem dum tepent, Mella conficere convehit. Favi exemti tepescant tantum, ne nimium ferventes, Cera cum Melle transmittatur: mox in saccum crassioris sili, inversaq; metæ similem mittuntur, præloq; vel instrumento, machinave in hoc præparata, aut qvalo Mel

exprimitur: sed cura habenda, ut separentur partes Cerarum, quæ vel pullos habent, vel rubras sordes: nam succo suo malo Mella corrumpunt. Ubi Mel liqvatum in subjectum alveum defluxit, transfertur in Vasa fictilia, quæ paucis diebus aperta sint, dum musteus fructus defervescat, isq; sæpius ligula purgandus est. Fragmina Favorum, quæ in sacco permanserunt, retractata exprimuntur, atq; in secundæ notæ Mel defluit, sed seorsim reconditur, ne optimo mistum id corrumpat.

Mel differt: *Colore*, dum aliud flavum, aurei coloris: aliud rutilum, aliud pallidum seu albet, quæ Lituanicum.

Sapore, aliud dulce, amarum, acerbum.

Odore, aliud odoratum, aliud fœtidum, inodorum, pro ut fuerint plantæ, quibus infidet.

Consistentia, aliud fluidum, aliud crassum.

Loco, aliud domesticum, aliud sylvaticum *Heiden Honig*.

R r r 2

Mel

Mel optimum, purum, pel-
lucidum, boni odoris, subfla-
vum, cui ex aureolo color,
dulcissimum gustanti, suba-
cre, jucundissimum, consisten-
tiâ nec planè crassa, nec liqui-
da, sed tam sibi cohærens, ut
continuitatem suam quasi
linea longissima non interei-
sam seruet, si digito attolla-
tur, & coqvendo paucam spu-
mam remittat. Bimum præ-
fertur vetustiori, sicut & Re-
centiori.

Panis intinctu facile cor-
rumpitur, qvare cavendum,
ne panis vasis immittatur.

Mel ad condimenta opti-
mum, ad pharmaca necessa-
rium: putredinem non ad-
mittit, qvique Melle per-
ungitur. Nutrit multum,
mediocriter sumtum, lapsas
vires restaurat, ac reficit plu-
rimum, bonum colorem ef-
ficat.

Coqvi hujus regionis cibos
Melle condire frequenter so-
lent, saporem gratum palato
parantes.

In calidis naturis vertitur
in bilem, in pituitosis & seni-
bus in sangvinem. Optimum
nutrimentum frigido Ven-
triculo.

ΜΕΛΙΤΙΚΑ, ΜΕΛΙΩΜΑΤΑ,

Placentæ Mellitæ, Dulciaria,
Pfeffer Kuchen/ Honigkuchen/
Nürnbergische Ruchlin vul-
gò. Præferuntur omnibus
Noribergenses placentulæ,
qvæ ut delitiæ passim secun-
dis mensis offeruntur. Parantur
ex farina Triticæ, Melle,
aromatibus, utpotè caryo-
phillis, Cinnamomo, Zingi-
bere, Pipere, Nuce myristica,
Cardamomo, Corticibus cum
Arantiarum Citrii conditis,
palato non ingrata.

Mel calefacit, exiccat or-
dine 2do. Insignem vim ha-
bet abstergendi, Acrimonia
pollet, alvum ciet, ora venarum
aperit, urinas movet. In-
temperies frigidas tuto sanat.
Calidis, siccis, biliosis, æsta-
te florentibus adversissimum:
item Morbis, qvos amara bi-
lis excitavit, ut Hæticis &
febribus aliis.

Putrescere Corpora non
finit, faucibus, tonsillis, angini-
nis, omnibusq; Oris desiderii-
is collutum gargarizatumq;
utilissimum; tum verò Peri-
pneumonici. Decoctum au-
xiliatur tussi, urinas ciet.

Adversus venena fungo-
rum, & rabiosi canis morsus
linctum aut potum proficit.
A Serpente percussis medetur.

In

In sordida ulcera sinusq;
utiliter infunditur, Aures pur-
gat, Herpeti exedenti com-
petit.

Ante balneum illitum fa-
ciem & oculos clarificat, Ca-
pitis Lentes & fœda Anima-
lia necat. Cum liqvido A-
lumine coctum Impetigeni
medetur, Oculorum cartila-
ginem discutit. Cum Ro-
faceo, vel sale fossili trito,
aurium sonitui & dolori pro-
dest.

Mel crudum.

Inflat alvum, ruffim laces-
sit, fastidium creat.

Mel in quo sunt Apes mor-
tue, utilissimum oculis & Au-
ribus.

Mel virgineum.

Mel album
Jungfrau Honig/
Kraide Honig.

Mel est albicans, quod no-
vellæ Apes conficiunt.

Oculis & ulceribus com-
modius applicatur.

Mel despumatum.

Gescheum Honig,
Cum despumandum est,
coqvatur super prunas, aut

flammam lignorum arido-
rum, & sine fumo.

R. Mellis ℥. j. Aquæ ℥.
ij. bulliant ad dimidiæ partis
consumtionem, detractâ as-
siduè spuma, adde tunc Al-
bum Ovi no. ij. dein calidè
coletur.

Minus acre mordaxq; effi-
citur, minus alvum movet,
carnem glutinat.

Ex Melle in officinis varia
parantur pharmaca: Mel
Rosarum, Violarum, An-
thosatum, Mercuriales: O-
ximet simplex, Oximet com-
positum, Oxim. scilliticum,
Miscetur medicamentis Ul-
cerum, Thoracis, Pulmonum,
omnibus antidotis.

Fiunt ex Melle etiam Sup-
positoria, additis Hyera, Aga-
rico, trochiscis Alhandal,
stercore murino, smegmate,
momento salis gemmæ, ad
duritiem cocto, quæ oleo il-
lica, Longano intraduntur ad
alvum sollicitandam.

Hydromel.

Ἰδρόμελι Græc.
Mulsum à mulcendo,
Medo, Meda Polon.
Meth vulgò,
Honig Trancé/
Honigwasser.

R r r 3

Coqvitur

Coqvitur hodie ex Melle multipliciter potus á Polonis Medo dictus, tanta svavitate, ut non aliter ac vinum inebriare possit.

℞. Mellis optimi Qvart. j.
Aqvæ Qvart. viij.

Coq. lento igne in vase amplo cupreo : despumetur continué, donec incipiat clarescere; doliolo infunde, ut defæcetur.

Qvidam addunt aromata &c. Cinnam. Caryophyll. Galang. Nuc. myristicam & alia.

℞. Mellis optimi ℥. x.
Aqvæ puræ ℥. 60.

Bull. ad ℥. 40. remanentiam. Refrigefacta indantur in vas vinarium. Adde fermenti panis q. s. excitandæ ebullitioni & defæcationi, simul nodulo suspendantur & mergantur, ne fundum attingant hæc aromata.

℞. Cinnam. el. Gran. Paradyfi. Pip. nig. Zingib. Caryophyll. crassiusculé contus. an. drach. i. flor Sambuci M. s. Serventur in cella vinaria. Si vis ei facere colorem, add. Tornæ Solis unc. iij.

Medo vim haber calefaciendi, aperiendi, abstergendi, expurgandi. Pectus dilatat & purgat, medetur tussi frigida. Abstergit, Renes, Utereres, Vesicam á crassis humoribus & á saburra liberat, Intestina abluit. Prodest potus ad Qvartanam, Cachexiam, & morbos Cerebri, quibus vini potus perniciosus, ut Epilepsiæ, Analepsiæ. Noxas aquarum corrigit, ubi hæ multas febres putridas gignere solent.

Præfertur omnibus Lituanicus Medo. *Sittawischer Meth.*

Cera.

Κηρός Diosc. ἀπό τοῦ κηρί-
νου, qvod est curare & sollicitare.

Μάλδη, Galeni.

Wachs/

Apum est simplex favus, in cellulas digestus, quæ excolato omni Melle purgatur, & in orbes funditur.

Expressæ favorum reliquiae, posteaqvam diligenter dulci aqua perlatae sunt, in vas æneum conjiciuntur, adjectaq; aqua igne liqvantur. Qvod, ubi factum est, Cera

per

per stramenta, vel juncos defusa colatur, ac iterum de integro coquitur, & in orbis vel alias quaslibet formas, aqua prius adjecta, diffunditur, Ceraq; concreta ex aqua facile eximitur.

Cera aut est fulva seu lutea, aut fusca, aut alba.

Cera candida, *ἐκλευκος*, Cera virginea, quam adolescentior Apum populus conficit, *Weis Wachs/ Jungfrauen Wachs*.

Cera candidissima, *Schne-weis Wachs/gebleichter wachs*. Fit post insolationem etiamnum recocta, lucente Syrio. Venetiis ad nos affertur.

Cæteri coloris sunt ascititii, ut viridis ab ærugine, ruber ab Anchusa seu Cinnabrio: niger ab atramento vel charta usta. A quibus mistis vires mutantur.

Cera simplex, optima est, recens, subflava, subpingvis, pura, odorata, odoris Mellei: secunda bonitas, candida, & quæ sua natura pingvis est.

Cera omnis calefit, mollit, digerit, modicè explet corpora. Calidi, frigidi, humidi,

sicci quodammodo sec. Galenum, media, crassioris essentia, emplastica. Eapropter aliorum Medicamentorum, tum excalescentium, tum refrigerantium, materia est, forisq; imposita concoquendi vim habet exiguam, quandam atq; imbecillam, & calidam, & ut Ægineta tradit, vim abstergendi obtinet.

Additur Ceratis, Unguentis, Emplastris, ad consistentiam, & liquidorum inspissationem.

In sorbitione Cera datur Dysentericis, nec Lac in Nutricibus patitur coagulari.

Ex Cera fiunt candelæ, quæ in mensis domesticis hyberno tempore lumen præbent.

Oleum Cerae eliciunt Chimi, ad dolores podagricos sedandos, vulnera ulceraq; curanda præstantissimum.

Apis fera.

Apis sylvestris *Vlyss. Aldrov.*

Ein-Hummel/vulgo sil.

Tota

Tota est hirsuta, Corpore crasso nigro, cujus superiorem partem lineæ lariusculæ per transversum pingunt luteæ binæ. Caput splendendum nigrum, antennæ juxta oculos prætenduntur binæ. Podex extremus cum hirsutie albet. Pennis volat quaternis, coloris fuliginei, Pedibus incedit senis, in extremo asperiusculis.

Sub terrâ nidum parat. Favos fingit longè aliter quàm Apes aut Vespeæ. Cellulas enim extruit teretes, longiusculas, inæquales, aliquando quinque, interdum sex, plures sæpè, veluti vesiculas Ouales conjungit, cerco lentore maddentes, nec prorsus inodoras. Harum aliæ vacuæ visuntur aliæ sobolem continent, aliæ in Mellis usum destinantur, ut eas impleant.

Mel colligunt, at inspidum & pravum.

Vehementer pungunt. Ictum comitantur Symptomata, quæ Apum ictus, sed intensiora: verum stimulum in percusso loco, ut Apes, non relinquunt.

Iisdem, quibus Apum dolor, auxiliis mulcetur.

Tritæ & illitæ Alopecie medentur.

Araneus.

Αράχνη, Diosc. παρὰ τὸ ἀραιὰ ἵχνη ἔχειν, quod tenuia habeat fila.

Αράχνη, Aranea.

Ein Spinn.

Araneolus,

Αράχνης, Aranea.

Insectum est plusquam notissimum, Capite minimo, Corpusculo plerumque, rotundo, coloris obscurioris, telas seu fila mira arte expandens. Cruscis incedit ut plurimum octonis, quibus omnibus internodia terna.

Estque Caput minimum, toto quoque Corpore parvo est: In latere exiles digiti pro Cruribus hærent, Cætera venter habet, de quo tamen illa remittit, Stamen, & antiquas exercet Aranea telas. Ovidius.

Loca incolit ut plurimum deserta, inculta seu ab hominibus neglecta, ut sunt Arbores Parietes, Muri, anguli ædium obscuri. Vivit succis, Melle

Melle & aliis dulcibus. Venatur Apes, Musca & alia animalcula.

Cum coire volunt, femina deductam Araneam trahit, mas eandem mutuó trahit, quód ubi sapius fecerint, coeunt & averfis c'unibus copulantur: qui modus iis propter alvum orbiculatam convenit.

Pariunt Vermiculos primum parvos, ovis similes, propter figuræ scilicet orbiculatam speciem, Nam & rotundi jam inde á primo ortu proveniunt. Cum pepererint incubant, & triduo peragunt.

Pariunt omnes in tela, sed alii in subtili & parva, alii in crassiore, & alii penitus in specu orbiculato, alii ita ut foetui aliquatenus tela obducta sit.

Iusta sibi recipiunt incrementa diebus quater septenis, á parvo sui ortus initio usq; ad finem.

Ætate nonnunquam ex Rore salivari, arboribus & plantis inhærente procreantur, quas totas aliquando corumpunt, nisi maturius auferantur.

Aranei differunt variis modis.

forma; dum Alii rotundi, longi, vespis, formicis similes.

quantitate: Alii magni, parvi, mediocres,

colore. Quidam cinerei, fuscí, nigri, subrubentes, virides, flavi, varii.

loco, Alii in domibus locis obscuris degunt, alii in campis seu terra vitam agunt, alii ad sepimenta telas suas expandunt.

textura Alii nullam telam parant, alii telam texunt, eamq; vel subtilem vel crassiore, raram vel densiore.

Araneus asterius.

Aranea stellata domestica,
Araneus ἀστέριος Vlyss.
Aldrov.

Ein Gestirnte Hausspinne.
Color ei obscure flavens, punctulis seu stellulis nigricantibus varius. Pectus Cordis figuram ferè æmulatur trigonam. Antrorsum é Capite prominent cornicula minuta bina, antrorsum incurvata. Denticuli duo inter hæc subrubentis coloris existunt, ceu forficula extremis hamulis minutissimis aduncis, quibus quaslibet res prehendere & tenere potest, sub his alii duo breviores.

S f f

viores.

viores, Venter rotundus, oblongiusculus semen Miragviliolæ apprimé refert, apiculis duobus minutis. É podice tantillum prominentibus, quæ exerere & retrahere potest. Per medium Dorsum lineæ secundum longitudinem excurrunt binæ atræ, quæ notulis seu asteriscis luteolis insiguntur. Crura habet octo crassa, longiora, ex luteo obscuro & fusco varia.

Occupat parietes & ædium cœclavia, in quibus telam amplissimam & densam mira arte textit & extendit, in medio concavam.

Ex raptu Muscarum, Culicum & aliarum bestiolarum vivit.

Ova folliculo immittit candido, ceu serici molliusculo, quæ incubando fover & excludit.

Venenatus admodum est, & morfu lædit.

Araneus sphericus.

an Aranea Uvea?

Eine grosse Kugel Spinne.

Figura Corporis rotunda, aliquando globuli saxeï, quo pueri ludere solent, magnitudinem æquat, Collo ferè

nullo, coloris Uvei ad nigredinem declinantis. Pedes habet octo ut prior.

Utr plurimum desertis domorum locis habitat.

Araneus lupus.

Λύκος Ἰώνόδ Muscas ven-
δαλος stur, trahat, & enecet
Araneus Muscarius,
Araneus venator.
Ein Zaun Spinne/
Fliegen Fanger.

Grandi est capite, lanuginosus, coloris fusci, asperam parvamque telam apud terram ad sepes, parietes, Apum domicilia textit, exiguo tempore longa fila ducit, cavernarum exigua vestibula præpandens, & telarum primordiis intus positis observat, dum aliquis in tela offendens commoverit, mox accurrit ut rapiat.

Non solummodo Muscas perdit, iisque pascitur, sed & Apibus & Vespis, omnibusque ad telam advolantibus Animalculis insidiatur.

Araneus subrubeus.

Eine dunckelrote Spinne.

Pedes obtinet octo breves, crassiusculos, qui Corpori latiusculo ad latera annectuntur.

tur, trigonæ fermé figuræ, Cordi æmulo, Caput minutum nigricat, Collum nullum habere videtur. Color universus ex fusco rubet.

Domesticus est & palatium suum in ædium angulis obscuris expandit, & telam texit densiorem.

Araneus messor.

Araneus μακρόπους.

Araneus longipes.

Ein Langbein/

Weder/ Vulgö.

Habergeist. f

Corpus rotundum oblongius, Orobo semini simile, superius cinereum, punctis minutissimis nigris varium: ventre albido. Anterior præ-tenduntur antennæ ceu hamuli duo incurvi. Crura omnium longissima habet, quæ avulsa diu palpitant, & scenisecæ instar, falcem seu batillum manu trahentis, contrahuntur & dilatantur.

Parietibus, Muris & aliis obscuris locis stabulatur, Agros etiam colit, nec ullam telam texit.

Araneus terrestris.

Araneus pulex nonn.

Ein ErdSpinne.

Color ei totus fuscus subniger, Corpus brevius habet, & breves pedes. Terram inhabitat. Cursus celerissimi, Salit etiam.

Araneus terrestris

Μεγαλονέφαλον.

Araneus terrestris alter.

Schwarze ErdSpinne.

Corpore ex atro & albo variat, capite grandi, candicante, brevibus antennis; pedibus cinereis.

Araneus gramineus.

Araneus pratensis Vlyss. Aldrov. Viridis.

Eine Grase Spinne.

Totus est viridis, Corpori protenso, & alvo acuta, maculis insignis.

Araneus luteus.

Ein gelbe Spinne.

Corpusculo est minimo, flavo, triangulari, pedibus octonis. In arboribus aliquando visitur, earum foliis se involvens.

Araneus lupus cum splenio subactus, & linteo illitus, prolatusque utrisque temporibus aut fronti, Tertianos circuitus persanat. Idem præstare fertur Avellanæ, demto nucleo, inclusus, & collo suspensus.

S f f 2

Araneus

Araneus telam texens candidam, in aluta ligatus, & brachio appensus. Quartanis circuitibus resistit. Decoctus ex Rosaceo & infusus, Aurium doloribus succurrit. Qui verò diducit filum ex alto, tritus atq; admotus, inhibet muliebres purgationes.

Aranei tela.

Ἀράχνης Ἀράχνης πέπλος,
Rere scutulatum Aranei,

Plinius

Araneæ Vestis.

Ein Spin Webe/
Spig Web.

Aranei telas varia arte texunt, utpotè ad textrinum opus spontè nati. Non enim textili artificio student, neq; aliunde filum assumunt, sed ex suo ventre stamina deducunt, celeritate pedum venabula contextunt, atq; in retis speciem diffundunt, tum fila quæ ad texendum de ventre suo detrahunt, iisdem ventrem suum studiosissimè alunt. In his foramen sibi semper excavant, in quo tanquam in insidiis latentes, irretiti Museas retinere in escam, ac deprædari possint.

Tela venenosa non est, li-

cet de visceribus Aranei egrediatur.

Candida, vi refrigerandi, adstringendi & glutinandi pollet, Lingvæ & Labiorum ulcera sanat.

Lupi tela imposita sanguinem sistit, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis injuria vindicat, saniem fieri prohibet, & plagam consolidat.

Qvo fine sale permistam vulneribus recentibus vulgus applicat.

Aranei Muscarii telæ, & præcipuè spelunca ipsa, fronti ad duo tempora affixæ, mirabili ac salutari vi Epiphoris mederi dicuntur.

Cum unguento Populeonis Carpo alligatur, ad febrium exacerbationis tollendas.

Aranei venenum.

Venenum Aranei frigidum censetur. Si ex improvviso devorentur in cibo, aut potu hauriantur, Corpus refrigerant valdè, frigoris sensus & horrores inducunt; Corpus obstupescit, & instar Anasarcae intumescit, Color depravatur, & omnes actiones hebescent.

Quæ symptomata à me sæpius

pius animadversa fuere, in-
primis verò ante sexennium,
in Coniuge mea svavissima,
quæ cum fortè fortuna in po-
tu Araneum hausisset, Cor-
pus totum mirè intumuit,
cum partium externarum re-
frigerio, & fœdo faciei colo-
re, qvælis Cacheticorum esse
solet. Hanc ut Cachesti-
cam cum curare instituisssem,
purgantia, nec hydrotica, nec
alia pharmaca, qvæcqvam
profuere: donec tandem ex-
plorata genuina causa, An-
tidotis veneni vim infringe-
rem, & reliquias sudoriferis
discuterem: qvorum usu,
Deo misericordie laus & sem-
piterna gloria, brevi curata,
& probe in integrum restitu-
ta fuit.

Antidota sunt.

Terra sigillata Strigoni-
fis.

Lapis Siderites.

Melissa.

Carduus benedictus

Absinthium Romanum.

Cortices Citrii, Arantia-
rum.

Sem. Citrii, Card. bene-
dictus.

Pulvis noster bezoarticus
aureus.

Theriaca Androm. Diates-
faron.

Mithridatium.

Cerebrum Gallinarum cum
exiguo piperis è vino dulci
potum.

Vinum Absinthites.

Melissatum:

Aqua Theriacalis.

Aranei morsus.

Aranei non ictu sed mor-
su venenum ejaculantur.
Deprehenditur stupore inde-
morsa parte, refrigeratione
extremorum, & Alvi flatu-
bus.

Vulnus aceto abluatur è
vestigio quàm valentissimè.

Theriaca seu Ceba & Allia
trita imponantur.

Muscæ tritæ attrahunt ve-
nenum, & morsum mitigant.

Coagulum Agni cum vino
sumrum.

Arachnites.

Aegonius Recent.

Lapis stellatus,

Victorialis

Spinnenstein/

Sternstein/

Siegstein.

Passim circumfertur lapis
albicans, stellulis plurimis
seu notis pictus fuscis, quæ

§ § §

aliqvando

aliqquando Araneorum figuram æmulantur.

Hinc Imperiti quidam autumant, Araneos hunc generare, cum revera sit mineralis, & magna frustra aliquando inveniantur. Oculi figura plerunq; extruberat. Aliis Cordis figuram sculptores affingunt.

Venena suspensus arcere creditur: Ictus Scorpionum & Araneorum morsus sanat.

Potus & Collo suspensus Caduco morbo correptos erigit, & Hydropicorum aquas exiccat.

Ascarides.

ἄσκαριδες, ἀσκαρίζω, id est moveo.

*Kleine Würme/
Maden Würme.*

Lumbricorum secundum genus VI. Aldrovandi, colore, magnitudine & loco differens.

Ascarides Animalium

Parvuli sunt, & tenues lumbrici albicantes, qui parte potissimum inferiore plenioris Intestini, quæ podici proxima est, gignuntur, vehementem pruritus loco afferentes.

Apparent plurimi in jumentis, qui male cibum concoquunt.

Sentiunt hoc malum Homines, præcipue ante pubertatem.

Sæpenumero ab Infantibus præsertim ἀσκαρίασις excernuntur.

Kinder Würme.

Kleine Maden Würme.

Vehementiora requirunt medicamenta, quam alii Lumbrici,

Semen Lumbricorum.

Rasura Cornu Cervi.

Centaureum minus.

Glandes ex Melle cum Hiera, ex carne salsa cum filo appensa. Infusiones ex dec. Centaur. Absinthii cum Nitro, Melle, vel cum Hiera picra & sale.

Ascarides Caseorum.

Vermiculi Caseos erodentes.

Räse Maden.

Vermiculi sunt candidi, in Caseis cariosis nascentes.

Ab Agricolis sine noxa cum Caseis devorantur: difficulter concoquuntur, obstructions pariunt, & crassum gignunt sanguinem.

Ascarides terrena.

Ascarides

Ascarides agrestes,
Erdenaden/
AckerWaden.

Non unius & ejusdem sunt coloris. Qvædam sunt candidæ, aliæ flavent, nonnullæ nigrae visuntur.

Aliquando plures in unum locum aliquem congregatae latent. Sata vastant earum radices subsecantes.

Sæpè aratro excinduntur, Avicularum cibus.

Ascarides militares.

HeerWürme/vulgò.

Minutissimi sunt vermiculi, capillares, subalbidi, qui æstivo tempore instar catenæ coherentes, longo ductu vicinios montes perreptant, ac si exercitum ducerent. Has si Montium juga versus processerint, annonæ caritatem: sin verò, deorsum ad plana declinaverint, annum fecundum & fertilem portendere Monticolarum opinio.

Ascarides palustres.

WasserWaden.

In puteis aut ubi aqua se colligit, terrena subidente concretionem oriuntur. Fit principium sæx ipsa putrescens, ut colorem candicantem trahat, mox nigricantè,

postrema cruentam. Hinc minutissima qvædam, & rubra specie algulae prodeunt, qvæ ad tempus hærentes suæ origini moventur, deinde absolvuntur: itaq; feruntur per aquam *Ascarides* vocatae.

Asellus.

Οντοκος Galeni.

Οvos Dioscor.

Τίλοι Plinii.

Κουβαγίδες

Κατακιδιος ovos Scribon.

Multipes

Porcellio,

Cutio Mancell. Empir.

Ein Eselin/

Schaffelein/

Hols Wantele/

Kanckhorn Wurm.

Bestiola est è vermibus terræ, subcinerei coloris, multis pedibus arcuatim repens, ad contactum se in orbem pilulae similem contrahens ac rotundans.

Nascitur in humidis locis, ad Cellarum parietes & fenestras, item sub vasis aqua repletis.

Tenuium est partium, digerit, extenuat, abstergit, aperit.

Ex

Ex vino potus, Calculo Renum, Urinæ difficultati, & Regio morbo auxiliatur.

Cum Melle Anginis utiliter illinitur, tritus & in cortice Punici mali calefactus, doloribus Aurium addito Rosaceo convenienter instillatur.

Panno lineo involutus in vino albo maceratur. Colatura potui datur Asthmaticis, dictum mirum, quam brevi fabricatos pulmones depleat.

Pulvis ad Oculorum affectus valet. Vaccis cum frustulo panis, cum inflantur præter morem, Villici devorandos Afellos præbent.

Porcis etiam utilis, qui tuberculo in maxilla superiore, vulgò das Mancern infestantur.

Aurelia.

Χρυσάλις, Aristot.
Μελολάνθη, Eustath.
Zarua Papilonea,
Ein GoldBurm/
GoldKaupe,

Aurelia folliculus est seu Ovum ab Eruca relictum, Papilionis futuri larva seu matrix.

Duplex Aureliarum genus

hactenus deprehendere licuit.

1. Aurelia ovalis, Rubei est coloris, forma oblonga terete, altera parte sensim in acutiem desinens, annulis senis septenisve distincta. In hoc tanquam ovo singularis continetur papilio, qui jam maturus, latiore extremitate perforato folliculo evolat. In ejusmodi folliculos immutantur Bombyces, Erucæ, item nonnullæ.

2. Aurelia ἀνδραπόμορφος & verè Aurelia dicitur. Formam refert infantis fasciis involuti, humana cum mitra, corniculis duobus prominentibus. Venter, ut ita loquar, annulis compactus octo novemque, instar caudæ sensim in acutum desinit, ac retrò & antè movetur. In tota parte prona, in singulis annulis tubercula bina seu papillæ visuntur, ut plurimum decem & quatuor.

Color huic varius est; vel enim tota aureo colore refulget, ac si inaurata esset: vel flavet, aut subvirescit, & maculis passim aureis respergitur: vel Cupri colorem representat: vel argenteo nitet candore: vel albicat ad latera, &

ra, & purpurascit, punctis & striis nigricantibus intercurrentibus variis.

Hanc Erucæ tanquam fœtum suum inde nasciturum parietibus, Muris, arboribus appendunt, ex quibus calore Solis elaboratis enascuntur papiliones, qui avolantes Brassicâ & alias plantas arrodunt, & Ovis suis conspurcant, unde tantæ Erucarum Augusto & Septembri colluvies prodit, ut integros sæpè agros Brassicâ confitos absumat, stipibitus solis relictis.

Blatta frumentacea.

Βλάττα ἢ Βλάττω id est noceo.

Σίλφη μαλακὰ Hes.

σιφοάγος,

Blatta mollis Dalcechamp.

Ein MeelWurm.

Vermiculus est longiusculus, teres, luteus, splendens, ex duodecim annulis compactus, Cauda capillari brevissima bifida, Capite rubente minutissimo, cui ad latera antennæ tenuissimæ prominent, Prioribus tribus tabellis subsunt pediculi seni, utrinque terni, quibus incedit.

In pistrinis & apud pistores

reperiuntur. Farina enim nutriuntur. Luscinia has avidissime legunt, quibus facile capiuntur. A morbis familiaribus eas liberant,

Blatta carnivora.

Barbegia

Carpæ

Fleischschaben/

Fleischwürme.

Prioribus sunt similes annulosis incisuris, sed multo breviores & tenuiores, Pedibus incedunt totidem. Anteriore facie crassiores sunt, quæ deinde sensim gracilescentes in acutum delinunt.

In carnibus nascuntur falsis inveteratis, primò vermes albi, dein toti hirsuti evadunt, annulis alternatim rubentibus & flavescantibus. Venter semper albicat. Tam exactè ab ossibus carnes denticulis suis auferunt, ac si novacula rasæ essent.

Blatta fatida.

Εδύσσαί quasi Εδύλκται,

Σίλφη foetens

ωονδύλη Nonn.

Erdschaben.

Insectum odore invisum, acuta clune, Cimicum modo

T t t putidum,

putidum; Coloris fufci, pedibus & antennis plús rubentibus.

In aggeribus & apricis inveniuntur.

Blattis eadem vires cum Buprestitribuuntur. In oleo decoctæ Aurium doloribus medentur.

Molles Verrucis illinuntur.

Bombyx domesticus.

Βόμυξ, *Aristot.*

Bombyx, *Plinii.*

Bombylis, Bombylius,

Eruca Serica, Vermis Indicus.

Vermis lanificus, *Alberti.*

Vermis Indicus corniger, *Ambros.*

Ser vestifluus á Seribus populis.

Ein Seiden Würmlein/
Seiden Raupe.

Vermis est annulosus, coloris cinerei, ex Erucarum genere, tenuissima fila nens & ducens, quæ Sericum appellantur.

Quidam tradunt, hunc primum in insula Coa repertum, ac Pamphilam Platis filiam bombycia illic principio novisse: inde propagationem secutam, quæ terrarum orbem compleverit.

Gignitur vel sponte, ut olim apud Seres: vel ex ovis, ut hodie frequenter fit in Europa.

Varia ejus est Metamorphosis.

Ova.

Primo Ova post coitum á Necydalo matre edita, & per hyemem loco tepidiore reservata, formam testæ compressæ, aut glumæ grani Miliaris habentia, alba, citrina, albolutea, livida seu plúbea, Vere primo, Aprili (seu Majo mense apud nos) Luna plena, vino albo tenui consperguntur, deinde calori blando ignis ad fornacem vel solem exponuntur; vel pulvinari molli, aut sinu Muliebri sub Mamillis fovetur: hinc in molli linteo inter duo cervicalia locantur: inde intra triduum, eroso putamine,

Erucula.

Erucula seu Vermiculi nigri pilosi prorepunt, primum capitulo, dein pedicellis, & reliquo tempore multiplex se involventes, quibus statim ac natis præbentur tenera Mori folia, quæ paulatim augentur, & deposita pelle seu senectæ, certis interval-

lis,

lis, colore & quantitate mutatis, post quartam mutationem, fiunt

Bombyces.

Bombyces, quæ Erucae hirsutæ formam habent, Corpusculo graciliore, Auricularis ferè digiti, seu Calami scriptorii crassitie, longitudine verò medii. Cui color plumbæus, niger, Caput protuberans nigrore splendet; Pectus, è cuius crate (ut ita loquar) sparsim sex pediculi porriguntur, albet: in cætero ventre vestigia pedum sunt (octo plerumque) seu pinnulae aut trunculi: posticum bifurcatum est. Pro cauda & pedibus posterioribus, duo quasi denticuli sunt & pedamenta, quibus protrudere sese & erigere quæant: interim crassitie & longitudine proficiunt, nigredinèq; dilutior facta, in fuscum & cinereum mutatur, & tandem abjecta tunica paulatim albescit, & sic sensim fit immutatio in Bombycem, Sole scilicet Cancrum subeunte.

Bombylis.

Bombycium. Post quartam Corii abjectionem, jam jam sesquimestres aut circiter, in-

cipiunt fila meditari Julio scilicet. Primus labor stupam, filave rudiora & intricata edit, quæ ex ventre promit, distribuit, & multiplici Corporis motu flexuq; ibi attexit, quin & pediculis anterioribus applicat, quorum firmitate Bombycia pendeant. Inde sequitur folliculi seu Bombycium ex amplo in angustum complicatio, dum fila ducuntur modo in orbem, modo recta, modo revolvuntur, donec Ovi-formis vesicula totum Vermem claudat.

Sunt verò Bombycia, folliculi seu vesiculae ovaes, quibus Bombyces se involvunt, & sepulchrum tutum sibi fingunt, in quo tanquam sub terra homo, transmutationem, & generis reparationem expectant Bombyces.

Biduo aut triduo Bombycium absolvitur, tuncq; nec strepunt intus amplius, nec moventur. Sed si Bombycium manu agitaveris, tanquam mola intus cadit, & latera ferit, unde cognoscitur mutatum Bombycè in Nympham esse Folliculo absoluto, rapiuntur vellera, selectis pri-

T t t 2

ad in

ad instaurationem generis Maribus, quorum folliculi minores, & femellis quorum majores sunt, ad arbitrium.

Nympha.

Quintâ senectâ exutâ (pelle nimirum cum capite & pedibus & cauda) dein perarescente cortice vermis obducitur, accipit formam Nymphae dictæ, quæ Insecti volatilis seu Papilionis rudimentum, colore fusco aut rufo: unde

Aurelia.

Aurelia $\chi\sigma\upsilon\sigma\alpha\lambda\acute{\iota}\epsilon$, Larva Papilionea dicitur, cortex nato Papilione relictus.

Necydalus.

Post quadragesimum diem (Totum enim mensem somno sepulsi dormiunt) Necydalus, cum jam intra Aureliam perfectionem accipit, frequenter moveri solet, se expediendi causa, donec tandem relicto corio, seu eutheca, parte latiore seu basi, humore quodam acris, ex osculo effuso aut expresso, madefacto emollitoque datâ viâ prodat, subinde foramen

pectore & ventre majus faciente. Quod sit plerumque cum Sol virginem attigerit. Est autem Necydalus ($\nu\epsilon\kappa\upsilon\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma$ Arist. Invalida $\alpha\lambda\lambda\alpha\tau\acute{\eta}\omicron\rho\epsilon\nu\omicron\varsigma$ $\nu\epsilon\kappa\upsilon\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma$, veluti redivivus, morte liberatus) Insectum volucre, instar papilionis ignavi, quatuor alis instructum, lanugine albicante aut grisea vestitum, ventre oblongo & pigro, circulis veluti distincto, & mobili, crasso, pinguique. In vertice cornua gerit duo, ab latere utroque plumulis hispida, ipsa inter se aversa & recurvata. Pedes femi utrinque terni, villosi & breves. Non volant sed moventur cum strepitu, & mas magis: non pascuntur, sed generationis opere peracto, fati concedunt.

Coitus.

Ut primum absoluti sunt, purgatis Corporibus, statim generationi dant operâ, Mares feminis multo minores copulantur, femina apicem posticæ partis in ventre recurvatum, in Maris naturam immitte, à quo retinetur quasi ferrea quadam, & sex retinaculis divisa manu. Hoc mutuo cohesu juncti aliquan-

aliquandiu commorantur, & intra triduum coitum perficiunt.

Partus.

Peracto concubitu, humorem per posteriora excrementitium, coloris vel citrini vel rubescentis vel albid, tanquam per canalem exprimit, idq; tanto cum impetu, ut quasi é siphone in aërem porro ejaculetur, deinde Ova statim deponuntur ordine alterum post alterum, numero plurima 50. 100. 200. & plura; quæ instar seminis Papaveris seu Hyoscyami, supernè modicè compressa, testula cutanea investita, succo intus comprehenso uniformi. Hæc maximè succulenta, primò quidem candida vel alba, successu temporis citrina vel plumbea evadunt. Charta vellinteo industriè convoluta, & capsulis inclusa collocantur in tepidario, ubi æstatis residuum, Autumnum & Hyemem transigunt absq; perfectione; quæ tandem iusto tempore, quo ceteræ naturæ revocantur & vigescunt, singulare Resurrectionis nostræ argumentum nobis re-inquantes. Bombyces itaq;

cū tres ferè Menses in opere, somno & coitu, sine cibo ac potu transegerunt, Sole jugum, aut ad summum Scorpionem, subeunte emoriuntur.

Alimentum.

Nutriuntur & aluntur Bombyces foliis Mori, quæ peculiare iis nutrimentum sunt, Ulmi, Rubi, Lactuca agnina. urtica recenti tenella &c. Cūm pascuntur, perreptant folia ab utraq; parte, & inter edendum incurvant pectunculum, rostrumq; defigunt, & perforant folium. Excrementa pilularum instar ferè rotunda subviridia sunt, quæ quotidiè expurganda, cū recens pabulum subministratur. Ter ut plurimū in die cibandi sunt: Vitanda nimia satietas, & fugienda fames.

Utilitas.

Bombycum natura censetur frigida & humida.

Bombyces exiccati, & in pulverem redacti, vertice Capitis, vertigini & Convulsioni obnoxii insperguntur.

Bombycia.

Βομβυκία,
T t t 3

Folliculi

Folliculi sericei,
 Ades sericeæ,
 Sepulcrum sericeum.
 Seidenbälglin / Seiden
 Henslin.

Differunt colore. Alia aurea, viridia & alba; alia rubella, Pomi Arantii perfecti colore, quæ optima sunt.

Pauca instaurandi Bombycis gratia servantur, ex quibus sufficiens expectari potest proventus. Ex decem enim vesiculis masculis, & totidem feminis, plura quam ter mille prodibunt Ova. Cætera revolvuntur, ut fiat Metaxa dicta seu seta.

Ad usum Medicum veniunt frequenter folliculi, devoluto Serico, è quibus prorepsit Necydaus.

Sæpè adhuc latitat Necydaus mortuus, vermibus exesus.

Verùm diligenter sibi caveant Pharmacopolæ ab istis folliculis, alvi spurcitia fœdatis, ac stuppa ignata, sed eligant potiùs Sericum crudum, purum, explicatum. Ea enim est substantia veri folliculi.

Arabes, & qui eos sequuntur, miram huius facultatem & virtutem Cor roborandi assignant.

Sericum crudum.

Μέταξα, πέταξα,
 σκρινὸν ὄμμα
 Βομβύκιον

Bombycinum *VI. Aldrov.*
 Seta cruda *Officinar.*
 Bombycina tela,
 Filum Bombycinum.
 Rohr Seide.

Est lana, quam Bombyces ex propriis visceribus operantur. Sericum Seres populi Asiæ Scythicæ primùm miscrunt, ubi Erucarum sericarum maximus proventus, ut tela circum arbores ducerent.

Sidonius.

Assyrius gemmas, Ser vellera,
 Thura Sabæus.

Virgilius.

Velleraq; ut foliis depectant
 tenvia Seres.

Plinius Bombycem laudat
 Assyrium. Arabia quoq;
 Bombyce abundat.

Propertius lib. II.

Nec si quæ Arabico lucet
 Bombyce puella.

Italia etiam optimam habet Bombycem, ex qua Florentini, Veneti, Genuenses, Mediolanenses optima & laudabilia faciunt serica.

Nec

Nec Galliæ Turonenſis provincia hiſ caret.

Germania, ut & Sileſia, Bombyces alit & nutrit in domibus, voluptatis potiùs quàm utilitatis gratiâ. Hanc ſumus Rerum Opifex Lino nobilitavit & locupletavit, quod tanta ubertate, bonitate & excellentia naſcitur, ut reliquas Regiones omnes longè ſuperet. Ex eo, induſtria & ſtudio incolarum, feminarum præſertim, telæ ſubtiliſſimæ ſunt & parantur, ut non ſolùm per Europam univerſam diſtribuantur; verùm etiam ad extremas Indias, magno regionis commodo, devehantur.

Sericum temperatum eſt, ſeu calidum & ſiccum primo reſeſſu. Exiccat, attenuat ea Naturæ dote, ut Cordi robur afflet, lætùmquæ efficiat. Quapropter laxat, firmat, purificat & illuſtrat ſpiritus & ſanguinem, virtutem vitalem roborat, & mirificè exhilarat. Venenis & Peſtilentiæ reſiſtit. Ob id Cordialibus medicinis frequenter additur, veluti Confectioni Alchermes, Diamoſcho & aliis.

Sericum Kermefinum.

Fila cocco tincta,

Scharrlachrote Seyde.

Variis modis Sericum tingitur, ſed ad Medicum uſum inprimis eligitur id, quod ſucco granorum Kermes fuit imbutum.

Sanguini ſiſtendo non abſurdè accommodatur. Vulneribus conducit obligandis exiccandisque.

Vulgus eo frequenter brachia vel Crura fortiter conſtringere ſolet, in Narium ſeu uteri hæmorrhagia.

Pannus ſericeus Kermefinus ad ſacculos Cordiales in officinis aptatur.

Bombyx ſylveſtris.

Similis Metamorphoſis in Erucis quibusdam virentibus æſtate obſervatur. Quæ jam grandiores factæ, ſolliculo teneriſſimo candido ſe includunt, & in Nympham abeunt, ex qua Papilioes variæ coloris, aliquando candidi hirsuti, quaſi farina alba aſperſi, Necydalis non diſſimiles, corpuſculo craſſiore ex nigro ſplendente oriuntur,

qui

qui postquam ova plurima
cumulatim foliis Arborum
aut parietibus, spuma seu la-
nugine veluti molliss. candi-
da seu citrina, quasi involu-
ta asperferint, pereunt,

Bruchus.

Βρουχος.

Ein Höppling/ vulgò.

Minor est Locusta, nigri
coloris, alis cinereis, sub qui-
bus rubet.

Cantharis.

Κανθάρης, Diosc. id est, par-
vas Scarabæolus.

Musca viridis Hispanica.

Ein Spanische Mücke/

Fliege/

Meißlandischer Käfer/

Goldwürmlin.

Insectum est κοιλέοπικρον
ex Scarabæorum genere, ob-
longius, ex aureo fulgore vi-
rescens, quod frumenta arro-
dit.

Nascuntur Cantharides ex
vermiculis Erucis similes, qui
proveniunt ex humore, foliis
Fraxini, Populi, Tritici in-
hærente: & quamvis coeant
& generent, non tamen sui
generis animal, sed Vermic-
ulos procreant.

Rariùs apud nos occurrunt.

Aliquando inter legetes v-
suntur; nonnunquam in Fra-
xino, Populo & Salice stabu-
lantur, quarum folia arrode-
re solent. Hoc anno magna
harum abundantia fuit. Vul-
gus singulo septennio appa-
rere credit.

Probantur Versicolores, &
quæ luteas in alis transversis
lineas habent, Corpore pro-
misso, crassæ, ac Blattarum,
modo pingves, recentes. Inu-
tiles ac inertes, quæ unius co-
loris sunt & virescentes, judi-
cantur. Nam facillè cariem
sentiunt.

Enecantur per linteolum,
vapore aceti, & reponuntur
ad usum. Acri pollent facul-
tate. Excalescunt in sum-
mo gradu, & exiccant secun-
do. Erodunt, ulcerant, calo-
rem eliciunt, & deniq; sumen-
tes interimunt, fœtent, & diu-
reticam facultatem obtinent,
nocent privatim Vesicæ, o-
mnibusq; urinæ inservienti-
bus membris, non modò hau-
stæ, sed quandoq; etiam ex-
teriùs illitæ, confirmante ex-
perientia: licet alii contra-
rium statuunt.

In Remediis externis, tum
iis quæ Vesicas excitant, tum
aliis

aliis interdum tota sumuntur. Recentiores capita, alas & pedes abjiciunt. Ureticis á Qvibusdam miscetur, & qvæ Lepras ferasq; Lichenas & Carcinomata sanant.

Menses eliciunt, pessis emollientibus addita,

Matthiolus á cane rabido demorsis præbet.

Cum uva Taminea ad verrucas laudat Plinius.

Axungia Leporina mista, & linteolodensu retró Aures posita, vesiculas excitando fluxiones retrahunt, Denti-umq; feroces dolores abigunt, trito vulgi usu. Alii Cervici affigunt in Ophthalmia, Epiphoris & Suffusione: ac cauté his utantur svaserim, ne Morbo Morbum accersant. Possem plura exempla adducere, qvám malé cessarit earum sinister usus.

Ante sexennium circiter, Vir nobilissimus vehementi Ophthalmia, ex acri defluxione correptus, Chirurgum imperitum ejus loci consuluit, qvi cum fluxum ab Oculis ad Cervicem retrahere moliretur, Emplastrum ex Cantharidibus nuchæ apposuit. Ex cujus usu ulcus summæ malitiei gangranosum laté ser-

pens, enatum fuit, cum Hepatis & Renum inflammatione, comitante Gonorrhœa, ut ob id in summum vitæ periculum inciderit, & ni Chirurgorum peritorum ac Medicorum diligenti opera fuisset repressum malum, tabe consumtus periisset.

*Cantharis formicaria
latior.*

Ein Goldkäfer in Dmes
Hauffen.

Forma similis est Scarabæo Najali majori rutilo, at brevior, capite parvo; tota superiore parte, colore orichalcum refert, subvirescens non-nihil, prona veró parte cum pedibus senis hirtiusculis Cupri ruborem ementitur.

Generatur in acervis Formicarum, ex verme albicante, hirtiusculo annuloso, longiusculo, digiti minimi feré crassitie, verticillæ admodum similis, qvi ut Nympha folliculo duro ovali, olivæ magnitudine, intus lævi, forinsecus asperiusculo, ex terra, resina & festucis compacto, convolutus detinetur. Augusto mense jam scarabæi formam adeptus, folliculum

U u u odoratum

odoratum rumpit, & relicto nido avolat.

Eandem vim cum priori obtinet, acrem nimirum & catharticam.

*Cantharis proluxior
cornuta.*

Ein gehörnter Goldkäfer.

Corpore est gracili & prolixo, duos digitos longo, pedibus senis, extremitatibus ferratis, thorace quadrato, Capite parvo, e cuius fronte Cornicula duo enascuntur tenuia, gracilia, purpuroviolacea, i. f. digitos longa, continuis geniculis distincta. Alae superiores ex viridi purpurescunt, venter hyacinthi colore nitet.

Julio mense reperitur.

*Cantharis cornuta
alia.*

Minor hæc est, & posterior ejus alvi pars in acutum definit, coloris ex flavedine obscura virescentis. Cornicula tenuissima, pinnis ceu plumulis continuis referta promit.

*Cantharis Amethysti-
zon.*

Ein violetbraun Käferle.
Viola Nonn.

Longiuscula est, compresso Corpore, capite parvo, antennis breviusculis. Colore Violam Martiam representat, jucundissimi aspectus.

Cantharis miniata.

Ein Friesen Würmlein
vulgò.

Fiebertkäferlein.

Color ei ex cæruleo non nihil subviridis, præter alas, quæ transversim lineis latiusculis miniatis insigniuntur. Caput parvum, cum isthmo gracili, cui venter jungitur compressior.

Majo in Rosis & aliis Plantarum floribus invenitur.

Ternæ in vertice Capitis trita februm circuitus amoluntur, Agricolarum experimento. Vesiculas excitant, quæ biliosum ichorem fundunt aperta. Escharotica vi ut Cantharides pollent.

Cantharis viridis longiuscula.

Ein lenglicht grünkäferlein.

*Cantharis viridis aurum
lucens.*

Καὶ δαίς χαρόχρυσος.

Scarabæus viridis Plin.

Ein Goldgrünkäferlein.

Visu intuitu recreare fertur.

Cantharis

Cantharis nigricans antennis longis.
Cantharis fulca seu 10.
 vlyff. Aldrov.

Ein schwarz Käferlin.
Cantharis castanei coloris
capite nigro.

Ein Braunkäferlin.
Cantharis rotunda 1.

Cantharis rubea.
 Ein rotes Käferlin/ Ofter-
 fälblin/ Pueris.

Cinnabarii est coloris, ven-
 tre latiusculo, dorso convexo.

Cantharis rotunda 2.
Cantharis guttata.
 Gespiegelt Ofterfälblin.
 Instar Minii rubet, sed alæ
 punctulis nigris respergun-
 tur.

Cantharis rotunda 3.
Cantharis viridis aurea.
 Gulden Ofterfälblin.
 Ex viridi aureus lucet co-
 lor, instar Cantharidum Se-
 plasiariorum.

Cantharis rotunda 4.
*Cantharis omnium mini-
 ma* Vl. Aldrov.
 Rubinrotes Käferlin.
 Minima omnium, quas vi-
 dere licuit, coloris elegantis-
 simi, instar Rubini lucentis.

Hæ Puerulis notæ, quas
 Majo in hortis inter olera,
 Rosæ & aliis plantis collige-
 re solent, nullius quod sciam
 usus.

Cicada fluviatilis.

Ein Wasser Grille.
 Bestiola est aquatilis, in ri-
 vulis nata, terrestri Cicadæ
 similis.

Terrenis Cicadis nos care-
 mus.

Cicindela.

λαμπυρίε, λαμπουρίε,
 πυρολαμπίε Arist.
 πυρολαμπίε Hesych.
Lampyrus alata vlyff. Ald.
Cantharis noctiluca
Nitedula, Noctiluca
Cicindela lunii.
Luciola Italæ,
Johannis Fliege/
Johannis Käferlin.
 Lichtmücke/
 Nachtmücke.

Insectum est pennatum, ex
 Cantharorum genere, Capi-
 culo parvo nigerrimo, in duo
 tubercula dispartito. Ocelli
 Bituminis nigri modo splen-
 dent: Alvus annulosa, mul-
 tis segmentis divisa, in cujus
 medio guttulæ duæ candidæ,
 noctu seu tenebris, ignis mo-
 do lucentes, diē non item.

U u u 2 Flammula

Flammula enim oppressa maioris luminis præsentia latitat, ne possit visum nostrum movere.

Æstate vesperi per prata & vias cernitur.

Cimices lectularii.

Κόρεαι δὲ ἀπὸ κλίνης. Diosc.

Wangen.

Wantelen/

Wandelse/

Wette Wantelen.

Vermiculi sunt latiusculi compressi rubentes, in cubilibus ad lectos & parietes nati.

Fœtidissima sunt, & dictu quoque fastidienda Animalcula, ex vapore quodam humidioris, ab Animalium corporibus foris collecto, genita.

Inter nocturnos hostes, qui nobis dulcem Somni quietem intercipiunt, nulli quidem nocentiores infestioresque habentur, quam Cimices: qui ut ipse qui non solum morsu dilacerent, quo & somnum interturbant, & sanguinem nobis adimunt: sed etiam fœtorem adeo detestabilem abominandūque ex se relinquant, ut eo longè magis sensus spiritusque lædantur, quam uni-

versæ Corporis partes, quæ ab ipsis fuerint ictæ.

Acri satultate præditi sunt. Cavis Fabarum inclusi, vel Melle & Cinnamomo involuti, devorati ante Febrium significationes Quartanis auxilio sunt.

Cum vino aut aceto poti, adhærentes sanguisugas abigunt.

Vivi triti, urinariæ fistulæ impositi, urinæ angustias levant.

Vulvarum examinationes olfactu revocant.

Cimices interimunt: Absinthium, Coriandrum viride, Cotula fœtida, flores Sambuci, Oximel scilliticū, Calx viva toris illita.

Cimices hortenses.

Cimices sylvestres,

Geisen / vulgò

Garten Wantelen.

Forma domesticis sunt similes, sed multo majores, partim virides seu herbacei coloris, partim flavescentes, partim subrubentes, æquæ ac illi fœtidi.

Fruges & herbas perrepant, ex quibus victum habent,

Cossus

Cossus.

Σκόληξ,
 ξυλοφάγορ,
 ξυλοφάγορ.

Cossus albus, Vlyf. Aldrov.

Teredo, Nonn.

Eine HolzMaede /

HolzWurm.

Vermis multipes, digitalis longitudinis, crassus, albus, Erucæ ferè similis, linea à Dorso ad caudam usq; conspicua, plurimis incisuris constans. Os nigrum, ex duobus velut introrsum se curvantibus dentibus confectum. Ad latera punctulis maculatur castaneis.

In cariosis lignorū caudicibus nascitur, & farina seu carie saginatur, cui involvitur.

Sanat omnia ulcera. Nommas verò combustus, cum pari pondere Anisi & oleo illitus.

Crabro.

Ανδρίων, Aristot.

Vespa coloris citrini aculeo infestissima Alberti, Plinii.

Eine Hornmüsse /

Hörnauß /

Hornlise.

Insecti genus, pennigerum, affine Vespi, sed multo majus, pertinacissimum, aculeo

pestilentissimo. Caput anteriorius, & Venter posterior, lutea sunt. Thorax hirtiusculus crassior, & Alvi initium ex flavedine rubent, ad castaneum colorem vergente, qui in maculam triangularem definit, reliqua tota annulis luteis compacta est, præter puncta supina parte subrubentia. Crurculis firmatur senis, asperiusculis. Alæ membranæ quatuor, superiores longiusculæ, latentes breviores obtegunt, coloris fumigati. Oculi fusci sunt. Cirri seu antennæ continuis veluti internodiis discretæ prominent croceæ. Ad posteriora aculeis latet, acutissimus.

Duces more Apum & Vesparum Crabrones habent, qui proportionem ad Crabrones, majores quam Vesparum ad Vespas, & Apum ad Apes sunt. Degunt hi quoque intus, sed non plures uno in singulis eorum alveis oriuntur.

Examinis emissio nulla, ut Apum, fieri solet, sed qui subinde oriuntur novelli, ibidem manent, & alveum fovēt ampliorem. Amplific-

U u u 3 cant

cant majorem in modum favos, & jam ex valentiore quodam Examine, qualli tres aut quatuor favorum pleni excepti sunt. Si qui Crabrones suo alveo aberraverint, colligunt se in aliquam arborem, favosq; ibi conficiunt in sublimi, qui sæpe conspicui apparent, in quibus unum procreant Ducem. Non ex floribus, ut Apes, cibum colligunt, sed carnibus maxima ex parte vivunt. Venantur etiam Culices, Muscas & Apes, quibus inter Caniculæ & Arcturi exortum, ante Alvearia plerunq; obsidiantur. Fructus dulces appetunt.

Degunt ut plurimum in sylvestrium Arborum, ut Quercus, Pyri, cavernis: nonnunquam & ædium conclavia subeunt, ubi miro artificio nidum trabibus ex ligno putrido annectunt: aliquando Alvearia Apum vacua subintrantes, nidum in sublimi suspendunt.

Longè lautior seu politior favus quam Vesparum. Cellularum oscula deorsum hiant, quibus fœtum instillant, quò à fluviis & aeris injuriis tutiores esse possint.

Vita bibratum non transit. Non enim cibum ritu Apum sibi recondunt, sed jejuni per hyemem latent, quo tempore plurimi moriuntur.

Favi Crabronum, adversus scrofulas, vulgò voss Driesen. Equis infunduntur.

Ictus eorum haud temerè sine febris est. Ter novenis punctis interficere hominem fama est,

Remedio est è vestigio suxisse vehementius, suctuq; infixos aculeos revulsisse. Parsin calentem aquam salubriter demergitur, per integram ferè horam, tandem aqua marina abluitur.

Theriaca, Mithridatium.

Malva sylv. Satureja.

Pastinaca pratensis,

Saliva jejuni hominis,

Bolus Armenus,

Sigillata.

Culex.

ab aculeo.

Kviϕ, σviϕ.

Muscram minimum genus, Corpore minimo, Alvo ferè jejuna, Cruribus prælongis, lingua fistulosa, & ad suctum,

factum, & aculei loco ad pun-
gendum, sanguinis & po-
tissimum humani avidissimū,
Proboscidis enim adjumen-
to, tenuissimum ac mollissi-
mum aculeum per cutim adi-
git usq; ad ossa, ac sanguinem
exugit.

Culicum varia sunt genera.

Culices Arborum.

BaumMücken/

Culices generantur ex rore
verno, salivari aliqvando, in
multis arboribus, Sambuco,
Fraxino & aliis, item in vesti-
culis Ulmi.

Culices fimetarii.

Kleine MistMücken/

Mücken/vulgò.

Oriuntur ex fimo, seu ejus
vapore putrido sæpè magna
Examina, Ex quibus si tur-
matim ad fimeta oberrarint,
Plebei aëris mutationem
colligunt.

Culices palustres.

αἱ ἐμπύδες,

Culices Muliones

WasserMücken.

Primum in humore putri-
do subsidente vivunt bestio-
læ seu vermiculi, deinde for-
ma immutata foris vitam a-
gere incipiunt.

Culices vinarii.

Κόροντες Arist.

EssigMücken/

Culices sunt minutissimi,
qui ex vermiculis capillari-
bus, qui in facie aceti gignun-
tur, originem trahunt.

Hi dulcia non accedunt,
sed acida petunt.

Culices abigunt, Succini, Co-
nyzæ fumus. Absinthii, Gra-
tiolæ, Rutæ, Nigellæ deco-
ctum aspersum, Cannabis
ramuli appensi.

Curculio.

Κίε Theoph. Κίε,

φάσις σίτου, Pediculus fru-
menti.

Cis, Gurgulio,

Ein Kornwurm/

Kornkäfer.

Kalander.

Vermis est frumenta ex-
inaniens, peculiaris Tritico,
Siligini, Hordeo. Nascitur in
granis excussis, quæ corrodit
& devorat, ex calore extra-
neo & putredinali, quem con-
trahunt ex situ, seu superfluo
humido dulci. Hic tandem
in chrysalin mutatus, è chry-
salide fit Papilio minutissi-
mus, quem frumentarium ap-
pellare licet. Vlysses Aldrovandus
Triticarium nominat.

Curculionem

Curculionem fugant tetri odores, Allii, Sulphuris, Lupulorum, Flores Sambuci, Cotula fœtida, Absinthium, Abrotanum, item frequens agitatio & commotio frumenti, anteqvam putredinem sentiat, si enim jam innatus fuerit Curculio, parum proderit, nisi in totum corruptæ fruges ablatae fuerint.

Curtilla.

â sono, quem æstivo tempore altum edit, ut etiam è longinquo exaudiatur, maxime noctu.

Talpa Ferrantis imperati.

Talpa annularis.

Vermis Cucurbitarius VI.
Aldrov.

*Cine Verre/ Sil. vom ver-
werren/ qvôd agros vastet &
depopuletur.*

Twäre.

Insectum est oviparum, è Grillorum genere, longitudine & crassitie Auricularis digiti. Anteriore facie Astacum fluviatilem, posteriore parte ventre nimirum Gryllum refert. Caput enim & Thorax testaceo cortice investuntur, ut Astaci, ex fusco rubente. Oculi nigerrimi utrinque eminent, instar picis

splendentis. Sub his cornicula duo oblonga tenuia, ceu exploratoria filamenta. Extremo rictui seu freno alia, veluti emissitia cornicula, seu appendiculæ veluti Locustis, in articulos seu internodia quaternaria minora & breviora superioribus, ac oris lateribus alia binae utrinque appendices, denique sub mento utrinque una protenduntur, quibus tanquam digitis alimentum in ore retinet ac complectitur. Venter mollis, Grylli similis, incisuris octo distinguitur, è cuius extremo spiculum exit geminum longiusculum ac subtile. Dorsum vestiunt alæ quaternæ, superiores breves & latæ, lineis & striis subrubeis marmoratæ, aliis angustis longioribus, & ad caudam ferè extensis incumbentes. Crura obtinet utroque latere terna duriuscula, geniculis divisa. Priora breviora tribus articulationibus compacta, in extremo Calcaris Equitis instar ferrata sunt, media tenuiora sunt, postica longissima, minus lata, quorum extremitates aculeis asperiusculis instructa sunt. Corpus universum tenuissima lanugine hirsutiem ostendit,

dit, parte supina & antica, subcastanei coloris, Ventre & pedibus flaventibus.

Insectum venenatum, in agris hordeaceis & Liniferis frequens, eos instar Talpæ peragrans & devastans, Agricolis invisum. Alatum humi repens sulcos elevat.

Radices totas consumit, & fruticū corticem tantū absumit.

Nidum in terra construit, & Ova subflava parit.

Admodū vocalis est, præfertim nocturno tempore.

Agricolæ ejus vocem diligenter observare solent verno tempore. Vix enim Hordeum, antequam cantillet, agris committere solent. U-pupæ in cibum rapiunt, & iis pullos suos enutrire solent.

Caput abjecto ventre, ut insigne amuletum, ab Agricolis prædicatur contra febrium exacerbationes: ob id argento inclusum collo gestatur.

Dipsaci vermiculi.

Weberfarten Maden.

Tineæ Dipsaci,

Vermiculi sunt candidi, annulis distincti, quos in E-

rucas abire, Vlyss. Aldrovandus Bonon. refert.

Contra Quartanas suspenduntur. Cavis dentium inditimi re prodesse Plinius autor est.

Equuleus marinus.

ἵππόναυπος Diosc. κάρπη, flexura, reliquo Corpore Equum refert, ab Equo & Eruca, Equinum Caput & Colum & Corpus, Cauda Erucæ.

Cabalio marinus Veget.

Dracunculus marinus,

Hippocampus Vl. Aldr.

Hippidium Athen.

Ein MeerKöslin/

SeeKöslin.

Insectum est marinum, cuius sceletro me donavit hoc anno humaniss. ac doctiss. M. Martinus Weinrich Medic. Candidatus, & Scholæ Vratitislav. ad D. Elisabetham Rector, quod ob miram fabricam hic inferere placuit. Longitudo tota sex digitorum. Rostrum ejus oblongum, teres, tubuli modo cavum, Capite, & Collo protuberante, Equino non dissimile. Corpus seu venter latiusculus est, ex circulis cartilagineis ceu costis, à Capite ad

X x x

caudam

caudam duodecim compactus, in cuius parte prona triplici, in dorso verò quadruplici serie processus acuti prominent. Cauda longa, inflexa, quadrangularis, sensim gracilescit ex continuis constat internodiis, eminentibus utrinq; supina parte aculeis. Oculorum meatus visuntur ad frontis initium: Branchiæ nullæ.

Desiccantis est facultatis, & tenuium partium. Cinis cremati cum pice liquida seu Amaracino unguento, aut adipe veteri suillo illitus, Alopecias replet. *Galenus.*

Vivit aqua & luto.

Venter ejus venenatus creditur.

Eruca Olerum.

Κέρμη Diosc. ἀπὸ τοῦ κέρμητος qvód flexo corpore progrediatur.

Κέρμη Scaliger.

Τρωξ αλῆ Athen.

Eruca ab erodendo, qvód folia Arborum & Olerum erodat.

Eruca vulgaris *VL. Aldrov.*
Brassicida.

Ein Raupe/ Raupe/
Kraut Raupe/

Grasewurm.

Vermis est vulgaris notitiae, longus, mollis, multis constans pedibus, flexo corpore obliquis tractibus repens, colore varius. Erucae oriuntur vel ex stirpium excrementis, Aeris nimirum humidioris constitutione, ac putredine tepida: vel à papilionum ovis.

Augusto enim mense ut plurimum Papilioes ex Aureliis nati, a versis olerum foliis ova pariunt subalbida seu flava, Milio minora, ex quibus Erucae brevi nascuntur, olerum hortensium, maxime Brassicae pestis & perniciēs.

Erucarum mira metamorphosis. Qvædam & quidem plurimæ in Aurelias abeunt, quæ sunt tanquam ovum seu rudimentum Papilionis. Aliæ in Arborum cacuminibus, ut Araneæ telam nere solent, at rudiores in modum regimenti consuetum, cui sese implicant, & semine imposito moriuntur, ex quo nisi frigoribus aut imbribus intercipiantur, ab hortulanis auferantur, aut Avium esca fiant, afflante veris aura tepidiore, arboribus virescentibus ingentia

gentia Erucarum examina
prodeunt, quæ integras Ar-
bores sæpè fronde spoliant.
Ovidius.

Quæq; solent canis frondes
intexere filis,

Agrestes tineæ, res observata
Colonis.

Ferali mutant cum Papilione
figuram.

Aliæ autumni fine parietes
& muros vicinos lanugine
molli, eaqve vel alba, flava
aut viridi conspurcant, cui o-
va sua committunt, quæ nisi
frigoris vi intereant, simili
modo Vere appropinquante
in Erucas abeunt.

Aliæ non immutantur, sed
cùm jam omnia consumsere,
ipsæ quoq; vel spontè vel ur-
gente frigore intereunt.

Erucarum totidem ferè
sunt species, quot Plantarum.

Aliæ maximæ, mediocres
minutulæ.

Quædam læves, hirsutæ,
villosæ, echinatae, hispidæ.

Aliæ rubent, nigricant,
quædam flavæ, aliæ virides;
quædam aureis punctulis ra-
diant; quædam vario colore
pictæ visuntur.

Sanies Erucarum oleo in-
trusarum peruncta, Corpora
ab ictu venenatarum bestia-

rum tuctur. Mirabile adver-
sus Serpantium vulnera amu-
letum.

Eruca ut fuganda.

Autumni fine, seu primo
vere nidi in arborum cacumi-
nibus abscindantur & com-
burantur.

Augusto mense Ova à Pa-
pilionibus Caulibus aspersa,
digitis atterantur vel aufe-
rantur, priusquàm Eruculæ
erumpant.

Erucæ natæ quotidiè, ma-
nu collectæ in fictili, combu-
rantur, vel aqua submergan-
tur.

Alii Brassicas vel Arbores,
post pluvias matutinis horis
succutere solent, sic enim de-
cidere, nec amplius ad superi-
ora prorepere ajunt.

Brassicas tenellas, prius-
quàm transplantentur, bro-
dio Canlium acidorum qui-
dam immergunt.

Nonnulli ossa Capitis Equæ
terræ immissa, vel sepibus af-
fixa, ubi Brassicæ sunt, eas fu-
gare, pro comperto asserunt.

Stercus Vespertilionis, Bi-
tumen aut Sulphur incensum.

Fumus Fungorum sub Nu-
cis arbore nascentium, Gal-
banum, Caprarum ungulæ,
Cornu Cervi.

X x x 2

Absinthij

Abinthii decoctum in-
sporsum.

Cancer fluviatilis in me-
dio horti suspensus.

Formica.

Μύρμηξ.

Μύρμος.

Formica á ferendo vel á
forandis micis.

Ein Ameisse/

Ambets/vom abbeissen/

Dmeisse.

Animalculum est parvum
& fugax, laboriosum, nulli
imperio subditum, Corpus-
culo gracili longiusculo, cu-
jus Capitulo antennæ ceu ex-
ploratoria filamenta præten-
duntur. Ocelli ad latera ni-
gra, tantæ subtilitatis, ut vi-
sum nostrum ferè effugiant.
Denticuli bini introrsum a-
dunci, forficulum veluti quæ
cibum apprehendit, constitu-
unt. Pedunculi ex pectuscu-
lo nascuntur seni. Venter
jungitur crassior. Tam exi-
libus hoc Insectum constat
particulis, ut rectè cum Phy-
sicis asseramus, Ejus Corpo-
ralem compaginem nondum
cognitam esse.

Basilii sapientissimè ad
retundendam eorum superbi-

am, qui Dei potentiam &
voluntatem scrutari adni-
tuntur, putat, nullum aptius
argumentum, quando vel
formicæ naturam assequi, o-
mni conatu adhibito, non
possint. An spiritu, inquit
epist. 268. & anhelitu vita
ipsius formicæ contineatur?
an Ossibus Corpus distinctum
sit? an nervis & ligamentis
compositio firmata sit? an
musculorum & glandularum
munimento nervorum natu-
ra contineatur? an medulla
á sinapite usq; ad Caudam
una cum spinæ verticulis, ex-
tendatur? an nervosæ mem-
branæ ambitus Membris, quæ
moventur, concitatoriam
vim immittat? an sit in ipsa
Jecur, & vas felle susceptori-
um in Jecore, Renesq; ac Cor,
& Arteriæ, & Venæ, pellicu-
læq;ve, ac intersepta? an nu-
dum sit Animal, aut pilosum?
solidipes sit, aut multipedes
gressus habeat? quanto tem-
pore vivat? Et quis sit ipsi
generationis modus? quàm
diu gestetur fœtus? & quo-
modo neque pedestres omnes
sunt Formicæ; neq; omnes a-
latæ, sed aliæ quidem humi
repunt, aliæ per aërem fe-
runtur? Qui igitur rerum
cognitio-

cognitionem jactat, interim Formicæ naturam explicet: dein ita virtutis, ac potentiæ omnem intellectum excedentis naturam exponat. Si verò minutissimæ Formicæ naturam nondum cognitione apprehendisti, quomodo incomprehensibilis Dei vim te imaginari gloriaris?

Domicilia sibi Formicæ passim in sylvis extruunt, & latibula sua per varios & inextricabiles labyrinthos excavant, quæ acervis, quas magno labore colligunt & comportant, cooperiunt, & adversus pluvias ac frigoris vim muniunt.

Omnis generis succos appetunt, quos partim in plantis quærent, partim ex fructibus exugunt. Mel mirè appetunt, unde Apibus insidiantur. Grana frugum tota æstate convehunt & reponunt, quo hyeme fruantur mira providentia grana, ut conserventur, cædentes. Negotia omnibus in promptu habentur, atque eadem semitâ semper ambulant, & cibaria reconducunt in annum, & Cellas promtuarias faciunt, ordine diligenter servato, nec interdiu solùm, sed etiam no-

ctibus, Luna plena laborem exercent, Interlunio quiescunt. Gerunt onera morsu majora aversa postremis pedibus moliuntur humeris obnixa. Semina arrosa condunt, ne rursus in fruges exeat terra: majora ad introitum domorum dividunt, madefacta imbre proferunt atque siccant.

Silices itinere earum attritos videmus, & in opere factam semitam: de qua eleganter Horatius:

Parvula (nam exemplo est)
magni Formica laboris,
Ore trahit, quodcunque potest,
atque addit acervo
Quem struit, haud ignara ac non incauta futuri:
Quæ simul inversum contristat Aquarius annum
Non usquam prorepit, & illis utitur antè
Quæ sitis sapiens.

Formicarum Respublica non videtur ad Monarchiam sicut Apum pertinere, sed ad eas quæ populariter administrantur, & quarum gubernatio Democratica aut Aristocratica nuncupatur. Nullus enim illis Rex, nullus præses, omnes ex æquo cives, pro-

X x x 3

opor-

oportunitate temporum aut preesse, aut subesse solent, servatis Institutionis suæ Reipublicæ ordinibus : attamen omnes, ut vericives solent, omnia ad communem utilitatem agunt, maxima solertia.

Salomon proverbior. 6.

Vade ad formicam, ô piger, & considera vias ejus, & disce Sapientiam, quæ cum non habeat Ducem, nec præceptorem, nec principem, parat in æstate cibum sibi, & congregat in messe, quod comedit.

Basilii Magni in hexa. hom. 9.

Non laborabis pro teipso, ô homo, non in præsentis seculo prædepones, ac recondes requiem futuri? Ad Formicæ exemplum respectum habeto, quæ in æstate alimentum hyemale sibiipso recondit, & non propterea, quod nondum adsunt hyemis molestiæ, per otium tempus transmittit, sed diligentia quadam indefinente seipsam ad laborem intendit, donec sufficiens alimentum in penum reposuerit, & neque hoc segniter ac negligenter, sed sapienti quadam versutia ex-

cogitans, quo ipsum alimentum quam diutissime perseveret. Suis enim unguis medios fructus dissecat, ut ne enascentes inutiles ipsi ad alimentum reddantur; eosdem etiam siccant, ubi senserit ipsos madefactos, & non in omni tempore ad ventum exponit, sed ubi persenserit aerem in serena constitutione conservari. Profecto non videas imbrem ex nubibus defluere, quo tempore frumentum à formicis expositum est.

Coëunt Formicæ hyberno tempore. Vermiculum pariunt nulli annexum, qui accrescens ex minutulo & rotundo longiusculus fit, ceu Ovum oblongum figuræ columnalis, ex quo, loco calido perfecte completo, formica nascitur. Ortus earum verno tempore agitur.

Ova si fuerint à suo loco mota aut dispersa, Formicæ recolligunt, & ad suos nidos referunt.

Formicæ calidi & sicci sunt temperamentum.

Quinq; potæ, adjecto sale exiguo, omnium Phalangiorum moribus auxiliantur.

Nocent

Nocent hortis, arbusculis
tenellis, Apibus. *Fugantur* pul.
Sulphuris & Origani agrestis,
super acervos resperfo, fumo
Storacis, Ampelitide, Creta,
Calce viva, Cineribus, Aqua
latere crudo diluta.

Ova Formicarum,
Dmeissen Eier / Avicularum,
Luscinæ, Coturnicis, Perdi-
cum, Picorum, nec non Ursi
minoris sunt alimentum.

Ad Aurium etiam gravi-
tatem faciunt. Malas hirsu-
tas Pueris infricata corri-
gunt.

Acervus Formicarius,
Ein Dmes Hauffe / Nidus
Formicarum.

Comportatur á Formicis
multo labore ex festucis, cor-
ticibus, foliis, resina, terra,
luto &c. unde sæpè gratum
odorem emittit.

Balneum Formicarium,
Ein Dmeis Bad. Sume Myr-
mecium vivarum agmen
(præcipuè ubi arbores resi-
niferæ sunt) in saccum re-
conde, atq; iis decoctis affu-
sa aqua in sufficienti copia,
balneum parato, & utere.

Calefacit & siccat multum.
Præstat in frigidis pedum tu-

moribus, & Podagra invete-
rata, Hystericis affectibus,
Scabie, Uteri suffocatione,
Cachexia, Resolutionibus,
torpore, aliisq; Nervorum de-
bilitatibus.

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | mi | } ruben- tes. nigri- cates |
| | | no | |
| | | res | |
| | | vel | |
| For- micæ aliæ | { | Impen- nes | majores, Formicæ Herculean. |
| | | | |
| | | Pennatæ, Formicæ alata. | |

*Formicæ Hercu-
laneæ.*

импортунные.

Formicæ majores

Grosse Nos Dmeissen.

Isthmus his exiguus rube-
us longiusculus, gracilis, u-
trinq; extremitatibus crassi-
usculis.

Tritæ adjecto Sale exiguo,
Pforam, Leporam & Lentigi-
nem sanant.

Formicæ

Formica alata.

Fliegende Dmetssen.

Cum senescit genus Formicarum, alatum efficitur. Consolatur enim illorum imbecillitatem Natura, volatu addito: sed ab editis alis parum supervivunt. Cardan.

Fullo.

Forbicina vl. Aldrov.

Vermis auricularis

Ein Ohrling/

Dehrlin/

Ohrwürmle.

Vermis est oblongus, compressus, lævis, coloris spadiceci, cujus cauda in bifidum mucronem exit: juxta oculos protuberantes antennæ, tanquam exploratoria fila enascuntur.

Sub lignis & arborum corticibus stabulatur. Arbores perreptat, & Pyra pomaq; erodit.

Aures Hominum facile incurrit, Enecatur spiritu vini, oleo Juniperi, Amygd. amararum.

Gryllus domesticus.

Αχέτη Ιυνί.

γρύλλος,

Ein Haus Heime/

Heimling/

Grille.

Locustæ genus Cicadæ simile, coloris spicei. Sub oculis eminent cirri bini, veluti capillamenta tenuia. Pedes seni, inter quos posteriores longiores, extremis instar serræ asperiusculis. Acuti duo appendices in cauda exeunt longiusculi hirti. Pennis superioribus subjacent membranulæ tenuissimæ, quæ veluti promuscis quædam bifida ultra appendices protenduntur: Hyeme ad hypocaustorum fornaces, & fumibulorum parietes habitant, stridore suo nocturno plusquam molesti. Quamvis nonnullis admodum sit gratus, eorum stridor, ut etiam somnum conciliare asserant.

Necantur hydrargyro Pifis coctis permisto, & rimis fornacum illito. Vim similem Quidam Cantharidibus tribuunt.

Gryllus agrestis.

Γρύλλος, Πίντι.

Gryllus campestris, arvensis.

Ein Feld Grille/

Feld Heime.

Corpulentior est domestico, at brevior, coloris nigripicis

picis instar splendentis. Oculis majusculis prominentibus, juxta quos Cornicula duo breviora; ad Rostrum verò supra & infra appendiculæ binæ, nodosæ. Alæ fuliginæ coloris fibris variè distinguuntur. Pedes seni utrinque tres obscure & veluti ferrati: In fine alvi superioris sub alis extant spicula duo acuta, sub quibus alii appendices longiores rigidiusculi setæ instar, porriguntur, in extremitate bifidi.

In campis, pratis & aridis Colliculis apricis frequens.

Aridam fodit terram, ut ejus cavernis cubet æstate,

Auribus prodest, cum sua terra effossus, & illitus. Lenit etiam tonsillas infricatus.

Hirudo.

Βδέλλα ἀπὸ τοῦ βδέλλειν,

quod est exugere.

Sanguisuga Plin.

λιμνῆς,

Ein Egte/

Wurmsauger.

Insectum est palustre, instar lumbrici oblongum lubricum, lineis & punctis nigris varium. Corpus veluti ex quibusdam circulis colli-

gatur, absque ossibus, pedibus & pinnis, quibus extensis contractisve movetur. Os citrifulcum, quod ex vulnere Cui inflicto apparet.

Hirudines alie sunt majores, Equinae dictæ, quod novem Equum sugentes occidere possint.

Grosse Egte/Xos Egte.

Minores kleine Egte / Harum rursus alie sunt subfusca, alie subvirides, alie nigrae, alie variae, schwarze/dunkelgrüne/bundte Egte.

Sua natura cæno ac limo delectantur; unde frequentiss. in palustribus, lacustribus & putridis aquis, rarissimè in probatis & limpidis fontibus, arenosis, & saxosis fluviiis vivunt.

Ex putredine tantum generantur. Minores minus nocivæ dicuntur, quæ & rugosæ & lineis in dorso distinctæ sunt.

Earum eadem est ratio ac Cucurbitularum, medicina tuta ad Corpora levanda sanguine. Priusquam applicentur, per aliquot dies aqua pura servandæ, ut probe purgentur, Cum applican-

Y y tur,

tur, locus nitro fricandus, sanguine vel argilla humida fovendus, vel ungribus scalpendus est. Cum amoveri vis, insperge eis parum salis aut cineris, aut Lini combusti.

Applicantur autem Corporis partibus, quibus Cucurbitula & Cornicula consistere nequeunt, ut Ano in Hæmorrhoidibus, ostio uteri, gingivis, labris, naso, digitis. In quavis Corporis parte, ubi semel hæserint Corpori, nulla ratione possunt revelli, donec suctu sanguinis repleti decidant. Raro his nostrates Medici utuntur.

Accidit aliquando, ut Viatores, & boves maximè, incauté Hirudines hauriant, unde Cruoris excretio, Capitis dolor, gravitas, sequuntur. Remedia sunt, Murie sorbitio, Beta cum aceto pota, Nitrum gargarizatum, Lupuli, Prunella ex aqua gargar. Farina Lupinorum &c.

Julus.

Ιούλος, πολύπους,
μυζιόπους,
Multipes,
Eruca hirsuta villosa.

Centipeda hirsuta Colum.
Ein rauche Raupe.

Vermis est terræ longus, ex annulis multis compactus, pilosus, multis pedibus, arcuatim repens.

Si contrectetur, in globum complicatur. In multas partes divisus, omnes vivunt.

In hortis oleraceis quandoque occurrit.

Ictericæ & urinæ difficultati confert ex vino potus.

Libella fluviatilis.

Ein Wägle/
Wagferderle.

Bestiola est minuta, palustris, à similitudine, quæ illi est cum fabrilis instrumento, & cum libella marina.

Locusta.

Ακρίε Diosc.
Κόρνωτ,
πάρνωτ,
Μολοιέ
Ακαςνος,
Μάσαξ Nicand.
Ein Henschrecke.

Insectum est campestre, infirmis pennis, alatum, ac proinde

inde alius non evolans, herbis & segetibus infestissimum.

Incisuris universa compago constat, pro Insectorum more & natura. Alas utrinque habet duas, ad scapularum commissuram infixas. Quæ superiores & tergo insident, vario colore interpuncta atq; discreta maculis nigris, alis phœniceis seu badio colore præditis superincumbentibus visuntur. In imo alia utrinque substernuntur, tenues admodum, albicantes, & ex lato in arcum desinentes, instar Alarum quæ Avibus insident, aut veli navis; his passis aëra quatientes ac diverberantes volant. Secundum Dorsum commissura quædam imminet, membrana duriore intertexta, ex qua sonum atq; stridorem edunt. Capiti porro secundum Oculos obscuros hebetes, Cornua tenuia, pilorum instar prominent duo. Facies autem torva apparet & oblonga, incisuris aliis super alia incumbentibus, & os integumentibus. Ori porro duo tantum parte superna insident Dentes durissimi, lati ac nigricantes, quibus segetum aristas gravi

morfu erodunt ac frangunt. Thoracem habent angustum, cartilaginofum & durum, Alvum mollem & longam, quæ motu dilatato & adstricto Pulmonum vice movetur, ad auram caprandam. Cruribus sex innituntur, quatuor primoribus tum tenuioribus, & ad superna magis positis, posterioribus duobus crassioribus, & ad motum valentioribus, miroq; artificio variegatis, & angulis acutis intercurrentibus artificiose delineatis, quibus saltantes utuntur. Prioribus enim Cruribus apprehendunt Manuum vice, ac continent, posterioribus saliant. Sunt autem posteriora hæc colore rubra, ac denticulis instar serræ munita, ut se illis in fata proruentibus fulcire adhærereq; firmitus ascensu suo possint.

Coëunt, Mare fœminam Dorso superveniente, Mas autem in concubitu Cauliculos duos acutos, quos ad dorsi extremum, paulo reliquo Corpore eminentiores, habet, oborta ima Corporis parte & inflexa, atq; ultimo Caudæ reflexo in femellæ uterum immittit.

Y y y 2

Nam

Nam cū spicula illa duo Dorso incumbētia Mas habeat, immittere ea in fēminæ uterum non posset, ni adversa Cauda flexili sese illi copularet. Arcēssimē verō diuq; conjunguntur, ut vix avelli semel copulata qveant: ita ut etiam salientes, ē loco motæ non dissiliant, nec nisi magno conatu avulsa discludantur. Femina verō Maris amplexu alvum intente movet, & se ima parte Mari applicans, illum diutius continet, modō hiatu vulvam aperiens, modō eandē coarctans, atq; dum hiaru patet uterus, tum Mas sese penitus in imum fēminæ insinuare satagit. Visunturq; meatus duo in fēminæ pudendo, interstitio quodam disjuncti, & crassiusculo quodam operimento contexti: quod quidem externa sui parte nigricat, atq; durum penēq; cartilagineum, interna leviter hirsutum, rugisq; quasi quibusdam scabris videtur, ad cujus operimenti fundum, Uterus colore albicans, instar muliebris pudendi cernitur.

Planis & rimosis locis Ova sua deponunt, quæ qui-

dem ova durant hyeme in terra; Æstate ineunte proveniunt ex fœtu anni superioris Locustæ.

Universæ autem loco eodem fœtum deponunt, ita ut quasi favus esse videatur: hinc Vermiculi speciem ovi gerentes oriuntur, qui terreni, quædam prætenui tanquā membranula ambiuntur, quæ dissecta emergunt Locustæ atq; evolant: quarum tam mollis fœtura est, ut ad tactū levissimum dilabatur & pereat.

Nec summæ telluri partus committitur, sed paulo altius. Concoctione peracta exeunt ex terreno illo amiculo migrantes, & parvæ Locustæ evadunt.

Differunt variè,

Quantitate. Quædam sunt magnæ, aliæ parvæ, ut Αἴγλας, πᾶσις. Brucus Hermolai, Minima omnium pennis carens.

Qualitate, Colore, Aliæ totæ virent, quædam flavæ, nonnullæ nigricant, aliæ deniq; variæ sunt:

Effectu. Aliæ portentosæ, ut μάστις, id est, Vates quæ viret, & plerunq; famem portendit.

Aliæ

Aliæ non item.

Motu. Qvædam ut *Απτεγες*,
Diosc. seu *ογος*.

Qvædam agiliores.

Nocent Locustæ morfu & uredine. Segetes morfu perdunt non solum, sed & prata, hortos, vineas, & quicquid in agris viret. Contactu verò terram urunt, tum salivâ luteâ, biliosa & acri, quam multam ex ore rodentes fundunt: tum etiam excremento, quod ex alvo mittunt.

Odoris suffitu Locustæ urinae difficultates adjuvât, præsertim quæ feminas malè habent. Quidam appensas collo, Hominem à Quartana liberare tradunt.

Marcellus Virgilius, de Locustis ita prodit. Variavit admirabili artificio Locustas Natura. Qvis enim tot primum in eodem corpore colores facile descripserit? Qvis tam diversas Corporum formas? Qvis ingressus, saltus, volatus earum? Sunt enim quæ virides, quæ nigra, quæ liventes, quæ aliqua parte hunc, aliqua illum colorem ostendant. Sunt quæ volantes tantum, latentem antea

colorem aliquem proferant. Sunt quæ simplicibus, quæ pluribus alis volent; quæ alis carentes saltent; quæ utroque hoc modo privata ingrediantur tantum. Sunt quæ longioribus, quæ brevioribus Cruribus sint: & in his pluribus brevioribusque & paucioribus longioribusque internodiis. Sunt quæ canant, quæ mutæ sint: quæ per diem, quæ in tenebris tantum audiantur. Sunt quæ nihil homini in re rustica noceant, innocentisque à Pueris se capi patiantur. Sunt contra quæ pestem & calamitatē Satorum omnium totis regionibus afferant, utque plura sunt in Natura genera, sic etiam penè infinita Veteribus earum nomina fuerunt.

Lumbrici terræ.

γῆς ἔντεα, Dioscor.

Lumbrici terrestres,

Vermes terræ,

Onisculi,

Regenwürme / Erdwürme.

Rußwürme /

Pieren / Pierwürme.

Y y y 3

Vermes

Vermes nulli non noti, sunt longi, teretes, rubentes, qui tempestate pluviae procedunt e terrae latibulis. Vermis habent naturam, Corpus verò Angvillarum. Ita ingrediuntur, ut praecedenti parte priore, quod reliquum est Corporis ad illam contrahant, atque hoc pacto ex uno loco in alium feruntur. Oculis sunt orbi.

Differunt colore, dum alii subalbidi, alii lividi, alii sanguinei sunt coloris.

Tota hyeme sub terra latent, quae etiam in cibo fruuntur, & ex qua generantur. Vere e terra prodeunt, Avium quarundam & Piscium cibus: ob id a Piscatoribus tanquam illicium hamulis appenduntur.

Temperatae sunt inter frigus & calorem adurentem qualitatis.

Egregie movent urinas, provocant sudores, aperiunt & reserant obstructions Hepatis: unde Ictericis & Hydropicis utiliter propinantur. Mirabiliter omnium partium Corporis, maxime verò Nervorum dolores sedant: ob id in Apoplexia, Spasmo, Paralysi non inutiliter adhibetur,

Lac Mulieribus augent. Medentur morsui Animalium venenatorum, maxime Canis rabidi.

Aurium affectibus cum auxungia Anserina auxilio sunt. Apponuntur vivi Panaritio. Gravidis secundas pellunt in passo poti.

Dracontios seu Comedones peculiari vi & efficacia excutunt, Wicero suffragante.

Cinis Dentium cavernis immissus, illos absque ferro & machinulis eradicat.

Capillo quinaetiam gignendo & augendo sunt idonei.

Struuntur ex his Olea, Unguenta, & Emplastra Anodyna, ad Rupturas, Contusiones, Arthritidem & Nervorum resolutiones.

Lumbrici Intestinalium.

Ελμινθες *Græc.*

Lumbrici *Cels.*

Vermes Intestinalium,
Würme.

Sunt Vermes, qui nascuntur in Animantibus, praecipue verò in Hominum Intestinalis.

Causa horum est humor crudus, qui corruptionis initium

tium in ventriculo crudus, mox in Intestina delabatur, in quibus præter solitum retentus, accedente putredinali colore computrescit.

Plures horum observantur differentia.

1. rotundi in longitudinem teretes Celsi.

Ελμινθες στρογγύλοι.
Colubræ cæcæ.

Runde lange Würme/
Spul Würme.

In Intestinis gracilioribus & superioribus plerumque gi- gnuntur, etsi ascendant & de- scendant. Ventriculum ali- quando subeunt, & per os aut Nares rejiciuntur.

Novi feminam Rusticam in vicinia, cui ante quinquen- nium Lumbrici longi tere- tes, palmares & longiores, noveni, per intervalla, ali- quot dierum spacio, inter Ilia & Umbilicum, dextra Abdo- minis parte sponte ex ventre prorupere, ulcusculo suapte natura iterum coalescente.

2. latiusculi in longitudi- nem ταινία fasciis, quod fasciarum instar sint longi

& lati. Lumbrici longissi- mi.

Schnur Würme.

Horum longitudo sæpe incredibilis reperitur, latitu- dine differunt. Anno 1602. Lanio quidam Hirsbergensis Tertianæ nothæ diuturna cor- reptus, & sæpe recidivas pas- sus, cum ventris torminibus, tandem Morbo declinante, ex haustu pharmaci abster- gentis & aperientis, Vermem latiusculum, duodecim cubi- torum longitudine per alvum excrevit, caudâ spithamalis longitudinis, in capilli ferè tenuitatem gracilescente : Quo egresso mox iterum convaluit.

3. lati.

Ελμινθες πλατέας
κηρίαι.

Lumbrici Cucurbitini.

Dicke Würme/
Kürbes Würme.

Lati sunt & breves, Cucur- bitarum seminibus non diffi- milis. In Colo nascuntur.

4. exigui sunt, vermibus Casei similes. De quibus vi- de Ascarides,

5. Ali-

5. Aliquando in vulnere aut
ulcere vermiculi nascuntur,
qui à Græcis peculiari nomi-
ne Εὐλαῖ nominantur,

Vermes sæpè gravissima
symptomata inducunt, Mor-
fus, rosiones, nauseam, fasti-
dium, Alvi fluorem, febres, fa-
mem, vomitum, syncopen,
Convulsiones, Spasmū, Ver-
tiginem, Somnum turbulen-
tum, vociferationes in somno
pruritus Narium, tussim ari-
dam, singultum, sitim, &c.

Resistunt Lumbrici acria, a-
mara, siccantia, quæ vias lu-
bricant, & quæ à proprietate
eos excludunt, ut

Unicornu,
Rasura Cornu Cervi,
Scammonium,
Aloe, Myrrha,
Rhabarbarum, Gentiana,
Absinthiū, Centaur, min.
Card. Benedictus,
Amygdala amara,
Lupini, Zedoaria,
Sem. Citrii, Tanaceti,
Plantaginis
Xantonium,
Portulacæ.

Theriaca, Mithridatum,
Theriaca Diatesaron,
Aq. Graminis, Plantag.
Portulacæ.

Fel taurinum,
Ol. Absinthii, Rutaceum,
Tanaceti.

Midas.

Μῖδας, Theophr.

Τρωγ.

Bohnenwurm/

Bohnenwirmle.

Vermiculus in Fabis natus,
eas erodens & consumens, ex
Tinearum genere.

Mordella.

Ομοδάνη, Arist.

Ein Eyer Fliege/

Blatterbeisser.

Insectum volucre, ex Mu-
scarum genere, ore largo &
propè denticulato, pustulas
Puerorum appetens.

Musca.

Μύα, Aristot.

δ᾿ ἄπλη.

Eine Fliege.

Insectum volatile, bipen-
ne, plusquàm notissimum, ad
cibum alienum volans, unde
agrè abigi potest. Lingvam
seu promuscidem habet fistu-
losam prominentem, quâ gu-
stat & cibum simul attrahit;

Pedes

Pedes senos, Oculos duos, eosq; hebetes.

Coëunt Muscæ, ut alia Insecta, & generant, verum non animal sui generis, sed vermiculum. Noq; ab Animalibus ipsæ generantur, sed ex vermiculis, ex sorde humida aut sicca putrescente genitis.

Ubivis reperiuntur, Junio ut plurimum, circa Vitum uberrimus earum proventus, quæ integra ætate cum Homini tum armentis morfu infestæ sunt.

Impudentissimæ sunt, nec contentæ immorari in ædibus & conclaviis, sed mensas advolant, & quoscunq; cibos appetere solent.

Fungis Muscariis dictis, lacte seu Melle pertritis, facile enecantur, si eos gustaverint.

Hyeme occultantur tanquam mortuæ in tepidioribus ædium aut turrium locis, quæ tandem Sole recurrente iterum reviviscunt, in cibum Hirundinum aliarumq; Avicularum.

Aqua Muscarum stillatitia, in Oculorum affectibus prædicatur. Muscarum Capita

trita illita Alopeciiis medentur.

Alianus hist. anim. lib. 2. c. 29.

Musca etsi ad omnia audax existit, si tamen in aqua decidat, cum natare nesciat, nec se valeat à submersione servare, exanimatur, si sic eam humore exanimatam extrahas, atq; in cinere condas, ad pristinam vitam reviviscit.

Muscæ differunt magnitudine, forma & colore.

Musca Insectoria.

Mutat speciem Lucan.

Musca grandior cærulea

Musca militaris.

Eine Schmeißfliege.

Vulgari est major, ex cæruleo nigricans, magna bombilatione strepens, & ingratum susurrum edens.

Carnes quascunq; attigerit, continuo emissæ alvi proluvie contaminat, unde vermiculi nascuntur, qui vulgò Maden appellantur,

Musca viridis.

Eine grüne Fliege.

Vulgari forma & magnitudine similis, præter colorem, qui Smaragdi viret more.

Musca versicolor.

Eine schöne bunte Fliege.

Z z z

Venter

Venter pauló oblongior.
Ocelli nigricant. Caput &
pectus instar Smaragdi vi-
rent, Alvus Hyacinthi radiat
fulgore. Cruscula virent si-
militer, Alis quaternis fuscis.

Musca Ligniperda.

Eine Holzfliege/
Borfliege.

Gracili est corpore, capite
majusculo, antennis binis, co-
lore Rubini pulcherrimo.

Arbores & ligna perforat,

*Musca grandior
oculata.*

Perla Italis, Vlys. Aldrov.

Ein Pfaffe/
Wildpferd/
Camel/
Bassermann/
Weib/
Wasserpfau.

Insectum est volatile, qua-
dripenne, ex grandiorum
Muscarum genere. Caput
ei grandiusculum rotundum,
instar speculi lucidum, oculis
utrinq; protuberantibus ma-
ximis, pectore crasso & brevi,
Alvo admodum procera &
gracili, cujus extremitas in bi-
furcatum mucronem desinit.
Pedes hirtiusculi quatuor.

Alis volat quatuor longis,
robustis, fibrosis.

Aestate sicca Cœli constitu-
tione in montibus, pratis, ad
aquas partim solitariae ut plu-
rimùm gregales cernuntur.
Celerrimè volant, & arbo-
rum ac fruticum cacuminibus
insidenter nonnunquam qui-
escunt.

Coeunt ut Muscæ, femina
Mare insidente, & membrum
feminæ sursum immittentis
recipiente.

Magna harum apud nos
varietas, quæ partim figura,
partim magnitudine, partim
colore discernuntur.

1. *Musca grandior ocu-
lata Versicolor.*

Pavo aquaticus. Job. Bauli.
Perla 6. speciosa & elegans,
Vlys. Aldrov.

Eine hundte Pfaufliege.

Maxima est, & omnium
pulcherrima, colorum emble-
mate variegata. Caput & Pe-
ctus virent ex flavedine, line-
is obscurè rubentibus inter-
mixtis. Oculi Mylii grani
magnitudine protuberant
glauco. Alvus annulis partim
cæruleis, partim virentibus &
subflavis, (linea per medium
ejus dorsum excurrente nigri
coloris

coloris, alternatim distinguitur. Pinnæ in extrema alvo visuntur duæ latiusculæ, inter quas Cauda acuta prominet. Alæ habet quaternas maximas & longas, & Crura quatuor breviuscula, in extremo internodio ferrata.

Rarior est cæteris, & montosis locis secus abietes & Pinastros, æstate saltando quasi qberrat, stridorem in volatu edens.

2. Eiusdem ferè est magnitudinis. Caput, Pectus, Alarum pars juxta exortum cum pedibus, ferruginei sunt coloris. Venter crassior pronus flavescit, Dorsum cæruleum, ut & Alarum reliqua pars, sed dilutiùs.

3. Tota ferruginei coloris, alvo minùs procera, circulis nigris intercisâ.

4. Tota flava, alis cinereis.

5. Ex viridi cærulea.

Perla aquatica 3. Vlyf. Ald.
Ein Wasserweib.

Hæc toto Corpore, Capite, pectore & ventre, qui gracilimè ex cæruleo virefcit, præter oculos grandiores, & pedes hirtiusculos, qui nigricant. Alæ primùm subvirent ex flavedine, deinde cæruleæ

sunt. Frequenter ad aquas juxta Alnos oberrat.

6. Viridis.

Perla minima viridis.

Ein Grüne Pfaufliege.

Omnium est minima, tota viridis. Capitulum dilutè viret. Ocelli verò luteo admixto, Alvus intensiùs. Antennæ tenuiss. & longiss. juxta Oculos prominent. Alæ virides aureo fulgore micant.

7. subrubei coloris.

Eine rote Pfaufliege.

Musca caudata.

Eine Schwanzfliege.

Major est Musca, coloris cinerei, Ventre gracili longiore, è quo cauda bifida Capillaris longissima enascitur.

Papilio.

τὸν, ἐπὶ τῆς ψυχῆς, ἃ spiritū, seu flatu.

ψάλλω, οὐροδονῶ.

Ein Zwiespalter/

Pfeiffholzer.

Molckendieb/ I pueris Si-

Gemmervogel. Silesie.

Vermiculus, aut potius Insectum alatum, alis prælongis latis, imbecillis omnino generis, varios colores ementens

Z z z z

Alas

Alas habet membranosas siccas, quaternas, ac tangenti quasi cinere asperfas. Ante Oculos prætenduntur antennæ, seu cornicula ignava longiuscula.

Erucæ auctæ, motu cessant, suaq; forma immutantur tantisper, Chrysalides, quasi Aurelias dixeris. Longo post tempore putamine obrupto, evolant inde animalia pennata, quæ Papilliones vocamus. Hi grandiores facti, Augusto mense ovis partim albidis, partim flaventibus Brassicæ folia plerunq; conspurcant, ex quibus intra paucos dies Erucarum turba nascitur, pestis & perniciës Hortorum, quæ nisi legantur & cõburantur, aut aqua immergantur, integros hortos Brassica confitos, nec non arbores vicinas, depopulantur, folis relictis stipitibus.

Horum à magnitudine, & colore multiplex insurgit differentia

Alii sunt maximi, alii parvuli.

Quidam candidi quasi farina aspersi, Weiße zwiespalter.

Lacteoli, à Lactis colore, unde vulgò Molschendiebe

nuncupantur. Hi omnium frequentissimi, etiam pueris noti.

Lutei coloris.

Alius Leucomelanos,

Oculatus, πολυὸφθαλμος, vlr. Aldrov. ob maculas frequentes in alis, quæ oculorum faciem representant.

Ein Gespiegelter Zwiespalter.

Niger, Vespertilionæus. Totus niger, hirsutus est, Vespertilionem Corpore referens. Alæ nigricant, maculis rubris resperis, pedes quatuor.

Ferrugineus.

Eysenählicher Zwiespalter.

Triticarius seu frumentarius, ex Curculione natus.

Coëunt Papiliones Julio & Augusto ut plurimum, clunibus conjunctis. Ova pariunt vel lutea aut cãdida, quæ foliis Brassicæ aliarumq; plantarum asperguntur, ex quibus Erucæ gignuntur.

Papilio ignavus.

πυγαις, Had. lxx.

ἡπίολος, Aristot.

καυδὸνλοσβέσης. φάλαινα, Nicand.

Papilio inhonoratus, Ignaria, Gaz.

Blatta

Blatta lucernaria, lucifuga.
Zwifalter/der des nachts umb-
fleugt.

Papilio minutus quidam,
qvi lucernarum luminibus
advolat, seq; exurit, coloris
cinerei seu obfcuri.

Apibus infestus est, favos
suo stercore conspurcat, ex
quo dein tinea nascuntur.

Pediculi, à pedibus
φδῖς ἀπὸ τοῦ φδῖς ab
humorum corruptione.

Σάδρανες, Pedunculi, *Plin.*
Euse.

Vermes in Capite & Cor-
pore Hominis, ceterisq; Ani-
malibus, ex humidis & cor-
ruptis vaporibus intercutane-
is, per poros cutis resudanti-
bus, generati.

Pueris magis, Viris minús,
feminis frequentiores sunt,
Avibus etiam, ut Phasionis,
Anseribus, ceterisque Avibus
communes; imó vix ullum
animal, quod à Pediculis sit
immune.

1. Pediculi communes.

Εγνας, *Eustath.*

HeubrEuse.

Pediculi sunt, qvi in Capi-
te generantur, & inter pilos

stabulantur. Gignuntur in
viventium Hominum capil-
lò, non in superficie, ubi fur-
fures consistunt; sed in pro-
funda Cute, ex humoribus
quibusdam calidioribus qvi-
dem & excrementiis, sed quæ
minús acres sint.

2. Pediculi feræles.

φδῖς ἀργιοί,

Pediculi feri, Ingvinales.

Pessulata, *Gordon.*

Piattoli, Plattulæ,

Morpiones,

StilEuse.

Lati sunt, in Pectine, axil-
lis, palpebris, barba pronati.
Pedibus carent, & permanent
infixi, atq; à Cute non facile
detrahuntur; duriores com-
munibus, & vehementer mor-
sibus sæviunt.

3. Obambulatorii.

HeubrEuse.

Pediculi sunt, qvi obam-
bulant, & plures habent pe-
des. Gignuntur in vestimen-
tis.

Ex pellibus ab ovibus mor-
tuis, aut Lupo occisis Vestes
factæ, facile pediculos pro-
creant.

Z z z 3

4: Lentes

4. *Lentes.*

á lædendo.

Koud'eg,

Diesse/ Eiehse.

Valde parvi sunt, asperginis instar, capillitio pertinacissimè inhærent. Caput infestant, humanum præsertim.

5. *Cyrones.*

Scirrones.

Acari, Pedicelli,

Pellicelli, Plactulæ.

Eieffen/

Cyren,

Omnium Insectorum minimum, Cyrenes nunquam erumpunt extra, sed semper intra Cutim & Cuticulam latitant, & rodunt. Generantur per viam putrefactionis extra cutim. Subter cuticulam erodunt, & agunt Cuniculos in pruriginosis manibus.

Pediculi á Rusticis contra Isteritiam devorantur. Immissi foramini virgæ, Dysuriam tollunt.

Pediculi ut fugandi.

Victus ratio sit bona, Cibus & Potus boni succi; Exercitium conveniens; Corpus servetur mundum, & á pravis humoribus liberetur convenientibus purgantibus; deinde pravi humores Cuti impa-

cti tollantur, & mala Corporis temperies corrigatur.

Theriaca, Cornu Cervi.

Absinthium, Centaurium minus, Ledum nostrate, Ruta, Abrotanum, Helleborus, Staphis agria, Lupini, Argentum vivum cum axungia porcina, Nitrum, Sal, Aqua marina &c.

Pulex.

ἡ ψύλλα Arist.

Pulex, quod ex pulvere nascatur.

Ein Floh/

Flog.

Vermis seu bestiola minutissima, nigra, mordax & pungens, feminis nota, & plusquam molesta.

Generantur ex minima quadam putredine, ex putrescente humido & sicco sec. Aristot. Aluntur omnes vivo humore, & multiplicantur per ovationem.

Saliunt potius quam volant. Augusto mense admodum molesti sunt. Noctu magis quam die torquent. Adhibita manu celeriter fugiunt.

Tempore frigido pigrescunt, vel omnino deficiunt, calido vero æstivoq; maximè urgent, & infesti sunt.

In duas partes divisi reviviscunt. Pulices fugantur, si Absinthio omni vespera Corpus fricetur, vel oleo ejus illinatur.

Pulicaria herba, seu frondes Alni Rore madentes, incubiculum projectæ, eas excutiant.

Vidi Pulicem catenula artificiosè alligatum: quod & Leonius de Rebus Africanis confirmat, his verbis: Pulex quāquam exiguum sit animal, in Memphi tamen urbe compertus est Aurifex, qui aurea catenula Pulicem alligavit, fuitq; ob eam industriam donatus magnis præmiis.

Pulex terrestris.

Ein Erd Floh.

Vulgari Pulici similis, & ex sordibus aridis progna scitur.

Vere primo Brassicas tenellas arrodit, aliq; terræ nascencia depopulatur, Hortulanis invisus.

Enecatur Calce, Cineribus, Absinthii decocto &c.

Pulex aquaticus.

Ein Wasser Floh.

Insectum palustre nigrum, Pulice paulo majus, supra aquas potissimum stantes velocissimo motu cietur,

Degunt gregatim invicem colludentes.

Pygolampis.

Pygolampis aquatica.

Nitedula palustris, Cantharis aquatica.

Ein Giesling/sil.

Wasser Käserlin.

Magnitudine & forma Cimicem refert. Cruscula sена habet subrufa. Vaginæ nigro virides præsertim ad Solem, & splendentes alas gerit, sed non totas: ad Caudam enim Alarum extremitas prominere, quæ cum in aqua celeriter fertur ut solet, mirabili candore splendoreq; conspicuâ argentum vivum quodammodo refert.

In paludibus & fossis huc illuc mira celeritate sese trahit, in superficie & profundo.

Cibus. Merulis aquaticis, Glareolis, Moracillæ, Vanello & Pardalis gratus.

Ricinus.

Kes Top,

Kuvog'sing.

Engula Quib.

Redivivus Gaz.

Reduvius.

Ein Hols Doel/vulgo.

Hunds Floh/Hunds laus/

Hunds Wurm.

Animal-

Animalculum est lividum, & fœdum, Bobus, Suibus, Capris, Ovibus atq; Canibus infestissimum, æstivo tempore, aculeo totoq; Capite infixo adhæret, nec prius decedit, quàm sanguine saturatus.

Oritur ex Animalis excrementis, non è suo genere. Nam ubi Rionus sanguine satur est, quod exitum non habeat, rumpendo moritur, & nihil procreat.

Ricini sanguis è cane evulsi Philothrum est, & ignes sacros restingvit. *Plinius.*

Scarabæus.

Κάρδαρος quasi καρδαρός quod valde sit impurus & fordidus.

Cantherius,

Ein Käfer/

Keiser.

Insecti genus, teneras habens pennas, ob id crusta superveniente tectas. *Plinius* Scarabæi nomine omne genus Insectorum complecti videtur, quod crusta regitur, quod vaginipenne est.

Varia ejus genera. Alii sunt magni, alii parvi: Cornuti, absq; Cornibus: Nigri, cinerei, lutei, rubentes, carulei, miniati, virides, varii co-

loris. Nutriuntur Scarabæi ligneis aridis, frumento & jumentorum excrementis.

Scarabæus cornutus.

Κάρδαρος.

Scarabæus bicornis.

Scarabæus Lucanus Nigid.

Scarabæus cervus,

Scarabelaphus Cardani.

Taurus, Fullo Gaz.

Cervus volans Leonie.

Ein gehörnter Käfer/

Schröter vulgò.

Scarabæus est omnium maximus, terrestris, longitudine quinq; vel sex digitorum. Caput quadratum cum Thorace obscure rubent, ut & venter inferior. Alarum vaginæ castanei sunt coloris. Cornua gerit pulcrè rubentia instar vitri splendentia, ramosa, dentata. Oculi ad latera prominent bini, ex fusco rubei. Inter quos & Cornua, ad latera exeunt duo parva Cornicula, veluti antennæ. Rostellum acutum, promuscidè, flaventi lanugine hirta donatur, ad quod appendiculæ utrinq; binæ. Pedibus incedit senis, cum splendore nigricantibus, quorum extrema genicula instar ferræ aspera videntur.

videntur, apiculis extremis
instar hamuli aduncis.

Cornua in cacumine com-
primit, ut Cancrī suas chelas.

Gignitur partim ex lignis
aridis, maximē Quercus aut
Roboris, partim per coitum
propagatur.

In sylvis, Quercetis Majo
& Æstate reperitur.

Abscisso capite, seorsum
Caput, ac seorsum Corpus u-
trumq; vivit, Caput tamen
diutius.

Oleo inunctus Auri instil-
latur, ejus dolorem excuti-
ens.

Cornua Infantibus reme-
dii vice ex Collo suspendun-
tur, ad eorum urinam cohi-
bendam.

Scarabæus pilularius.

Κορταῖορ Hipp.

Κάυνδαρε Vlyss. Aldr.

Scarabæus stercorum,

ἡλιοκάνδαρε.

Scarabæus solaris,

Ein Ross Käfer/

Pferd Käfer/

Mist Käfer.

Corpus est ei compactum
latum, ex cæruleo nigrore
splendescens. Caput planum
inferius, & superius nonnihil

arcuatum, multis eminentiis
conspicuis, è quo ab utraq;
parte duæ prominent anten-
næ breviusculæ, sed in fine in
plurima tenuia filamenta di-
visæ. Pedes anteriūs sunt
serrati in fine.

Virilem sexum tantum
habet; prolem tamen sine fe-
mina gignit.

E fimo ingentes pilas pedi-
bus averso vultu volutat, par-
vosq; in iis, contra hyemis ri-
gorem, vermiculos fœtus sui
reponit & recondit,

Ælianus lib. 9. b. 4. c. 16. In
suo genere Scarabæorum ra-
tio feminei sexus quod sit ex-
pers, ideò in fimi pilam se-
men emittit, quam octo &
viginti dierum spacio & vo-
lutat & calefacit, deinde fœ-
tum procreat.

Clemens Alex. Strom. lib. 5. Sca-
rabæus cum rotundam ex bu-
bulo stercore effinxit figurā,
eam vultu averso convolvit;
hoc animal sex mensibus sub
terra, alteram autem partem
anni vitam degit super ter-
ram, & semen in globum e-
mittit, & gignit, & non nasci-
tur femina Scarabæo. Ob id
Egyptii Scarabæum summo-
perè venerantur, animatam
Solis effigiem esse putantes.

A A a a

Scarabæus

Scarabæus unctuosus.

Scarabæus Majalis,
Cantharis unctuosus,
Κάνθαρος σκαρώδης

Ein Schmalz Käfer/
Erd Käfer/
Meylander/
Meyling/
Meywurm.

Cantharus est crassus, oblongior, mollis, Corpore ex obscuro cæruleo splendido. Caput ei rotundum ferè, juxta Oculos antennæ porriguntur, cõtinuis internodiis distinctæ. Isthmo gracili Venter oblongior, in acutum desinens & incisuris refertus annectitur. Alæ integunt splendidæ convexæ, Pedes seni, extremitatibus bifidis seu trifulcis.

Majo & Junio passim in sylvis, & secus vias obrepit.

Cùm in manus sumitur, eas pingvi liqore inficit subflavoq;.

Cantharidum naturã imitatur, urinam pellit, & unã sangvinem. Renibus & Vesicæ inimicus.

Agricolæ hunc Melle cõdire solent, adversus Canis rabidi morsum, cujus venenum egregiè expugnat.

Novi quendam Nobilem

virum, qui cum cum Agri-
monia & Plantagine minore
pulveriz. ex vino rubro, á
Cane rabido demorsis fre-
qventer, non absq; felici suc-
cessu, propinare solet: at for-
tioribus & rusticis, cum sin-
gulari custodia. Vehemen-
ter enim Corpus exagitat, su-
dores movet, & urinam cru-
entam prolicat.

Johannes Wierus Medicus
doctiss. pulverem præpara-
tum iis, qui á varis divexan-
tur, ex Cerevisia offert.

Liquor ad vulnera á Qui-
busdam expetitur.

Additur Emplastris com-
modè in Bubone & Carbun-
culo Pestilentiali, ex signatu-
ra desumpto inditio. Circum-
foranei suis antidotis permi-
scere solent.

Scarabæus rutilus
major.

Scarabæus Saligneus,
Scarabæus rubeus prægran-
dis,

Ein Weiden Käfer/
Weiden Käfer.
Ercus Käfer.

Pilulario ferè est similis,
sed Corpore longiore & co-
lore rubente, capite aliàs ni-
gro, aliàs rubro.

Majo

Majo in Salicibus, Betula
& Qvercu frequens, quarum
folia tenella sæpè tota arro-
dit & absumit.

Scarabeus rutilus
minor.

Scarabæolus rubeus,
Ein Brachkäferlin.

Priori forma similis, sed
multo minor, & Junio fre-
quens.

Rosas & tenella arborum
folia arrodit. Sturnorum &
aliarum Avium cibus.

Scarabeus bufonius.

Μελολώνθη, Arist. Quib.

Μελολώνθη,

Χερσίβουσα, Dalech.

Χερσονόμος.

Galeruca, Scarabæus viri-
dis, Vlys. Aldrov.

Ein Krottenkäfer/

Goldgrünkäfer.

Scarabæus est major, in a-
cutum definens, coloris ob-
scure virentis. Capitulum
parvum nigricat, instar Cu-
curbitulæ rotundum, Oculi
ad latera prominent nigri-
cantes, ante quos Cornicula
duo nodosa enascuntur. Ap-
pendiculæ item quatuor jux-
ta os, ex duobus denticulis
acutis introrsum se curvanti-

bus confectum. Pectus qua-
dratum ferè, instar Auri Mu-
fici digiti colore rutilat. Alæ a
Thorace ad extremum, lineis
longis elevatis, inter quas
notæ longiusculæ, insigniun-
tur. Pedes habet sex, postero-
res longissimos in extremo
ferratos. Prona pars ut
Pissaphaltum splendet, nigri-
cantis coloris.

In terra iis locis, ubi Bubo-
nes frequentes sunt, occurrit,
quibus cum coire vulgus opi-
natur.

Venenosæ prorsus naturæ:
Erodendi, exulcerandi, colo-
remq; excitandi naturam ha-
bet.

Scarabæoli pistrinarii.

Μύλικοι,

Μυλακγίδες, μυλάγγια,

Hesych.

Σίλφαι ἀεροκοπέωρ, Diosc.

Meelkäfer/

Mühlkäfer.

Scarabæoli sunt longiuscu-
li, corniculis tenuissimis, pe-
diculis senis, totis nigris, ex-
cepta parte prona, quæ ex ob-
scuro rubescit.

Ex farina gignuntur hu-
mida, quæ conspersa inter-
dum toti albicant. In Mole-
trinis & pistrinis frequentes.

A A a 2

Scara-

*Scarabeolus Cadaverum.*Ein Aastäferlin/
Aaswürmlein.

Insectum minutissimum, vaginipenne, nigrum, per dorsum alba transversim insignitum, in Cadaveribus exiccatis, vel carnibus suffumigatis iaveteratis nascens. Quod si tangatur digito, aut alia re, Pulicis instar subsilit.

Scirifices.

Machwürmlein.

Muscae sunt minutissimae, aculeis molestae. Pecudum, anhelitum sequuntur, & homines maxime dormientes aculeis suis pungunt acriter. Hinc Nobiles & delicati retia circa lectos expandunt, ut ab iis sint immunes, & secure dormiant.

Scolopendra terrestris.

Σκολόπενδρα, Plin.

Οφιοκτόνη, Diosc. quod ictu serpentes interficiat.

Σκολοπία, Theoph.

Multipeda, Seps Norn.

Julus Millepida, Quibudam.

Ein Eisselwurm/ vulgò
Nössel/ Nassel/
Dössel/Langer Dhrwurm/
Dhrmittel.

Vermis est longiusculus, planus, gracilis, trium aut quatuor digitorum longitudine, coloris sublutei, pedibus innumeris utrinque refertus, & antennis binis longiusculis, Caudaque bifida ornatus.

Multis pedibus arcuatum, contactusque se contrahit.

Invenitur in truncis Arborum, aut in lignis supra terram locatis, aut palis terrae infixis.

Dissecta etiam in partes multo tempore vivit. Ictu tantum, venenum relinquit, cui medentur Sal cum aceto, Menthastrum, Anethum, Serpyllum, Cancrorum cinis, Scolopendra decocta & illita, Capillos evellit sec. Dioscor.

Seta aquatica.

Vitulus aquaticus,

Vermis aquaticus,

Pilus palustris ab exilitate, quod ut pilus exilis sit.

Ein Wasser Seite/

Wasser Kals.

Insectum palustre longum, instar Setae tenuissimum, cubitalis longitudinis, setae vel pilo caudae Equinae similis.

Ex

Ex pilis Equinis positis in aquis stagnantibus, vitam & spiritum concipientibus, nasci quidam crediderunt.

Haustra Homini tabem inducit, & cum cruciatu duro vitam exhaurit. Antidota sunt Centauriū minus, Gentiana, Ageratum, Gratiola, Allium.

Ante annus sex civis quidam Consularis Fridebergæ ad Qvadum fluvium, De Colicis & Nephreticis doloribus ingentissimis conqvestus, opera mea usus, tandem filum cubitum j. s. longum, instar pili aut setæ per meatum urinarium extraxit magno cum dolore: ex eo cessantibus torminibus, paulo post iterum sanitati pristinae fuit restitutus.

Spondylis.

σπονδυλῖς, Aristot.

Verticilla, Gaz.

Ein Wirbel Made/

Engertin/ vulgò.

Vermis oblongus, digitum crassus, ex Erucarum genere, Capitulo rubente, reliquo Corpore subflavente, pediculis minutissimis antrorsum utrinq; ternis,

Si tangatur bacillo, in ver-

ticilli formam convolvitur.

Pestis hortorum. In terra circa plantarum radices latet, quas aliquando totas arrodendo abluunt. Piscatores ad inescandos pisces utuntur.

Squilla fluviatilis.

Gryllus fluviatilis.

palustris.

Eine Wasser Heime/

Wasser Mûheime.

Insectum est aquaticum, tenuissima crusta instructum, longiusculum, Capite rotundo & compresso, Lentis liguminis instar. Oculi ad latera eminent bini. Cornicula tria longiuscula, subfusca prætenduntur, cum toridem appendiculis. Thorax latior ex tribus tabellis constat pallidiusculus, lineolis & punctis nigris varius, cui prona parte affinguntur pedes seni utrinq; terni, geniculis distincti. Ventrem longiorem teretem constituunt decem undecimve annuli, punctulis & circulis nigris insignes. Cauda gemino spiculo firmatur. Prona parte albet. In fluviis passim occurrit, Piscium quorundam cibus.

A A a 3

Tabanus

Tabanus.

Οἷος ὁ Arist. ab ὄω quod
est ferio.

Μύω, ἀπό μύσεος & ὠπός
quod Muscæ sit similis.

Afilus,

Eine Bräme!

Nos Bräme!

Nos Stiege.

Magnitudo ei Crabronis
ferè, at Corpore obeso & cras-
siore. Caput nigrum, in cu-
jus fronte antennæ duæ ob-
scure rubentes porriguntur.
Oculi conspicui nulli. Præ-
ter aculeum in ore, visuntur
aliæ duæ appendiculæ, quibus
res oblatas fortiter apprehen-
dit, Thorax superior fuscus,
inferior cum facie flavente
lanugine hirtus, ex quo na-
scuntur pedes sex luteoli, ni-
gricantibus extremis. Al-
vus obtusa annulosa nigricat,
circulis luteolis & notis tri-
angularibus in medio sursum
porrectis insignita. Alæ mem-
branæ sunt, coloris fumi-
gati.

Muscarum majorum genus
est Armentis infestum.

Pungit & infestat æstu.

Virgilius,

Cui nomen Afilo

Romanum est, Oestrum Graii
vertère vocantes,
Asper, acerba sonans, quo to-
ta exterrita sylvis
Diffugiunt armenta, fugit
mugitibus æther
Concussus.

Teredo.

Τερὲς ὡς ἄ terendo.

Eine HolzMade!

Vermiculus candidus mi-
nutus, ligna erodens & crum-
pens.

Teredinem sentiunt omnes
ferè arbores, præter Laricem
Evonymum & Xylosteum.

Farina seu Caries ulceribus
humidis & fluidis utiliter in-
spargitur. Sine morfu exic-
cat.

Termes.

Termus,

Eine FleischMade.

Carni recenti innascuntur
vermiculi candidi, æstivo
præsertim tempore, qui dein-
de in Barbegias transmutan-
tur.

Tinea.

Σῆψς Theoph.

σίλφαι,

τίλφαι,

Teredines

Teredines Plin.

Blattæ Nonn.

Schaben/ Motten/

NierMaden/ in Alveariis.

Vermiculi sunt albicantes minutissimi, vestes, chartas, libros &c. erodentes.

Generantur ex putredine innata, vel ex Rore aëreo, aut Papilionis excrementis. Potissimum in laneis vestibus Martarorum, Pellibus Ovi-um á Lupo demorsarum, vel etiam mortuarum.

Tineæ infestant quovis Po-
ma, Pyra, Radices, Caules
plantarum quarundam, fun-
gos Cynosbati, Gallas, & fa-
vos Apum.

Tineas abigunt amara &
odorifera, Folia Lauri, Cu-
pressi, Absinthium, Lavan-
dulæ flores, Stechados Arabi-
ci, Rosmarinus, Botrys, Le-
dum Silesiacum, Asarum,
Mentha græca, Scordium, Iris
odorata, Mala Citria, Cydo-
nia & similia. Libri præca-
ventur, si aq. Aluminosa aut
Nitri abluta exsiccentur.

Tinea aquatica.

Scrofulæ aquaticæ.

Aselli aquatici.

Pediculi aquatici,

Wasser Schaben/

WasserMaden/

Scabyfen/ Gynen.

Bestiolæ sunt fontium per-
parvæ, albicantes. Pedicel-
lis nituntur continuis, per to-
tius ferè Corporis alvum. Ab
ore etiam veluti pediculi pro-
minent. Cauda oblonga in
aculeum definit. Oculi sunt
perexilia puncta alba, cum
centro nigro longè minutissi-
mo.

In fontibus reperiuntur, ac
puteis bonis & frigidis dun-
taxat, præsertim Martio seu
Aprili. In aqua moventur &
currunt, Corpore non recto
& æquali, sed in alterum
latus inclinato. Conglobari
convolviq; quasi in arena
solent.

Periculosa sunt iis qui
hauserunt, ita ut & in sum-
mum vitæ discrimen redi-
gantur, tumorem in ventre
excitant, nec non scrophulas,
quas á Regibus Anglorum &
Gallorum solo contactu cu-
rari ajunt, pariunt.

His medentur Clysteres e-
mollientes & abstergentes,

Vini potus copiosior.

Lac, Serum Lactis.

Butyrum

Butyrum, Oleum commune Amygdalinum.

Theriaca, Methridatium.

Theriaca Diatesaron,

Polypodium Allium, &c.

Tipula aquatica.

Tabula,

Aranea aquatica Alb. Mag.

Tipulla,

Eine Wasser Spinne.

Insectum est parvum aquaticum, levissimum, colore Aranei obsoleto, cætera Scarabæo similior, corpore compresso. Capitulo minuto duæ forpiculæ adnatæ extrorsum reflexæ viam prætentant. Ocelli prominent bini, Pro alis sunt membranulæ duæ tenuiores, quas tegunt duriores fuscæ. Cauda gemino spiculo sed imbelli armatur. Per Ventris mediam longitudinem excurrit linea nigra, cum splendore, Crusculis utrinq; ternis prioribus, brevioribus, posteriorum ad Corpus proportionem sesquialtera, mira celeritate aquæ superficiem sicco pede permeat & trajicit, ac si terram ipsam obambularer.

Æstate in palustribus & aquis residibus occurrit.

Thrips.

Θρίψ, Τρώλινξ Theoph.

Ein-Hols Wurm/

Hols-Mücke.

Insectum Culici simile, quod in lignis natum materiam, paulatim perforat & erodit, secundum illud:

Ipes, Gesatq; Tripes,
Ies, Sies Midasq; habent suos.

Ips vineas & Cornua,
Frumenta Cis, Trips arbores,

Is vitra, Sis velamina,
Fabas Midas arrodere solent:

Nil minus sic & a quibus
Iniquam ferant gratiam,
Consul, Magister & Parens,
Tutor, Patronus & Herus.

Trox.

Τρώξ.

Vermis ex Tinearum genere, qui Legumina arrodit.

Vespa.

Σφήξ Arist.

Eine Wespe/

Gemeine Wespe.

ῥωρ δημοιορ μελισση.

Vespa

Vespa major.

Eine grosse Wespe.

Insectum est longiusculum gracile Api ferè simile, aculeatum, Capite longiore, rostellum, antennis supra Oculos nigricantibus. Thorax hirtiusculus nigricat, juxta Alarum exortum maculis luteis conspersus. Venter longior in acutum desinit, & cum splendore flaver, quem cingunt nigræ annulares lineæ, quæ supernè notis quibusdam triangularibus in medio Dorsum versus, punctisq; ad latera similis coloris distinguuntur. Cruscula flava sunt, asperiuscula extremitatibus. Alæ ferruginei coloris.

Vespa *μεγίστη* Vesparia, Vespeta seu nidos suos in arboribus, & tectis figunt: nonnunquam in Arboribus cavis aliquando sub terra nidificant, terram ut Formicæ egerentes. Gellis sexangulis favos extruunt omnes, ut Apes, sed ex materia corticea quadam & araneosa, initio facta à radicum fibrillis, quibus artificiosè nidum appendunt. Foetura modo Apum instillant, ad latus Cellarum favi, & parietibus admovent, Ve-

rùm non in omnibus inest æqualis foetus, sed taliis jam grandiusculus, ut vel queat volare, aliis in Nympha est, aliis adhuc in vermiculo. *Μεγίστη* Arist. Matrix seu Dux, (femina Vesparum VI. Aldr.) latior est, ponderosior, crassior & robustior quàm Vespa, rarò evolans, semper in Vespario sedet, effingens favos, & munere fungens cellario. Aculeum quidem gerit, sed non extrahit, aut ferit, quod aliquoties effosso integro Vesperto diligenter exploravi. Operariæ seu Opifices minores sunt. Ætas annum non complet, sed omnes hyeme invalescente moriuntur. Hyeme enim incipiente stupescunt, bruma autem nullæ omnino apparent.

Duces, ubi sibi jam locum opportunum delegerunt, favos opere æstivo confingunt, & Vespeta ceu cellulas parvas & quævis dictas constituunt, quaternis foriculis aut propè, in quibus Vespa non Matrices nascuntur, quæ cum increverint, rursus altera ampliora effingunt, quorum item proles cum creverit, alia faciunt, ita ut postremo Autumno plurima amplissi-

B B b b maq;

maq; Vespera condita habentur, in quibus Dux, quæ Matrix vocata est, non insuper Vespas sed Matrices jam procreat; quæ quidem supernè per summa Vesperti, Vermium specie, multo grandiora gignuntur, in cellulis continuatis quatuor numero, aut paulo pluribus: alioqui incrementi ratio. Ducibus eadem quæ Vespis est.

Temporibus siccis locisq; asperis potius oriuntur, & melius proficiunt quam humidis & pluviosis. Cibum ex floribus & fructibus petunt. Cupediosæ admodum sunt, & ad culinam, pisces, carnes putridas, & alias huiusmodi delicias advolant.

Apibus admodum molestæ sunt. Cum nec Ceram nec Mel fingant, hyeme pabuli defectu moriuntur. Singulari proprietate contra Quarantanam laudantur Vespæ.

Vespa minor.

Kleine Wespe.

Tota est minor priori, Corpore graciliore, alvo medioeris longitudinis, quæ flavo & nigro colore alternatim distinguitur, Pedes & anten-

næ longæ valde tenues flaventes. Alæ coloris fumigati.

Nidum ad parietes, fenestras & arbores suspendunt, frequentissimæ in hisce montanis.

Volvox.

Idem, i. Plin.

Volucra Columel.

Involvulus, Convolvulus.

Vermis est, qui vites arrodit, gemmantiaq; vitium germina, ex Austrina Cœli constitutione, putrescente in vitibus humore superfluo, & excrementitio nascitur.

Xylophthorus.

Ξυλοφθόρος Arist.

Phryganium Bell. & Gesn. quod phryganis seu thecis hæreat.

Ligniperda aquatica Vlyss. Aldrov.

Tinea tunicas trahens Plin.

Ein HolzWurm/

Kärder, Kärderle/

Vermis est oblongus ex Eruucarum seu Tinearum genere, coloris cinerei, thecula oblonga festucacea inclusus. Caput, antennis duabus brevibus, & pedibus senis, putamine

mine suo exerit varium: reliqua pars, alvus nimirum oblongus intus conditur, supra infraque cirris albicantibus hirsutus, quibus thecæ suæ adeo tenaciter adhæret, ut vix evelli vix queat. Hanc secum dum ambulat trahit.

In Chrysalidem abit ac tandem in papilionem, ut Erucae quædam. In putridis lignis, fluviis appositis aut immerfis nascitur.

Piscatores hos legunt, ad Piscees inescandos, quos avidissime appetunt.

Hæc de Insectis obiter annotasse sufficiant, quorum singulas species si quis enumerare se posse putet, operam luserit; cum ne verbis quidem exprimi possint. Non dum enim inventus fuit, quæ Dei sapientiam & potentiam satis unquam pro dignitate admirari aut commemorare potuisset. Nusquam sanè magis tota Natura est, quàm in minimis, nusquam spectatius, quàm in Insectis, Naturæ artificium est.

Psal. 148. v. 7. & 10.

Laudate Jehovah Bestiæ, & universa pecora, serpentes & volucres pennatæ, omnes Cete & omnes abyssi.

Psal. 150. v. 5.

Omnis Spiritus laudet Dominum cui soli laus & gloria in seculum.

B B b b z

Charta

Chartâ nonâ, quæ notata est literâ I. paginæ 69. & 70. inter-
ferenda hæc integra pagina est, quæ Syllabothetæ per incuri-
am inter exputandum omissa erat:

Præstantissimus & suaviss.
in cibo, Stomacho minimè
noxius, aliisq; omnibus caseis
concoctu transituq; facilior,
succum non habens vitiosum,
neq; usq; adeo crassum, Gal. 3.
alim. facult.

Bojemi addere solent bu-
tyrum & aromatibus condi-
unt, sacculisq; teretibus ob-
longis recondunt, vulgò
Smettas vocant, saporis qui-
dem non ingratis, at minus
salubres.

Serum Lactis ὀξὺς γά-
λατος Diof.

Ὀξόγαλα Hesych. Molken
Sil. Râfswasser.

Lactis est aquosa substan-
tia, quæ à Mulierculis, dum
Caseos parant, ex lacte se-
paratur.

Edulium Pauperum, qui-
bus res angusta domi.

Calefacit & siccit primo ad
adm. gradû. Attenuat, abluir,
abstergit, & nitrosa faculta-
te alvum absq; aliqua mor-
dacitate (addito Melle & sa-
le) tenuiter subducit. Bilem
utramq; ab exustis humori-
bus genitam dejicit. Unde
confert Maniacis & Melan-
cholicis, præstat ad viscerum

infarctus, & Morbis inde
provenientibus opitulatur:
nonnunquam aqua intercu-
te laborantibus, felle suffu-
sis & Lienosis. Datur utiliter
febrientibus ex bile, & visce-
rum ac vasorum obstructio-
nibus. Competit etiamnum
vitiis in cute à bile & perustis
humoribus emergentibus.

Quare Lichenib; vitiliginib;
Alphis, Pforis, Leprisq; admo-
dum convenit. Comitialibus
quoq; & iis, qui ob potentis
vini largiorem potum malè
habent, auxilium præstat.

Fimus Bovis, Stercus
bubulum. Lætamen,

Βολεῶν, ὀνδοῦ βοός,

Βολειτόν,

Rühmist/ Rühsladen.

Rühdrech.

Exiccantis, attrahentis est
facultatis & digerentis, si pa-
leis vescantur. Vnde aqua in-
tercute laborantibus illinitur.
Recens dum viridi herba pa-
scuntur, vulnerum inflammatio-
nes mitigat, Podagras lenit,
Coxendicis cruciatus fotu cõ-
pescit. Illit ex aceto, duritias,
Panos & strumas discutit. A-
pum Vespariûq; morsus juvat.

Sequitur

Hoc circum &c,

Errata graviora sic reponito.

In præfatione pag. 3. l. 10. lege sopore : p. 6. l. i. singularum :
 p. 9. l. 3. fensu p. 2. columna b. linea 4. habuerunt : p. 4. c. b. l. 29. Ca-
 rasos : p. 6. c. a. l. 20. Aper : p. 7. c. b. l. 27. Taxus : p. 12. c. a. l. durius Adi-
 pe : p. 15. c. a. l. 17. Cani : Ex pluribus compactis : p. 18. c. b. l. 12. supe-
 rius : p. 19. c. a. l. 17. πλάκτες : p. 20. c. b. l. 27. Anseri : p. 21. c. a. l. 10.
 σάκκωτες : c. b. l. 25. elicitur, l. ult. inter femina : p. 22. c. a. l. 22. Extra. c.
 b. l. 25. cartilaginis : p. 23. c. a. l. 15. abundantiore : c. b. l. 4. Diaphra-
 gma : p. 24. c. a. l. i. Vesicula : p. 34. c. a. l. 7. providit : p. 35. c. b. l. 9.
 Carnes. p. 39. c. a. l. 29. paratur oleum : p. 41. c. a. l. 14. Brutis : p. 48. c. a.
 l. 22. fronte. c. b. l. 19. Cornigeris, l. 20. Hæc : p. 50. c. a. l. 17. acris. p.
 52. c. a. l. 3. inserviunt : p. 53. c. a. l. 12. Bifons : p. 58. c. b. l. 20. fit : p. 62.
 c. b. l. 15. Hodie : p. 63. c. a. l. 4. Myrtino : p. 66. c. a. l. 23. Laureola.
 p. 67. c. b. l. 20. devoratum, p. 68. c. b. l. 5. Fiunt hic Casei : p. 69. c. b. l.
 35. Carveos : p. 72. c. a. l. 12. Lanii quidam imperiti : p. 78. c. b. l. 33.
 excrementitium : p. 82. c. a. l. 17. ἐλάφιον κρέας 92. c. a. l. 10. Hunc :
 93. c. a. l. 4. Hippomanes, 94. c. b. l. 31. Bartham : 95. c. a. l. 24. Convul-
 sis utilis : c. b. l. penult. Cachecticis & l. ult. Nephreticis : 97. c. b. l. 28.
 inimica : 107. c. b. l. 16. extincti : 116. c. b. l. 6. Eine Hasel Nias vul-
 gó. Ein Wasd Nias : 117. c. a. l. 12. longos : 121. c. a. l. 20. albedo : 127.
 c. a. l. 17. latæ. c. b. l. 27. qvæ : 131. c. b. l. i. Nares nigræ : l. 23. Limax do-
 miporta Ciceroni : 143. c. a. l. 8. uncis : 144. c. b. l. i. nuda Plin. Coch-
 lea testa seu domuncula carens. Limax rufa seu fusca. l. 11. Ob-
 longæ sunt. Cornicula é capite exeunt quatuor, quibus iter præ-
 tendunt. 145. c. a. l. 4. Limacius lapis, Officulum Limacum Plin.
 Schneckenstein. In Capite Limacis quidam generari arbitrantur
 lapidem subalbidum & modicé transparentem, nonnihil com-
 pressum. Adversus Tertianas febres adalligatur, & Capitis do-
 lori remedio est : 146. c. b. l. ult. Gillius : 147. c. b. l. 26. Acrochor-
 donas : 148. c. a. l. 15. fuscus c. b. l. 12. exuit. 150. c. a. l. 2. asperitate. l.
 3. ἔχρη : 153. c. a. l. 15. διοπτρίαι : 155. c. b. l. 8. timores : 156. c. a. l. 15.
 extenuatis : 157. c. a. l. 24. fugillata : 160. c. a. l. 6. rigidioribus : 161.
 c. a. l. 5. invita l. 6. profusio. 164. c. a. l. 28. Refina. l. 31. pinei : 165. c. a. l.
 4. resperfa. c. b. l. 18. Viadus & Bartha : 166. c. b. l. 8. cubitali. 170. c. b. l.
 14. Alcyoni : 171. c. b. l. 17. cuspides l. 24. Corvo. 30. Milvo, Turdo
 aquatico. 174. c. a. l. 22. brevis : 178. c. a. l. 18. Tepidiora : 185. c. a. l. 28.
 gallina aut, 190. c. a. l. 28. Iris cærulea. c. b. l. 15. Galeritas & Corur-
 nices

B B b b 3

nices

nices: 192. c. b. l. 3. offertur: 193. Inferatur col. b. l. 15. Alaudæ cano-
 ræ ferè similis, nisi quòd minor sit. Rostrum simile, rectum, a-
 cutum fuscum superius, inferius albicat. Dorsum cinereum, ma-
 culis nigris varium, emicante rubedine lateritia. Crista fusca est,
 lineolis rufis intercisa, quam posteriore parte ambit circulus mo-
 dicè albicans, qui ad Oculos desinit colore obscurè castaneo.
 Alarum remiges, majores & cauda fusca sunt. Vere & æstate ca-
 cuminibus arborum insidet cantillans. Ungvis in calce cæteris;
 ut in canora, longior: 204. c. a. l. ult. alba Gesn: 209. c. a. l. 31. Pi-
 cæ: 219. c. a. l. 21. conclusa, c. b. l. 8. Columba: 221. c. a. l. 2. quædam:
 224. c. b. l. 17. territorii Leobergensis, 225. c. a. l. 10. phæopi: 232. c. a. l.
 28. pueas, 237. c. a. l. 27. cibum: 240. c. a. l. 5. nivei. 242. c. b. l. 8. Aldro-
 vandus: 243. c. b. l. 2. Nassefregel: 249. c. b. l. 8. fine & Septembri: 250.
 c. a. l. ult. Phil. Jacobi: c. b. l. ult. ubicunq;: 251. c. b. l. 8. totum ramu-
 sculum: 252. c. b. l. 28. griseum: 254. c. b. l. 5. fortè: 255. c. a. l. 11. dex-
 trorsum. c. b. l. 1. majore 258. c. a. l. 1. fegopyro 261. c. a. l. 27. rufa, l. 30.
 ex cæruleo fuscum aduncum. c. b. l. 18. incurvi. Digni singuli pro-
 pe ungvium exortum appendiculis flaventibus donantur: 263. c.
 b. l. 18. macula: 271. c. b. l. 28. vel cum aceto. l. 29. salubria sunt, faci-
 le digeruntur, & bonum succum procreant: 274. c. b. l. 15. Ova far-
 ca: 275. c. a. l. 15. Opali: 278. c. a. l. 12. quædam. l. 13. ceu. 281.
 c. b. l. 12. Coturnicis. l. 16. pygolampidibus. 287. c. a. l. ult. perungun-
 tur: 292. c. a. l. 6. propior, 293. c. a. l. 16. aterrimis, 295. c. a. l. 2. minor:
 298. c. a. l. 30. nummo: 299. c. b. l. 11. antidoto, 303. c. b. l. 24. ternos: 309.
 c. a. l. 31. saturè. l. 32. pupilla, 310. c. b. l. 20. fit, 311. c. a. l. 21. herbas, 312. c.
 a. l. 9. sacci. c. b. l. 20. ex. 313. c. b. l. 7. fænisecæ. 317. c. a. l. 2. Pardalus: 318.
 c. a. l. 13. tabe: 320. c. a. l. 21. ornatur 322. c. a. l. 3. salacitatem: 330. c. b. l.
 20. Stoparola: 331. c. b. l. 1. Aristoph. 332. c. b. l. 17. affectibus opitula-
 tur. 338. c. a. l. 24. Cornice: 339. c. b. l. 24. bicuspides, 342. c. b. l. 17. Sei-
 lan. 343. c. b. l. 35. Αιγυπτος: 344. c. a. l. 22. insigni: 345. c. a. l. 21. pedicu-
 li: 346. c. a. l. 13. nucis: 348. c. a. l. 19. nitet, Auditorii meatus ampli ad-
 modum: 351. c. b. l. 6. Spreche: 354. c. a. l. 29. igitur. l. 30. fiunt Nenia,
 quæ in volucres falsa figurat anus & c. 356. c. b. l. 18. Alanda paulè
 major, palmum: 357. c. b. l. 22. cristæ: 360. c. a. l. 28. versus. c. b. l. 19.
 prolicet. l. 33. λευκοκέφαλος: 361. c. b. l. 2. hyemis. l. 21. Strep Dressel:
 363. c. a. l. 15. El. 364. c. b. l. 25. γελασικός: 367. c. b. l. 8. rævum. l. 11. vari-
 us, 368. c. a. l. 1. Pinnula. l. 12. singuli, c. b. l. 7. Nans Ent: 369. c. a. l. 11.
 falcatum,

falcatum, c. b. l. 3. Curtillis. 372. c. a. l. 10. aperta: 379. c. a. l. 1. A mia.
 381. c. b. l. 1. subterraneisq; 383. c. b. l. 2. 385. c. a. l. 10. Pastina-
 ca. l. 29. Leuciscus. l. ult. referto aculeis. Aculeati pisces Stachel-
 Fische, cujus generis sunt. c. b. l. 19. testam habent: 392. c. a. l. 31. 393.
 guyxor: 393. c. b. l. 6. Lingva. l. 7. Gulas Rana piscatrix. 394. c. a. l. 16.
 tinca. l. 23. ac. 396. c. a. l. 18. coagulato: 402. c. a. l. 12. seminis 403. c. a.
 l. 1. favaginem: 406. c. a. l. 10. 397. guyxor: 414. c. a. l. 12. pinna. c. b. l. 9.
 parit, & Majol. 11. memorant: 415. c. b. l. 4. vescuntur: 425. c. a. l. 12. se-
 tas. 426. c. a. l. 21. sale: 428. c. a. l. 27. Fius Karpffen: 432. c. b. l. 14. Mar-
 tio: 436. c. b. l. 1. faburram: 443. c. a. l. 29. varium: 448. c. a. l. 16. de-
 gat. l. 20. limosis familiaris: 450. c. b. l. 9. conditi. 452. c. b. l. 9. infe-
 statis: 454. c. b. l. 15. vectura: 455. c. a. l. 10. Fungus. l. penult. 457.
 717. c. b. l. 11. habent: 458. c. a. l. 21. Dracunculi: 465. c. a. l. 28. at. c. l.
 l. 23. strictis. 471. c. a. l. 26. Cruribus. 477. c. b. l. 16. Genista: 490. c. a. l.
 12. minim6: 494. c. b. l. 15. recondit. 498. c. a. l. 5. Cichoracea: 501. c. a.
 l. 9. Impetiginem. l. 10. caliginem. c. b. l. 15. Mercurialis. l. 27. intru-
 duntur: 505. c. b. l. 6. quidam: 508. c. a. l. 16. SpinnWab: c. b. l. 23. ex-
 acerbationes: 512. c. a. l. 27. Larva papilionea: 513. c. a. l. 12. tanta: 520.
 c. b. l. 10. transversas.



LIGNICII

IMPRIMEBAT NICOLAUS
 SARTORIUS.

Anno C. MDCIIII.


* *


568


Handwritten text in a medieval script, likely Latin, covering the upper half of the page. The text is arranged in several lines and is somewhat faded and stained.


FIGURAE
LIBRI
COLUMBARI


LIBRI
COLUMBARI














005643835

12